







ANNALES

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON.

**ANNALES**

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**

**DE LYON.**



LYON.

IMPRIMERIE DE V. LEBLANC, LIBRAIRE,  
rue de la République - 20.

Paris — Imprimerie de la Bibliothèque nationale — 1874



CHATELAIN

DE LA

5.89/6.

SOCIÉTÉ ANONYME

DE LYON

**ANNALES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**  
**DE LYON.**

---

*Année 1856.*

---

( NOUVELLE SÉRIE. )

---

**TOME TROISIÈME.**



**LYON.**

IMPRIMERIE DE F. DUMOULIN, LIBRAIRE,  
rue Centrale-St-Pierre , 20.

---

1856.







# TABLEAU

DES

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

PENDANT L'ANNÉE 1856.

---

## BUREAU :

M. VAÏSSE (C. ✱) Sénateur, chargé de l'administration du département du Rhône, *président d'honneur*.

MM. PERROUD, *président*.

MULSANT, *vice-président*.

GACOGNE, *secrétaire général*.

MILLIÈRE, *archiviste*.

MALMAZET, *trésorier*.

## Conservateurs.

MM. CLEMENÇON, *pour la minéralogie*.

ROLLET, *pour la botanique*.

TERVER, *pour la zoologie*.

AUNIER, *bibliothécaire*.

HOFFET, *bibliothécaire adjoint*.


## Membres titulaires.

MM.

1822. Aunier (Noël-Antoine), rue Pizay, 5.

Lacène (Antoine), place Bellecour, 20.

1824. Dugas ✱ (Thomas), rue du Pérat, 12.

1825. Clemençon (le docteur Toussaint), cours Morand, 7.
1829. Seringe (le docteur Nicolas-Charles), directeur du Jardin-des-Plantes, professeur à la Faculté.
1833. Mulsant (Etienne), sous-bibliothécaire de la ville, professeur d'histoire naturelle au Lycée, port Neuville, 25.
1836. Hoffet, cours Morand, 20.
1839. Gérard (le docteur Jean-Antoine), rue Clermont, 5.
1841. Madenis (l'abbé Claude-Benoît), professeur au petit Séminaire des Minimes.
1845. Jordan (Alexis), rue de l'Arbre-Sec, 44.  
Pontbriant (de), ancien chef de division à la Prefecture, route de Villeurbane, 27.  
Gacogne Alphonse, rue d'Algérie, 2.
1846. Dugas (Ozippe), rue du Pérat, 12.  
Perroud (Benoît-Philibert), rue St-Pierre, 23.  
Beckensteiner (Christophe), rue St-Pierre, 12.  
Levrat (Gustave), rue Madame, 40.  
Millière (Pierre), rue Grenette, 21.  
Gaillard (Fleury), place Bellecour, 9.
1847. Vernange (l'abbé Martin), professeur à la Faculté de théologie, au Lycée.  
Galliard (Léon), place Bellecour, 35.
1848. Terver (Ange-Paulin), quai Pierre-Seize, 52.  
Ponson (Philippe), négociant, quai St-Clair, 2.
1849. Vincent  (l'abbé Jean-Baptiste), inspecteur général des Ecoles primaires.
1850. Thiollière (Victor), géologue, directeur de l'assurance mutuelle, rue St-Dominique, 15.
1854. Philippon (Marius), quai de la Baleine, 6.  
Forest (Jules), négociant, quai St-Clair, 3.  
Blanchon (Aimé), rue de Bourbon, 51.  
Blanchon (Louis), quai St-Vincent, 29.  
Dumortier (Eugène), négociant, rue Constantine, 12.  
Malmazet (Jean-André), négociant, place de la Comédie, 25.  
Navier (Hippolyte), cours d'Herbouville, 1.  
Choitel (l'abbé), quai Fulchiron, 6.

- Cazenove (Raoul de), rue de Jarente, 16.  
 Mouterde (Louis), rue Madame, 34.  
 Thiollière (Louis), ingénieur des ponts et chaussées, place de la Charité, 5.  
 Fayard, pharmacien, place des Terreaux, angle de la rue Clermont.  
 Chardiny (Louis), port St-Clair, 18.  
 Boffard (Claudius), petite rue Mercière, 4.  
 Bouchet (Albert), place Bellecour, 6.  
 1855. Mayet (Octave), port Neuville, 26.  
 Polaillon (Benjamin), quai St-Benoît, 30.  
 Chavanis (Amedée), quai de l'Archevêché, 3.  
 Reissier (Philibert), rue de Bourbon, 7.  
 Guinon ✻, rue de Condé, 2.  
 Carrier (le docteur), rue St-Dominique, 13.  
 Mangini (Lucien), ingénieur, rue de Bourbon, 38.  
 Brolemann (Arthur), négociant, rue des Feuillants, 1.  
 Martin (François), négociant, petite rue Mersière, 22.  
 Levrat-Perrotton (Francisque), rue Grenette, 22.  
 Rollet, rue Flesselle, 24.  
 Coinde (Paul), rue Ste-Elisabeth, 37.  
 Richoud (l'abbé), professeur au séminaire des Minimes.  
 Jaricot (Ernest), négociant, place de la Comédie.  
 Sérulas (Léon), rue Ste-Catherine, 17.  
 1856. Pallias (Honoré), rue Centrale, 65.  
 Blanc (James), place Bellecour, 25.  
 Gabillot (Joseph), place de la Platière, 2.  
 Bizot (Jules), place de la Charité, 5.  
 Vernier (Louis), rue de Bourbon, 47.  
 Deriard (Auguste), quai de Retz, 47.  
 Rodet, professeur à l'Ecole vétérinaire.  
 Thevenet (l'abbé), vicaire à Ainay.  
 Flotard (Eugène), rue de Bourbon, 7.  
 Monterrat (Amedée), propriétaire, rue Royale, 29.  
 Guichon, pharmacien, place St-Nizier.  
 Arlès-Dufour (Gustave), négociant, port St-Clair.

Morin (Henri), banquier, rue des Feuillants, 9.  
 Vachon, négociant, quai St-Vincent, 39.  
 Royé-Vial, négociant, rue Fromagerie, 1.  
 Poncin (Henri-Athanase), chef d'institution, place du Collège, 4.  
 Hasse (Frédéric), négociant, quai d'Orléans.  
 Péaud, (Aimé), ancien magistrat, propriétaire à St-Cyr-au-Mont-d'Or.  
 Magaud (Adolphe), quai de la Charité, 25.  
 Vézu, pharmacien, aux Brotteaux.  
 Girodon (l'abbé), professeur à la Faculté de théologie.  
 Chamberet (Ernest de), Directeur de l'Ecole de la Martinière.  
 Pelletier (Jean-Baptiste), pharmacien, rue Clermont, 16.  
 Rambaud (André), rentier quai des Augustins, 61.  
 Saint-Didier (de), propriétaire, rue Vaubecour, 19.  
 Duport (Pedro), quai de la Charité, 23.  
 Surieux (l'abbé), supérieur du petit Séminaire de St-Jean.  
 Ozanon (Charles), rentier, place Louis XVI, 14.  
 Rater (Arthur), rue du Pérat, 3.

**Membre titulaire** décédé en 1856.

M.

Timeroy, rue St-Jean, 18, décédé le 13 novembre 1856.

**Membre titulaire,**

*devenu correspondant par changement de résidence.*

M.

Pravaz (Théodore).

**Membres correspondants**

*Nommés depuis le 1<sup>er</sup> janvier jusqu'à la fin de décembre 1856.*

MM.

Dreschler (Adolphe), naturaliste à Dresde.  
 Guirao, naturaliste à Madrid.  
 Terver (le docteur Pierre), naturaliste à Ecully.



Déséglise (Alfred), naturaliste à Graire, près Mehun-sur-Yèvre ( Cher ).

Baldanus (Edouard), pasteur à Diebzig près Keutten ( duché d'Anhalt ).

Krauss (le docteur), naturaliste à Stuttgart.

Heeger (le docteur Ernest), de Vienne (Autriche).

Puccinelli (Benoît), professeur à Lucques.

Borelli (Hippolyte), professeur à Lucques.

Fischer de Waldheim (Alexandre), vice-président de la Société des naturalistes de Moscou.

Ingo (le docteur Vincent), naturaliste à Caltagirone (Sicile).

Taranto (Emmanuel), professeur à Caltagirone (Sicile).

Sava (Robert), naturaliste sicilien.

Marschall (le comte), naturaliste à Vienne (Autriche).

---



## TABLE DES MATIÈRES.

---

Constitution d'un nouveau genre détaché du genre <i>Trogophilæus</i> (famille des Brachélytres), par E. MULSANT et CL. REY. Page	1
Description d'une espèce nouvelle du genre <i>Plegaderus</i> (famille des Histérides) par E. MULSANT et CL. REY. . . . .	5
Description d'un Coléoptère inédit constituant un genre nouveau voisin du genre <i>Pseudopsis</i> (famille des Brachélytres) par E. MULSANT et CL. REY. . . . .	7
Description d'une espèce nouvelle du genre <i>Chrysomela</i> par E. MULSANT . . . . .	12
Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Latigènes, par E. MULSANT et CL. REY. . . . .	15
Notes relatives à quelques insectes Coléoptères de la tribu des Pectinipèdes par E. MULSANT. . . . .	17
Description de quelques Elatérides nouveaux ou peu connus par E. MULSANT et GUILLEBEAU. . . . .	60
Notes pour servir à l'histoire de l' <i>Amphimallus marginatus</i> par E. MULSANT et VALÉRY MAYET. . . . .	100
Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère de la tribu des Longicornes par E. MULSANT et GUILLEBEAU . . . . .	105
Description d'une espèce nouvelle de Coléoptère du genre <i>Orchesia</i> par E. MULSANT et GODART. . . . .	108
Description d'une nouvelle espèce de Coléoptère du genre <i>Bostrichus</i> par E. MULSANT et CL. REY. . . . .	111

Notes pour servir à l'histoire de l' <i>Agnathus decoratus</i> par E. MULSANT et CL. REY . . . . .	114
Description de quelques Hémiptères-Hétéroptères nouveaux ou peu connus par E. MULSANT et CL. REY. . . . .	119
Description de la larve de l' <i>Elenophorus collaris</i> , Coléoptère de la tribu des Latigènes par E. MULSANT et V. MULSANT. . . . .	133
Additions et rectifications au tableau des Coccinellides publié en 1853 par E. MULSANT. . . . .	135
Description d'une nouvelle espèce de Longicorne, constituant un nouveau genre dans cette tribu de Coléoptères par E. MULSANT. . . . .	157
Description de deux nouvelles espèces de Coléoptères constituant un genre nouveau dans la famille des Ulomiens par P. PERROUD et E. MULSANT. . . . .	160
Additions et observations relatives à la monographie des Palpicornes par E. MULSANT . . . . .	166
Notice sur J. T. Doublier par E. MULSANT. . . . .	175
Description des deux nouvelles espèces d'Oiseaux-Mouches par J. BOURCIER et E. MULSANT. . . . .	187
Description de la larve du <i>Ludius ferrugineus</i> par E. MULSANT et GUILLEBEAU. . . . .	190
Histoire des Coléoptères de France par E. MULSANT.	
— — — — — Barbipalpes. . . . .	193
— — — — — Longipèdes. . . . .	305
— — — — — Latipennes. . . . .	473
— — — — — Latigènes, supplément . . . . .	520
Histoire des Métamorphoses de l' <i>Acidalia asbestaria</i> , par P. MILLIERE. . . . .	523



CONSTITUTION D'UN GENRE NOUVEAU  
DETACHE DU GENRE **TROGOPHILUS**

( FAMILLE DES BRACHÉLYTRES ),

PAR

**E. MULSANT et Cl. REY.**

(Mémoire lu à la Société Linnéenne de Lyon, le 10 décembre 1855.)

---

GENRE **OCHTHEPHILUS**.

(*οχθη*, rivage, *φιλος*, ami).

*Corpus* elongatum, depressum.

*Palpi maxillares* articulo ultimo conico, attenuato.

*Antennæ* apice sensim crassiores.

*Pedes* mediocres, basi approximati.

*Tibiæ* muticæ, pubescentes.

*Tarsi* breves, triarticulati.

*Corps* allongé, sublinéaire, déprimé.

*Tête* assez saillante ; légèrement inclinée ; subtriangulaire ; faiblement resserrée à la base ; séparée du prothorax par une espèce de cou.

*Yeux* sémiglobuleux, assez gros et assez saillants.

*Labre* transversal ; sinueux et cilié à son bord antérieur.

*Mandibules* peu saillantes ; bidentées à leur extrémité.

*Palpes maxillaires* assez grands ; à dernier article en cône atténué au sommet.

*Menton* transversal ; largement mais faiblement échancré en avant.

*Antennes* graduellement plus épaisses à leur extrémité ; à premier article assez grand, allongé : les deuxième et troisième

beaucoup plus longs que les suivants : les intermédiaires submoniliformes : les quatre derniers un peu plus épais que les précédents, ou transversaux, ou guère plus longs que larges : le dernier ovulaire.

*Prothorax* plus ou moins rétréci en arrière, plus ou moins transversal, plus ou moins tronqué à la base et au sommet.

*Écusson* assez grand ; en triangle transversal.

*Élytres* en carré long, tronquées au sommet, arrondies aux angles postéro-externes.

*Abdomen* sublinéaire ; de six segments : le dernier très-petit, tronqué au sommet.

*Dessous du corps* assez convexe.

*Pieds* médiocrement allongés ; rapprochés à leur base.

*Tibias* non spinosules, mais pubescents.

*Tarses* courts ; de trois articles : les deux premiers très-courts : le dernier deux fois plus long que les deux précédents réunis.

Obs. Ce genre diffère du *G. Trogophloeus*, par la conformation du dernier article des palpes maxillaires, qui est en cône atténué, au lieu d'être en alène. On peut y joindre deux espèces décrites par Eriehson, et qui présentent ce même caractère, savoir : *Tr. omalinus* et *Tr. angustatus* (Genera et species Staphylinorum, pages 802 et 805).

### **Ochtheophilus flexuosus.**

*Elongatus, depressus, parvè luteo-pubescent, nitidulus, piceus, capite abdomineque obscurioribus ; antennis rufo-ferrugineis, pedibus piceo-testaceis. Elytris grossè parvèque punctatis, thorace tertîa parte longioribus ; hoc basi subcarinato, utrinquè obliquè fortiùs impresso, lateribus post medium dentato-flexuosis.* (Pl. fig. 3).

Long. 0<sup>m</sup>,0036 (1 l. 2/3).

*Corps* allongé, assez déprimé ; brillant ; d'une couleur de poix,

ordinairement plus claire sur le prothorax et plus obscure sur la tête et l'abdomen ; couvert de poils courts, brillants, jaunâtres, couchés et peu serrés.

*Tête* subtriangulaire ; un peu plus étroite que le prothorax ; assez convexe ; d'un noir de poix brillant, avec les parties de la bouche d'un roux testacé ; creusée entre les antennes de deux sillons assez larges, parallèles, se terminant sur le front par deux petites fossettes peu apparentes ; assez fortement ponctuée dans le fond et autour de ces sillons, ainsi que derrière les yeux ; couverte de quelques rares poils jaunâtres transversalement ou obliquement couchés de dehors en dedans, et ciliée derrière les yeux de deux ou trois longs poils obscurs. *Cou* très-finement chagriné ; brillant ; d'un noir de poix.

*Antennes* un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; graduellement plus épaisses à l'extrémité ; pubescentes ; d'un roux ferrugineux, avec les deux ou trois premiers articles un peu plus clairs : le premier assez gros, en massue oblongue ; le deuxième subcylindrique, plus grêle et d'une moitié plus court que le précédent ; le troisième en massue allongée, plus long que le deuxième ; les quatrième à septième submoniliformes ; les huitième à dixième légèrement transversaux ; le dernier ovulaire.

*Prothorax* près d'un tiers moins large que les élytres ; un peu plus court que large ; sensiblement rétréci en arrière ; très-faiblement subbissineusement tronqué à la base et au sommet : à angles postérieurs droits ; les antérieurs infléchis, obtus et légèrement arrondis au sommet ; les côtés assez fortement arrondis en avant, et présentant vers les deux tiers postérieurs une petite dilatation dentiforme ; faiblement convexe ; d'une couleur de poix ferrugineuse, brillante ; garni de quelques poils jaunâtres, courts, couchés obliquement ou en travers ; chargé d'une carène longitudinale, obsolète, se prolongeant en avant un peu au-delà du milieu ; marqué à la base, de chaque côté, d'une impression

oblique assez forte, et d'une autre beaucoup plus petite, ovale, de chaque côté de l'extrémité antérieure de la carène; en outre, d'une petite fossette de chaque côté vers les bords latéraux, au dessus de la dilatation dentiforme. Le fond et les bords de ces impressions sont plus ou moins grossièrement ponctués.

*Écusson* assez grand, triangulaire, finement et rugueusement ponctué.

*Élytres* plus d'un tiers plus longues que le prothorax; déprimées; d'une couleur de poix brillante; marquées à la base d'une très-légère impression oblique, et sur toute leur surface de points grossiers, peu serrés, un peu oblongs; couvertes de poils courts, assez raides, couchés, peu serrés et d'un jaune brillant.

*Abdomen* plus long que la poitrine; légèrement arrondi sur les côtés, qui sont assez fortement rebordés; faiblement convexe; lisse, d'un noir de poix brillant, avec l'anus un peu plus clair; garni d'une pubescence assez rare sur le dos, plus fournie sur les bords; cilié en outre, sur les côtés et au sommet, de quelques poils plus longs et non couchés: le cinquième segment plus grand que les précédents, un peu rétréci postérieurement sinueux et pellucide à son bord apical; le dernier, petit, en cône tronqué au sommet, plus ou moins voilé par le précédent.

*Pieds* médiocrement allongés; d'un testacé de poix; pubescents, avec deux ou trois longs poils, plus redressés que les autres, en dessous des cuisses antérieures et intermédiaires et en dessus des cuisses postérieures, et un autre poil solitaire semblable, au milieu de la tranche externe des tibiais. *Tarses* courts; pubescents; testacés.

*PATRIE*: Beaujolais, parmi les feuilles mortes, sur les bords de l'Ardière. Principalement en automne.



# DESCRIPTION

D'UNE

ESPECE NOUVELLE DU GENRE **PLEGADERUS**

(FAMILLE DES HISTÉRIDES),

par

**E. MULLANT et Cl. REY.**

(Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 12 juin 1854.)

## ***Plegaderus hispidulus.***

*Oblongo-subquadratus, leviter convexus, nitidus, breviter albido-hispidulus, grossè parcéque punctatus, niger, pedibus antennisque rufis, capitulo pallidiori. Prothorace margine laterali incrassato, dorso non transversim sulcato; elytris extus obsolete histriatis.*

Long. 0,0012 (1/2 l.).

*Corps* en carré long, un peu plus étroit en arrière et en avant, légèrement convexe, d'un noir brillant; couvert de poils courts, hispides, blanchâtres, peu serrés.

*Tête* verticale, près d'une moitié plus étroite que le prothorax, subtriangulaire, subdéprimée entre les antennes, longitudinalement convexe sur l'épistome qui est arrondi à son sommet où il présente quatre longs poils; d'un noir assez brillant, obsolètement et rugueusement pointillée, et garnie surtout en avant, d'une pubescence très-courte, hispide, blanchâtre. *Parties de la bouche* d'un roux de poix. *Yeux* noirs, déprimés, en partie cachés par le prothorax.

*Antennes* atteignant le milieu du prothorax , légèrement pubescentes , d'un roux-ferrugineux , avec le bouton plus clair , testacé.

*Prothorax* très-grand , un peu plus large que long, de la largeur des élytres à leur base , rétréci en avant à partir du quart antérieur ; faiblement arrondi sur les côtés qui sont épaissis en forme de bourrelet entier ; assez fortement échancré au sommet et légèrement arrondi au milieu de la base ; les angles antérieurs infléchis et aigus, les postérieurs droits ; sans sillon transversal sur le dos ; assez convexe , d'un noir brillant , couvert d'une ponctuation assez grossière , peu serrée , obsolète , et de poils hispides très-courts , blanchâtres.

*Écusson* très-petit , triangulaire , noir , lisse.

*Élytres* d'un quart plus longues que le prothorax , légèrement convexes , largement tronquées au sommet ; à côtés s'élargissant derrière les épaules jusqu'au quart antérieur , puis se rétrécissant insensiblement , d'une manière faiblement cintrée , jusqu'à l'extrémité ; d'un noir brillant ; couvertes de points grossiers , peu serrés , et de poils hispides , courts , couchés , blanchâtres ; marquées à la base sur les côtés de deux stries sulcifformes , obsolètes , arquées , obliques , s'effaçant avant le milieu.

*Pygidium* peu saillant ; ponctué ; d'un noir brillant.

*Dessous du corps* ponctué ; d'un noir brillant.

*Pieds* courts , d'un roux ferrugineux. *Cuisses* épaisses , latéralement comprimées , offrant quelques poils hispides , blanchâtres , très-courts. *Tibias* légèrement arqués , spinosules : les antérieurs brusquement dilatés dans la dernière moitié de leur arête externe , où ils présentent quatre denticules , bien distincts. *Tarses* d'un roux-testacé , brièvement ciliés ; à troisième article aussi long que les précédents réunis.

PATRIE : Draguignan. Rare.

DESCRIPTION  
D'UN COLÉOPTÈRE INÉDIT

CONSTITUANT UN GENRE NOUVEAU

VOISIN DU **G. PSEUDOPSIS**

(FAMILLE DES BRACHÉLYTRES),

PAR

**E. MULSANT et Cl. REY.**

(Lue à la Société Linnéenne de Lyon, le 13 août 1855.)

---

GENRE **PHOLIDUS**.

(φωλις — δος, écaille).

*Corpus* depressum, squamiferum.

*Palpi maxillares* articulo ultimo magno, conico.

*Antennæ* graciles, articulo primo permagno, incrassato.

*Pedes* tenues, breviusculi.

*Tibiæ* extùs obsoletè spinosulæ.

*Tarsi* breves, triarticulati.

*Corps* court ; déprimé ; couvert d'écailles en dessus.

*Tête* proéminente ; libre ; assez grosse.

*Yeux* gros ; subglobuleux ; saillants.

*Labre* grand ; transversal.

*Mandibules* peu saillantes.

*Palpes maxillaires* à dernier article très-grand ; en cône renversé.

*Menton* transversal ; trapéziiforme.

*Antennes* grêles ; de onze articles : le premier très-gros, épais,

intérieurement dilaté en angle arrondi : le deuxième petit, en ovale court : les troisième, quatrième et cinquième allongés, sublinéaires : les sixième à onzième allant insensiblement en grossissant et formant une massue allongée : les sixième à huitième subégaux, coniques : le neuvième pas plus long que large, en cône tronqué : le dixième légèrement transversal : le dernier en ovale court, rétréci au sommet.

*Prothorax* transversal; cyathiforme; largement subtrilobé à sa partie antérieure.

*Écusson* très-petit, triangulaire.

*Élytres* larges ; déprimées ; simultanément échancrées à la base ; sinuusement tronquées aux angles postéro-externes ; chargées de côtes longitudinales peu saillantes.

*Ailes* complètes.

*Abdomen* ample ; largement reborbé ; postérieurement acuminé ; de six segments visibles : le premier plus grand que les suivants : le dernier petit, conique.

*Dessous du corps* convexe.

*Métasternum* très-développé.

*Pieds* courts ; assez grêles ; rapprochés à leur insertion.

*Tibias* obtusément spinosules en dehors ; ciliés en dedans, à leur sommet.

*Tarses* courts ; de trois articles : les premier et deuxième petits, subégaux, pubescents : le troisième plus long que les deux précédents réunis.

Obs. Ce genre, voisin du *G. Pseudopsis* par la forme de la tête et du dernier article des palpes maxillaires, s'en éloigne, ainsi que de tous les autres genres de la même tribu, par son corps écailleux, et par la structure de ses antennes et de son prothorax.

**Pholidus insignis.**

*Brevis, depressus, opacus, niger, fusco-griseo-squamosus, pedibus rufo-ferrugineis. Prothorace cyathiformi, anticè subtrilobo, postice coarctato. Elytris hoc paulò longioribus, depressis, costatis. Abdomine amplo, latè marginato.* (Pl. fig. 2.)

Long. 0m,0022 (1 l.).

*Corps court; déprimé; opaque; noir, et couvert d'écailles d'un gris plus ou moins obscur.*

*Tête assez grosse; un peu étranglée postérieurement à sa réunion avec le prothorax; d'un tiers plus étroite que celui-ci; assez large en arrière, et un peu rétrécie en avant; opaque, noire et couverte de squamules grisâtres; chargée en outre de trois tubérosités: une, de chaque côté, vers l'insertion des antennes: la troisième grande, oblongue, longitudinale, occupant tout le milieu du crâne. Parties de la bouche d'une couleur de poix testacée avec les palpes maxillaires noirs. Yeux gros, saillants, noirs.*

*Antennes grêles; noires; légèrement pubescentes; aussi longues que la tête, le prothorax et les élytres, et terminées par une massue allongée: à premier article très-gros, épais, couvert sur toute sa surface d'écailles grisâtres, et dilaté au côté interne en angle obtus, arrondi au sommet: le deuxième petit, en ovale court, offrant quelques rares et petites écailles cendrées, souvent caduques; les troisième à cinquième allongés, subfiliformes; le troisième beaucoup plus grêle et deux fois plus long que le précédent: le quatrième un peu plus court, et le cinquième un peu plus long que le troisième: les sixième à huitième obconiques, subégaux, graduellement un peu plus épais; le neuvième en cône renversé, tronqué au sommet, pas plus long que large: le dixième légèrement transversal: le dernier en ovale court, assez brusquement rétréci au sommet.*

*Prothorax* d'un quart plus étroit que les élytres ; transversal, cyathiforme ; brusquement rétréci en arrière ; tronqué à la base, avec les angles postérieurs obtus ; antérieurement largement subtrilobé : le lobe médian occupant le milieu du bord antérieur ; les externes figurant une large oreillette formée des angles antérieurs et des deux tiers antérieurs des bords latéraux ; d'un noir opaque ; couvert d'écailles grisâtres ; chargé au milieu du disque d'une gibbosité oblongue, bifide en avant ; le lobe médian et toute la base relevés en forme de bourrelets, légèrement interrompus ou sillonnés en leur milieu ; les lobes latéraux plus faiblement relevés à leur bord.

*Écusson* triangulaire ; noir ; très-petit.

*Élytres* larges ; formant ensemble un carré transversal ; simultanément échancrées derrière le prothorax au milieu de leur base ; individuellement tronquées au sommet d'une manière un peu oblique de dehors en dedans ; à épaules légèrement arrondies, à côtés faiblement arqués ou presque droits, et à angles postéro-externes largement et sinueusement tronqués ; déprimées ; d'un noir opaque, avec la suture, les côtés, la base, le sommet et trois lignes longitudinales sur le disque, relevés en forme de côtes plates et composées de squamules grisâtres : les côtes latérale et apicale assez larges : la suturale et les discales assez étroites ; l'externe de celles-ci partant de l'épaule où elle est réunie à la basilaire par un épaississement notable, se dirigeant un peu obliquement de dehors en dedans, s'affaiblissant et n'atteignant point l'apicale : la médiane presque droite, entière, partant de la basilaire pour aller se réunir à l'apicale ; l'interne partant aussi de la basilaire, presque droite jusqu'aux deux tiers postérieurs où elle se déjette un peu en dehors, et n'atteignant pas l'apicale ; toutes ces côtes s'épaississent plus ou moins à leur point de réunion, et offrent entre elles une série plus ou moins régulière de squamules grisâtres, plus ou moins nombreuses et plus ou moins caduques.



*Ailes* subopaques ; blanches.

*Abdomen* un peu plus large que les élytres ; légèrement convexe en son milieu ; fortement arrondi sur les côtés, et assez brusquement rétréci au sommet ; largement rebordé, avec les rebords fortement relevés ; d'un noir opaque ; uniformément couvert de squamules grisâtres ; à premier segment d'un tiers plus grand que les suivants : le dernier petit, conique.

*Dessous du corps* convexe ; noir ; assez brillant ; offrant une granulation plate comme écailleuse, plus forte sur la poitrine. *Ventre* en outre couvert de petits poils hispides, très-courts, blanchâtres, peu serrés.

*Pieds* courts ; assez grêles ; d'un roux ferrugineux. *Tibias* légèrement ciliés en dedans à leur sommet ; obscurément spinosules en dehors. *Tarses* courts ; pubescents ; d'un roux testacé, avec le sommet du troisième article un peu plus foncé.

**PATRIE :** Hyères. Parmi les débris végétaux, au bord des eaux saumâtres. Au premier printemps. Rare.

---

## DESCRIPTION

D'UNE

### ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE CHRYSOMELA

PAR

**E. Mulsant.**

(Présentée le 14 février 1854.)

---

#### ***Chrysomela Ludovicæ.***

*Oblongue ; presque parallèle ; médiocrement convexe ; noire ; prothorax d'un rouge brunâtre ; élytres ornées d'une bordure suturale et chacune d'une bordure marginale moins étroite, d'une couleur semblable : le premier, grossièrement ponctué et faiblement sillonné longitudinalement près de chaque bord latéral, assez finement ponctué sur le dos : les secondes, chagrinées. (Pl. fig. 1.)*

Long. 0,0095 ( $\frac{1}{4}$  l.) Larg. 0,0048 ( $\frac{1}{8}$  l.).

*Corps oblong ; presque parallèle ; médiocrement convexe. Tête très-penchée ou presque verticale ; noire, peu luisante ; marquée de points petits et peu rapprochés ; rayée sur le milieu du front d'une ligne longitudinale assez légère ; à suture frontale en arc dirigé en arrière : labre et palpes noirs. Antennes prolongées jusqu'à la moitié du corps ; presque filiformes jusqu'au quatrième ou cinquième article, plus visiblement subcomprimées et plus larges sur les derniers ; d'un noir luisant, parcimonieusement ponctuées et garnies de poils courts, fins et peu nombreux sur les cinq premiers articles, d'un noir brun mat, pubescentes et den-*

sement pointillées sur les autres : le premier , un peu renflé dans son milieu , un peu moins long que le troisième : le deuxième, petit, globuleux : le troisième, plus grand que le quatrième : le cinquième presque égal au précédent : les cinquième à dixième un peu plus longs, presque égaux : le onzième un peu brusquement rétréci vers les deux tiers de sa longueur et comme formé de deux articles soudés. *Yeux* noirs. *Prothorax* échancré en devant, c'est-à-dire presque en ligne droite dans sa partie médiale, avec les angles avancés, embrassant les yeux sur les côtés ; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié de ses bords latéraux, plus faiblement rétréci ensuite ; en arc dirigé en arrière et bissiné, à la base ; deux fois et demie environ aussi large que long ; à peine convexe ; rayé de deux espèces de sillons longitudinaux, naissant chacun du bord antérieur , vers la partie de celui-ci correspondant au côté interne des yeux, prolongés chacun jusqu'à la base, en se rapprochant un peu du bord latéral ; offrant la partie en dehors de ce sillon plus plane ou moins déclive ; marqué de points gros sur ces sillons et sur les parties voisines, plus fins sur le dos ; d'un rouge brunâtre ou d'un rouge testacé. *Écusson* en triangle plus long que large, à côtés curvilignes ; lisse, luisant ; noir ou d'un rouge obscur. *Elytres* d'un sixième plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; presque parallèles jusqu'aux deux tiers , arrondies à l'extrémité ; médiocrement convexes ; à calus huméral peu saillant, assez faiblement déprimées entre lui et la suture ; chagrinées , mais plus finement vers l'extrémité ; à granulations écrasées ; rayées d'une strie juxta-suturale distincte seulement à partir des deux tiers ; noires ou d'un noir brûlé , avec la suture d'un rouge testacé obscur, sur une largeur un peu plus étroite que la base de l'écusson ; ornées sur les côtés d'une bordure d'un rouge testacé plus clair ou plus jaunâtre , laquelle se confond graduellement avec la couleur foncière. *Repli* d'un rouge jaunâtre. *Repli prothoracique* de même couleur. *Dessous du corps* d'un rouge jaunâtre ou testacé sur la majeure

partie des côtés de l'antepectus, d'un noir luisant sur le reste; parimonieusement et finement ponctué; peu distinctement garni de poils fins et clairsemés. *Prosternum* élargi et plan après les hanches, tronqué à l'extrémité. *Partie antéro-médiane du premier arceau ventral* tronquée en avant. *Pieds* noirs, luisants; peu ponctués. *Jambes* garnies, à partir de la moitié jusqu'à l'extrémité, de poils d'un fauve cendré, graduellement plus longs et plus apparents.

Cette belle espèce a été découverte, près de Gavarnie, dans les Pyrénées, par feu Madame Louise de Gueneau d'Aumont, née de Coucy, à qui je l'ai dédiée. Puisse cet insecte rappeler longtemps le souvenir de cette femme si bonne et si aimable, pour laquelle l'Entomologie avait tant d'attraits !

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. 1. *Chrysomela Ludovicæ*.

b. Antenne.

c. Tarse antérieur.

d. Tarse.

Fig. 2. a. *Pholidus insignis*.

b. Les trois premiers articles des antennes.

c. Derniers articles des *palpes maxillaires*.

Fig. 3. a. *Ochtheophilus flexuosus*.

b. Derniers articles des *palpes maxillaires* dans le genre *Ochtheophilus*.

c. Derniers articles des *palpes maxillaires* dans le genre *Trogophlæus*.




F 2



F 3



*Carab. - ...*





## DESCRIPTION

D'UNE


## ESPÈCE NOUVELLE DE COLÉOPTÈRE

DE LA TRIBU DES LATIGÈNES.

PAR

**E. Mulsant** et **Cl. Rey**,

(Présentée à la Société Lyonnaise de Lyon, le 13 juin 1855).



### ***Helops pellucidus*.**

Ovale-oblong ; convexe ; entièrement d'un jaune testacé. Yeux noirs. Prothorax presque tronqué et bissubsinué en devant, élargi jusqu'aux deux cinquièmes environ, en ligne droite et parallèle ensuite, à angles postérieurs émoussés et un peu ouverts ; tronqué ou à peine arqué en arrière, à la base ; convexe ; assez finement ponctué. Élytres un peu élargies jusqu'à la moitié, rétrécies ensuite assez régulièrement jusqu'à l'angle sutural, à rebord marginal uniforme, peu tranchant ; à stries assez légères et finement ponctuées. Intervalles pointillés : le huitième, postérieurement uni au deuxième. Cuisses hérissées de poils en dessous.

Long. 0,0051 à 0,0072 (2 1/4 à 3 1/4 l.) Larg. 0,0033 à 0,0045 (1 1/2 à 2 l.).

PATRIE : Le midi de la France.

*Obs.* Cette espèce a tant d'analogie avec l'*H. pallidus* qu'elle ne paraît pas s'en distinguer au premier coup-d'œil. Mais avec un peu d'attention, on reconnaît facilement les différences qui séparent ces deux espèces. Dans l'*H. pallidus*, les côtés du prothorax vont en s'élargissant jusqu'à la moitié, et se rétrécissent ensuite

en formant avant les angles postérieurs une sinuosité très-apparente : ces angles se trouvent par-là rectangulairement ouverts et assez vifs : la base du prothorax est à peu près en ligne droite. Chez l'*H. translucidus*, le prothorax s'élargit jusqu'aux deux cinquièmes environ de ses côtés, qui sont ensuite en ligne droite et parallèle ; les angles postérieurs se trouvent par-là un peu plus ouverts que l'angle droit et émoussés, et la base est très-légèrement arquée en arrière plutôt qu'en ligne droite, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus.

L'*H. pallidus* habite les rives de la mer ; l'*H. pellucidus* se trouve principalement sur les chênes verts.

# NOTES

RELATIVES A QUELQUES INSECTES COLÉOPTÈRES

DE LA TRIBU DES PECTINIPÈDES ,

PAR

M. E. Mulsant.

Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 12 novembre 1855.

---

FAMILLE DES CISTÉLIENS.

ALLÉCULATES.

Ce groupe doit s'enrichir de la coupe nouvelle suivante :

Genre *Upinella*, UPINELLE.

CARACTÈRES. *Tête* plus longue que large. *Antennes* prolongées environ jusqu'à la moitié (♀), ou un peu plus (♂) du corps ; grêles ; presque filiformes, moins minces des trois cinquièmes aux trois quarts de leur longueur ; de onze articles : le deuxième très court : le troisième notablement plus long que le quatrième, égal environ au cinquième de sa longueur totale : les trois derniers graduellement plus courts que les six précédents, ovalaires. *Mâchoires* à deux lobes. *Menton* élargi d'arrière en avant ; tronqué en devant. *Yeux* assez saillants ; échanerés. *Prothorax* plus rapproché du carré transverse que de la forme semi-orbiculaire ; à angles postérieurs non courbés en arrière sur les angles huméraux des étuis. *Elytres* d'un sixième ou d'un cinquième plus larges en devant que le prothorax

à sa base. *Repli* prolongé presque jusqu'à son extrémité. *Prosternum* non comprimé, séparant les hanches; non prolongé après le bord de l'antépectus. *Mésosternum* tronqué ou presque bidenté à son extrémité; notablement plus large à celle-ci que le prosternum. *Postepisternums* allongés; presque parallèles. *Pieds* allongés, surtout les postérieurs. *Cuisses* comprimées. *Jambes* grêles. *Tarses* antérieurs et intermédiaires à troisième et quatrième articles munis en dessous d'une sole membraneuse sensiblement avancée sous l'article précédent: les postérieurs (1) à quatrième article muni d'une sole semblable. *Premier article des tarses postérieurs* au moins aussi long que les trois suivants réunis. *Ongles des pieds postérieurs* offrant chacune de leurs branches munie de cinq ou six dents.

Ce genre, très-voisin de celui d'*Allecula*, s'en distingue facilement par les caractères fournis par les antennes.

#### **U. aterrima** (DEJEAN).

*Suballongée; glabre en dessus. D'un noir mat. Antennes et partie des pieds souvent moins obscurs. Tête densément ponctuée. Prothorax tronqué en devant et à la base; un peu arqué et étroitement rebordé sur les côtés; peu densément et finement ponctué. Elytres à neuf stries profondes et marquées de points qui les crénelent à peine; offrant en outre une strie juxta-suturale prolongée jusqu'au tiers. Intervalles presque plans en devant, subconvexes postérieurement: impointillés.*

(1) Dans mon travail sur les Pectinipèdes, p. 37, ligne 48, l'oubli du mot *postérieurs* après celui de *tarses*, peut offrir de l'incertitude. Dans le genre *Allecula*, les quatre tarses antérieurs offrent aussi les troisième et quatrième articles en forme de sole; aux tarses postérieurs l'avant dernier article présente seul ordinairement ce caractère. Mais quelquefois chez les Alléculés et chez les Upicules, principalement chez les ( $\sigma^2$ ), le deuxième article des quatre tarses antérieurs et le troisième des postérieurs présente un petit allongement qui simule une sole rudimentaire; ordinairement alors cette fausse sole est rétrécie à son extrémité, au lieu d'être tronquée.

♂ Yeux séparés sur le front par un espace un peu moins large que le diamètre transversal de l'un d'eux.

♀ Yeux séparés sur le front par un espace plus grand que le diamètre transversal de l'un d'eux.

*Helops aterrimus*, (DEJ.) Catal. (1824) p. 70.

*Upis aterdoides*, ZIEGLER, in Litter. — (DEJ.) Catal. (1821) p. 70. — *Id.* (1833) p. 213. — *Id.* (1837) p. 234.

*Allecula aterrima*, (DÉJEAN) Catal. (1833) p. 243. (1837) p. 234. — KUSTER, Kaef. Europ. 18 58.

*Upis cisteloides*, (FINDEL) (DEJ.) Catal. (1833) p. 213. — *Id.* (1837) p. 234.

Long. 0,0107 à 0,0112 (434 à 51.). Larg. 0,0033 (1 1/2 l.).

*Corps* suballongé; peu convexe sur sa partie longitudinalement médiaire; d'un noir mat, en dessus. *Tête* densément et un peu ruguleusement ponctuée; déprimée sur la suture frontale; tronquée en ligne droite à la partie antérieure de l'épistome. *Antennes* prolongées au moins jusqu'à la moitié de la longueur du corps; parfois noires, ordinairement couleur de poix. *Prothorax* tronqué en devant et à la base; arqué sur les côtés, soit ordinairement d'une manière régulière et offrant vers le milieu sa plus grande largeur, soit en offrant parfois celle-ci vers ses deux tiers; presque plan sur le dos, convexement déclive sur les côtés; muni à ceux-ci, d'un rebord très-étroit; d'un quart environ moins long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; finement ponctué. *Elytres* d'un quart au moins plus larges après les épaules que le prothorax à la base; plus larges que lui dans son diamètre transversal le plus grand; à stries profondes, marquées de points les débordant à peine: les quatrième et cinquième ordinairement plus courtes, non unies postérieurement, encloses par les voisines. *Repli* tourné en dehors. *Prosternum* sillonné, séparant les hanches. *Pieds* allongés; grêles. *Cuisses* ordinairement d'un noir brun.

Jambes brunes ou d'un brun rouge. Tarses fauves ou d'un rouge brun.

PATRIE : la Styrie, l'Illyrie (collect. Chevrolat, Reiche.)

Obs. La couleur de quelques parties varie, suivant le développement de la matière colorante. Quelquefois tout le corps est noir, moins les tarses qui sont bruns ou d'un brun rouge; d'autres fois les antennes, une partie des palpes, le labre, les jambes et les tarses sont d'un brun rouge ou d'un rouge brun.

### CISTELATES.

Au genre *Gonodera* se rapporte l'espèce suivante.

#### **G. metallica**, (CHEVROLAT), KUSTER.

Suballongé; glabre, luisant et d'un brun métallique, en dessus. Dessous du corps d'un brun rouge ou d'un rouge brun: bouche, antennes et pieds d'un rouge brun ou d'un roux ferrugineux testacé. Ecusson en triangle à côtés un peu curvilignes. Elytres à fossette humérale prononcée; à stries prononcées et ponctuées: la quatrième ordinairement unie postérieurement à la cinquième. Intervalles plans, finement ponctués.

*Cistela metallica* (CHEVROLAT) (DEJEAN), Catal. (1833), p. 214. — *Id.* (1837), p. 235.

— KUSTER, Kaef. Europ. 20. 73.

Long. 0,0112 (3 l.). Larg. 0,0059 (1 3/4 l.).

Patrie: la Lombardie et diverses autres parties de l'Italie (collect. Aubé, Chevrolat).

### Genre *Hymenorus*.

#### **H. rugicollis**.

Suballongé; peu convexe; garni en dessus de poils obscurs, presque couchés; d'un noir brun: bouche et antennes d'un brun testacé. Pieds d'un



*fauve testacé. Prothorax subparallèle dans sa seconde moitié ; sans rebord à sa base ; ruguleusement ponctué ; à peine déprimé au-devant des sinuosités basilaires , sans dépression sur la ligne médiane. Ecusson triangulaire. Elytres à stries ponctuées et subcrénelées. Intervalles peu convexes et ruguleusement ponctués. Hanches séparées par le prosternum.*

Long. 0,0067 (3 l.) Larg. 0,0026 (1 1/2 l.).

Patrie ? (collect. Chevrolat).

L'exemplaire unique et dépourvu de son abdomen d'après lequel a été faite cette description , s'éloigne de l'*H. Doublieri* par son prothorax sans rebord distinct à la base , sans traces de sillon ou de dépression sur la ligne médiane , rugueusement ponctué ainsi que les côtés de l'antépectus ; par son écusson triangulaire ; par la couleur de sa bouche et de ses palpes , couleur qui peut être sujette à varier.

Cet exemplaire paraît être un ♂. Ses yeux sont séparés l'un de l'autre , dans leur point le plus rapproché , par un espace sensiblement moins grand que le diamètre transversal de l'un d'eux. Ne serait-il que le ♂ de l'*H. Doublieri* que je n'ai pas vu ? Ce rapprochement des yeux chez le ♂ doit faire modifier les caractères que j'ai donnés en fondant primitivement le genre (*Opuscules entomol.* 1<sup>er</sup> cahier , p. 68).

---

Au genre *Cistela*, resserré dans les limites que je lui ai données, se rapporte l'espèce suivante :

***C. serrata* ; CHEVROLAT.**

*Suballongée, ovulaire ; garnie en dessus d'une pubescence courte et soyeuse ; noire : prothorax d'un roux rouge ou d'un roux testacé. Ecusson et élytres d'un roux testacé, ou testacés : celles-ci à stries ponctuées.*

Long. 0,0112 (5 l.)

*Cistela serrata*, CHEVROLAT, in GUÉRIN, Iconogr. du règne anim. de CEVRES, p. 125, fig. 9, a, détails (suivant le type).

*Cistela superciliosus*, (DÉJEAN) Catal. (1833) p. 213. — *Id.* (1837) p. 236. — KUSTER, Kœf. Europ. 20. 71.

PATRIE : la Hongrie (collect. Chevrolat, Reiche.)

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la *C. ceramboïdes*. La tête, les palpes, les antennes, le dessous du corps et les pieds sont noirs : le prothorax et les élytres sont roux ou d'un roux testacé ou d'une teinte rapprochée : le prothorax tire ordinairement un peu sur le rouge roux.

Au genre *Isomira* se rapporte l'espèce suivante :

### *I. corsica.*

Oblongue ; ruguleusement pointillée ; garnie en dessus de poil testacés, fins, couchés et médiocrement serrés ; tête et prothorax d'un rouge testacé : élytres testacées. Dessous du corps brun testacé ou testacé : pieds d'un flave testacé. Prothorax d'un quart environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; plus étroit postérieurement que les élytres ; subsinué et déprimé vers chaque tiers externe de sa base, avec les angles postérieurs rectangulairement ouverts, vifs, un peu moins prolongés en arrière que la partie médiane ; subsilloné sur le dernier tiers de la ligne médiane. Élytres offrant une strie juxta-suturale affaiblie en avant et postérieurement une autre voisine de celle-ci.

Long. 0,0086 à 0,0089 (2 1/2 à 2 3/4 l.) larg. 0,0022 à 0,0026 (1 à 1 1/5 l.).

Cette espèce a été trouvée en Corse par M. Reveillière.

Obs. Le dessous du corps, dans l'état qui paraît normal, est brun ou d'un brun testacé, ainsi que le repli ; chez d'autres exemplaires il est testacé ou d'un testacé rougeâtre.

L'*I. corsica* a quelque analogie avec l'*I. antennata* ; elle s'en rapproche par la couleur de sa tête et de son prothorax ; mais elle s'en distingue par ce segment proportionnellement moins court ou plus allongé, plus étroit à la base que les élytres, à angles postérieurs un peu moins longuement prolongés en arrière que la partie médiane de sa base, subsilloné sur le dernier tiers de sa ligne médiane.

Au genre *Eryx* se rattachent les deux espèces suivantes :

1. *E. anthracina*.

Ovale ; médiocrement convexe ; d'un noir brun un peu luisant ; ruguleusement ponctuée et garnie de poils obscurs et mi-couchés, en dessus. Dessous du corps, pieds et partie au moins des antennes, ordinairement bruns. Prothorax déprimé au devant de chaque sinuosité basilaire. Elytres marquées sur toute leur longueur de deux stries juxta-suturales, de deux autres dans leur seconde moitié, légèrement ou obsolètement striées sur le reste de leur surface ; assez finement ponctuées. Prosternum courbé longitudinalement conformément aux hanches, ne les dépassant pas postérieurement.

Long. 0,0090 ( 4 l. ). larg. 0,0045 ( 2 l. )

PATRIE ? (collect. Chevrolat).

Obs. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec l'*E. atra*. Elle s'en éloigne par sa taille plus petite ; par sa teinte moins foncée ; par son prothorax offrant , au devant de chaque sinuosité de la base, une dépression assez légère, et une autre moins sensible, au devant de l'écusson ; par son prosternum convexement décline à sa partie postérieure, parallèlement aux hanches qu'il ne dépasse pas postérieurement, même vers leur base.

Je n'ai vu que le ♂. La ♀ pourrait avoir les élytres moins légèrement striées sur leur moitié externe. La couleur du corps peut aussi être parfois plus foncée.

2. *E. mauritanica*.

Ovale ; médiocrement convexe ; d'un noir un peu luisant ; ruguleusement ponctuée et garnie de poils obscurs et mi-couchés en dessus : base des antennes et partie au moins des pieds souvent moins obscures. Elytres offrant dans leurs deux cinquièmes postérieurs les première et deuxième stries juxta-suturales distinctes ; les troisième et quatrième plus

*courtes et plus légères, sans stries sur le reste. Prosternum obliquement déclive postérieurement, prolongé après les hanches, vers la base de celles-ci.*

*Pryonjchus mauritanicus*, (GAUBIL.) Catal. p. 225.

Long. 0,0100 (4 1/2 l.). larg. 0,0032 (2 1/3 l.).

PATRIE : la Sicile (collect. Aubé); l'Algérie (collect. Chevrolat, Reiche, et Gaubil, *type*).

Obs. Cette espèce se rapproche de l'*E. atra* par la forme de son prosternum ; mais elle en diffère par sa taille plus petite. Elle est d'ailleurs très-facile à reconnaître à ses élytres sans stries sur leur moitié antérieure au moins, et sur la moitié externe de leur partie postérieure.

### OMOPHLIENS.

Les genres *Podonta* et *Cteniopus* renferment des espèces qui se lient les unes aux autres par des transitions si insensibles, qu'il est difficile d'établir, pour séparer les deux coupes, des caractères distinctifs bien tranchés. Ni la forme des articles des palpes admises par Solier, ni les autres indications fournies par des auteurs divers n'indiquent des limites précises entre ces deux genres. La plupart des Cteniopes ont le corps plus étroit que ceux des Podontes ; mais le *C. sulphuripes* ♀ se rapproche déjà de ces derniers sous ce rapport. La même espèce s'éloigne de ses congénères par son prothorax presque aussi large à la base que les élytres aux épaules. Les Cteniopes se distinguent généralement des insectes de l'autre coupe par leurs antennes plus grêles, à peu près filiformes et plus longues que la moitié du corps ; mais le *Podonta alpina* a de l'analogie avec les Cteniopes, par la longueur et le peu d'épaisseur de ces organes. Enfin les

Cténiopes n'offrent pas la base de leur prothorax courbée en arrière sur les angles huméraux des élytres, comme la plupart des Podontes ; mais le *P. lugubris* présente aussi une exception à cette règle.

Pour les espèces ci-après, que j'ai eu l'occasion d'observer, on pourrait établir de la manière suivante la diagnose des caractères génériques, caractères que j'ai dû donner un peu différents, pour les rendre plus précis, pour nos espèces de France.

---

Genre *Podonta*, Mulsant (\*).

CARACTÈRES. *Antennes* plus épaisses dans leur seconde moitié ; à troisième article généralement d'un quart plus long que le quatrième ; habituellement moins longues ou à peines aussi longues que la moitié du corps , parfois un peu plus longues , mais alors prothorax sensiblement courbé en arrière à ses angles postérieurs sur ceux des élytres. *Dernier article des palpes maxillaires* très-obliquement tronqué à son extrémité ; offrant son côté antéro-interne de deux tiers au moins aussi grand que le postéro-interne. *Prothorax* plus rapproché de la forme du demi-cercle que de celle du parallépipède transversal ; à peu près aussi large à sa base que les élytres à leur partie antérieure ; ordinairement courbé en arrière sur les angles huméraux de celles-ci. Elytres plus souvent obtusément arrondies chacune à l'extrémité.

De tous ces caractères , celui tiré de la longueur du troisième article des antennes semble être le plus sensible et le moins inconstant.

---

(\*) Hist. nat. des Coléopt. de France (Pectinipèdes), p. 66.

Les espèces du genre *Podonta* qui me sont connues, sont les suivantes :

- A. Prothorax non courbé, à sa base, sur les angles huméraux des élytres.  
*Lugubris*.
- AA. Prothorax sensiblement courbé en arrière, à sa base, sur les angles huméraux des élytres.
  - B. Antennes à peine aussi longuement ou à peine plus longuement prolongées que la moitié du corps. Elytres obtusément tronquées ou subarrondies chacune à l'extrémité.  
*Nigrita*.  
*Aubei*.
  - BB. Antennes plus longuement prolongées que la moitié du corps. Elytres subarrondies, prises ensemble, à l'extrémité.  
*Alpina*.

### 1. *P. lugubris* ; KUSTER.

Oblong ou suballongé ; médiocrement convexe ; d'un noir luisant ; garni en dessus de poils fins , couchés et obscurs. Antennes à peine aussi longuement prolongées que la moitié du corps. Prothorax élargi jusqu'à la moitié, faiblement rétréci postérieurement ; à angles postérieurs non courbés en arrière sur ceux des étuis ; finement ponctué. Elytres à stries peu profondes, mais distinctes. Intervalles pointillés. Prosternum très-comprimé entre les hanches, un peu moins élevé qu'elles, souvent peu distinct après la moitié de celles-ci.

Long. 0,9100 à 0,0112 (4 1/2 à 5 l.) Larg. 0,0045 (2 l.).

♂ Ongles des tarses antérieurs élargis vers le milieu de leur peigne. Sixième arceau ventral creusé sur presque toute sa largeur d'une gouttière profonde, offrant longitudinalement, sur sa partie médiane, une faible arête bifurquée : tranches latérales de cette gouttière arrondies chacune à l'extrémité.

*Cistela lugubris*. (FRIVALDSKY) KUSTER, Kaef. Europ. 20. 80.

PATRIE : la Turquie (collect. Aubé).

Corps oblong ou suballongé ; noir ; pubescent ; soyeux. Tête



ponctuée, plus finement sur sa moitié postérieure que sur l'antérieure; sans fossette sur le milieu du front. *Antennes* assez épaisses, à peine prolongées jusqu'à la moitié du corps. *Prothorax* tronqué en avant, sans dépression derrière les yeux; subarrondi et déclive aux angles de devant; élargi en arc sur les côtés, c'est-à-dire élargi en ligne courbe jusque vers la moitié, et faiblement rétréci ensuite jusqu'aux angles postérieurs, qui sont peu émoussés et rectangulairement ouverts; tranchant et sans rebord sur les côtés; muni à la base d'un rebord étroit, peu distinct près des angles de derrière; aussi finement ponctué que la partie postérieure de la tête; garni de poils fins et courts. *Élytres* à peine plus larges en avant que le prothorax à ses angles postérieurs; subparallèles jusqu'aux deux tiers, rétrécies ensuite, obtusément tronquées ou obtusément subarrondies chacune à l'extrémité; à rebord latéral formant à peine, du sixième aux quatre septièmes, une gouttière très-étroite; à stries assez légères, cependant toutes distinctes: les voisines de la suture plus marquées, surtout postérieurement: les cinquième et sixième, ordinairement plus courtes: ces stries imponctuées ou peu distinctement ponctuées. *Intervalles* finement pointillés; presque plans; garnis de poils obscurs, fins et couchés. *Repli* presque perpendiculaire. *Dessous du corps* et *pieds noirs*. *Prosternum* rétréci d'avant en arrière, très-comprimé entre les hanches, moins élevé qu'elles, peu distinct dans la seconde moitié de celles-ci. *Ongles* d'un rouge testacé.

Obs. Cette espèce se distingue de toutes les espèces suivantes par la base de son prothorax tronquée en ligne droite, non courbée en arrière sur les angles huméraux des étuis.

## 2. *Æp. nigrita*; FABRICIUS.

*Podonta nigrita*, Muls. Hist. Nat. des Coléopt. de F. (Pectinipèdes) p. 67.

Obs. Peut-être faut-il rattacher à cette espèce la :

*Cistela oblonga*, OLIVIER, Encycl. meth. t. 6. p. 6. n. 19. — *Id.* Entom. t. 9. n. 54. p. 13. 19 pl. 2, fig. 20. (suivant l'exemplaire typique). — SCHOENHER, Syn. insect. t. 2. p. 338. 37.

*Cistela nigrita*, BRULLÉ, Expéd. sc. de Morée, p. 226. 390.

Long. 0,0095 à 0,0100 (4 1/4 à 4 1/2). Larg. 0.0035 (1 1/2).

L'exemplaire typique existant dans la collection de M. Chevrolat, a passé sous mes yeux. Cet exemplaire indiqué par Olivier comme originaire d'Italie, ainsi que divers autres individus provenant des îles Ioniennes, de la Grèce, de la Syrie et de la Perse, se distinguent des exemplaires ordinaires de la *nigrita* par une taille ordinairement moins faible, par un corps proportionnellement plus étroit; par sa tête sans fossette sur le front; par ses élytres à stries ordinairement affaiblies ou moins distinctes sur le tiers externe au moins; par le prosternum presque réduit à une tranche à partir de la moitié de la longueur de celles-ci au lieu d'être graduellement rétréci jusqu'à leur extrémité; mais ces caractères sont si faibles et parfois si inconstants, qu'il est difficile de décider si les *P. nigrita* et *oblonga* doivent constituer deux espèces distinctes. Pour augmenter les incertitudes, le prothorax est parfois peu courbé en arrière sur les angles des élytres chez quelques individus. Les élytres sont quelquefois sans stries bien marquées ou même distinctes sur leur moitié ou leur tiers externe, tandis qu'elles ont, chez la plupart des autres exemplaires, des stries au moins apparentes sur toute leur surface. De nouvelles observations faites sur une plus grande échelle sont donc nécessaires pour élucider cette question.

Les caractères sexuels du ♂ de l'*oblonga* sont les mêmes que chez la *nigrita* et présentent les mêmes anomalies. Ordinairement le dernier article des tarses antérieurs du ♂ est arqué longitudinalement et anguleux près de l'extrémité de son côté antérieur ou interne; d'autres fois il est peu arqué et simplement et graduellement un peu élargi vers cette extrémité.

3. *P. Aubei*.

Oblong ; médiocrement convexe ; très-noir ; brillant ; subaspérément ou squammuleusement et assez finement ponctué ; garni en dessus de poils très-courts, fins et peu épais. Prothorax bissinué en devant, déprimé derrière les yeux, avec la partie médiane arquée et plus avancée que les angles ; élargi jusqu'aux angles postérieurs, plus faiblement dans sa seconde moitié ; à peine bissinué à la base, avec les angles courbés en arrière. Elytres obtusément subarrondies chacune à l'extrémité ; offrant seulement près de la suture trois stries, plus distinctes dans leur seconde moitié. Prosternum réduit à une tranche à partir de la moitié des hanches, un peu moins élevé qu'elles.

Long. 0.0067 à 0,0078 (♂ à 3 1/2 l.) Larg. 0.0028 (1 1/4 l.) ♂ 0,0033 (1 1/2 l.) ♀.

♂ Dernier article des tarsi antérieurs échancré à son côté antérieur ou interne, anguleux près de la base, offrant près de celle-ci et non près de l'extrémité sa plus grande largeur. Sixième arceau ventral entaillé à son extrémité ; creusé de deux sillons longitudinaux séparés par une carène médiane.

♀ Dernier article des tarsi antérieurs sans échancrure. Sixième arceau ventral régulier, c'est-à-dire rétréci d'avant en arrière, obtusément arrondi à son extrémité ; convexe.

Patrie : l'orient (collect. Aubé, Chevrolat).

Obs. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la *P. nigrita*. Elle s'en distingue par sa taille plus faible ; par sa ponctuation moins fine, moins rapprochée, plus squammuleuse ; par les poils du dessus de son corps conséquemment moins serrés, plus courts, moins apparents. Par son prothorax bissinué en devant, c'est-à-dire déprimé et plus sensiblement sinué derrière chaque œil, avec la partie comprise entre chacune de ces sinuosités paraissant arquée en devant et un peu plus avancée que les angles ; faiblement bissinué à la base ; faiblement garni de poils ou paraissant presque glabre. Par ses élytres sans stries distinctes sur leurs deux tiers externes jusqu'à la strie marginale ; peu garnies

de poils ; brillantes. Par son prosternum rétréci d'avant en arrière jusqu'à la moitié des hanches , réduit à une tranche et souvent peu distinct à partir de cette moitié ; un peu moins élevé que les dites hanches.

J'ai dédié cette espèce à M. Aubé , dont le nom est si glorieusement inscrit dans les fastes entomologiques. Puisse cet hommage lui témoigner de ma gratitude pour ses bienveillantes communications !

#### 4. *P. alpina*.

*Oblong ou suballongé ; médiocrement convexe ; très-noir ; peu luisant. Prothorax près d'une fois plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; assez faiblement courbé en arrière aux angles postérieurs ; glabre ; assez finement ponctué ; offrant de faibles traces d'une ligne médiane. Elytres un peu plus larges en devant que le prothorax à sa base ; garnies de poils courts et mi-couchés ; subarrondies , prises ensemble , à l'extrémité ; à stries ponctuées toutes distinctes. Intervalles rugueusement ponctués. Prosternum comprimé , séparant les hanches.*

*Cistela alpina*. (KINDERMANN), D. de MARSEUL , in collect.

Long. 0,0090 ( 4 l. ). Larg. 0,0033 ( 1 3/5 l. ).

*Corps* oblong ou suballongé ; médiocrement ou peu fortement convexe ; entièrement noir : ongles d'un rouge testacé. *Tête* couverte de points serrés , médiocres sur sa partie antérieure , plus fins depuis la moitié du front jusqu'à sa partie postérieure ; notée d'une fossette sur le milieu de celui-là ; à peu près glabre. *Antennes* prolongées jusqu'aux trois cinquièmes ou aux deux tiers des côtés du corps ; un peu plus épaisses sur leur seconde moitié. *Prothorax* obtusément tronqué en devant , élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes ou à la moitié de ses côtés , subparallèle ensuite , paraissant presque en demi-cercle élargi ; tronqué à la base , avec les angles postérieurs assez faiblement courbés en arrière sur ceux des élytres ; tranchant et

presque sans rebord sur les côtés ; muni à sa base d'un rebord très-étroit , plus indistinct près des angles ; glabre ; densément et ruguleusement ponctué ; offrant les traces d'une ligne longitudinale médiaire en partie lisse. *Elytres* faiblement plus larges en devant que le prothorax à sa base ; une fois plus longues qu'elles sont larges dans leur milieu ; subarrondies , prises ensemble , à leur extrémité ; à stries ponctuées , toutes distinctes. *Intervalles* marqués de points médiocres , rugueux , donnant chacun naissance à un poil noir , court , mi-couché , peu apparent. *Repli* sensiblement tourné en dehors. *Prosternum* comprimé ; séparant les hanches ; aussi élevé qu'elles ; à peine prolongé jusqu'à leur extrémité.

Patrie : l'Europe orientale (collect. de Marseul).

Obs. Cette espèce s'éloigne des précédentes par ses antennes plus longues ; par son corps proportionnellement moins étroit ; par son prothorax plus large, sans dépression derrière les yeux ; moins déclive aux angles de devant ; moins finement ponctué ; glabre. Par ses élytres subarrondies, prises ensemble, à l'extrémité, au lieu d'être obtuses ou obtusément arrondies chacune ; à stries distinctes ; à intervalles moins finement ponctués.

---

### Genre *Cteniopus* , Solier.

CARACTÈRES. *Antennes* à peu près filiformes ; à troisième article à peine plus grand que le quatrième ; plus longuement prolongées que la moitié du corps. *Dernier article des palpes maxillaires* très-obliquement coupé à son extrémité ; offrant son côté antéro-interne de trois quarts au moins aussi grand que le postéro-interne. *Prothorax* ordinairement plus rapproché de la forme du parallélipède que du demi-cercle ; souvent plus étroit à sa base que les élytres à leur partie antérieure ; non courbé en arrière sur les angles huméraux de celles-ci.



A ce genre se rapportent les espèces suivantes :

A. Prothorax plus étroit à la base que les élytres à leur partie antérieure. Elytres jaunes.

B. Hanches antérieures très-visiblement séparées par le prosternum.

*Altaicus.*

*Luteus.*

BB. Hanches antérieures presque contiguës. Prosternum très-comprimé, réduit à une tranche. souvent peu distincte sur une partie de sa longueur.

*Sulfureus.*

*Pallidus.*

AA. Prothorax presque aussi large à sa base que les élytres à leur partie antérieure.

Elytres noires.

*Sulfuripes.*

### 1. *C. altaicus* ; GEBLER.

*Suballongé, jaunâtre ou flave : antennes et genoux, noirs. Elytres garnies de poils concolores, très-fins; à stries ponctuées très-distinctes. Intervalles pointillés. Hanches de devant très-visiblement séparées par le prosternum.*

♂ Sixième arceau ventral profondément échancré, avec les côtés externes de cette échancrure prolongés chacun en un appendice corniforme, pubescent.

*Cistela altaica*, GEBLER, LEDEBOURS Reise in das Altaigebirg, 2<sup>e</sup> partie, 3<sup>e</sup> division, p. 128. — *Id.* Verzeichniss der in Kolywan-Woskressenskischen, Huttenbezirk Sud-west Sibiriens beobachteten Käfer, p. 196. — DÉJEAN, Catal. (1833), p. 214. — *Id.* (1837), 233.

Long. 0,0090 à 0,0200 (  $\frac{4}{5}$  à  $4\frac{1}{2}$  l. ). Larg. 0,0033 (  $1\frac{1}{2}$  l. ).

Patrie : les monts Altaï (coll. Reiche).

Obs. Les antennes, moins ordinairement le premier article, les yeux, le dernier article au moins des palpes maxillaires et les genoux sont noirs : la tête, le prothorax, le dessous du corps et les pieds sont jaunes ou d'un jaune flave : les élytres sont généralement plus pâles.



2. *C. luteus* ; (DEJEAN), KUSTER.

*Suballongé. Prothorax, élytres et cuisses, moins les genoux, jaunes : tout le reste, noir. Elytres garnies de poils obscurs ; à stries ponctuées : intervalles ponctués. Hanches antérieures distinctement séparées par le prosternum.*

♂ et ♀. Caractères analogues à ceux du *C. sulphureus*.

*Cistela lutea* (DEJEAN). Catal. (1833), p. 214 — *Id.* (1837), p. 235. — KUSTER, Kaef. Europ. 12, 82.

Long. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 1/2 l.). Larg. 0,0030 à 0,0039 (1 1/3 à 1 1/2 l.).

Patrie : la Sicile, l'Espagne méridionale (collect. Aubé, Reiche).

Obs. Cette espèce s'éloigne du *C. sulphureus*, avec lequel elle a beaucoup d'analogie, par le deuxième article des antennes proportionnellement plus court ; par ses élytres à stries toutes très-distinctes, assez prononcées et visiblement ponctuées ; par ses intervalles moins finement ponctués, moins plans postérieurement, garnis de poils obscurs, au lieu d'être concolores ; par ses hanches de devant très-distinctement séparées par le prosternum. Les cuisses sont brusquement noires vers les cinq sixièmes de leur longueur.

La couleur jaune passe quelquefois au jaune testacé ou nankin.

3. *C. sulfureus* ; FABR.

*Cteniopus sulfureus*, MULS. Hist. nat. des Col. de Fr. (*Pectinipèdes*), p. 70.

4. *C. pallidus* ; KUSTER.

*Suballongé ; presque glabre ; garni de poils très-courts et presque indistincts ; d'un flave pâle ou d'un flave nankin : dernier article des palpes ordinairement noir à son extrémité. Prothorax plus étroit que les élytres à sa base, creusé de trois grosses fossettes basilaires. Elytres offrant près de la suture deux ou trois stries légères, à stries souvent peu distinctes sur le reste*

de leur surface. Prosternum réduit à une tranche étroite, peu distinct entre les hanches.

Je n'ai vu que la ♀.

*Cistela pallida* (SCHMIDT et HELFER). (STURM). Catal (1845) p. 320. — KÜSTER, Kœf. Europ. 20. 82.

Long. 0,0061 à 0,0067 (2 3/4 à 3 l.). Larg. 0,0013 à 0,0022 (1/5 à 1 l.).

PATRIE : la Mésopotamie (collect. Reiche).

Tête presque glabre ; ponctuée. Prothorax tronqué en avant et à sa base ; arqué sur les côtés, un peu plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs ; creusé de trois fossettes basilaires : l'une, sulciforme, sur la ligne médiane, avancée presque jusqu'à la moitié antérieure de cette ligne : chacune des autres plus grosse, subarrondie, près des angles postérieurs qui sont un peu relevés ; tranchant sur les côtés ; peu convexe ; densément et finement ponctué ; presque glabre. Elytres d'un quart ou d'un tiers plus larges en avant que le prothorax à la base ; près de quatre fois aussi longues que lui ; garnies de poils concolores, fins, courts, peu épais, peu apparents ; offrant près de la suture deux ou trois stries, peu distinctement striées sur le reste. Dessous du corps et pieds entièrement de la couleur du dessus. Prosternum très-comprimé, réduit à une tranche, souvent en partie peu distinct entre les hanches ; non prolongé après elles.

Obs. Suivant M. Küster une partie des articles des antennes et plusieurs articles des palpes sont parfois bruns ou obscurs.

##### 5. *C. sulphuripes* ; GERMAR.

Suballongé (♂) ou oblong (♀). Dessous du corps, front et élytres, noirs. Bord antérieur de l'épistome, cuisses et jambes antérieures au moins, jaunes. Elytres presque aussi larges en avant que le prothorax ; garnies de poils noirs, couchés, soyeux ; rayées de quelques stries, près de la suture,

peu distinctement striées sur le reste. Prosternum très-étroit et parfois peu distinct entre les hanches.

♂ Noir : bord antérieur de l'épistome et souvent du labre, cuisses et jambes ordinairement jaunes : base des cuisses intermédiaires et postérieures et partie des jambes des mêmes pieds, souvent obscures, au moins après la mort. Sixième arceau ventral creusé d'une gouttière profonde, avec les côtés de celle-ci arrondis à leur extrémité.

*Cistela sulfuripes*. (Kox) GERMAN, Ins. nov. spec. p. 162. 267. — W. de REDTENDACHER. De quæd. gen. et spec. p. 18. 15.—*Id.* in GUÉRIN, Revue Cuvierienne (1843) p. 183. 15. — KUSTER, Käf. Europ. 20. 74.

♀ Prothorax d'un rouge testacé, avec trois bandes longitudinales nébuleuses, brunes ou noirâtres, tantôt peu distinctes, tantôt assez foncées; paraissant parfois dans ce dernier cas, noir, avec deux bandes longitudinales d'un rouge testacé. Cuisses et jambes, jaunes : tarses généralement noirs ou obscurs. Sixième arceau ventral de forme régulière, non creusé d'une gouttière.

*Cistela collaris* (DEJ.). Catal. (1833), p. 213. — *Id.* (1837), p. 235. — KUSTER, Käf. Europ. 20, 73.

♂ ♀ *Cistela sulphuripes*, CHARPENT. Horæ Entomol. p. 221.

♂ ♀ *Cteniopus sulfuripes*, L. REDTENDACHER, Faun. Aust., p. 603.

Long 0,0056 ( 2 1/2 l. ). Larg. 0,0018 ( 4/5 l. ) ♂ 0,0026 ( 1 1/5 l. ). ♀.

Patrie : la Hongrie.

Obs. Cette espèce s'éloigne des deux espèces précédentes par sa tête plus rétrécie en devant ; par son labre à peine plus large qu'il est long ; par son prothorax à peine moins large à la base que les élytres à leur partie antérieure ; de deux tiers (♂) ou près d'une fois (♀) plus large qu'il est long ; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes de sa longueur, parallèle ensuite ;

par ses élytres obtuses ou obtusément arrondies chacune à l'extrémité ; par son prosternum plus indistinct entre les hanches.

Par la largeur de son prothorax , par ses élytres obtuses ou obtusément arrondies chacune à l'extrémité , par sa couleur , elle semble se rapprocher des espèces du genre *Podonta*

---

### Genre *Heliotaurus* , MULSANT (1).

Dans mon histoire naturelle des Coléoptères de France , j'ai cherché à diviser les Omophliens par des caractères plus constants et plus faciles à saisir qu'on ne l'avait fait jusqu'alors. J'ai indiqué les ressources qu'offre le repli des élytres pour séparer les Omophles des auteurs en deux genres , dont les limites paraissent assez nettement tracées. Chez les Héliotaures , ce repli se prolonge presque jusqu'à l'angle sutural , ou du moins jusqu'à la partie postéro-externe voisine de l'extrémité des élytres ; et quelquefois il a une telle tendance à se tourner en dehors , que son bord interne semble être le bord marginal des étuis , et que l'espace compris entre ses deux bords paraît constituer , au moins dans la seconde moitié , un intervalle des élytres. Chez les Omophles au contraire , ce même espace se replie en dedans sur la majeure partie de la longueur du repli , en sorte que ce dernier est réduit à une tranche , quelquefois à partir du niveau de l'extrémité du postépisternum ou du bord antérieur des hanches des pieds de derrière , dans tous les cas , à partir de l'extrémité du premier arceau ventral , ou à peu près. Au genre *Heliotaurus* se rapportent les espèces suivantes. Chez toutes , les hanches antérieures ne sont pas visiblement séparées par le prosternum.

---

(1) Hist. nat. des Coléopt. de Fr. (*Pectinipèdes*), p. 73.

Le tableau ci joint facilitera leur détermination.

A. Elytres garnies de poils.

B. Elytres brièvement pubescentes. Ventre entièrement rouge ou d'une teinte rapprochée.

C. Prothorax rouge ou d'une teinte rapprochée.

*Nigripennis*.

CC. Prothorax noir.

D. Cuisses noires.

*Abdominalis*.

*Ovalis*.

*Anceps*.

DD. Cuisses rouges.

*Rufiventris*.

BB Elytres hérissées de longs poils.

E. Prothorax et ventre rouges ou d'une teinte rapprochée.

*Erythrogaster*.

EE. Prothorax et ventre de couleur foncée.

*Cæruleus*.

AA. Elytres glabres.

F. Prothorax rouge.

G. Ventre entièrement rouge ou d'une teinte rapprochée.

*Perroudi*.

GG. Ventre au moins en grande partie obscur.

H. Extrémité du ventre rouge.

*Distinctus*.

HH Ventre entièrement noir.

*Ruficollis*.

FF. Prothorax noir ou d'une couleur obscure.

*Angusticollis*.

*Reichii*.

#### 1. *H. nigripennis*; FABRICIUS.

*Suballongé ; peu convexe ; brièvement pubescent ; roux ou d'un rouge roux testacé, au moins sur le prothorax, l'abdomen, les cuisses et les ongles. Elytres soit entièrement d'un noir brulé, soit brunes, avec les bords d'un rouge roux ; à stries ponctuées. Intervalles squammuleusement ponctués.*

Long. 0,0100 à 0,0112 ( 4 1/2 à 5 l. ). Larg. 0,0039 à 0,0045 ( 1 3/4 à 2 l. ).

ETAT NORMAL. Tête, antennes, élytres, médi et postpectus,

tarses et majeure partie des tibias, noirs : prothorax, antépectus, ventre, cuisses, et ongles d'un roux rouge.

Obs. Les palpes maxillaires sont tantôt noirs, tantôt avec l'extrémité des deuxième et troisième articles d'un rouge testacé.

*Cistela nigripennis*, FABRICIUS, Entomol. Syst. t. 1. 2. p. 44. 41. — *Id.* Syst. Eleuth. tom. 2. p. 18. 9.

*Megischia nigripennis*, LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, p. 359. 936. pl. 31. fig. 11.

### *Variations* (par défaut).

Obs. Quand la matière colorante noire a plus ou moins fait défaut, la tête, la moitié antérieure des antennes, l'écusson, tout le dessous du corps et les pieds passent parfois au roux rouge. Les élytres deviennent brunes ou d'un brun rougeâtre, avec le bord externe, la base et parfois une partie variable de la suture, surtout vers l'extrémité, d'un rouge testacé ou d'un rouge roux testacé. On trouve toutes les transitions entre les variétés extrêmes.

*Megischia (Podonta) erythrocephala*, SOLIER, Prodrome, etc. in Annales de la Soc. Entom. de Fr. t. 4. p. 248. — LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, p. 359. 937. pl. 31. fig. 12.

♂ Ongles des pieds antérieurs épais, renflés dans leur milieu, parfois munis d'une dent vers le milieu du côté extérieur de la branche externe. Dernier arceau ventral échancré à l'extrémité; souvent longitudinalement creusé de deux sillons assez faibles, séparés par une carène médiane légère.

♀ Ongles des pieds extérieurs plus grêles; à branche externe sans dent vers le milieu de son côté extérieur. Sixième arceau ventral en ogive; fendu longitudinalement dans son milieu, à son extrémité.

*Corps* allongé ou suballongé; peu convexe; brièvement pu-



bescient. *Tête* assez finement et peu densément ponctuée. *Antennes* moins longuement prolongées que la moitié du corps ; comprimées et élargies à partir du septième jusqu'au dixième article. *Prothorax* tronqué en devant ; tronqué ou à peine bisinué à la base ; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié ou aux trois quarts, émoussé ou subarrondi aux angles postérieurs ; près de moitié plus large à la base, qu'il est long sur son milieu ; presque sans rebord. *Elytres* presque parallèles jusqu'aux deux tiers ; à *repli* invisible en dessus à l'épaule ; graduellement un peu élargi en gouttière vers le tiers de la longueur ; à stries ponctuées bien marquées. *Postépisternum* parallèles ; quatre fois environ aussi longs qu'ils sont larges.

Patrie : l'Algérie (collect. Aubé, Chevrolat, Godart, de Marseul, Reiche).

## 2. *II. abdominalis* ; DE CASTELNAU.

*Allongé ; subparallèle ; médiocrement convexe ; brièvement pubescent ; noir, avec l'abdomen et les ongles, d'un rouge fauve ou d'un rouge jaune. Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu plus, faiblement rétréci ou subparallèle ensuite, subarrondi aux angles postérieurs. Elytres à stries ponctuées. Intervalles squammuleusement pointillés : le marginal, à peine en gouttière étroite vers le tiers de sa longueur, aplani et un peu élargi vers l'extrémité.*

Long. 0,0142 à 0,0123 ( 5 à 5 1/2 l. ). Larg. 0,0045 ( 2 l. ).

➤ Dernier article des tarses antérieurs renflé. Branche externe des ongles des mêmes pieds, armée extérieurement d'une dent ; renflée dans le milieu de son peigne : branche interne grêle et inerme. Sixième arceau ventral et extrémité du cinquième profondément concaves : le sixième divisé longitudinalement dans sa moitié postérieure, en deux feuilletts arrondis chacun et ciliés, à l'extrémité : ces feuilletts débordés par le pygidium qui forme en dessous un septième arceau visible.

♀ Ongles des pieds antérieurs plus grêles : branche externe inerme à son côté extérieur. Sixième arceau ventral entier, convexe. Septième arceau invisible.

*Omophlus abdominalis* (DEJEAN), Catal. (1833). p. 213. — *Id.* (1837). p. 235. — DE CASTELNAU, Hist. Nat. t. 2. p. 247. 7. — KUSTEN, Kaef. Europ. 20. 68.

Patrie : l'Algérie (collect. Chevrolat, Godart).

OBS. Le dessus du corps est brièvement garni de poils noirs, couchés. Les antennes, les palpes, la tête, le prothorax, les élytres, la poitrine et les pieds sont d'un noir peu luisant. La tête et le prothorax sont ponctués : celui-ci à peine rebordé ; à angles postérieurs subarrondis et ouverts. Le prosternum ne se prolonge pas entre les hanches. Le repli est sensiblement tourné en dehors, au moins dans sa première moitié.

### 3. *H. ovalis*; DE CASTELNAU.

*Suballongé ; subovalaire ; médiocrement convexe ; brièvement pubescent ; noir , avec l'abdomen et les ongles d'un rouge fauve ou d'un rouge jaune. Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'au tiers , puis en ligne droite jusqu'à l'extrémité ; à angles postérieurs vifs et un peu aigus. Elytres à stries ponctuées. Intervalles squammuleusement pointillés : le marginal élargi depuis un peu après les épaules jusqu'à la moitié , en une gouttière plus large vers le tiers de sa longueur, déclive et plus étroit vers l'extrémité.*

Long. 0,0112 à 123 ( 5 à 5 1/2 l. ). Larg. 0,0045 à 0,0030 ( 2 à 2 1/4 l. ) vers le milieu des élytres.

♂ Dernier article des tarses antérieurs dilaté. Branche externe des mêmes ongles plus épaisse et plus longue que l'interne. Sixième arceau ventral échancré à sa partie postérieure ; longitudinalement creusé d'une large gouttière un peu ovalairement évasée d'avant en arrière, avec les bords latéraux de cette gouttière tranchants, déclives en ligne courbe et ciliés à leur extrémité.

♀ Dernier article des tarses antérieurs non dilatés. Branches

des ongles des mêmes tarses, égales et grêles. Sixième arceau ventral rétréci d'avant en arrière, obtus ou obtusément tronqué à son extrémité; convexe. Septième arceau parfois en partie visible.

*Omophilus ovalis*, DE CASTEL. Hist. Nat. t. 2. p. 247. 8.—LUCAS, Expl. sc. de l'Algérie, p. 356. 950.

Patrie : l'Algérie (collect. Aubé, Chevrolat, Godart, de Marseul).

OBS. Cette espèce à beaucoup d'analogie avec l'*H. abdominalis* et elle est confondue avec ce dernier par divers entomologistes. Elle s'en distingue par son prothorax élargi d'avant en arrière jusqu'aux angles postérieurs, d'abord en ligne courbe jusqu'au tiers de sa longueur, puis un peu plus faiblement et en ligne droite sur ses deux tiers postérieurs; à angles de derrière assez vifs au lieu d'être subarrondis, et un peu aigus, au lieu d'être un peu ouverts; à bord postérieur un peu arqué en arrière, au lieu d'être en ligne droite. Par ses élytres un peu ovalaires ou élargies vers leur milieu, au lieu d'être subparallèles; à intervalle marginal formant dans sa première moitié une gouttière commençant un peu après les épaules et aussi large vers le tiers de sa longueur que l'intervalle voisin; rétréci et décline vers l'extrémité.

Les ♂ des deux espèces offrent entre eux des différences faciles à saisir.

#### 4. III. *anceps*.

*Suballongé; très-médiocrement convexe; brièvement pubescent; noir, avec le ventre d'un rouge jaune. Elytres à stries ponctuées très-apparentes. Intervalles squammuleusement et finement ponctués.*

Long. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 1/2 l.). Larg. 0,0029 à 0,0033 (1 2/3 à 1 1/2 l.).

♂ Ongles dilatés dans leur milieu. Sixième arceau ventral légèrement échancré dans le milieu de son bord postérieur.

♂ Inconnue.

Patrie : Tanger (collect. Reiche).

Obs. L'exemplaire unique qu'il m'a été donné d'examiner diffère de l'*H. rufiventris* par ses pieds entièrement noirs ; mais il a d'ailleurs tant d'analogie avec cette espèce , que peut-être n'en est-il qu'une variété ou l'un des sexes.

### 5. *H. rufiventris* ; WALT.

*Allongé ; très-médiocrement convexe ; brièvement pubescent ; noir, avec le ventre et les cuisses de tous les pieds, d'un roux jaune. Elytres à stries ponctuées , très-apparentes. Intervalles squamuleusement et finement ponctués.*

Long. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 1/2 l.). Larg. 0,0029 à 0,0033 (1 2/3 à 1 1/2 l.).

♂ Je ne l'ai pas vu.

♀ Ongles des pieds antérieurs sans dent au côté externe de leur branche extérieure. Sixième arceau ventral de forme normale, c'est-à-dire rétréci d'avant en arrière , convexe , entier , émoussé à l'extrémité.

*Cistela rufiventris*, WALT., Reise Nach. Span. 2. p. 75. — SILBERMANN, Rev. Entomol. t. 4. p. 155.

*Omophlus rufiventris* (DEJ.), Catal. (1853). p. 213. — *Id.* (1837). p. 235. — KEST., Kaef. Europ. 20. 67.

Patrie : l'Espagne (collect. Chevrolat , Reiche).

Obs. Cette espèce a tout le corps noir, mat ou peu luisant ; le ventre et les cuisses d'un roux-jaune ; la tête et le prothorax ponctués : ce dernier à peu près tronqué à la base ; sans sillon longitudinal médiaire en dessus ; à peine rebordé. Repli horizontal.

### 6. *H. erythrogaster* ; LUGAS.

*Allongé ; très-médiocrement convexe ; noir : prothorax, antépectus, abdomen et ongles d'un rouge jaune : élytres d'un bleu vert foncé, hé-*

*rissées de poils noirs ; à stries ponctuées , moins distinctes sur les côtés. Intervalles ponctués. Prothorax garni de poils peu apparents.*

Long. 0,0100 à 0,0123 (4 1/2 à 5 1/2 l.). Larg. 0,0029 à 0,0045 (1 1/5 à 2 l.).

♂ Ongles des pieds de devant un peu renflés vers le milieu de leur peigne ; sans dent au côté extérieur de leur branche externe. Sixième arceau ventral peu profondément échancré à l'extrémité ; sillonné de chaque côté de la ligne médiane qui est relevée en carène.

♀ Ongles des pieds de devant grêles. Sixième arceau ventral normal, entier.

*Cistela testacea*, DE CASTELN. Hist. Nat. t. 2. p. 246. 3.

*Omophlus erythrogaster*, LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, p. 358. 954. pl. 31. fig. 10.

Patrie : l'Algérie (collect. Aubé, Chevrolat, Godart, de Marseille, Reiche).

*Tête, antennes, dessous du corps et pieds noirs* : la tête hérissée de poils noirs ou obscurs. *Prothorax* d'un rouge jaune ou jaunâtre ; garni de poils nébuleux, fins, mi-couchés, peu apparents. *Repli* des élytres un peu tourné en dehors..

### 7. III. *cœruleus*.

*Oblong ou suballongé ; médiocrement convexe ; hérissé de poils ; noir ; élytres d'un bleu verdâtre foncé ou d'un bleu noir ; à stries ponctuées ; intervalles fortement ponctués. Prothorax d'un tiers au moins plus large que long. Hanches antérieures ordinairement terminées en pointe.*

Long. 0,0090 à 0,0123 (4 à 5 1/2 l.). Larg. 0,0033 à 0,0045 (1 1/2 à 2 l.).

♂ Menton armé d'une corne perpendiculaire ordinairement assez longue, parfois rudimentaire. Ongles des pieds antérieurs habituellement arqués ; à peignes épaissis et renflés ; à branche externe souvent munie d'une dent à la base de son côté extérieur. Sixième arceau ventral entaillé ou échancré à son bord postérieur ;



creusé à partir de son bord antérieur d'une concavité ovalaire : bords de cette concavité tranchants ; chacun des lobes postérieurs cilié, subarrondi, ou en angle un peu aigu.

♀ Menton inerme. Ongles des pieds antérieurs grêles, inermes. Sixième arceau ventral de forme régulière, c'est-à-dire rétréci d'avant en arrière et convexe.

*Cistela cœruleus*, FABR. Mantiss. Ins. t. 1. p. 85. 10.

*Cistela cœrulea*, FAER. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 43. 10. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 15.

8. — LATR. Hist. nat. t. 11. p. 20. 4. — COQUEB. Illustr. t. 3. p. 127. pl. 29. 3. — SCHONH. Syn. Ins. t. 2. p. 334. 7. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 246. 8.

*Cryptocephalus (Cistela) cœrulescens*, GMEL. C. LINN. Syst. nat. t. 1. p. 1714. 100.

*Cistela cœrulescens*, OLIV. Encycl. méth. t. 6. p. 11. 6. — *Id.* Entom. t. 3. n. 54. p. 12. 17. pl. 2. fig. 18. a, b.

*Omophlus cœruleus*, DEJ. Catal. (1833) p. 213. — *Id.* (1837) p. 238. — LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, p. 357. 952. — KUSTER, Kœf. Europ. 13. 67.

PATRIE : l'Algérie (collect. Aubé, Chevrolat, Godart, de Marseul, Perroud, Reiche).

*Tête, antennes, palpes, prothorax, dessous du corps et pieds* ordinairement noirs. *Elytres* d'un bleu vert, d'un bleu violâtre ou d'un bleu noir ; hérissées de poils noirs ; ongles rouges. *Antennes* prolongées au moins jusqu'à la moitié de la longueur du corps (♀) ou plus longuement que cette moitié (♂). *Prothorax* subarrondi et déclive aux angles de devant, subparallèle ou peu arqué sur les côtés, émoussé aux angles postérieurs ; tronqué à la base ; muni d'un rebord très étroit ; légèrement déprimé ou moins déclive près des bords latéraux ; assez finement ponctué ; plus parcimonieusement et plus brièvement hérissé de poils que les étuis. *Elytres* à stries très-prononcées. *Intervalles* fortement ponctués. *Repli* sensiblement tourné en dehors.

Obs. Le dessous du corps, les pieds, et plus rarement le prothorax, au lieu d'être noirs, ont une teinte de noir bleu ou de bleu verdâtre plus ou moins apparente. Les hanches antérieures sont habituellement terminées en pointe, mais chez divers exemplaires, ce caractère s'efface, et elles se montrent obtuses. Le ♂ a



généralement le menton armé d'une corne droite, perpendiculaire, qui n'a pas été signalée, quoiqu'elle soit très-apparente; cependant cette partie saillante est parfois nulle ou rudimentaire. En général, la concavité du sixième arceau est d'autant plus profonde que la corne du menton est plus développée. Les ongles des pieds antérieurs du même sexe offrent aussi des variations singulières; ordinairement crochus et munis d'une petite dent à la base du côté externe de la branche interne ou antérieure: cette dent est parfois indistincte, et les ongles sont à peine arqués; mais leur épaisseur ou la dilatation de leur peigne dans son milieu, les distinguent toujours de ceux de la ♀.

### 8. **II. Perroudi.**

*Suballongé; médiocrement convexe; glabre et luisant en dessus. Tête, antennes et poitrine, moins les côtés de l'antépectus, noirs: prothorax, côtés de l'antépectus, ventre et pieds, d'un rouge ferrugineux ou testacé: élytres d'un vert bleu ou d'un bleu vert, à stries ponctuées. Intervalles finement ponctués.*

Long. 0,0123 (5 1/2 l.). Larg. 0,0033 à 0,0036 (1 1/2 à 1 2/3 l.).

Patrie: l'Algérie (collect. Perroud).

Je l'ai dédié à mon savant ami M. Perroud.

Obs. Elle se distingue des espèces précédentes par ses élytres glabres; des suivantes par son ventre et ses pieds rouges.

La poitrine est garnie de poils. Les tarses sont quelquefois en partie obscurs.

### 9. **II. distinctus**; DE CASTELNAU.

*Suballongé; convexe ou médiocrement convexe; glabre, en dessus; noir: prothorax, anus, ordinairement partie au moins des pieds antérieurs et ongles, d'un rouge jaune. Elytres d'un noir vert ou d'un noir bleu; à stries ponctuées. Intervalles ponctués.*

Long. 0,0078 à 0,0112 (3 1/2 à 5 l.). Larg. 0,0029 à 0,0043 (1 2/3 à 2 l.).

♂ Branche externe des ongles des pieds de devant , munie à la base de son côté extérieur d'une dent prolongée jusqu'à la moitié de sa longueur. Sixième arceau ventral tronqué ou à peine échanuré à son extrémité ; creusé presque sur toute sa largeur d'une concavité en demi-cercle vers son bord antérieur, offrant souvent une faible carène sur la partie postérieure de sa ligne médiane.

♀ Branche externe des ongles de devant , inerme. Sixième arceau ventral inerme.

*Omophlus Buquetii* (DEJ.), Catal. (1833), p. 213. — *Id.* (1837). p. 235.

*Cistela distincta*, DE CASTELN. Hist. Nat. t. 2. p. 246. 7.

*Omophlus distinctus*, LUCAS, Exp. lor. scient. de l'Algérie, p. 358. 953.

ETAT NORMAL. Tête , antennes , palpes , dessous du corps , moins l'an us , quatre pieds antérieurs et dessous de la page inférieure des cuisses , noirs : base de la partie antérieure ou supérieure des cuisses noirâtres. Prothorax, antépectus, deux tiers du côté antérieur des cuisses de devant , jambes et tarse s des mêmes pieds , tous les ongles et anus , d'un rouge jaune ou d'une teinte rapprochée.

### Variations.

Obs. Quand la matière noire a été moins abondante , l'extrémité des cuisses intermédiaires et postérieures , les jambes et tarse s des mêmes pieds , parfois la presque totalité des deux pages des cuisses de devant , et le labre sont d'un rouge jaune.

Quand , au contraire la matière noire surabonde , les pieds antérieurs sont entièrement noirs ou en partie d'un noir rousâtre.

La couleur rouge de l'an us est parfois réduite au sixième arceau , et se montre même quelquefois tachée de nébuleux ; d'autres fois le bord postérieur du cinquième arceau est également

rouge jaune. Les élytres varient du noir vert ou du noir bleu au vert noir ou au bleu noir. Leurs intervalles ordinairement presque plans, sont parfois un peu convexes; plus ou moins grossièrement ou finement ponctués. Malgré ces variations, cette espèce est très-facile à distinguer par son prothorax et son anus rouge jaune.

Patrie : l'Espagne, l'Algérie (collect. Aubé, Chevrolat, Godart, de Marseul, Reiche).

#### 10. *H. ruficollis*; FABRICIUS.

*Suballongé; médiocrement convexe; glabre et luisant, en dessus; noir. Prothorax et ongles d'un rouge pâle. Elytres d'un noir vert; à stries ponctuées, très-prononcées, surtout postérieurement: les premières affaiblies en devant. Intervalles subconvexes, parcimonieusement pointillés, crénelés par les pointes des stries.*

Long. 0,0090 à 0,0112 (4 à 5 l.). Larg. 0,0055 à 0,0045 (1 1/2 à 2 l.).

♂ Dernier article des tarses antérieurs renflé. Branche externe des ongles des pieds de devant munie d'une dent à la base de son côté extérieur. Sixième arceau ventral échancré à son bord postérieur jusqu'à la moitié de sa longueur; profondément concave sur presque toute sa largeur, offrant les bords de cette concavité tranchants et déclives en ligne courbe postérieurement, arrondis chacun en ligne courbe à leur extrémité.

♀ Dernier article des tarses antérieurs non renflé. Ongles des mêmes tarses, grêles: l'externe, inerme à son côté extérieur. Sixième arceau ventral, rétréci d'avant en arrière, convexe.

*Cistela ruficollis*, FABR. Spec. Ins. t. 1. p. 147. 7. — *Id.* Mant. t. 1. p. 85. 9. — *Id.* Entom. Syst. t. 1. 2. p. 43. 9. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 18. 7. — OLIV. Encycl. meth. t. 6. p. 6. 8. — *Id.* Entomol. t. 3. n. 54 p. 6. 4. pl. 1. fig. 5 a. — LATR. Hist. Nat. t. 11. p. 20. 5. — SCHONH. Syn. Ins. t. 2. p. 354. 6. — DE CASTELN. Hist. Nat. t. 2. p. 246. 6.

*Cryptocephalus (Cistela) rubricollis*, GIEL., C. LINN. Syst. Nat. t. 1. 1714. 99.

*Omophilus ruficollis* (DEJ.), Catal. (1853). p. 213. — *Id.* (1837). p. 235. — KÜSTER.

Kaef. Eur. 12. 81.

*Megischia* (*Podonta*) *ruficollis*, SOLIER, Annales de la Sociét. Entom. de Fr. 1. 4. p. 248.

*Antennes* prolongées jusqu'à la moitié de la longueur (♀) ou un peu plus (♂); à articles septième à dixième presque cylindrique. *Tête* ponctuée. *Prothorax* élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié, presque parallèle ou plus faiblement rétréci ensuite; émoussé ou subarrondi aux angles postérieurs; moins déclive près des bords latéraux; très-étroitement rebordé; souvent noté d'une faible fossette ou dépression près du milieu de la longueur de ses côtés et plus rarement d'une autre près de la ligne médiane; peu densément pointillé. *Elytres* noires, d'un noir vert ou verdâtre, parfois d'un noir bleuâtre; à dixième intervalle non en gouttière; à repli sensiblement tourné en dehors. *Dessous du corps et pieds* peu garnis de poils très-courts.

Obs. Dans les belles collections de M. Aubé et Reiche, se trouvent des Héliotaures ne différant du *ruficollis* que par leur prothorax noir. Ces individus, qui sembleraient devoir constituer une espèce particulière (*H. incertus*), ne sont vraisemblablement qu'une variation très-singulière de l'*H. ruficollis*. L'un de ces exemplaires offre même sur le prothorax des taches rouges, indices de la livrée normale de ce segment.

Patrie : l'Espagne méridionale.

### 11. *H. angusticollis*.

*Suballongé*; médiocrement convexe; glabre et luisant, en dessus; noir : élytres violettes, d'un bleu violet ou d'un bleu vert : ongles rouges. *Prothorax* d'un cinquième plus large à la base qu'il est long; finement ponctué. *Elytres* à stries en partie réduites à des rangées de points : les deuxième à quatrième plus voisines de la suture, apparentes : les autres peu marquées ou indistinctes. Intervalles assez fortement ponctués.

Long. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 1/2 l.). Larg. 0,0033 à 0,0039 (1 1/2 à 1 3/4 l.).

♂ Ongles des tarses de devant épais : la branche externe inerme à son côté extérieur. Sixième arceau ventral tronqué ou faiblement échancré à son extrémité ; un peu déprimé, rayé sur cette faible dépression de deux sillons longitudinaux, séparés par une légère arête médiale.

♀ Ongles des pieds de devant grêles. Sixième arceau ventral normal.

*Corps* suballongé ; médiocrement convexe ; glabre et luisant , en dessus. *Tête* noire ; assez finement ponctuée ; creusée d'une fossette sur le milieu du front. *Palpes* noirs. *Antennes* noires ; prolongées environ jusqu'à la moitié de la longueur du corps ; un peu plus grosses dans leur seconde moitié ; à articles septième à dixième presque cylindriques. *Prothorax* tronqué en devant ; émoussé et déclive aux angles antérieurs ; élargi en ligne un peu courbe jusqu'au tiers environ , puis presque parallèle ou à peine élargi jusque près des angles postérieurs ; émoussé ou subarrondi à ces derniers ; tronqué à la base ; d'un cinquième environ plus large à celle-ci qu'il est long sur son milieu ; très-étroitement rebordé ; médiocrement convexe ; ordinairement déprimé près de la moitié de ses bords latéraux, assez finement ponctué ; noir ou d'un noir violâtre ou bleuâtre. *Ecusson* en triangle très-obtus ou subarrondi à son extrémité ; ponctué ; de la couleur des étuis. *Élytres* d'un quart environ plus larges en devant que le prothorax à sa base ; à bord marginal étroit ; médiocrement convexes ; un peu déprimées transversalement chacune sur leur tiers ou sur leur moitié interne , vers le septième de la longueur ; à stries ponctuées légères , en partie réduites à des rangées striales de points : les deux à quatre plus voisines de la suture , assez marquées : les autres plus légères et en partie peu distinctes : les première et deuxième ordinairement plus prononcées postérieurement : les trois premières , surtout la deuxième , plus profondes sur la dépression post-basilaire. *Intervalles* plans ; assez densément et assez fortement ponctués ; un



peu rugueux. *Repli* tourné sensiblement en dehors. *Dessous du corps et pieds*, noirs. *Ongles* rouges.

Patrie : l'Égypte (collect. Chevrolat, de Marseul).

## 12. *H. Reichii*.

*Suballongé* ; médiocrement convexe ; glabre et luisant, en dessus ; noir : ongles rouges. *Prothorax* élargi jusqu'au tiers, subparallèle ensuite ; d'un cinquième plus large à la base qu'il est long ; finement ponctué ; creusé d'un sillon naissant vers le milieu de chaque bord latéral et dirigé d'avant en arrière vers la suture. *Elytres* d'un quart plus larges en devant que le *prothorax* ; à stries très-marquées, formées de points qui ne les débordent pas. Intervalles plans, ponctués.

Long. 0,0090 ( 2 l.). Larg. 0,0029 ( 1 2/5 l.).

♂ Inconnu.

♀ Ongles des pieds antérieurs grêles ; inermes au côté externe. Sixième arceau ventral régulier, rétréci d'avant en arrière, convexe.

*Corps* suballongé ; médiocrement convexe ; glabre et luisant, en dessus. *Tête* noire ; ponctuée ; creusée d'une fossette au milieu du front : mandibules rougeâtres près de l'extrémité. *Palpes* noirs. *Antennes* noires ; prolongées environ jusqu'à la moitié de la longueur du corps ; un peu plus grosses dans leur seconde moitié ; à articles sept à dix, presque cylindriques. *Prothorax* tronqué en devant ; déclive et émoussé aux angles de devant, qui, en raison de la déclivité, paraissent subarrondis ; élargi en ligne un peu courbe jusqu'au tiers de la longueur de ses côtés, subparallèle ensuite ; émoussé aux angles postérieurs ; tronqué à la base en ligne presque droite ou à peine trissinuée ; muni latéralement et à la base d'un rebord très-étroit ; d'un cinquième environ plus large à cette dernière qu'il est long sur son milieu ; noir ou d'un noir très-légèrement verdâtre, luisant ; finement et peu densément ponctué ; marqué, de chaque côté, d'un sillon



ou d'une dépression, naissant vers le milieu du bord latéral, dirigé, en s'affaiblissant, d'une manière obliquement transverse, vers la suture qu'il n'atteint pas, vers les trois quarts ou quatre cinquièmes de la longueur ; déprimé ou brièvement sillonné à l'extrémité de la ligne médiaire. *Ecusson* noir ; pointillé ; subarrondi à son extrémité. *Elytres* d'un quart ou d'un tiers plus larges en avant que le prothorax à sa base ; subparallèles ou faiblement élargies jusqu'au deux tiers, rétrécies ensuite en ligne un peu courbe jusqu'à l'angle sutural ; rebordées, mais non en gouttière latéralement ; médiocrement convexes ; noires ou d'un noir très-légèrement verdâtre et luisant ; à stries uniformément très-marquées, ponctuées ou formées de points presque contigus, ne crénelant pas les intervalles : ceux-ci, plans, marqués de points médiocrement rapprochés (ordinairement un ou deux seulement sur la largeur de chaque intervalle). *Repli* tourné en dehors. *Dessous du corps* noir. *Pieds* noirs. *Ongles* rouges.

PATRIE : L'Algérie (collect. Reiche).

J'ai dédié cette espèce à M. Reiche, l'un de nos entomologistes les plus distingués, comme un faible témoignage de ma reconnaissance pour ses bienveillantes communications, et d'admiration pour ses travaux.

Obs. Elle a beaucoup d'analogie pour la forme avec l'*H. angusticollis*, dont elle se distingue par son prothorax offrant de chaque côté un sillon obliquement transverse, qui semble former avec son pareil, un arc transversal dirigé en arrière et largement affaibli ou interrompu dans son milieu ; par ses élytres à stries uniformément très-apparentes ou très-marquées sur toute leur longueur ; par ses intervalles moins densément ponctués, lisses ou presque lisses entre les points.

Toutefois je n'ai vu qu'un individu ♀ de cette espèce.

---

Il faut probablement rapporter au même genre l'espèce suivante que je n'ai pas vue.

12. *H. maroccanus* ; Lucas.

Tête et prothorax d'un bleu violacé brillant : élytres d'un vert bleu : poitrine et cuisses, d'un noir bleu : ventre, jambes et tarses, d'un jaune rouge. Prothorax finement ponctué ; fortement rebordé sur les côtés ; marqué d'un sillon mi-transversal vers chaque angle postérieur. Elytres peu convexes ; assez profondément striées. Intervalles saillants, finement ponctués.

Long. 0,0123 (3 1/4 l.). Larg. 0,0050 (2 1/4 l.).

*Omophilus maroccanus*, Lucas, Explor. sc. de l'Algérie. p. 357. 931.

PATRIE : L'Algérie, vers les frontières du Maroc.

Obs. Les antennes et l'écusson sont noirs.

Genre : *Omophilus*.

Divers entomologistes confondent souvent avec l'*O. curvipes*, (décrit dans l'Hist. nat. des coléopt. de Fr. (Pectinipèdes p. 75), ou du moins avec la ♀ de celui-ci, l'espèce suivante :

*O. armillatus* ; Brullé.

Allongé ; noir : deuxième et troisième articles au moins des palpes et des antennes et jambes antérieures au moins, d'un roux testacé livide. Elytres d'un jaune testacé. Tête et prothorax finement ponctués ; garnis de poils cendrés fins, très-courts et peu épais. Prothorax presque en parallélogramme, d'un tiers plus large qu'il est long ; relevé en rebord uniforme et très-étroit sur les côtés ; déprimé près du milieu de ceux-ci. Elytres garnies de poils concolores ; à neuf stries ponctuées, régulières et très-marquées. Intervalles presque plans, ruguleusement et finement ponctués. Prosternum séparant les hanches, moins élevé qu'elles, graduellement moins saillant postérieurement. Repli rétréci presque en tranche, mais offrant les deux bords distincts jusqu'à près de l'extrémité.

Long. 0,0123 (6 l.).

♂ Jambes droites. Sixième arceau ventral échanuré en demi-cercle jusqu'au bord du cinquième arceau sur plus de la moitié de la largeur : ordinairement caréné dans le fond de cette échancrure : celle-ci offrant ses bords latéraux droits, terminés chacun en une pointe hérissée de poils roussâtres.

♀ M'est inconnue.

*Gistela armillata*, BRULLÉ, Exped. scient. de Morée t. 9. première part. p. 225. 388. pl. 41. fig. 2.

PATRIE : La Sicile, la Grèce.

OBS. Le prothorax est faiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés ; offrant vers le milieu de ceux-ci sa plus grande largeur ; à peine plus large aux angles postérieurs qu'aux antérieurs. Les élytres sont parallèles jusqu'aux deux tiers (♂), rétrécies ensuite en ligne peu courbe, subarrondies chacune à l'angle sutural ; creusées à la base au devant de la fossette humérale d'une dépression qui se prolonge en s'affaiblissant jusqu'à l'écusson.

Parfois tous les articles des palpes, les quatre premiers articles des antennes, l'extrémité des cuisses antérieures, toutes les jambes et les tarses sont d'un flave ou roux testacé, du moins chez le ♂.

Cette espèce est surtout remarquable par son repli, qui au lieu d'être réduit à une tranche à partir des hanches postérieures, se continue très étroit, mais avec des bords distincts, jusque près de l'extrémité. Elle se rapproche par là, de l'*O. curvipes*, dont elle diffère par son prosternum moins élevé que les hanches, non graduellement plus saillant d'avant en arrière ; par son prothorax plus large ; par ses élytres seulement à neuf stries, etc.

#### ♂. *orientalis*.

Suballongé ; noir : élytres d'un roux testacé. Prothorax en parallépipède une fois environ plus large que long ; presque en ligne droite à son bord

antérieur, à peine arqué sur les côtés; relevé sur les côtés en un rebord graduellement un peu plus large dans son milieu; rayé de chaque côté de deux sillons transverses raccourcis vers la ligne médiane; offrant parfois sur celle-ci les traces d'une ligne longitudinale; rugueusement ponctué sur les côtés; peu garni de poils. Elytres glabres; sans fossette au milieu de leur base; subrugueusement ponctuées; à stries ponctuées: les six ou sept premières très-distinctes, mais affaiblies vers l'extrémité: la huitième indistincte; offrant une gouttière assez étroite, depuis l'épaule jusque vers la moitié.

Long. 0,0090 à 0,0112 (4 à 5 l.). Larg. 0,0033 à 0,0043 (1 1/2 à 2 l.) à la base des élytres.

Corps suballongé; médiocrement convexe. Tête noire, finement ponctué; hérissée de poils cendrés ou nébuleux, fins, clairsemés ou peu épais; marquée d'une fossette légère sur le milieu du front, et d'une dépression plus sensible entre celle-ci et le côté interne de chaque œil; sillonnée sur la suture frontale. Palpes noirs. Antennes prolongées jusques au-delà de la moitié du corps (♂); noires; presque glabres. Prothorax en parallélipède transversal, une fois environ plus large qu'il est long; en ligne presque droite à ses bords antérieur et postérieur; à peine élargi en ligne un peu courbe jusqu'à la moitié de ses côtés, subparallèle ou un peu rétréci en ligne droite, et dans ce cas paraissant légèrement arqué sur les côtés ou un peu anguleux dans le milieu de ceux-ci; émoussé aux angles antérieurs et postérieurs; à peine plus large à ceux-ci qu'à ceux de devant; muni en devant et à la base d'un rebord très-étroit; relevé de chaque côté en un rebord graduellement moins étroit dans son milieu, égal dans ce point au sixième ou au septième de la moitié de la largeur; déprimé de chaque côté vers les bords latéraux et d'une manière graduellement plus large vers la moitié de ceux-ci; peu convexe, un peu inégal; noir, finement ponctué sur le dos, rugueusement dans chaque dépression latérale; les petits points du dos séparés par des espaces lisses; garni ou hérissé de poils cen-

drés très-clairsemés ; creusé de deux sillons transversaux interrompus dans leur milieu : l'un naissant vers les deux tiers ou un peu plus de la gouttière latérale, interrompu au moins sur son quart médiaire : l'autre moins apparent ou moins marqué , naissant vers le tiers environ de la fossette latérale , plus largement interrompu ; offrant quelquefois sur le milieu de sa longueur les traces d'une ligne médiane. *Ecusson* en triangle obtus ; noir ; pointillé ; presque glabre. *Elytres* d'un sixième ou d'un cinquième plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; quatre fois ou quatre fois et demie environ aussi longues que lui ; élargies en ligne subsinuée jusqu'aux trois cinquièmes de leur longueur, rétrécies ensuite , subarrondies chacune à l'extrémité, plus brièvement à l'angle sutural qu'au côté externe ; une fois plus longues qu'elles sont larges, prises ensemble ; offrant sur les côtés une gouttière assez étroite, naissant un peu après les épaules et prolongée jusqu'à la moitié de leur longueur , réduite à une légère strie postérieurement ; assez faiblement ( $\sigma$ ) convexes ; à fossette humérale avancée jusqu'à la base ; sans dépression bien sensible sur le milieu de celle-ci ; d'un roux testacé ; glabres ; ruguleusement et finement ponctuées ; offrant, à partir de la suture, six ou sept stries assez finement ponctuées , plus légères ou peu distinctes vers l'extrémité. *Intervalles* plans : ordinairement presque égaux ou peu régulièrement inégaux ; espace compris entre la septième strie et la juxta-marginale, sans trace de strie , égal à environ trois autres intervalles. *Dessous du corps et pieds* noirs ; hérissés de poils fins et cendrés. *Prosternum* comprimé et indistinct entre les hanches ; moins élevé qu'elles ; prolongé jusqu'à l'extrémité de l'arceau.

**PATRIE :** Les environs de Constantinople (collect. Wachanru) ; la Crimée (collect. Godart).

**Obs.** Cette espèce a beaucoup d'analogie avec l'*O. brevicollis* ; elle en diffère par sa taille ordinairement un peu plus petite ;



par ses antennes proportionnellement un peu plus longues ; par son prothorax à peu près en ligne droite à son bord antérieur , moins largement et moins uniformément relevé en rebord sur les côtés ; par ses élytres moins rugueuses , à stries mieux marquées et ordinairement distinctes, du moins les cinq premières, jusque près de l'extrémité.

#### ***G. scutellaris.***

*Suballongé ; noir : élytres d'un roux testacé. Prothorax en parallélipède d'un cinquième ou d'un quart plus large que long ; presque en ligne droite sur tous ses côtés ; très-étroitement rebordé ; rayé de chaque côté de deux sillons transverses un peu divergents et raccourcis vers la ligne médiane ; rayé sur celle-ci d'un sillon affaibli en devant, plus marqué vers la base. Ecuison d'un roux testacé, à base obscure. Elytres presque glabres, peu garnies de poils ; ruguleusement ponctuées ; à neuf stries ponctuées et distinctes : rayées d'un sillon juxta-latéral depuis l'épaule jusqu'au cinquième de leur longueur.*

Long. 0,0090 (4 l.) Larg. 0,0028 (1 1/4 l.) à la base des élytres.

*Corps suballongé ; très-médiocrement convexe. Tête noire ; finement ponctuée ; presque glabre ; marquée d'une fossette légère sur le milieu du front, et d'une dépression assez faible entre celle-ci et le côté interne de chaque œil ; sillonnée sur la suture frontale. Palpes noirs. Antennes prolongées environ jusqu'à la moitié du corps ; grossissant graduellement à partir du troisième ou du quatrième article ; noires, avec les trois premiers articles en partie d'un brun fauve. Prothorax en parallélipède transversal d'un cinquième ou d'un quart plus large que long ; en ligne presque droite sur tous ses côtés ; aussi large aux angles de devant qu'à ceux de derrière ; très-étroitement rebordé ; peu convexe ; finement ponctué ; glabre ; marqué de chaque côté de deux sillons transverses, naissant près des bords latéraux : l'antérieur, vers les deux cinquièmes de sa longueur, dirigé vers la ligne médiane qu'il n'atteint pas, en se rapprochant*



un peu du bord antérieur : le postérieur , naissant vers les trois cinquièmes ou deux tiers, se rapprochant un peu de la base, en se dirigeant vers son pareil avec lequel il ne s'unit pas ; creusé sur la ligne médiane d'un sillon longitudinal, affaibli en devant, plus prononcé sur le milieu et surtout au devant de la base. *Écusson* en triangle à côtés curvilignes ; d'un roux testacé, à base obscure. *Elytres* d'un sixième environ plus larges que le prothorax, un peu moins de quatre fois aussi longues que lui ; faiblement élargies jusque vers les deux tiers ; subarrondies chacune à l'extrémité ; peu ou très-médiocrement convexes ; marquées d'une fossette humérale et d'une autre, au milieu de la base ; d'un roux testacé ; presque glabres, garnies de poils très-clair-semés et peu apparents, surtout en devant ; à neuf stries ponctuées distinctes : les troisième et sixième plus courtes et encloses par leurs voisines. *Intervalles* rugueusement ponctués ; offrant à partir des épaules , un sillon juxta-latéral prolongé jusqu'au cinquième de leur longueur. *Dessous du corps* et *pièds* noirs ; garnis de poils cendrés peu épais. *Prosternum* très-comprimé, peu distinct entre les hanches, moins élevé qu'elles, non prolongé au-delà de l'extrémité de l'arceau.

**PATRIE :** L'Égypte (collect. Reiche).

**Obs.** Elle se distinguerait facilement des autres espèces connues par la couleur de son écusson, si cette couleur n'est pas susceptible de se montrer obscure chez d'autres individus, ce qui serait possible. La couleur des premiers articles des antennes peut en revanche être moins sombre ou plus claire chez d'autres exemplaires.

#### ♂. *syriacus* ; (Dejean) Reiche.

*Allongé ; entièrement noir, garni de poils cendrés qui lui donnent une teinte d'un noir grisâtre. Antennes grossissant sensiblement vers l'extrémité. Prothorax presque en parallépipède d'un tiers plus large que long ; étroitement rebordé ; ponctué ; marqué de deux sillons transverses interrompus dans le milieu. Elytres rugueusement ponctuées ; à stries légères : la huitième*

et parfois aussi la septième, indistinctes ; à fossette humérale légère. *Prosternum* comprimé et peu distinct entre les hanches.

*Omophilus syriacus* (DÉJEAN) Catal. (1827) p. 235. — REICHE.

♂ Inconnu. Il doit avoir vraisemblablement les antennes moins grosses que la ♀.

♀ Sixième arceau ventral régulier, sans dépression. Jambes de devant denticulées sur leur arête externe. Peignes des ongles des pieds antérieurs, grêles.

Long. 0,0095 à 3,0100 (4 1/4 à 4 1/2 lig.). Larg. 0,0033 à 0,0034 (1 1/2 à 1 2/5 l.).

*Corps* allongé ; noir, mais paraissant d'un noir cendré ou un peu ardoisé par l'effet des poils dont il est garni. *Tête* de moitié environ plus longue qu'elle est large vers les yeux ; subconvexe ; assez grossièrement ponctuée ; hérissée de poils d'un brun cendré, assez longs, peu épais ; notée d'une fossette sur le milieu du front, et d'une dépression à peine moins faible au côté interne des yeux. *Palpes* et *antennes* noirs : celles-ci, peu et très brièvement pubescentes ; un peu luisantes sur les premiers articles, mates sur les autres ; à peine comprimées, et grossissant sensiblement à partir du quatrième article. *Prothorax* presque en parallélipède transversal, d'un tiers environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; tronqué en devant, mais subsinué derrière chaque œil ; très-faiblement élargi jusqu'aux deux cinquièmes de ses côtés, subparallèle ou à peine rétréci ensuite ; tronqué à la base ; très-étroitement rebordé en devant et à sa base ; à peine moins étroitement relevé sur les côtés en un rebord tranchant ; émoussé à ses angles, surtout aux postérieurs ; médiocrement convexe ; faiblement déprimé près du milieu de ses côtés ; offrant deux sillons interrompus dans leur tiers médiaire environ, naissant de chacun des bords latéraux : l'un, vers le tiers ou les deux cinquièmes ; l'autre, vers les deux tiers ; noir, luisant ; ponctué à peu près comme la tête, près de ses côtés, plus légè-

ment sur le dos ; hérissé de poils d'un brun cendré fins, peu épais, peu allongés et souvent usés sur le dos. *Ecusson* en triangle presque aussi long que large ; à côtés un peu curvilignes ; ruguleusement pointillé. *Elytres* d'un quart environ plus larges que le prothorax dans son milieu ; quatre fois environ aussi longues que lui ; munies d'un rebord latéral très-étroit et tranchant , presque planes ou peu convexes sur le dos, convexe-ment déclives sur les côtés ; à fossette humérale très-faible ; notées au milieu de la base d'une fossette plus distincte ; rugueusement ponctuées ; noires ; garnies de poils cendrés fins, courts et presque couchés, leur donnant une teinte d'un noir grisâtre ou un peu ardoisé ; à stries ponctuées légères ou peu prononcées : la huitième et parfois aussi la septième indistinctes : intervalle marginal faiblement sulciforme, après l'épaule. *Repli* réduit à une tranche à partir du niveau des hanches. *Dessous du corps et pieds* noirs, luisants, hérissés de poils cendrés. *Prosternum* comprimé entre les hanches et moins élevé qu'elles.

PATRIE : La Syrie (collect. Reiche).

Je n'ai vu que la ♀

DESCRIPTION  
DE  
QUELQUES ELATÉRIDES  
NOUVEAUX OU PEU CONNUS

PAR  
E. Mulsant et Guillebeau

Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 42 mai 4836.



**Athous titanus.**

*D'un noir brun, avec les élytres d'un brun noirâtre et leur bord extérieur d'un testacé roussâtre; presque glabre en dessus (♀). Tête déprimée sur le front; grossièrement ponctuée, avec des empâtements lisses. Arête frontale arquée, confondue avec l'épistome au milieu de sa partie antérieure. Deuxième article des antennes court: le troisième à peine moins long que le suivant. Prothorax rebordé latéralement; à angles postérieurs munis d'une très-petite dent dirigée en dehors; ponctué; offrant les traces d'une ligne médiaire lisse. Elytres à stries assez profondes, marquées de points ne les débordant pas. Intervalles finement et peu densément ponctués: les troisième à cinquième obtusément en toit en devant. Repli tranchant sur les côtés du ventre. Partie sternale de l'antépectus munie en devant d'un rebord court et convexe, suivi d'un sillon.*

♂ Inconnu.

♀ Corps assez large. Antennes un peu plus longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; à articles quatrième à dixième dilatés au côté interne, en forme de dent graduellement plus faible du quatrième au dixième. Prothorax presque parallèle, très-faiblement arqué sur les côtés depuis les angles de devant jusqu'aux cinq sixièmes de sa longueur, subparallèle ensuite, offrant, par là, une légère sinuosité vers les cinq sixièmes ; convexe ; presque glabre ; marqué de points un peu ou à peine moins gros que ceux de la tête, moins serrés sur le dos que sur les côtés. Elytres trois fois ou trois fois et quart aussi longues que le prothorax ; subparallèles jusqu'aux cinq sixièmes, obtusément arrondies à l'extrémité, prises ensemble ; très-médiocrement convexes sur le dos. Intervalles peu ruguleusement ponctués.

Long. 0,0225 (40 l.). Larg. 0,0067 (3 l.).

*Corps* allongé ; subparallèle ; presque glabre en dessus (♀). *Tête* d'un noir brun ; creusée d'une dépression naissant au milieu du front, élargie d'arrière en avant jusque vers le bord antérieur ; marquée de gros points, moins rapprochés sur le milieu de la dépression : plusieurs de ces points séparés par des espaces lisses simulant des empâtements. *Arête frontale* en arc régulier assez faible ; offrant une tranche assez vive, saillante au-dessus du labre, confondu avec l'épistome sur la moitié médiale au moins de sa largeur, lisse dans son milieu. *Mandibules* d'un rouge brun à la base, plus obscures à l'extrémité. *Palpes* d'un rouge brun. *Antennes* brunes ou d'un brun noir à la base, graduellement un peu moins obscures à l'extrémité ; peu pubescentes ; comprimées ; à deuxième et troisième articles plus étroits que les suivants : le deuxième égal aux deux tiers du troisième : celui-ci un peu moins long que le suivant : les quatrième à dixième obtriangulaires, plus développés au côté interne et, par là, subdentés à ce côté. *Prothorax* presque tronqué en devant ,



avec les angles antérieurs déclives et avancés pour embrasser un peu les yeux ; à peine plus long sur son milieu qu'il est large à la base ; à angles postérieurs un peu obtus, faiblement plus prolongés en arrière que les angles de l'échancrure antéscutellaire, armés près de leur extrémité d'une petite dent dirigée en dehors ; muni latéralement d'un rebord un peu tranchant entièrement visible en dessus ; ponctué ; d'un noir brun ; presque glabre (♀) ; offrant sur la ligne médiane une faible trace étroite, lisse ou à peine déprimée ; parfois noté d'une légère fossette, de chaque côté de la ligne médiane, vers les trois quarts de sa longueur. *Ecusson* brun ; presque parallèle, obtusément arrondi à l'extrémité ; subconvexe ou obtusément en toit ; pointillé : presque glabre. *Elytres* faiblement plus larges aux épaules que le prothorax à ses angles postérieurs, brunes, avec l'intervalle marginal d'un testacé roussâtre ; à neuf stries : les deux premières légères : les autres assez profondes, surtout les troisième à cinquième à leur partie antérieure : ces stries marquées de points assez petits, irréguliers, ne les débordant pas : la sixième, avancée jusqu'à la base où elle s'unit à la cinquième : les septième et huitième plus courtes en avant : la neuvième un peu sinuée et sulciforme, depuis l'épaule jusqu'aux hanches postérieures. *Intervalles* marqués de points irréguliers, peu épais, un peu rugueux ; presque glabres ou peu garnis près de la base et du bord marginal de poils courts et cendrés (♀) ; presque plans : les troisième à cinquième obtusément en toit à leur partie antérieure : les troisième, cinquième et septième plus larges postérieurement que leurs voisins : le dixième ou marginal presque nul en avant, graduellement moins étroit d'avant en arrière, un peu moins large que le neuvième vers les deux tiers de sa longueur. *Repli* d'un testacé roussâtre ; en gouttière et à peine plus large que le postépisternum, vers la moitié de celui-ci, réduit à une tranche sur les côtés du ventre jusqu'au quatrième arceau. *Dessous du corps* d'un noir brun, un peu



moins foncé sur l'antépectus ; ponctué assez grossièrement sur ce dernier, finement sur les autres parties pectorales et sur le ventre ; garni de poils fins, couchés, d'un fauve livide, luisants, mi-dorés à certain jour, donnant aux segments postérieurs de la poitrine et à ceux du ventre une teinte d'un noir verdâtre. *Partie sternale de l'antépectus* à peine arquée à son bord antérieur ; munie à celui-ci d'un rebord convexe, à peine égal au diamètre du dernier article des palpes sur les deux tiers médiaux de sa largeur, rétréci à ses extrémités : ce rebord suivi d'un sillon transversal très-marqué. *Métasternum* suivi, à l'extrémité de sa ligne médiane, d'un trou profond, presque en losange, prolongé jusqu'au niveau du milieu de la longueur des hanches. *Pieds* d'un brun noir ou d'un noir brun, avec les tarses un peu moins obscurs en dessus, avec l'extrémité du dernier article et le dessous des autres d'un rouge testacé : hanches postérieures assez fortement élargies au côté interne de leur partie supérieure, graduellement rétrécies depuis l'insertion des cuisses jusqu'aux deux tiers de leur largeur, presque linéaires ou réduites à peu de chose extérieurement : tarses postérieurs graduellement moins épais du premier au quatrième article : le premier presque aussi long que les deux suivants réunis.

**PATRIE :** Le Midi de la France.

**Obs.** Cette espèce se distingue des autres par une taille beaucoup plus avantageuse. Elle s'éloigne des ♀ des *A. fuscicornis* et *Dejeanii* par la sixième strie des élytres avancée jusqu'au niveau de la cinquième avec laquelle elle se lie ; par les troisième à cinquième intervalles en toit en devant ; par le repli des élytres tranchant sur les côtés des deuxième à quatrième arceaux ; par la partie sternale de l'antépectus munie en devant d'un rebord convexe et peu développé dans le sens longitudinal de l'insecte ; par le trou plus grand de l'extrémité du métasternum. Elle s'éloigne en outre de l'*A. Dejeanii* par l'arête frontale en arc

régulier, et du *fuscicornis* par cette arête confondue en devant avec l'épistome.

### **Athous Dejeanii.**

*Dessus du corps* d'un noir brun sur la tête et sur le prothorax, brun sur les élytres, avec le bord marginal de celles-ci d'un roux testacé; pubescent (♂), presque glabre (♀). Tête déprimée sur le front; assez grossièrement ponctuée. Arête frontale en angle tronqué en devant; confondue avec l'épistome à son bord antérieur. Deuxième article des antennes court: le troisième presque aussi long que le quatrième. Prothorax muni latéralement d'un rebord visible en dessus; à angles postérieurs armés d'une dent dirigée en dehors; ponctué; offrant à peine les traces d'une ligne médiane. Elytres à stries ponctuées et assez prononcées. Intervalles presque plans; pointillés. Repli à deux bords distincts sur les côtés du ventre. Partie sternale de l'antépectus relevée et obtusément arquée en devant, chargée un peu après d'une saillie transversale.

♂ Corps plus étroit, plus parallèle, moins convexe; garni en dessus de poils d'un fauve cendré ou d'un fauve testacé, fins, couchés, mais très-apparents, qui lui donnent une teinte d'un brun fauve. Antennes prolongées environ jusqu'au quart de la longueur des élytres; d'un roux ou d'un fauve testacé: articles quatrième à dixième, moins dilatés, proportionnellement plus longs; à dernier article quatre ou cinq fois aussi long qu'il est large. Prothorax presque parallèle; à peine plus long sur son milieu qu'il est large à la base; peu convexe. Elytres presque parallèles jusqu'aux deux tiers, rétrécies ensuite; peu convexes. Intervalles plus sensiblement ruguleux: les troisième à cinquième moins sensiblement plus convexes que les autres vers la base. Pieds bruns, avec les tarses d'un brun testacé ou d'un testacé brun.

♀ Proportionnellement plus large, moins parallèle, plus convexe; brune et à peu près glabre en dessus, au moins sur le prothorax et sur les élytres. Antennes à peine plus longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax; brunes à la

base, graduellement d'un brun rouge testacé vers l'extrémité ; à articles quatrième à dixième proportionnellement plus dilatés , moins longs. *Prothorax* un peu élargi en ligne faiblement courbe jusqu'à la moitié ou aux quatre septièmes, subsinuusement rétréci ensuite ; convexe ; à peine plus long sur son milieu qu'il est large à la base, un peu moins long qu'il est large vers la moitié de ses côtés ; marqué d'une dépression ou fossette oblique contiguë au bord marginal vers le tiers ou les deux cinquièmes de la longueur. *Elytres* subsinuusement élargies jusqu'aux deux tiers ; médiocrement convexes. Intervalles moins rugueux : les troisième à cinquième plus sensiblement convexes en avant. *Pieds* bruns ou d'un brun testacé sur les cuisses, d'un fauve ou d'un roux testacé graduellement plus clair sur les jambes et les tarses.

*Athous Dejeanii* (YVAN) (DEJEAN) Catal. (1833) p. 89 — *Id.* (1837) p. 101.

(Suivant un exemplaire envoyé à M. Foudras par feu le comte Dejean.)

Long. 0,0157 (7 l.) ♂. — 0,168 (7 1/2 l.) ♀. — Larg. 0,0043 (2 l.) ♂. 0,0050 (2 1/3 à 2 1/2 l.) ♀.

*Corps* allongé ; subparallèle ; pubescent (♂) ou presque glabre (♀) en dessus. *Tête* brune ou d'un brun rougeâtre ; creusée d'une dépression naissant au milieu du front, plus prononcée sur ce point et près du bord antérieur que sur la région intermédiaire ; marquée de points assez gros, surtout sur la dépression. *Arête frontale* en angle tronqué en avant ; confondue dans cette partie tronquée, qui est lisse, avec l'épistome. *Mandibules* d'un rouge brun, avec l'extrémité obscure ou noirâtre. *Palpes* testacés ou d'un testacé fauve. *Antennes* d'un fauve testacé, ordinairement plus obscures chez la ♀ ; pubescentes ; comprimées ; à troisième et surtout deuxième articles plus étroits que le quatrième : le deuxième, près de moitié plus court que le troisième ; celui-ci un peu moins long ou presque aussi long que

le quatrième : les quatrième à dixième obtriangulaires , plus développés au côté interne et, par là, subdentés à ce côté. *Prothorax* presque tronqué en devant , subsinué derrière les yeux, avec les angles antérieurs déclives; à angles postérieurs non obtus , médiocrement prolongés en arrière et munis vers leur extrémité, d'une petite dent très-apparente dirigée en dehors ; muni latéralement d'un rebord entièrement visible quand l'insecte est examiné en dessus ; ponctué un peu moins grossièrement que la tête ; offrant les traces d'une ligne longitudinale médiane lisse ; noté d'une fossette de chaque côté de cette ligne, vers les deux tiers ou un peu plus de la longueur. *Ecusson* de la couleur des étuis ; obtusément arrondi à son extrémité ; subconvexe ; ponctué. *Elytres* un peu plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; deux fois et demie ou un peu plus aussi longues que lui ; brunes, avec l'intervalle marginal d'un roux testacé ; à neuf stries étroites , linéaires , assez prononcées, marquées de points plus longs que larges, ne les débordant pas : les troisième à cinquième plus profondes vers la base : la sixième et surtout les septième et huitième non avancées jusqu'à la base : la neuvième subciforme depuis l'épaule jusqu'au niveau des hanches postérieures. *Intervalles* marqués de petits points ; presque plans : les troisième à cinquième graduellement un peu élargis et subconvexes en devant : les troisième à septième un peu plus larges postérieurement que leurs voisins : le dixième ou marginal, presque nul en devant, graduellement moins étroit d'avant en arrière, un peu moins large que le neuvième vers les deux tiers de sa longueur. *Repli* testacé ; à peine plus large que le postépisternum vers la moitié de celui-ci ; presque réduit à une tranche sur les côtés du ventre , mais offrant cependant ses deux bords distincts : l'interne graduellement moins élevé que l'externe d'avant en arrière. *Dessous du corps* brun ou d'un brun rougeâtre ; moins finement ponctué sur l'antépéctus que sur les autres parties ; garni de poils fins , couchés , cendrés ou



d'un cendré fauve. *Partie sternale de l'antépectus* obtusément arquée et relevée à son bord antérieur : cette partie relevée à peine égale dans son milieu au sixième de sa largeur totale : chargée d'une saillie transversale vers les deux cinquièmes ou un peu plus de sa longueur jusqu'aux hanches de devant ; creusée d'un sillon transversal après la partie antérieure relevée, et d'un autre entre celui-ci et le relief transverse : ce dernier sillon ordinairement peu marqué chez le ♂. *Pieds* bruns sur les cuisses, un peu moins obscurs sur les jambes et surtout sur les tarses, souvent testacés ou d'un fauve testacé à l'extrémité de ceux-ci, chez la ♀.

**PATRIE :** Les parties méridionales de la France.

**Obs.** Cette espèce varie un peu de teinte suivant le développement de la matière colorante ; mais nous ne l'avons jamais vue d'un rouge brun ou d'une teinte plus claire en dessus, même sur les élytres.

*L. A. Dejeani* a beaucoup d'analogie avec *L. A. titanus*. Il s'en distingue principalement par son arête frontale, en angle tronqué au lieu d'être en arc ; par son prothorax armé vers l'extrémité de ses angles postérieurs d'une dent dirigée en dehors plus prononcée ; par la sixième strie des élytres avancée jusqu'à la cinquième avec laquelle elle s'unit en devant ; par le repli offrant même sur les côtés des premiers arceaux du ventre deux bords au lieu d'une simple tranche ; par la partie sternale de l'antépectus obtusément arquée en devant, au lieu d'être simplement munie d'un rebord convexe, chargée d'un relief transversal, vers les deux cinquièmes de l'espace compris entre les côtés du bord antérieur et les hanches de devant.

#### ***Athous fuscicornis.* ♀.**

*Dessus du corps variant du noir brun au brun fauve sur la tête et le prothorax, et du brun au roux testacé sur les élytres ; presque glabre. Tête déprimée sur le front ; grossièrement ponctuée. Arête frontale arquée, un*

*peu avancée au-dessus de l'épistome qui reste libre. Deuxième article des antennes court : le troisième à peine moins long que le suivant. Prothorax muni latéralement d'un rebord visible ; à angles postérieurs munis d'une petite dent un peu dirigée en dehors ; offrant les traces d'une rainure longitudinale médiane. Elytres à stries étroites, marquées de points ne les débordant pas ; la sixième raccourcie en avant. Intervalles plans, pointillés. Partie sternale de l'antépectus uni-sillonnée, arquée et relevée au devant de ce sillon.*

♂. Inconnu.

♀. Corps assez large. Antennes à peine aussi longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; à articles quatrième à dixième dilatés au côté interne en forme de dent graduellement plus faible du quatrième au dixième. Prothorax un peu arqué sur les quatre cinquièmes antérieurs de ses côtés, parallèle ensuite ; convexe ; presque uniformément marqué de points un peu moins gros que ceux de la tête. Élytres légèrement élargies jusqu'aux trois cinquièmes, rétrécies ensuite en ligne graduellement plus courbe jusqu'à l'angle sutural ; médiocrement convexes sur le dos. Intervalles à peine ruguleux.

Long. 0,0135 à 0,0157 (6 à 7 l.). Larg. 0,0039 à 0,0045 (1 1/2 à 2 l.)

*Corps allongé ; subparallèle. Tête ordinairement d'un brun noir, parfois brune, d'un brun rouge ou d'un rouge brun ; creusée d'une dépression naissant sur le milieu de son front et triangulairement élargie d'arrière en avant jusqu'au bord antérieur (cette dépression ordinairement moins prononcée sur le disque de cette région triangulaire) ; marquée de gros points, séparés par des intervalles dont quelques-uns sont lisses ou empâtés, près de la fossette frontale : ces points donnant naissance à un poil court, fin et peu distinct. Arête frontale en arc régulier, ou parfois à peine anguleux dans le milieu de son bord antérieur ; légèrement relevée ou un peu épaissie à ce bord ; un peu avancée au dessus de l'épistome qui est perpendiculaire et reste distinct sur*



toute la largeur. *Labre* brun ou brun fauve ; ponctué ; cilié. *Mandibules* brunes ou fauves. *Palpes* de cette dernière couleur. *Antennes* variant du brun au rouge brun ; médiocrement pubescentes ; comprimées ; à deuxième et troisième articles étroits : le deuxième à peine plus long que la moitié du troisième : celui-ci presque aussi long ou un peu moins long que le suivant ; les quatrième à dixième obtriangulaires ou plus dilatés au côté interne et paraissant, par là, subdentés à ce dernier. *Prothorax* presque tronqué en devant, avec les angles antérieurs déclives et un peu avancés pour embrasser les yeux ; d'un cinquième environ moins large à la base qu'il est long sur son milieu ; à angles postérieurs un peu obtus , faiblement plus prolongés en arrière que les angles de l'échancre antécutellaire ; à peine muni à ces angles d'une petite dent relevée et obliquement dirigée en dehors ; muni latéralement d'un rebord entièrement visible quand l'insecte est examiné en dessus ; garni de quelques poils courts et peu distincts (♀) ; offrant longitudinalement les traces d'une ligne médiane, souvent indistincte à ses extrémités ; ordinairement noir, parfois d'un brun rouge ou même d'un rouge brun. *Écusson* de la couleur des états ; obtusément arrondi à l'extrémité ; pointillé ; pubescent ; subconvexe. *Elytres* un peu plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; deux fois et quart à deux fois et demie aussi longues que lui ; ordinairement brunes , avec l'intervalle marginal moins obscur, parfois d'un brun rouge , d'un rouge brun ou même d'un roux testacé ; presque glabres (♀) , garnies sur les côtés de quelques poils peu distincts ; à neuf stries linéaires, étroites, marquées de points irréguliers, plus longs que larges , ne les débordant pas : les troisième à cinquième moins légères ou plutôt approfondies en devant ; les sixième à huitième non avancées jusqu'à la base : la neuvième sulciforme depuis l'épaule jusqu'au niveau des hanches postérieures. *Intercalles* plans ; irrégulièrement marqués de petits points peu serrés : le dixième ou marginal

presque nul en devant , graduellement moins étroit d'avant en arrière, moins large que le neuvième vers les deux tiers de la longueur. *Repli* à peu près de la couleur du dessus ou du moins du dixième intervalle ; à peine aussi large ou à peine plus large que le postépisternum vers la moitié de celui-ci ; presque réduit à une tranche sur les côtés du ventre jusqu'au premier arceau, offrant néanmoins ses deux bords très-distincts quoique rapprochés : l'interne un peu moins saillant que l'externe. *Dessous du corps* d'un noir brun ou d'un brun noir dans l'état normal, d'un brun testacé ou d'un brun roux testacé chez les variétés plus claires ; assez grossièrement ponctué sur l'antépectus , plus finement sur les autres parties pectorales et surtout sur le ventre ; garni de poils fins, couchés, d'un fauve livide, luisants, mi-dorés à certain jour, donnant aux segments postérieurs de la poitrine et à ceux du ventre une légère teinte d'un noir verdâtre , chez les variétés foncées. *Partie sternale de l'antépectus* sillonnée transversalement près de son bord antérieur, avec les traces légères d'un ou de deux autres sillons ; arqué plus fortement, ponctué et un peu relevé à son bord antérieur, offrant le milieu de cette partie arquée aussi développé dans le sens de la longueur de l'insecte que le quart ou le tiers de la largeur de ladite partie sternale. *Pieds* pubescents ; de la couleur du dessus sur les cuisses, d'une teinte un peu plus claire sur les jambes et surtout sur les tarses : hanches postérieures un peu plus élevées que le niveau du ventre ; assez fortement élargies à leur partie supérieure vers l'insertion des cuisses, subgraduellement rétrécies depuis ce point jusqu'aux deux tiers, presque linéaires extérieurement : tarses postérieurs moins épais depuis le premier article jusqu'au quatrième : le premier un peu moins long ou à peine aussi long que les deux suivants réunis : le dernier égal aux deux précédents pris ensemble.

**PATRIE :** Le midi de la France.

**OBS.** Nous n'avons vu que la ♀.

Cette espèce varie beaucoup de couleur suivant le développement de la matière colorante. Chez les individus qui peuvent être considérés comme étant à l'état normal, la tête, le prothorax et le dessous du corps sont d'un noir brun ; mais chez d'autres individus les parties les plus foncées passent au brun, au brun rouge ou même au roux brun : les élytres et les cuisses, ordinairement brunes, se montrent d'un roux testacé chez les variétés les plus claires.

*L'A. fuscicornis* se rapproche de l'*A. Dejeanii* ; mais il en diffère par sa taille moins avantageuse ; par son arête frontale régulièrement arquée, laissant distinct l'épistome ; par sa partie sternale de l'antépectus non chargée d'un relief transverse vers les deux cinquièmes de sa longueur jusqu'aux banches, etc.

#### ***Athous escorialensis.***

Corps ordinairement brun en dessus, avec l'intervalle marginal des élytres d'un fauve testacé, mais parfois d'un rouge brun ou brunâtre, ou même avec les élytres d'un fauve ou roux testacé chez le ♂ ; pubescent (♂), presque glabre (♀). Tête déprimée sur le front ; grossièrement ponctuée. Arête frontale en angle obtus, non avancée au-dessus de l'épistome qui reste distinct. Deuxième article des antennes court : le troisième à peu près aussi long que le suivant. Prothorax très-étroitement rebordé latéralement ; à angles postérieurs munis d'une petite dent dirigée en dehors ; ponctué ; offrant les traces d'une ligne médiane. Elytres à stries ponctuées assez prononcées. Intercalles en partie presque plats ; finement ponctués. Repli offrant deux bords distincts sur une portion des côtés du ventre. Partie sternale de l'antépectus munie en avant d'un rebord presque uniforme, peu étroit.

♂. Corps plus étroit, plus parallèle, moins convexe, garni en dessus de poils d'un cendré fauve, fins, couchés, mais très-apparents. Antennes prolongées au moins jusqu'au quart antérieur des élytres ; à articles plus allongés, proportionnellement moins élargis et moins dentés au côté interne : le troisième un peu moins long que le quatrième : le dernier, quatre fois au moins aussi

long qu'il est large. Prothorax à peine ou très-faiblement arqué sur les côtés depuis les angles de devant jusqu'à la sinuosité, vers les trois quarts de sa longueur, un peu élargi d'avant en arrière après celle-ci ; peu convexe ; un peu plus long sur son milieu qu'il est large à sa base ; offrant sur les côtés, un peu avant la moitié de sa largeur, les traces plus ou moins distinctes d'une faible dépression. Elytres presque parallèles jusqu'aux quatre cinquièmes, obtusément arrondies à l'extrémité, prises ensemble ; très-peu convexes ; à stries moins profondes en devant ; à intervalles plus ruguleux ; les deuxième à cinquième moins convexes ou moins sensiblement en toit. Repli offrant ses deux bords distincts jusqu'à l'extrémité du quatrième arceau. Deuxième sillon transversal de la partie sternale ordinairement plus faible. Premier article des tarses postérieurs aussi long que les deux suivants réunis.

♀. Corps plus large, moins parallèle, plus convexe, presque glabre en dessus. Antennes à peine plus longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; à articles quatrième à dixième, proportionnellement plus larges, plus dilatés au côté interne et moins longs : le neuvième au moins aussi long que le quatrième : le dernier deux fois et demie aussi long qu'il est large. Prothorax plus sensiblement arqué depuis les angles antérieurs jusqu'à la sinuosité, vers les trois quarts de la longueur de ses côtés, parallèle ensuite ; convexe ; à peine plus long sur son milieu qu'il est large à la base. Elytres sinuées après les épaules, élargies assez faiblement ou médiocrement jusqu'aux quatre septièmes, rétrécies ensuite ; médiocrement convexes. Repli offrant jusque vers la partie postérieure du deuxième arceau ventral ses deux bords distincts, graduellement réduit ensuite à une tranche, ou à bord interne moins saillant. Premier article des tarses postérieurs un peu moins long que les deux suivants réunis.



Long. 0,0123 à 0,146 (5 1/2 à 6 1/2 l.). Larg. 0.0035 (1 1/2 l.). ♂. — 0,0045 (2 l.). ♀.

*Corps* allongé ; subparallèle ; pubescent (♂) ; presque glabre (♀) ; ordinairement brun en dessus, avec le bord des élytres fauve ou testacé, mais offrant des teintes diverses suivant le développement de la matière colorante, parfois d'un rouge brun plus pâle sur les élytres que sur la tête et le prothorax (?), ou même d'un roux testacé également plus pâle sur les élytres que sur les parties précédentes. *Tête* marquée d'une dépression naissant au milieu du front et prolongée jusqu'au bord antérieur, ordinairement plus prononcée à ses deux extrémités ; marquée de gros points. *Arête frontale* en angle obtus, non avancée sur l'épistome qui reste distinct sur sa toute sa largeur et subperpendiculaire ou déclive d'arrière en avant dans son milieu. *Mandibules* d'un rouge brun ou testacé, teinte variable à la base, obscures à l'extrémité. *Palpes* testacés ou d'un fauve testacé, même chez les variétés les plus foncées. *Antennes* testacées ; pubescentes ; comprimées ; à deuxième article étroit et à peine aussi long que le troisième : celui-ci à peu près aussi long que le suivant : les quatrième à dixième, obtriangulaires, plus développés au côté interne qu'à l'externe et, par là, subdentés à ce côté. *Prothorax* presque tronqué en devant, avec les angles antérieurs déclives et un peu avancés ; plus long sur son milieu qu'il est large à la base ; sinué vers les trois quarts de ses côtés ; à angles postérieurs un peu obtus, médiocrement prolongés en arrière, et armés vers leur extrémité d'une petite dent obliquement dirigée en dehors ; muni latéralement d'un rebord très-étroit, assez visible quand l'insecte est examiné en dessus ; généralement marqué de points aussi gros que ceux de la tête ; offrant longitudinalement sur la ligne médiane une raie sulciforme (♂) ou une trace lisse (♀) indistincte à ses extrémités ; ordinairement noté d'une fossette, de chaque côté de cette ligne

médiane, vers les trois quarts de sa longueur. *Écusson* de la couleur des étuis ; obtusément arrondi à l'extrémité ; subconvexe ; pointillé. *Elytres* un peu plus larges en devant que le prothorax ; deux fois et quart à deux fois et demie environ aussi longues que lui ; à neuf stries : les cinq premières plus profondes en devant, graduellement moins prononcées postérieurement, étroites, marquées de points plus longs que larges, ne les débordant pas : les sixième à huitième et surtout la septième avancées jusqu'à la base : la neuvième sulaiforme depuis l'épaule jusqu'au niveau de la hanche postérieure. *Intervalles* marqués de petits points : les deuxième à sixième en partie au moins subconvexes ou légèrement en toit en devant, presque plans postérieurement : le marginal un peu subsinué, presque également un peu plus étroit depuis après l'épaule jusqu'au niveau du milieu du premier arceau ventral, faiblement moins étroit postérieurement. *Repli* testacé ou testacé roussâtre ; en gouttière et faiblement plus large que le postépisternum, vers la moitié de celui-ci ; presque réduit à une tranche sur les côtés du ventre, offrant néanmoins deux bords distincts au moins jusque près de l'extrémité du deuxième arceau ventral. *Dessous du corps* d'un brun noir ou brun, avec le bord postérieur des arceaux du ventre plus clair, chez les individus ayant toute leur couleur : moins foncé et parfois d'un roux testacé chez quelques individus, avec le bord des arceaux du ventre plus pâle encore ; assez grossièrement ponctué sur l'antépectus, plus finement sur les autres parties pectorales et surtout sur le ventre ; garni de poils fins et couchés. *Partie sternale de l'antépectus* munie en devant d'un rebord subconvexe, presque uniformément égal sur les trois quarts médiaux de sa largeur ou peut-être un peu plus court dans son milieu, à peine plus développé dans ce point, dans le sens de la longueur de l'insecte que le septième ou le huitième de la largeur totale de la partie sternale : ce rebord suivi d'un sillon, puis d'un autre plus ou moins léger ; légèrement en relief transverse après ce dernier.



*Pieds* d'un fauve testacé graduellement plus clair depuis les cuisses, chez les individus le plus fortement colorés, d'un testacé plus ou moins clair chez les autres. *Hanches postérieures* un peu élevées au-dessus du niveau du premier arceau ventral ; offrant leur plus grande dilatation vers l'origine des cuisses, graduellement rétrécies jusqu'au milieu de leur largeur, linéaires extérieurement. *Tarses postérieurs* graduellement moins épais, du premier article au quatrième : le premier, à peu près aussi long que les deux suivants réunis.

**PATRIE :** les environs de l'Escorial, en Espagne (collection Arias).

**Obs.** Cette espèce varie beaucoup de teinte, depuis le brun, jusqu'au roux testacé ; néanmoins elle se distingue des espèces voisines, par son arête frontale en angle obtus dirigé en avant, non avancée au dessus de l'épistome qui reste distinct sur toute sa largeur, subperpendiculaire ou plus ordinairement déclive d'avant en arrière et dépassant sensiblement alors à son bord antérieur celui de l'arête frontale ; par sa partie sternale de l'antépectus munie en devant d'un rebord presque moins court d'avant en arrière près des côtés que dans son milieu.

#### **Athous Godardi.**

*Dessus du corps* ordinairement d'un noir brun sur la tête et le prothorax, brun ou d'un brun châtain sur les élytres, avec le bord de celles-ci testacé ; pubescent (♂ ♀). *Tête et prothorax* ponctués : la première déprimée sur le front. *Arête frontale* tronquée, relevée à ses extrémités ; avancée sur l'épistome qui reste distinct. *Prothorax* muni, sur les côtés, d'un rebord très-étroit, peu distinct en dessus dans sa moitié antérieure. *Écusson* obtusément en toit. *Elytres* à stries ponctuées : intervalles ruguleusement pointillés. *Repli* à deux bords distincts sur les côtés du ventre. *Partie sternale de l'antépectus* arquée et relevée en devant : cet arc aussi long que le tiers de sa largeur. *Dessous du corps* ordinairement d'un noir brun. *Pieds* d'un fauve testacé.

♂. Corps plus étroit ; moins convexe. Antennes prolongées environ jusqu'au cinquième des élytres ; à articles plus allongés, proportionnellement moins larges : les quatrième à dixième plus régulièrement obtriangulaires, moins dilatés au côté interne, peu dentés à ce côté : le dernier, trois fois et demie aussi long qu'il est large sur son milieu. Prothorax presque parallèle, à peine élargi en ligne presque droite ou à peine sinué jusque vers la moitié de sa longueur, faiblement rétréci ensuite jusqu'à la subsinuosité, puis subparallèle ou à peine élargi d'avant en arrière, aussi large à ses angles postérieurs que vers la moitié de sa longueur ; d'un cinquième plus long sur son milieu qu'il est large à sa base ; peu convexe. Élytres presque parallèles jusqu'aux deux tiers, peu rétrécies jusqu'aux quatre cinquièmes, obtusément arrondies à l'extrémité ; peu convexes.

♀. Corps moins étroit ; plus convexe. Antennes prolongées à peine jusqu'à l'extrémité des angles postérieurs du prothorax : à articles quatrième à dixième proportionnellement moins longs ou plus larges, plus dilatés au côté interne, plus visiblement subdentés à ce côté : le dernier, deux fois et demie aussi long qu'il est large sur son milieu. Prothorax faiblement arqué sur les côtés jusqu'à la subsinuosité, subparallèle ou faiblement élargi ensuite, un peu moins large à l'extrémité de ses angles postérieurs que vers la moitié de sa longueur ; d'un sixième environ plus long sur son milieu qu'il est large à la base ; médiocrement convexe. Élytres subsinueusement élargies jusqu'à la moitié, rétrécies faiblement ensuite, en ligne graduellement moins courbe ; très-médiocrement convexes.

Long. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 1/2 l.). Larg. 0,0022 (1 l.).

*Corps* assez allongé ; subparallèle ; pubescent (♂. ♀) ; ordinairement d'un noir brun ou d'un brun noir sur la tête et sur le prothorax, brun ou d'un brun châtain sur les élytres, avec l'intervalle marginal de celles-ci testacé. *Tête* marquée de points

gros ou assez gros, peu serrés, donnant chacun naissance à un poil fin, cendré ou cendré nébuleux ; creusée sur le front d'une dépression naissant sur le milieu du front , élargie d'arrière en avant jusqu'au bord antérieur. *Arête frontale* tronquée en devant, relevée à ses extrémités et paraissant quelquefois, par là, échancrée dans son milieu ; avancée au-dessus de l'épistome, qui est perpendiculaire et reste distinct sur toute sa largeur. *Mandibules* d'un brun rouge, à extrémité noire. *Palpes* testacés ou d'un roux testacé. *Antennes* pubescentes ; comprimées ; ordinairement brunes ou d'un brun noir ; quelquefois brunes, avec le premier ou les deux premiers articles d'un rouge brunâtre ; d'autres fois d'un rouge fauve ou d'un rouge testacé, avec la seconde moitié des articles quatrième à dixième brunâtre ; à deuxième et troisième articles étroits : le deuxième à peine plus long que la moitié du troisième : celui-ci un peu moins long que le suivant : les quatrième à dixième, obtriangulaires : les cinquième à dixième légèrement arqués à leur côté interne. *Prothorax* presque tronqué en devant, avec les angles antérieurs déclives ; subsinué sur les côtés vers les quatre cinquièmes de leur longueur ; à angles postérieurs un peu obtus , médiocrement prolongés, munis vers leur extrémité d'une dent très-petite et souvent peu distincte, dirigée en haut ou un peu de côté ; ordinairement noir brun ou brun noir ; ponctué à peine moins grossièrement que la tête, et, comme celle-ci, garni de poils fins ; n'offrant pas ou offrant à peine les traces d'une ligne longitudinale médiane. *Écusson* de la couleur des étuis ; pointillé ; pubescent ; en toit obtus ou chargé d'une faible arête longitudinale. *Elytres* un peu plus larges en devant que le prothorax à sa base ; une fois ou une fois et quart plus longues que lui ; ordinairement brunes, ou d'un brun châtain, avec le dixième intervalle testacé, et parfois avec le sutural d'une teinte rapprochée ; à neuf stries assez prononcées , à peine affaiblies d'avant en arrière, marquées de points assez petits, ne les débordant pas : la première subsulciforme par l'effet de l'inter-

valle sutural légèrement relevé : les sixième à huitième non avancées jusqu'à la base : la neuvième la plus profonde sur toute sa longueur. *Intercalles* ruguleusement pointillés ; pubescents : les troisième à cinquième légèrement convexes en devant , plus sensiblement chez la ♀ : le dixième, presque aussi large que le neuvième vers les deux tiers de sa longueur. *Repli* testacé ; une fois au moins plus large que le postépisternum vers la moitié de celui-ci ; presque réduit à une tranche vers les côtés du ventre, mais offrant néanmoins ses deux bords distincts. *Dessous du corps* ordinairement noir, noir brun ou brun noir, quelquefois avec les sutures des flancs de l'antépectus et le bord de l'arceau postérieur du ventre d'un fauve testacé ; moins finement ponctué sur l'antépectus que sur les autres parties pectorales ; pubescent. *Partie sternale de l'antépectus* arquée et relevée à son bord antérieur : cet arc presque aussi long sur son milieu que le tiers de sa largeur ; rayée d'un sillon transversal assez prononcé servant de limite à la partie arquée : marquée d'un autre sillon plus léger suivi d'un relief transversal plus ou moins sensible. *Pieds* d'un fauve testacé sur les hanches, testacés sur les jambes et les tarses : hanches postérieures à peine plus élevées que le niveau du ventre ; offrant vers le point d'insertion des hanches la plus grande dilatation de leur partie supérieure , graduellement rétrécies de ce point jusqu'à la moitié de leur largeur, presque linéaires extérieurement : deuxième, troisième et quatrième articles des tarses garnis en dessous d'une sorte de petite houppe de poils ; le premier des postérieurs à peine aussi long que les deux suivants réunis : le dernier, plus grand que les deux précédents, pris ensemble.

**PATRIE** : le midi de la France.

**Obs.** Nous l'avons dédiée à notre ami M. Godart, l'un de nos meilleurs entomologistes lyonnais.

Dans l'état qui semble être normal, le dessous du corps paraît être noir ou d'un noir brun sur la tête et sur le prothorax, et brun ou

brun châtain sur les élytres : nous n'avons pas eu d'exemple de cette couleur passant au testacé ; cependant chez quelques individus, surtout chez le ♂, l'intervalle sutural des élytres est d'un fauve testacé.

*L. A. Godarti* se distingue des espèces voisines par son arête frontale tronquée, relevée à ses extrémités ; par la couleur de ses antennes ; par son écusson en toit ; par la forme de la partie sternale de son antépéctus ; par les deuxième à quatrième articles des tarses garnis en dessus de houppes de poils. Il s'éloigne de *l'olbiensis* avec lequel il a quelque analogie, par sa taille plus avantageuse et par l'intervalle marginal des élytres testacé.

#### ***Athous vestitus.* ♂.**

*Corps ordinairement brun ou d'un brun de poix, en dessus, avec l'intervalle marginal des élytres testacé ; pubescent (♂). Tête déprimée sur le front ; ponctuée. Arête frontale arquée, avancée un peu au dessus de l'épistome qui reste distinct. Deuxième article des antennes court : le troisième, un peu moins long que le quatrième. Prothorax à peine muni d'une petite dent à ses angles postérieurs ; étroitement rebordé ; ponctué. Elytres à stries ponctuées, étroites. Intervalles plans, finement ponctués. Repli offrant deux bords distincts sur la majeure partie des côtés du ventre. Partie sternale de l'antépéctus arquée et un peu relevée en devant, aussi développée dans le milieu de cette partie arquée que le cinquième de sa largeur. Dessous du corps ordinairement brun ou brun noir, avec le bord des arceaux et les côtés du ventre testacés. Pieds de cette couleur.*

♂. Corps assez étroit ; presque parallèle ; peu convexe ; pubescent. Antennes prolongées jusqu'au cinquième ou au quart des élytres ; à articles proportionnellement plus allongés, moins dilatés, moins dentés : le troisième plus étroit et d'un cinquième moins long que le quatrième : le dernier trois ou quatre fois aussi long qu'il est large vers la moitié de sa longueur. Prothorax faiblement élargi en ligne presque droite jusqu'à la moitié de sa longueur, offrant dans ce point vers ses bords latéraux une



dépression qui le fait paraître un peu brusquement élargi vers ladite moitié, rétréci ensuite en ligne droite ; peu convexe ; d'un cinquième environ plus long sur son milieu qu'il est large à la base. Élytres presque parallèles jusqu'à moitié, faiblement rétrécies ensuite jusqu'aux quatre cinquièmes, obtusément arrondies à l'extrémité, prises ensemble ; peu convexes sur le dos ; à intervalles peu rugueux. Repli offrant deux bords distincts et à peu près égaux jusque vers la moitié du cinquième arceau. Partie prosternale, à peine marquée d'un second sillon transverse et d'un relief à peine distinct après celui-ci. Premier article des tarses postérieurs aussi long que les deux suivants réunis.

*Athous vestitus* (DEJEAN). Catal. (1833) p. 90. — *Id.* (1837), p. 101.

Long. 0,0112 (5 l.). Larg. 0,0026 (1 1/5 l.).

*Corps* allongé ; presque parallèle ; garni de poils assez fins, peu épais, cendrés, en partie mi-couchés (♂). *Tête* couleur de poix, fauve ou d'un brun rougeâtre ; pubescente ; marquée d'une dépression naissant au milieu du front, graduellement élargie d'arrière en avant jusque près du bord antérieur, avec le disque de cette région non déprimé ; ponctuée ; à arête frontale un peu relevée en rebord, tranchante, arquée, un peu avancée au-dessus de l'épistome : celui-ci, court, perpendiculaire et distinct sur toute sa largeur, de l'arête frontale. *Labre, palpes et mandibules* d'un rouge brun, fauves, ou d'un rouge testacé : les mandibules obscures ou noirâtres à leur extrémité. *Antennes* pubescentes ; fauves ou d'un fauve testacé : deuxième et troisième articles plus étroits que les suivants : le deuxième, de deux tiers aussi long que le troisième : celui-ci, un peu moins long que le suivant. *Prothorax* presque tronqué ou à peine arqué en avant ; à angles postérieurs faiblement plus prolongés en arrière que les angles de l'échancrure antéscutellaire, un peu obtus à leur extrémité, à peine munis à celle-ci d'une dent dirigée en dehors et peu dis-



tincte ; marqué de points à peine plus petits que ceux de la tête, mais moins serrés sur le dos ; muni latéralement d'un rebord très-étroit, plus affaibli et peu visible en dessus dans la moitié antérieure de ses côtés ; d'un brun de poix, un peu plus rougeâtre sur le dos que sur les côtés ; offrant les traces d'une ligne longitudinale médiaire. *Ecusson* obtusément arrondi à l'extrémité ; finement et densément ponctué ; pubescent ; d'un brun de poix. *Elytres* d'un quart plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; deux fois à deux fois et quart aussi longues que lui ; peu convexes sur le dos ( $\curvearrowright$ ) ; à neuf stries un peu affaiblies d'avant en arrière, assez étroites, marquées de points plus longs que larges, ne les débordant pas ; les troisième à cinquième plus prononcées en devant : les sixième à huitième non avancées jusqu'à la base : la neuvième très-peu sinuée entre les épaules et le niveau des hanches postérieures ; d'un brun de poix ou d'un brun rougeâtre, comme le prothorax, avec l'intervalle marginal testacé. *Intervalles* plans ; assez finement ponctués : le septième à peine caréné depuis l'épaule jusqu'au cinquième de la longueur, près de la septième strie : le neuvième graduellement moins étroit d'avant en arrière, un peu plus étroit vers les deux tiers de la longueur que le neuvième. *Repli* testacé ; plus large, même sans son rebord, que le postépisternum vers la moitié de celui-ci, à peu près réduit à une tranche sur les côtés du ventre, mais offrant néanmoins sur la majeure partie de ceux-ci, deux bords distincts. *Dessous du corps* d'un brun plus foncé ou plus noirâtre sur les deux dernières parties pectorales que sur l'antérieure ; ventre d'un brun obscur, avec les côtés et le bord postérieur des arceaux, testacés, et le dernier de ceux-ci graduellement de même couleur d'avant en arrière ; ponctué peu finement et peu densément sur l'antépectus, pointillé sur le reste : brièvement et parcimonieusement pubescent. *Partie sternale de l'antépectus* arquée en devant et légèrement relevée à son bord antérieur, aussi développée dans le milieu de cette partie arquée que

le cinquième ou le sixième de sa largeur ; creusée d'un sillon transverse très-prononcé après cette partie arquée ; offrant au moins les traces d'un second sillon, suivi d'un relief plus ou moins faible. *Pieds* testacés, plus foncés sur les cuisses, plus clairs sur les autres parties. *Hanches* postérieures un plus élevées que le ventre ; offrant près de l'insertion des cuisses la plus grande dilatation de leur bord supérieur, rétrécies à partir de ce point jusqu'à la moitié, linéaires ensuite : dernier article des tarses postérieurs égal aux deux précédents pris ensemble.

**PATRIE** : le midi de la France (collect. Godart).

**Obs.** La couleur doit sans doute varier un peu suivant les individus.

L'*A. vestitus* se distingue de quelques espèces voisines par sa couleur à peu près uniforme en dessus, à l'exception de l'intervalle marginal des élytres qui est testacé : par sa carène frontale faiblement arquée, non confondue à sa partie antérieure avec l'épistome ; par la ligne déprimée de sa tête plus saillante sur son disque ; par la grandeur relative des deuxième, troisième et quatrième articles des antennes ; par le septième intervalle des élytres offrant après l'épaule une très-légère carène ; par la forme de la partie sternale de l'antépectus et par celle de ses hanches postérieures.

### ***Athous cylindricollis.***

*Corps* d'un rouge testacé, plus foncé ou nébuleux sur le disque du prothorax et des élytres, plus pâle sur les côtés ; garni de poils fins et d'un cendré fauve. Tête et prothorax marqués de points assez gros ou médiocres : la première, déprimée sur le front. Arête frontale obtusément tronquée en avant ; un peu avancée au dessus de l'épistome qui reste distinct. Deuxième article des antennes égal aux deux tiers du troisième. Elytres à stries ponctuées. Intervalles assez finement ponctués ; presque plans. Dessous du corps brunâtre sur l'antépectus, d'un flave rouge sur le reste. Partie prosternale à deux sillons transverses : le deuxième presque obsolète ; arquée en avant : la partie arquée plus longue que l'espace séparant les sillons.

♂. Corps subparallèle. Antennes prolongées au moins jusqu'à la moitié du corps ou aux deux cinquièmes des élytres; à articles allongés, peu dentés; le dernier cinq ou six fois aussi long qu'il est large. Prothorax à peine élargi d'avant en arrière, graduellement un peu plus large après la moitié de sa longueur, ou au moins aussi large à celle-ci que vers les angles postérieurs; d'un quart plus large sur son milieu qu'il est large à la base; peu convexe; à peine muni d'une petite dent à ses angles postérieurs. Élytres subparallèles, à peine plus larges vers la moitié de leur longueur; obtusément arrondies à l'extrémité; peu convexes. Intervalles ruguleux.

♀. Inconnue.

Long. 0,0112 (5 l.), larg. 0,0053 (1 1/2 l.).

*Corps* allongé: presque parallèle; peu convexe (♂); garni de poils assez fins, peu épais, couchés ou presque couchés, cendrés ou d'un cendré fauve. *Tête* d'un rouge testacé ou d'un rouge testacé brunâtre; creusée d'une dépression naissant du milieu du front et graduellement élargie jusqu'à l'arête frontale; marquée de points assez gros sur la partie déprimée, un peu moins gros postérieurement. *Arête frontale* obtusément tronquée ou très-obtusément arquée en devant; avancée au-dessus de l'épistome: celui-ci court, perpendiculaire et distinct sur toute la largeur de l'arête frontale. *Mandibules* d'un rouge brun, à extrémité noire ou obscure. *Palpes* d'un flave testacé ou d'un testacé rougeâtre. *Antennes* prolongées au moins jusqu'à la moitié du corps (♂); pubescentes; d'un flave testacé; à deuxième article égal aux deux tiers du troisième: celui-ci à peu près égal aux deux tiers du quatrième. *Prothorax* presque tronqué en devant, sinué derrière chaque œil; à angles postérieurs médiocrement prolongés en arrière, en ligne droite à leur côté externe, en ligne arquée à l'interne, un peu obtus, muni d'une très-petite dent dirigée en dehors; ponctué, à peine plus finement que la partie postérieure

de la tête ; muni latéralement d'un rebord très-étroit entièrement visible en dessus, au moins chez le ♂ : offrant vers sa moitié la trace d'une ligne médiane ; d'un rouge testacé brun ou d'un brun rouge testacé, plus clair sur les côtés, plus obscur sur le milieu ; pubescent. *Écusson* obtusément arrondi à l'extrémité ; subconvexe ; ponctué : pubescent ; brun. *Elytres* un peu plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; deux fois et quart environ aussi longues que lui ; à neuf stries prononcées, un peu affaiblies d'avant en arrière, assez étroites, marquées de points à peu près aussi larges que longs, ne les débordant pas ou les débordant à peine : les troisième à cinquième un peu plus profondes en devant : les sixième et septième presque avancées jusqu'à la base : la huitième, plus courte en devant : la neuvième, un peu sinuée depuis les épaules jusqu'au tiers ; d'un rouge testacé, plus pâle d'avant en arrière, plus foncé ou plus obscur près de la suture, plus pâle sur les côtés. *Intervalles* presque plans ; finement ponctués ; à pubescence presque mi hérissée : le dixième, réduit au rebord jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes, au moins aussi large postérieurement que le neuvième vers son extrémité. *Repli* testacé ; près d'une fois plus large que le postépisternum vers la moitié de la longueur de celui-ci ; presque réduit à une tranche sur les côtés du ventre, offrant néanmoins ses deux bords distincts ; élargi vers l'extrémité. *Dessous du corps* d'un brun rouge testacé ou d'un rouge testacé brun sur l'antépéctus, d'un rouge testacé graduellement plus pâle ou passant au flave rougeâtre sur les autres parties ; ponctué, moins finement sur l'antépéctus que sur les autres parties ; peu densément garni de poils fins, cendrés et couchés. *Partie sternale de l'antépéctus* creusée, vers sa partie antérieure, de deux sillons transverses, dont le second en partie obsolète ; obtusément arquée à son bord antérieur : cette partie arquée aussi longue dans son milieu que le cinquième environ de la longueur du sillon. *Pieds* d'un flave rougeâtre ; pubescents : hanches postérieures un peu plus élevées



que le ventre ; offrant près de l'insertion des cuisses la plus grande dilatation de leur bord supérieur , rétrécies en ligne un peu courbe, à partir de ce point jusqu'à la moitié de leur largeur, linéaires dans la moitié extérieure. *Dernier article des tarsi* à peu près aussi grand que les deux suivants réunis.

PATRIE : les environs de Bordeaux (collect. Perroud).

Obs. L'*A. cylindricollis* se distingue de l'*A. subtruncatus* par son prothorax et ses élytres d'une couleur presque uniforme ; par la longueur proportionnelle des deuxième et troisième articles des antennes ; par le deuxième sillon de la partie sternale de l'antépéctus, presque oblitéré. Il s'éloigne de l'*A. vestitus* par la couleur de ses élytres ; par son arête frontale obtusément tronquée ; par le troisième article des antennes proportionnellement plus court.

#### ***Athous subtruncatus.***

*Corps garni en dessus d'une pubescence d'un cendré fauve (♂ ♀). Tête et prothorax marqués de points assez gros : la première déprimée sur le front ; d'un fauve testacé, avec la partie postérieure obscure. Arête frontale presque tronquée en avant ; un peu avancée au dessus de l'épistome qui reste distinct. Deuxième et troisième articles des antennes courts, presque égaux. Prothorax brun, orné de chaque côté d'une bande longitudinale testacée. Elytres brunes près de la suture et sur le neuvième et partie du huitième intervalle, testacées sur le reste ; à stries ponctuées. Intervalles assez finement ponctués ; presque plans. Dessous du corps brun sur l'antépéctus. Ventre et pieds, testacés. Partie prosternale à deux sillons transverses, arquée en avant : cette portion arquée plus longue que l'espace séparant les sillons.*

♂. Taille ordinairement moins avantageuse. Corps plus étroit ; un peu plus pubescent. Antennes prolongées environ jusqu'au cinquième des élytres ; à articles proportionnellement plus allongés, moins dilatés, moins dentés : le dernier trois ou quatre fois aussi long qu'il est large. Prothorax un peu rétréci d'arrière en avant sur le cinquième antérieur , subparallèle

jusqu'à la sinuosité, vers les trois quarts de la longueur, un peu élargi ensuite d'avant en arrière; d'un cinquième plus long sur son milieu qu'il est large à sa base; peu convexe; à peine muni d'une petite dent relevée à ses angles postérieurs. Elytres sub-parallèles ou plutôt faiblement rétrécies jusqu'aux quatre septièmes de leur longueur; plus sensiblement rétrécies ensuite, assez étroites à l'extrémité; peu convexes. Intervalles ruguleux; plus densément garnis de poils mi-hérissés. Repli offrant ses deux bords plus égaux, plus distincts sur une plus grande étendue. Premier article des tarses postérieurs aussi long que les deux suivants réunis.

♀. Corps d'une taille un peu plus avantageuse; plus parallèle; plus sensiblement convexe; à peine moins pubescent. Antennes à peine prolongées au delà des angles postérieurs du prothorax; à articles proportionnellement moins allongés, plus dilatés: le dernier, deux fois et demie à trois fois aussi long qu'il est large. Prothorax sensiblement arqué sur les côtés jusqu'à la sinuosité, parallèle ensuite; armé à l'extrémité de ses angles postérieurs d'une petite dent dirigée en dehors et très-distincte; moins d'un cinquième plus long sur son milieu qu'il est large à la base; médiocrement convexe. Elytres parallèles jusqu'aux trois quarts de leur longueur, obtusément arrondies à l'extrémité; médiocrement convexes. Intervalles moins densément et moins ruguleusement pointillés; moins pubescents. Repli offrant son bord interne moins distinct, en partie voilé par les côtés du ventre. Premier article des tarses postérieurs à peine aussi long que les deux suivants réunis.

*Elatér marginalis* var. (Dahl.) (DeJ.) Catal. (1833) p. 90.

*Athous parallelus* (DeJean.) Catal. (1833) p. 90. — *Id.* (1837) p. 101.

Long. 0,0090 à (1 l.) Larg. 0,0018 (4/3 l.)

Corps allongé; presque parallèle; peu (♂) ou médiocre-



ment (♀) convexe ; garni de poils assez fins , peu épais , d'un fauve cendré, en partie mi-couchés (♂ ♀). *Tête* d'un rouge brun, avec la partie postérieure plus obscure ; creusée d'une dépression naissant au milieu du front et graduellement élargie jusqu'à l'arête frontale ; marquée de points assez gros, presque réticuleux. *Arête frontale* obtusément tronquée ou très-obtusément arquée en avant ; un peu avancée au-dessus de l'épistome : celui-ci court , perpendiculaire et distinct , sur toute sa largeur, de l'arête frontale. *Mandibules* d'un rouge brun, à extrémité noire. *Palpes* d'un rouge testacé , à dernier article souvent obscur. *Antennes* pubescentes ; d'un brun de poix ou d'un brun rouge ; à deuxième et troisième articles presque égaux, plus étroits que les suivants : le troisième, de moitié moins long que le quatrième. *Prothorax* presque tronqué en avant ; à angles postérieurs médiocrement prolongés, un peu obtus et munis vers leur extrémité d'une petite dent dirigée en dehors ; ponctué, à peine plus finement que la tête ; muni latéralement d'un rebord étroit, peu visible en dessus dans sa moitié antérieure ; sans trace de ligne médiane ; brun, d'un brun rougeâtre ou d'un brun de poix ; orné de chaque côté, d'une bande longitudinale d'un rouge testacé ou d'un rouge brunâtre, s'étendant depuis le bord externe jusqu'au côté interne des yeux ; pubescent. *Ecusson* obtusément arrondi à l'extrémité ; subconvexe ; marqué de points assez gros et presque contigus ; brun ou d'un brun noir. *Elytres* un peu plus larges en avant que le prothorax à ses angles postérieurs ; deux fois à deux fois et quart aussi longues que lui ; à neuf stries prononcées , un peu affaiblies d'avant en arrière, assez étroites, marquées de points plus longs que larges, ne les débordant pas : les troisième à cinquième un peu plus profondes en avant : les sixième à huitième, à peine ou moins avancées en avant jusqu'à la base : la neuvième un peu sinuée depuis l'épaule jusqu'au tiers ; d'un brun de nuance variable , soit obscur , soit tirant sur le rougeâtre sur le deuxième et ordinairement sur le troisième inter-

valle, sur le neuvième, les deux cinquièmes antérieurs du huitième et parfois sur une partie du septième, testacées sur le reste. *Intercalles* presque plans; assez finement ponctués; à pubescence mi-hérissée: le dixième, presque nul jusqu'aux deux cinquièmes de sa longueur, plus étroit postérieurement que le neuvième. *Repli* testacé; un peu moins étroit que le postépisternum vers la moitié de celui-ci; presque réduit à une tranche sur les côtés du ventre, offrant néanmoins sur la majeure partie de ceux-ci deux bords distincts. *Dessous du corps* brun ou d'un brun noir sur l'antépectus, avec la partie sternale de celui-ci souvent un peu moins foncée, d'un rouge brun sur les autres parties pectorales, testacé ou d'un fauve testacé sur le ventre; ponctué moins finement sur l'antépectus que sur le reste; peu densément garni de poils fins, cendrés et couchés. *Partie sternale de l'antépectus* creusée, vers sa partie antérieure, de deux sillons transverses; obtusément arquée à son bord antérieur: cette partie arquée aussi longue dans son milieu que le sixième environ de la largeur du sillon. *Pieds* d'un testacé encore plus clair que le ventre; pubescents: hanches postérieures un peu plus élevées que le ventre; offrant près de l'insertion des cuisses la plus grande dilatation de leur bord supérieur, rétrécies à partir de ce point jusqu'à la moitié de leur largeur, linéaires dans la moitié extérieure. *Dernier article des tarsi* aussi grand que les deux suivants réunis.

**PATRIE** : le Midi de la France (collect. Godart).

**Obs.** La couleur varie un peu de teinte; les parties brunes sont ordinairement un peu plus obscures chez le ♂ et font ressortir davantage les parties testacées.

Les élytres ont ordinairement les deuxième et troisième intervalles bruns; souvent le sutural est presque de la même couleur, surtout chez la ♀; d'autres fois au contraire le troisième est en majeure partie ou entièrement testacé, principalement chez le ♂. Le septième a souvent ses deux cinquièmes antérieurs bruns du

côté externe ; d'autres fois il est entièrement testacé : le huitième est brun sur les deux cinquièmes antérieurs moins le sixième voisin de la base : le neuvième est brun, mais d'une teinte moins obscure postérieurement : le dixième ou marginal est testacé, au moins en majeure partie.

L'*A. subtruncatus* se distingue des autres espèces voisines par son prothorax paré de chaque côté d'une bande longitudinale testacée, de largeur à peu près égale ; par ses élytres testacées sur leur région longitudinale médiane, brunes près de la suture et près du bord extérieur ; par sa carène frontale presque tronquée ou très-obtusément arquée en devant, non confondue vers le milieu de son bord antérieur avec l'épistome qu'elle ombrage un peu et qui reste distinct sur toute sa largeur ; par les deuxième et troisième articles des antennes presque égaux ; par son prothorax sans traces de ligne médiane ; par la partie sternale de son antépectus creusée de deux sillons transverses presque également prononcés ; par la forme de ses hanches postérieures.

Cette espèce est désignée dans le catalogue Dejean sous le nom de *parallelus*, déjà employé par Say pour une autre espèce d'*Athous*.

### **Athous analis.**

*Dessus du corps ordinairement brun ou brun fauve, quelquefois testacé ; pubescent (♂ ♀). Tête et prothorax ponctués : la première, plane sur le front. Arête frontale tronquée en devant, saillante au dessus de l'épistome qui reste distinct. Deuxième et troisième articles des antennes presque égaux, plus courts que le quatrième. Prothorax à peine rebordé latéralement ; à peine muni d'une petite dent aux angles postérieurs. Elytres à stries ponctuées : Intervalles ruguleusement pointillés. Repli à deux bords distincts sur les côtés du ventre. Partie sternale de l'antépectus arquée en devant : cet arc aussi long dans son milieu que le tiers de sa largeur. Partie postérieure du ventre, antennes, jambes et tarses, testacés.*

♂. Corps plus étroit, moins convexe. Antennes prolongées

environ jusqu'au cinquième des élytres ; à articles plus allongés, proportionnellement plus grêles : le dernier, trois fois au moins aussi long qu'il est large dans son milieu. Prothorax subparallèle, à peine élargi d'avant en arrière jusqu'à la moitié, faiblement rétréci ensuite jusqu'à la sinuosité, puis légèrement élargi d'avant en arrière, aussi large à ses angles postérieurs que vers la moitié de sa longueur ; d'un quart environ plus long sur son milieu qu'il est large à la base ; très-médiocrement convexe. Elytres presque parallèles jusqu'aux deux tiers, rétrécies ensuite en ligne graduellement plus courbe ; peu convexes. Deuxième sillon transversal de la partie sternale ordinairement faible, parfois peu distinct.

♀ Corps plus large, plus sensiblement convexe. Antennes à peine prolongées au delà des angles postérieurs du prothorax ; à articles moins allongés, un peu plus dilatés au côté interne, obtusément subdentées à ce côté ; à dernier article deux fois ou deux fois et quart aussi long qu'il est large dans son milieu. Prothorax sensiblement arqué sur les côtés depuis les angles de devant jusqu'à la subsinuosité, subparallèle ensuite, moins large aux angles postérieurs que vers la moitié de sa longueur ; d'un cinquième environ plus long sur son milieu qu'il est large à la base ; médiocrement convexe. Elytres subsinueusement élargies jusque vers la moitié de leur longueur, rétrécies ensuite en ligne graduellement plus courbe ; très-médiocrement convexes. Intervalles moins rugueux. Deuxième sillon de la partie sternale de l'antépectus moins prononcé que l'antérieur, mais toujours distinct.

*Athous analis* (Rex). in. collect.

Long. 0,0078 à 0,0106 (3 1/2 à 4 3/4). Larg. 0,0016 à 0,0022 (2/3 à 1 l.)

Corps allongé ; subparallèle ; pubescent (♂ ♀). Ordinairement brun en dessus, avec les angles antérieurs et postérieurs du



prothorax testacés ; mais souvent d'une teinte moins sombre surtout sur les élytres, et alors d'un brun fauve , d'un fauve brunâtre, d'un fauve testacé ou même testacé. *Tête* marquée de points serrés et assez gros ; plane ou à peine déprimée sur le front. *Arête frontale* tronquée en devant, avec ses extrémités légèrement relevées et subarrondies ; tranchante à son bord antérieur ; avancée au dessus de l'épistome qui est perpendiculaire et distinct de l'arête sur toute sa largeur. *Labre* d'un rouge testacé ; pointillé ; cilié. *Mandibules* et *palpes* testacés : les premières, obscures à l'extrémité. *Antennes* testacées ou d'un testacé pâle ; pubescentes ; subcomprimées ; à deuxième et troisième articles plus courts, plus étroits, presque égaux : le troisième souvent variablement un peu plus long que le deuxième, égal environ aux deux tiers du suivant : les quatrième à dixième obtriangulaires : le quatrième , le plus large, le plus dilaté à son côté interne, le moins obtus à son angle antéro-interne : les suivants, un peu arqués à leur côté interne. *Prothorax* presque tronqué en devant, avec les angles antérieurs déclives ; subsinué sur les côtés vers les quatre cinquièmes ou un peu plus de sa longueur ; à angles postérieurs un peu obtus, médiocrement prolongés, terminés par une petite dent relevée ou dirigée en dehors et à peine sensible ; à peine rebordé sur les côtés, surtout vers la moitié de ceux-ci ; pubescent ; n'offrant pas ou offrant à peine les traces d'une ligne longitudinale médiaire ; un peu moins grossièrement ponctué que la tête ; ordinairement brun, avec les angles testacés ou d'un fauve testacé, mais souvent d'une teinte plus claire. *Ecusson* de la couleur des étuis ; pointillé ; subconvexe. *Elytres* un peu plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; une fois plus longues que lui ; à neuf stries assez prononcées , à peine affaiblies d'avant en arrière, marquées de points crénelant à peine les intervalles : la première aussi prononcée que les autres , subsulciforme sur une partie de sa longueur : les sixième à huitième, non avancées jusqu'à la base :



la neuvième la plus profonde de toutes. *Intervalles* ruguleusement pointillés ; pubescents : les troisième à cinquième légèrement convexes en devant, surtout chez la ♀ : le dixième presque aussi large vers les deux tiers de sa longueur que l'intervalle voisin. *Repli* de la couleur des étuis ; une fois environ plus large que le postépisternum vers la moitié de celui-ci ; presque réduit à une tranche sur les côtés du ventre, mais offrant néanmoins ses deux bords distincts. *Dessous du corps* brun, chez les individus ayant acquis toute leur couleur, ou brun sur les médi et postpectus et d'un brun fauve sur le reste, avec la partie postérieure du dernier arceau ventral testacé ; parfois presque entièrement de cette couleur, chez les variétés les plus claires ; ponctué moins finement sur l'antépectus que sur les autres parties ; garni de poils fins et couchés. *Partie sternale de l'antépectus* arquée et relevée à son bord antérieur : cet arc aussi long sur son milieu que le tiers de sa largeur ; creusée d'un sillon transversal limitant la partie arquée et, un peu après, d'un autre plus faible : l'espace séparant les deux sillons plus court que la partie antérieure arquée : fossette de la partie postérieure du métasternum réduite à un point. *Pieds* fauves sur les cuisses, testacés sur les jambes et les tarses, avec les cuisses parfois de même couleur chez les variétés pâles : hanches postérieures à peine plus élevées que le niveau du ventre ; offrant vers le point d'insertion des cuisses la plus grande dilatation de leur partie supérieure : cette partie graduellement rétrécie ensuite jusqu'à la moitié, linéaires dans leur moitié externe : deuxième et troisième articles des tarses garnis en dessous de poils fins et allongés, simulant une sorte de sole s'avancant sur l'article suivant : premier article des postérieurs aussi long que les deux suivants réunis : le quatrième, très-court : le dernier aussi grand que les deux précédents, pris ensemble.

Cette espèce a été prise par M. Cl. Rey, dans les environs de Hyères et de Marseille, en juin.

Obs. Elle varie beaucoup sous le rapport de la teinte et présente toutes les nuances entre le brun et le testacé.

L'*A. analis* se distingue des autres espèces voisines par son arête frontale tronquée, avec les extrémités légèrement relevées, non confondue avec l'épistome; par les articles cinquième à dixième de ses antennes légèrement arqués à leur côté interne; par son prothorax à peine rebordé, peu ou point muni d'une petite dent à l'extrémité, sans trace bien distincte de ligne médiane; par ses élytres offrant le dixième intervalle presque égal au neuvième vers les deux tiers de sa longueur; par le développement de l'arc de sa partie prosternale; par le trou situé à l'extrémité de la ligne médiane du métasternum réduit à une sorte de point enfoncé.

### ***Athous olbiensis.***

Noir, garni d'une pubescence cendrée et peu épaisse qui lui donne une teinte d'un noir grisâtre. Tête et prothorax marqués de points assez gros : la première, déprimée sur le front. Arête frontale épaissie, échancrée dans son milieu, avancée au dessus de l'épistome qui reste distinct. Troisième et quatrième articles des antennes presque égaux : le deuxième, court. Prothorax offrant les traces d'une ligne médiane légère et raccourcie. Ecusson caréné longitudinalement. Elytres à stries étroites et ponctuées : les sixième à huitième, non avancées jusqu'à la base. Intervalles rugueusement ponctués ; plans : le septième faiblement caréné après l'épaule. Partie sternale de l'antépectus à un sillon transversal, avec la partie antérieure obtusément arquée.

Long. 0,0078 à 0,0084 (3 1/2 à 3 5/4 l.). Larg. 0,0017 à 0,0018 (3/4 à 4/5 l.).

Corps allongé; noir, garni d'une pubescence cendrée peu épaisse, le faisant paraître d'un noir grisâtre. Tête couverte de points confluent, assez gros, rugueux; déprimée sur le front; à arête frontale relevée, renflée ou épaissie et échancrée dans son milieu, avancée au dessus de l'épistome : celui-ci court, perpendiculaire. Mandibules et palpes en partie ferrugineux,

noirâtre à l'extrémité. *Antennes* un peu plus longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; noires, pubescentes ; comprimées ; à deuxième et troisième articles plus étroits que les quatrième et cinquième : le deuxième, court : les troisième et dixième presque égaux en longueur : les quatrième à dixième graduellement plus étroits. *Prothorax* tronqué en avant, avec les angles antérieurs un peu avancés ; presque parallèle, un peu plus étroit en avant ; à angles postérieurs médiocrement prolongés en arrière, un peu obtus ; d'un quart plus long qu'il est large ; muni latéralement d'un rebord étroit, peu visible en dessus dans la moitié antérieure ; marqué d'une ponctuation analogue à celle de la tête, plus serrée sur les côtés que sur le disque ; offrant sur les deux tiers antérieurs de sa ligne médiane les traces d'une raie légère. *Ecusson* plus long que large ; obtusément arrondi à l'extrémité ; pointillé ; pubescent ; chargé longitudinalement d'une carène médiane. *Elytres* un peu plus larges en avant que le prothorax ; deux fois et quart à deux fois et demie aussi longues que lui ; presque parallèles jusqu'aux trois quarts, rétrécies ensuite en ligne graduellement plus courbe jusqu'à l'angle sutural ; peu convexes sur le dos ; à neuf stries étroites, affaiblies d'avant en arrière, marquées de points ne les débordant pas : les sixième, septième et huitième non avancées jusqu'à la base. *Intervalles* rugueusement et finement ponctués ; plans : le septième chargé au dessus de l'épaule, d'une légère carène. *Repli* aussi étroit jusqu'à son rebord interne que le postépisternum vers le milieu de sa longueur ; réduit, à partir du bord postérieur du premier arceau ventral, à peu près à une tranche, offrant néanmoins ses deux bords distincts à un grossissement suffisant. *Dessous du corps* parcimonieusement pubescent et de la couleur du dessus ; marqué de points plus serrés et moins petits sur l'antépectus que sur le reste : partie sternale de l'antépectus obtusément arquée en avant, un peu relevée jusqu'au sillon transversal servant de limite à ce rebord, offrant dans son milieu

une longueur égale au tiers de sa largeur. *Pieds* noirs, avec les tarses d'un ferrugineux obscur : hanches postérieures dilatées médiocrement et presque uniformément sur la moitié interne de leur bord supérieur, rétrécies ensuite et réduites presque à rien à leur extrémité marginale : premier article des tarses un peu plus long que le deuxième : le dernier moins long que les deux précédents réunis.

**PATRIE :** Hyères (collect. Rey); Provence (collect. Gacogne).

**OBS.** Cette espèce se distingue des voisines par sa couleur, par la carène de l'écusson, surtout par son arête frontale échancrée et par le septième intervalle légèrement caréné.

### **Cardiophorus versicolor.**

*Suballongé ; d'un noir gris ; revêtu en dessus d'un duvet long, soyeux, d'un gris flavescent, luisant et mi-doré à certain jour. Antennes, palpes, jambes et tarses d'un rouge ferrugineux ou testacé. Tête déprimée en avant. Arête frontale semi-hexagonale, un peu avancée au dessus de l'épistome qui reste distinct. Prothorax à deux petites entailles au devant de l'écusson ; fendu longitudinalement vers chaque sixième externe de la base ; à peine déprimé sur le milieu de la ligne médiane. Elytres à stries ponctuées : les troisième et quatrième, et cinquième et sixième, postérieurement unies et plus courtes. Partie sternale de l'antépectus tronquée et relevée, en avant.*

Long. 0,0100 (4 1/2 l.). Larg. 0,0029 (1 1/3 l.).

*Corps suballongé ; d'un noir gris ; finement ponctué en dessus et revêtu d'un duvet long, soyeux, d'un gris flavescent, luisant et mi-doré à certain jour. Tête déprimée en avant. Arête frontale en demi-hexagone ou en angle largement tronqué en avant ; un peu avancée au dessus de l'épistome qui est perpendiculaire et reste distinct sur toute sa largeur. Labre, palpes et mandibules d'un rouge ferrugineux ou testacé : ces dernières noirâtres à l'extrémité. Antennes à peine plus longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; d'un rouge ferrugineux ou*



testacé ; pubescentes ; comprimées ; à deuxième article égal à environ la moitié du troisième : celui-ci , à peu près égal aux suivants : les troisième à dixième obtriangulaires. *Prothorax* élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié de ses côtés, plus faiblement rétréci ensuite en ligne presque droite ; à peine sinué au devant des angles postérieurs ; médiocrement prolongé à ceux-ci ; à deux petites entailles au devant de l'écusson ; échancré entre cette partie antéscutellaire et chaque angle postérieur ; rayé, vers chaque sixième externe de la base, d'une ligne un peu obliquement longitudinale, parallèle au bord externe, avancée environ jusqu'au cinquième postérieur de la longueur ; à peine aussi long sur son milieu qu'il est large à la base ; sans rebord sur les côtés, si ce n'est aux angles postérieurs ; médiocrement convexe ; peu sensiblement déprimé sur le milieu de sa ligne médiane ; pointillé ; d'un noir gris , revêtu d'un duvet couché de différents côtés. *Ecusson* revêtu d'un duvet semblable ; cordiforme. *Elytres* deux fois et quart environ aussi longues que le prothorax ; presque parallèles du sixième aux quatre septièmes de leur longueur, postérieurement rétrécies ; très-médiocrement convexes ; d'un noir gris ; revêtues d'un duvet moins épais et moins flavescent que celui du prothorax ; à stries ponctuées : la cinquième sulciforme en devant : la neuvième, sur toute sa longueur : la sixième, réduite sur le calus à une rangée de points : les septième et huitième un peu plus courtes en devant : les troisième et quatrième, et cinquième et sixième, postérieurement unies par paires et plus courtes. *Intervalles* à peu près plans ; pointillés. *Repli* uniformément étroit à partir du premier arceau ventral jusqu'à l'extrémité. *Dessous du corps* d'un noir gris ; pointillé ; garni d'un duvet gris cendré, moins épais et plus court que celui du dessus. *Partie sternale de l'antépectus* tronquée et relevée en devant : *Pieds* pubescents ; d'un noir gris ou brun gris sur les cuisses ; hanches antérieures, genoux, jambes d'un rouge ferrugineux ou d'un fauve testacé : tarses testacés.



Patrie : le midi de la France.

Obs. Cette espèce se distingue des espèces voisines par son duvet long, soyeux, châtoyant.

**Diacanthus aeratus.**

Allongé ; peu convexe ; bronzé en dessus et en dessous ; garni de poils fins d'un cendré flave ou mi-doré. Tête notée d'une fossette sur le milieu du front : bord antérieur de celui-ci avancé et tronqué dans son milieu, rétréci et sinué sur les côtés. Epistome indistinct. Antennes noires ; à deuxième article égal aux deux tiers du quatrième : le troisième, un peu moins court. Prothorax offrant les traces d'un sillon vers l'extrémité de la ligne médiane. Elytres à stries ponctuées, étroites. Intervalles plans, finement ponctués. Partie sternale de l'antépectus arquée en devant : cet arc aussi long sur son milieu que le quart de sa largeur, suivi d'une dépression transverse au moins aussi longue. Pieds bronzés : genoux et ongles testacés.

*Diacanthus aeratus* (CL. REY.) in collect.

Long. 0,0107 à 0,0112 (4 3/4 à 5 l.). Larg. 0,0026 (1 1/5 l.).

Corps allongé ; peu convexe ; bronzé, luisant, et garni de poils couchés, flavescents, mi-dorés, en dessus. Tête décline ; marquée d'assez gros points, plus serrés sur sa partie postérieure que sur l'antérieure ; notée d'une fossette sur le milieu du front ; tronquée et plus avancée sur la partie médiane de son bord antérieur, rétrécie et sinuée sur les côtés de celui-ci ; peu en point saillante au dessus du labre. Epistome indistinct. Labre, mandibules et palpes maxillaires, bronzés. Mâchoires testacées, pâles. Antennes prolongées un peu au delà des angles postérieurs du prothorax ; comprimées ; un peu pubescentes ; d'un noir un peu bronzé ; à deuxième et troisième articles plus étroits : le deuxième à peu près égal aux deux tiers du quatrième : le cinquième, un peu moins court : les quatrième à dixième obtriangulaires. Prothorax sinué sur les côtés près de la base des angles postérieurs ; élargi d'avant en arrière en ligne légèrement arquée

depuis les angles de devant jusqu'à la sinuosité, offrant sur cet espace sa plus grande largeur vers les trois cinquièmes ou deux tiers de sa longueur, élargi d'avant en arrière depuis la sinuosité jusqu'à l'extrémité des angles postérieurs où il offre sa plus grande largeur ; médiocrement prolongé et un peu obtus à ces angles ; un peu plus ou à peine plus long sur son milieu qu'il est large à l'extrémité de ses angles postérieurs ; très-médiocrement convexe ; garni de points plus petits et moins serrés que ceux de la tête, donnant, comme ceux-ci, naissance à un poil flavescent ; offrant les traces d'un léger sillon vers l'extrémité de la ligne médiane. *Ecusson* pointillé ; pubescent ; légèrement déprimé sur son disque. *Élytres* de la largeur, après les épaules, du prothorax à ses angles postérieurs ; deux fois environ aussi longues que lui ; subparallèles ou à peine élargies jusqu'aux quatre septièmes, rétrécies ensuite en ligne graduellement plus courbe jusqu'à l'angle sutural ; peu convexes sur le dos ; bronzées et pubescentes comme le prothorax ; à neuf stries à peine avancées en devant jusqu'au niveau de la moitié de l'écusson : ces stries étroites, marquées de points ne les débordant pas : les quatre premières plus prononcées en devant ; la neuvième sulciforme. *Intervalles* plans ; pointillés. *Repli* bronzé ; de moitié plus large que le postépisternum, vers le milieu de celui-ci ; uniformément à peine plus large que la moitié du postépisternum sur les côtés du ventre. *Dessous du corps* d'un bronzé à peine plus obscur que le dessus ; garni de poils fins et couchés, cendrés ou d'un cendré flavescent ; moins finement ponctué sur l'antépectus que sur le reste. *Partie sternale de l'antépectus* obtusément arquée et un peu relevée, en devant : cette partie arquée rebordée, aussi longue dans son milieu que le quart de sa largeur, suivie d'une dépression transversale à peine plus développée dans le sens de la longueur que la partie arquée ; chargée longitudinalement sur son milieu, après cette dépression, d'une carène à peine apparente à certain jour. *Pieds* bronzés, pubescents, avec les genoux,

les ongles et l'extrémité du dessus des deuxième à quatrième articles des tarsi testacés. Hanches postérieures offrant vers l'insertion des cuisses la plus grande dilatation de leur partie supérieure, graduellement rétrécies de ce point à leur côté externe : premier article des tarsi postérieurs près de moitié plus grand que le suivant.

**PATRIE :** le Mont-Pilat (collect. Rey).

**Obs.** Cette espèce se rapproche du *D. metallicus* par sa couleur ; mais elle en diffère par sa structure plus étroite ; par la couleur de ses antennes, par les proportions des deuxième et troisième articles ; par la forme de la partie antérieure de la région sternale de l'antépectus , par la couleur des pieds, etc.

---

# L'AMPHIMALLUS MARGINATUS,

PAR

**E. Mulsant et Valéry Mayet.**

Présentées à la Société Linnéenne de Lyon, le 9 juillet 1855.

---

*Larve* hexapode ; courbée. *Tête* convexe ; d'un roux livide , lisse ou à peine hérissée de quelques poils peu apparents : épistome en parallépipède transverse. Labre élargi depuis sa base jusqu'à sa moitié , en ogive en devant, rugueux ou râpeux sur sa surface, cilié. *Mandibules* subcornées et d'un roux livide à la base ; noires et cornées à l'extrémité, tronquées à celle-ci de manière à se joindre et à faire l'office de tenaille coupante, quand elles se rapprochent. *Mâchoires* presque pédiformes, naissant près du bord postérieur de la partie inférieure de la tête; anguleusement dirigées en dehors dans leur milieu ; embrassant les côtés du menton dont elles voilent les bords, et la partie antérieure ; à un seul lobe, munies à leur côté interne de cils spinosules et de nombreuses petites dents qui s'entrecroisent pour diviser plus facilement les matières alimentaires. *Palpes maxillaires* filiformes ; de trois articles. *Antennes* plus longuement prolongées que la partie antérieure des mandibules ; filiformes ; de quatre articles, non compris le nodule basilaire : le premier article cylindrique , moins long que le deuxième : celui-ci quatre fois aussi long que large, cylindrique : le troisième un peu

plus longue que le premier, prolongé en forme de dent au dessous du quatrième : celui-ci ovalaire. *Corps* courbé en arc ; composé de douze arceaux ; les dix premiers blancs, ridés et garnis en dessus de poils roux , sétulosules : le onzième presque glabre : le douzième ardoisé, tronqué à l'extrémité, garni vers celle-ci de poils roux spinosules : anus offrant une fente longitudinalement dirigée en bas : et de chaque côté une ligne transversale ou un peu remontante. *Dessous du corps* hérissé de poils flexibles, clair-semés. *Pieds* allongés , d'un blanc livide ; cuisses plus longues que les jambes : celles-ci paraissant composées de deux pièces non articulées ; garnies de poils roux spinosules. *Tarses* terminés par un ongle ; renflés en dessous dans leur milieu ; plus épineux que les jambes.

Ces larves, trouvées dans l'automne de 1854, ont été tenues dans une terre modérément humectée, sur laquelle nous semions de l'orge, dont ces larves rongaient les racines. Vers le 10 juin 1855, ces larves se construisirent une coque de terre agglutinée, dans laquelle elles se transforment en une nymphe , dont voici la description.

NYMPHE: long. 0,0135 (6 l.)

*Corps* oblong ; glabre. *Tête* subperpendiculaire. *Antennes* couchées longitudinalement au dessous de la tête, avec la massue verticalement relevée, quand l'insecte est couché sur le dos. *Elytres* et *ailes* déhiscentes : les secondes en majeure partie voilées par les premières; les unes et les autres repliées en dessous, prolongées environ jusqu'au troisième arceau ventral. *Cuisses* transversalement dirigées du côté externe : les quatre antérieures visibles et un peu moins prolongées que le côté extérieur du corps : les postérieures en partie voilées par les organes du vol et un peu plus longuement prolongées que les autres. *Jambes* formant avec les cuisses un angle aigu ; toutes visibles. *Tarses*



dirigés d'une manière un peu obliquement longitudinale ; convergeant chacun avec leur pareil vers la partie médiane du corps : les postérieurs prolongés presque jusqu'à l'extrémité du ventre. *Abdomen* offrant en dessus neuf arceaux visibles, offrant vers le troisième sa plus grande largeur, graduellement rétréci à partir de celui-ci : les six premiers courts, à peu près égaux : les trois derniers graduellement plus longs : le dernier terminé par une pointe cornée, servant à l'insecte à se tourner dans sa coque.

---

## DESCRIPTION

D'UNE

### ESPÈCE NOUVELLE DE COLÉOPTÈRE

DE LA TRIBU DES LONGICORNES ,

PAP

**E. Mulsant et Guillebeau.**

(Lue à la Société Linnéenne de Lyon , le 12 août 1855.)

#### ***Exocentrus punctipennis.***

*Dessus du corps d'un rouge brun ou d'un fauve brun. Prothorax arqué à son bord antérieur, garni de poils cendrés et couchés, relevé en forme de carène sur sa ligne médiane. Elytres garnies sur leur moitié antérieure et sur leur quart ou tiers postérieur d'un duvet cendré, parsemées d'espaces ponctiformes dénudés donnant chacun naissance à un poil obscur hérissé ; ornées entre ces deux points d'une bande transversale brune anguleuse, plus prolongée en arrière sur la suture que vers le bord externe. Troisième, quatrième et cinquième articles des antennes annelés.*

Long. 0,0056 (2 1/2 l.). Larg. 0,0022 (1 l.).

*Corps assez allongé ; médiocrement convexe ; d'un rouge brun ou d'un fauve brun ou brunâtre, et garni de duvet. Tête perpendiculaire ou inclinée ; subconvexe ; rayée depuis le bord postérieur jusqu'au niveau de la base des antennes d'une ligne longitudinale médiane peu profonde ; d'un rouge brun ou brunâtre , garnie de duvet cendré ; hérissée de quelques poils obscurs : labre plus pâle. Antennes d'un quart ou d'un tiers plus longues que le corps ; sétacées ; ciliées en dessous : de onze articles ; le pre-*

nier légèrement renflé vers son milieu, aussi long que le quatrième, moins long que le troisième ; d'un fauve brun, avec les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et quelquefois sixième, brièvement annelés de blanc à leur base. *Prothorax* arqué à son bord antérieur ; tronqué à la base ; élargi en ligne courbe jusqu'aux trois cinquièmes de ses côtés, et armé dans ce point d'une épine un peu dirigée en arrière, rétréci en ligne un peu courbée en dedans, à partir de ce point jusqu'au bord postérieur ; rebordé à la base ; plus large que long ; convexe ; d'un rouge brun ou brunâtre ; garni de poils cendrés, couchés, relevés et formant longitudinalement sur la ligne médiane une sorte de carène ; hérissé près des côtés, de quelques poils obscurs. *Ecusson* en triangle à côtés un peu courbés ; rouge brun, revêtu d'un duvet cendré. *Élytres* près d'une fois aussi larges en avant que le prothorax à sa base ; d'un cinquième ou d'un quart plus larges que ce dernier dans son diamètre transversal le plus grand ; trois fois et demie environ aussi longues que lui ; presque parallèles jusqu'à la moitié, faiblement élargies vers les quatre septièmes, subarrondies à l'extrémité (prises ensemble), mais souvent un peu subarrondies chacune à l'angle sutural ; généralement moins contiguës à la suture dans leur cinquième postérieur ; médiocrement convexes ; à fond d'un rouge brun, ou d'un fauve brun ; ornées d'une bande transversale brune, garnie de poils concolores, comme formée sur chaque élytre de deux taches unies : cette bande plus prolongée en arrière sur la suture que près du bord externe, naissant à ce dernier vers la moitié de la longueur, couvrant jusqu'aux deux tiers, naissant aux quatre cinquièmes de la suture et couvrant jusqu'aux cinq septièmes de celle-ci, offrant à son bord antérieur deux angles dirigés en avant sur chaque élytre, l'un aux deux cinquièmes internes, l'autre au sixième de la largeur voisin du bord externe, offrant sur la suture une entaille plus profonde et plus large que les autres comprises entre les angles : cette bande moins sinuée ou moins anguleuse à son bord posté-

rieur, dont la partie suturale est la partie la plus prolongée en arrière ; couvertes sur le reste de leur surface de poils cendrés ou d'un blanc cendré, couchés, parsemées de petits espaces dénudés, circulaires, du milieu de chacun desquels sort un poil obscur ou noirâtre, long, hérissé, un peu dirigé en arrière. *Dessous du corps* d'un brun rouge ou d'un rouge brun, plus pâle sur l'antépectus que sur le ventre ; garni de poils couchés, assez épais, cendrés ou d'un blanc cendré. *Pieds* de la couleur du dessous du corps et garnis comme lui de poils cendrés ; hérissés de quelques poils obscurs sur les jambes et les tarses. *Cuisses* en massue dans leur milieu. *Jambes antérieures* sub-échancrées vers le milieu de leur arête inférieure : les intermédiaires, échancrées vers les deux tiers de leur arête supérieure. *Premier article des tarses* presque aussi long que les deux suivants réunis.

Cette espèce se trouve en juillet dans les environs de Lyon ; sa larve vit dans l'orme.

Obs. Elle se distingue facilement des *Ex. balteatus* et *adsper-sus* par la bande de ses élytres plus prolongée en arrière sur la suture que près du bord externe ; par son prothorax arqué en devant, etc.

Voici la description de cet insecte dans ses premiers états :

*Larve* allongée ; apode ; blanche ; hérissée de poils fins, assez clairsemés, blanchâtres, moins relevés, plus épais et plus apparents sur la moitié antérieure des parties supérieure et inférieure du premier segment. *Tête* parallèle jusqu'au bord antérieur du front ; blanche ; rayée d'une ligne longitudinale médiane. *Epistome* transversal ; membraneux et d'un blanc livide dans sa partie médiane, subcorné et d'un rouge brun sur les côtés. *Labre* plus étroit, arqué à son bord antérieur. *Antennes* nulles ; indiquées seulement par une petite fossette ponctiforme. *Mandibules* arquées ; cornées ; brunes ou d'un rouge brun, un peu obtuses à leur extrémité. *Mâchoires* à un lobe, cilié ou garni de poils

rigides à son côté interne. *Palpes maxillaires* aussi avancés que le lobe maxillaire ; graduellement rétrécis depuis la base jusqu'à l'extrémité ; de trois articles. *Menton* presque carré. *Langnette* échancrée en devant. *Palpes labiaux* peu apparents. *Corps* paraissant composé de treize segments, presque quadrangulaire, subgraduellement rétréci jusqu'au neuvième, faiblement rentlé du dixième au douzième : le dernier brusquement plus étroit : le premier, au moins aussi grand que les deux suivants réunis, offrant en devant deux dépressions contiguës sur la ligne médiane, couvrant presque toute sa largeur, prolongées jusqu'à un peu plus de la moitié de sa longueur : les quatrième à dixième offrant en dessus et en dessous un mamelon rétractile servant à la progression. *Stigmates* au nombre de neuf paires : la première près du bord antérieur du deuxième segment : les autres sur les quatrième à dixième anneaux.

Cette larve se creuse des galeries dans l'écorce de l'orme et s'y prépare une retraite pour passer à son second état.

*Nymphe* allongée ; blanche dans les premiers jours. *Tête* inclinée. *Antennes* prolongées de chaque côté du corps jusques à la moitié environ des organes du vol, où elles se courbent en dedans et reviennent le long de la ligne médiane jusqu'au niveau des cuisses antérieures : ces organes, quand la nymphe offre à la vue sa partie supérieure, passent latéralement sur les deux premières paires de pieds. *Prothorax* moins long que les deux segments suivants. *Abdomen* garni de poils très-clairsemés, fins et peu distincts ; de neuf segments : les six premiers très-distincts, presque égaux, en ligne droite et presque en forme de tranche sur les côtés : les premier et deuxième peu sensiblement relevés à la partie antérieure de leurs côtés : les septième à neuvième, graduellement rétrécis mais distinctement articulés : le dernier tronqué à son extrémité, muni de cinq pointes subcornées : une dans le milieu du bord supérieur : une courbée en dedans à la partie supérieure de chaque bord latéral : une courbée en dehors



à la partie inférieure de chaque bord latéral. *Elytres* et *ailes* divergentes , incurbées en dessous, prolongées jusqu'à l'extrémité du quatrième arceau ventral. *Pieds* offrant les cuisses dirigées en dehors d'une manière un peu obliquement transversale, avec les jambes presque appliquées contre les cuisses et les tarses étendus dans la direction de la ligne médiane : les postérieurs prolongés jusqu'à l'extrémité du sixième arceau ventral. Les quatre pieds antérieurs libres et visibles sur le dessous du corps : les cuisses et les jambes des postérieurs voilées, presque jusqu'à l'extrémité, par les organes du vol.

---

## DESCRIPTION

D'UNE

### ESPÈCE NOUVELLE DE COLÉOPTÈRE

DU GENRE **ORCHESIA**,

PAR

**E. MULSANT et GODART,**

(Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 11 février 1886.)

---

#### **Orchesia maculata.**

*Suballongée ; garnie de poils fins, soyeux et couchés. Tête, prothorax et écusson d'un brun noir ou d'un noir brun ; celui-ci noté de deux fossettes basilaires. Antennes d'un fauve testacé ; à massue en partie obscure de quatre ou cinq articles. Elytres d'un fauve testacé ; marquées chacune de deux taches et d'une bande transversale noire ou noirâtre : la première tache, ovale, discale, sur le second septième de leur longueur ; la deuxième, marginale, vers les deux cinquièmes ; la bande, vers les deux tiers. Poitrine brune ; ventre et pieds d'un fauve testacé.*

Long. 0,0036 (2 1/2 l.). Larg. 0,0020 (9/10 l.).

*Corps suballongé ; longitudinalement un peu arqué ; peu convexe ; garni de poils fauves , fins et couchés. Tête finement ponctuée ; pubescente ; brune : labre et parties de la bouche d'un fauve testacé. Palpes de cette dernière couleur. Antennes d'un fauve testacé sur leur première moitié et à l'extrémité du dernier article , brunes sur le reste ; à premier article allongé , renflé : le deuxième un peu plus gros et à peu près aussi long*

ou à peine moins long que le troisième : les quatre ou cinq derniers constituant une massue fusiforme. *Yeux* noirs ; à grosses facettes ; séparés, l'un de l'autre, dans leur point le plus rapproché, par un espace égal aux deux tiers ou aux trois quarts de celui qui sépare les antennes entre elles, à leur base. *Prothorax* obtusément arqué ou subarrondi en devant ; à angles antérieurs inclinés et invisibles en dessus ; élargi en ligne courbe assez régulière jusqu'aux trois quarts de sa longueur, offrant vers les angles postérieurs ou un peu avant, sa plus grande largeur ; d'un tiers environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; presque en ligne droite à son bord postérieur, avec les angles à peine courbés en arrière et le tiers médiaire à peine plus prolongé en arrière, à peine sinué de chaque côté de cette partie médiaire qui est tronquée ou plus sensiblement en ligne droite : médiocrement convexe en devant, peu convexe en arrière ; noté, vers chaque quart externe de sa base, d'une fossette longitudinale ou triangulaire assez marquée, avancée jusqu'au tiers postérieur de la longueur ; d'un brun noir ; pointillé d'une manière presque squammuleuse ; garni de poils fauves, fins et couchés. *Ecusson* presque en carré, une fois plus large que long, un peu arqué en arrière à son bord postérieur ; brun ; pointillé ; pubescent. *Elytres*, en devant, de la largeur du prothorax à ses angles postérieurs ; quatre fois environ aussi longues que lui ; subparallèles depuis la base jusqu'à leur milieu, rétrécies ensuite, et plus sensiblement depuis les deux tiers jusqu'à l'angle sutural ; peu convexes sur le dos ; relevées à la suture en un rebord sutural, affaibli près de la base et prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité, paraissant, par là, rayées d'une suture juxta-suturale ; superficiellement pointillées, presque lisses ; garnies de poils d'un fauve testacé, très-fins, soyeux et couchés ; d'un fauve testacé, ornées chacune de deux taches et d'une sorte de bande transversale noires ou d'un noir brun : la première tache, la plus grosse, ovale, couvrant plus du tiers médiaire de la largeur, sur

le deuxième septième de la longueur : la deuxième, ponctiforme, située près du bord externe, vers les deux cinquièmes de leur longueur, ordinairement moins marquée ou plus faiblement apparente : la bande, située vers les deux tiers de leur longueur, constituant avec sa pareille une bande un peu arquée en avant, paraissant composée de trois taches subponctiformes liées ensemble. *Repli* prolongé jusqu'à l'extrémité du troisième arceau ventral, où il se réduit à une tranche. *Dessous du corps* brun ou d'un brun fauve sur les parties pectorales, fauve ou d'un fauve testacé sur le ventre ; pointillé ; parcimonieusement pubescent. *Postépisternums* quatre fois aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. *Pieds* d'un fauve testacé.

PATRIE : la Sicile.

---

# DESCRIPTION

D'UNE

## NOUVELLE ESPÈCE DE COLÉOPTÈRE

DU GENRE **BOSTRICHUS**,

PAR

**E. MULSANT et Cl. REY.**

(Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 11 juin 1853).

---

### **Bostriehus alni.**

*Elongatus, cylindricus, nitidus, parcè pilosellus, piceus, antennis pedibusque rufo-testaceis; prothorace medio elevato, antice asperato, postice sublorigato; clytris punctato-striatis, apice oblique subretusis, denticulatis.*

Long. 0,0035 ( 1 1/2 l. ).

*Corps* allongé, sublinéaire, cylindrique, couleur de poix, cilié, principalement en avant et sur les côtés, de poils pâles, disposés en séries longitudinales sur les élytres.

*Tête* verticale, fortement engagée sous le prothorax, légèrement convexe sur le front, longitudinalement subcarénée à sa partie antérieure; d'un brun de poix, quelquefois un peu rougeâtre; finement chagrinée; grossièrement ponctuée; hérissée en devant de longs poils pâles, et transversalement sillonnée à l'épistome. Celui-ci bissinueux à son bord antérieur. *Parties de la bouche* testacées, avec les *mandibules* ferrugineuses à leur base, d'un brun de poix à leur extrémité. *Yeux* noirs, déprimés.



*Antennes* courtes, à peine de la longueur de la tête, d'un testacé un peu rougeâtre, avec le bouton pâle à son sommet, légèrement pubescent. Le premier article offrant en dessous trois ou quatre longs poils, et le deuxième, deux semblables : un en dessus, l'autre en dessous.

*Prothorax* grand, oblong, cylindrique, d'un tiers plus long que large, de la largeur des élytres; élevé et comme gibbeux au milieu de son disque; tronqué à la base, réfléchi sur les côtés qui sont subparallèles; fortement arrondi à son bord antérieur qui est garni d'un liseré pâle, formé de poils courts et serrés; à angles postérieurs arrondis, les antérieurs nuls; d'un noir de poix brillant, quelquefois un peu ferrugineux; glabre, lisse ou obsolètement ponctué à sa moitié postérieure; garni à sa moitié antérieure d'aspérités nombreuses dirigées en arrière, et hérissé de poils pâles, ayant aussi la même direction, plus longs sur le bord apical. On aperçoit en outre de chaque côté, à la base, une impression oblique, obsolète.

*Ecusson* oblong, très-petit, lisse, d'un brun de poix.

*Elytres* d'un tiers plus longues que le prothorax, cylindriques, d'un brun de poix brillant, avec une petite tache ferrugineuse au calus huméral; marquées de stries obsolètes, formées de points rugueux, assez gros, assez serrés et peu profonds : les intervalles présentent une ligne de points beaucoup plus petits et plus écartés, souvent peu visibles, et en outre une série de poils pâles et redressés. Enfin elles sont obliquement coupées à leur extrémité, où elles offrent des denticules assez nombreuses, disposées sur trois séries longitudinales sur chaque élytre : la première, auprès de la suture, composée de quatre ou cinq denticules; l'intermédiaire, ordinairement de quatre; l'extérieure, interrompue, très-irrégulière, formée de sept ou huit.

*Dessous du corps* convexe, brillant, d'un noir de poix, parcimonieusement poilu. *Ventre* assez densément ponctué.

*Poitrine* assez fortement ponctuée sur les côtés , presque lisse sur son milieu.

*Pieds* courts , larges ; comprimés ; d'un testacé rougeâtre. *Tibias* triangulairement dilatés et obliquement tronqués à leur extrémité ; denticulés et ciliés à leur tranche externe et au sommet , et simplement ciliés vers l'extrémité de leur tranche interne. *Hanches antérieures* et *intermédiaires* hérissées de longs poils pâles. *Tarses* grêles ; testacés ; ciliés en dessous de quelques poils pâles.

**PATRIE :** Environs de Lyon , sur les troncs d'aulne , dans l'intérieur desquels la larve se creuse des galeries profondes.

**Obs.** Cette espèce est très-voisine du *Bostrichus monographus*, Gyl. Elle s'en distingue par sa taille un peu plus courte , par sa couleur constamment plus obscure , par les aspérités du prothorax plus fortes , par les points des stries plus gros et plus marqués , et par les denticules de la troncation des élytres plus nombreuses.

NOTES POUR SERVIR A L'HISTOIRE  
DE  
**L'AGNATHUS DECORATUS.**

---

DESCRIPTION

DE LA

**LARVE ET DE LA NYMPHE DE L'AGNATHUS DECORATUS.**

PAR

**E. Mulsant et Cl. Rey;**

(Mémoire lu à la Société Linnéenne de Lyon, le 13 juin 1855.)

---

LARVE.

*Corpus elongatum, leviter convexum, parce ciliato-pilosellum, luteo-testaceum, tenuissime longitudinaliter canaliculatum, segmentis duodecim præter caput compositum; hoc verticali; segmentis tribus primis, ultimisque tribus cæteris majoribus; ultimo granulato, apice profunde bifoveolato et bihamato. Pedes sex, triarticulati.*

Long. 0,006 — 0,007 (2 1/2 à 2 3/4 lignes).

*Corps* allongé, légèrement convexe, d'une couleur testacée; marqué sur son milieu d'un sillon longitudinal très-fin qui parcourt tous les segments, excepté la tête; finement et obsolètement chagriné en travers; cilié de quelques longs poils pâles, disposés principalement sur six séries longitudinales: la première marginale, formée d'un seul poil pour chaque segment; la deuxième sur les côtés, formée de deux poils pour chaque segment; la troisième dorsale formée de la même manière que la précédente.

*Tête* verticale, déprimée sur le front, où elle présente deux sillons arqués en dedans, convergeant à l'occiput, et se recourbant intérieurement sur eux-mêmes à leur extrémité comme pour former une espèce de boucle elliptique; obsolètement chagrinée, transversalement ridée en avant; arrondie sur les côtés qui sont faiblement gibbeux vers l'insertion des antennes, d'où elle se rétrécit brusquement; ciliée de quelques longs poils pâles; d'un jaune testacé, avec la partie antérieure et l'épistome plus obscurs; celui-ci légèrement échancré. *Labre* transversal, largement arrondi au sommet, dont le bord présente sur son milieu une très-faible pointe ou angle obtus; d'un roux de poix testacé; cilié de six à huit poils brillants, jaunâtres. *Mandibules* cornées, assez courtes, solides, d'un roux de poix testacé, avec le sommet plus obscur. *Palpes maxillaires* testacés, de trois articles apparents, diminuant graduellement d'épaisseur: les deux premiers courts, le troisième aussi long que les deux précédents réunis. *Palpes labiaux*, menton et lèvre inférieure d'un testacé très-pâle. *Yeux* nuls ou non apparents.

*Antennes* insérées sur une espèce de tubercule court ou bourrelet; d'un testacé de poix; de trois articles apparents: le premier court, épais; le deuxième un peu moins épais, mais d'une moitié plus long que le précédent; le dernier très-petit, subulé, tronqué.

Les trois segments thoraciques qui portent les pieds, plus grands que les suivants: le premier d'un tiers plus grand que le deuxième, en carré transversal, postérieurement rétréci; offrant, à chaque série, un faisceau de poils de plus que dans les autres segments; les deuxième et troisième subégaux, transversaux, plus larges en arrière qu'en avant; ce dernier postérieurement plus large que le précédent.

Les six premiers segments abdominaux courts, transversaux, allant graduellement en s'élargissant un peu, épaissis en bourrelet sur les bords et présentant chacun vers l'angle antérieur un

petit stigmatc arrondi , ombiliqué ; marqués chacun postérieurement d'un léger sillon transversal s'affaiblissant et disparaissant sur le dos , et en outre , sur les côtés d'une impression oblique , oblongue , assez marquée.

*Les trois derniers segments* allant en se rétrécissant un peu , plus grands que les précédents , à stigmates semblables , à bourrelets moins épais. Le pénultième plus long que le précédent et un peu plus lisse. Le dernier un peu plus long que le pénultième , convexe , granuleux ; à bord postérieur subbissinuement tronqué , tranchant ; creusé en dessus de deux fossettes arrondies , profondes , obscurcies , et en outre armé latéralement de deux crochets solides , recourbés en haut , rembranis à leur pointe ; garni en dessus et principalement sur les côtés de quelques longs poils , d'un jaune pâle.

*Dessous du corps* déprimé , testacé , obsolètement chagriné en travers. Le segment anal plat , marqué à la base d'une petite strie longitudinale , obscure ; orné au sommet de deux petits sillons sémi-lunaires , joignant la tranche apicale qui est rembrunie.

*Pieds* assez courts , insérés sur un prolongement coxal , assez développé , conique , composé de trois ou quatre pièces ; d'un testacé de poix ; garnis de quelques rares poils jaunâtres ; composés de trois articles : le premier un peu plus large au sommet où il est tronqué ; le deuxième un peu moins épais et presque aussi long que le premier , un peu plus étroit vers l'extrémité ; le troisième en forme d'ongle recourbé en dedans , fortement réuni au précédent , avec lequel il semble ne faire qu'un.

Obs. Cette larve dont tous les anneaux et tous les organes sont plus ou moins rétractiles , présente plus ou moins de rides ou plis à son épiderme , suivant la tension qu'éprouve celui-ci dans les divers mouvements du corps. Quand elle est près de se transformer elle devient plus courte , plus épaisse et beaucoup plus voûtée.



## NYMPHE.

La *Nymphe*, dans laquelle on reconnaît facilement l'insecte parfait, est assez convexe. La *tête*, infléchie en dessous, est fortement engagée dans le prothorax. Les *yeux*, assez gros, sont à moitié voilés par les bords de celui-ci. Les *palpes* sont tous libres. Les *antennes* dont on compte distinctement tous les articles, rejetées en arrière le long des côtés du prothorax, viennent s'appliquer, par leur sommet, contre les cuisses intermédiaires. Les *élytres*, repliées sous le corps, dont elles atteignent les deux tiers de la longueur, présentent sur les côtés deux plis longitudinaux, parallèles. Les *segments thoraciques* répondant aux *mesosternum* et *métasternum*, sont faiblement convexes, tandis que les *segments abdominaux* le sont assez fortement en travers. Ceux-ci sont au nombre de six, et le segment anal, arrondi à son sommet, laisse dépasser en arrière un lobe large, déprimé, terminé par quatre lanières, dont les intermédiaires courtes, rapprochées l'une de l'autre, subparallèles; les extérieures divergentes, beaucoup plus longues, spiniformes.

Les *pieds antérieurs* et *intermédiaires* sont en dehors des élytres contre lesquelles ils sont appliqués, à l'exception des tibia et tarses antérieurs qui s'en détachent un peu. Les *tarses* présentent distinctement tous leurs articles, et même leurs crochets. Les *pieds postérieurs* se trouvent engagés sous les élytres, à l'exception des genoux qui les débordent sensiblement.

La larve de l'*Agnathus decoratus* se rencontre, ainsi que l'insecte parfait, au bord des rivières, dans les vieilles souches d'aulne. Elle vit en compagnie du *Rhizophagus coruleus* et d'un *Bostrichus* (*Bostrichus alni*), dont nous avons donné ci-devant la description. Suivant toutes nos présomptions, elle doit être parasite des larves de ce dernier xylophage, car nous l'avons souvent trouvée mêlée à celles-ci et au fond des galeries qu'elles

s'étaient creusées dans l'intérieur du bois. Les larves des *Rhizophages*, trop petites et trop déprimées, ne sauraient pratiquer des chemins suffisants pour laisser passage à une larve du volume de celle de l'*Agnathus*. D'ailleurs leurs petites galeries, peu profondes, ne s'écartent guère de la surface de l'aubier à laquelle elles sont parallèles, et c'est le plus souvent dans le cœur même du bois que nous avons surpris la larve de l'*Agnathus*.

---

#### EXPLICATION DE LA PLANCHE.


Fig. 4 — Larve grossie de l'*Agnathus decoratus*.

— 2 — Tête grossie de la même.

— 3 — Segment anal de la même, vu par dessus.

— 4 — Nymphe de l'*Agnathus decoratus*.

---



---

11

20

10

I Larve et nymphe de l'Eugnatius

St. Rey d.1

II Hemiptères, hemiptères



# DESCRIPTION

DE QUELQUES

## HÉMIPTÈRES-HÉTÉROPTÈRES

NOUVEAUX OU PEU CONNUS,

PAR

**E. Mulsant et Cl. Rey.**

Présentée à la Société Linéenne de Lyon, le 12 novembre 1855.

### FAMILLE DES SCUTELLÉRIDES.

#### GENRE STERNODONTUS.

(στερνον, sternum, ὀδους dent).

#### CARACTÈRES DU GENRE.

*Corpus* breve, scutiforme.

*Caput* elongatum. — *Rostrum* mediocre.

*Oculi* minuti, globosi. — *Ocelli* postici, distantes.

*Antennæ* subgraciles, articulo tertio sequenti duplo brevior.

*Prothorax* transversus, angulis posticis rotundato-dilatatis.

*Scutellum* oblongum, postice rotundatum.

*Prosternum* antice bispinosum.

*Pedes* sat validi, spinosuli.

*Corps* court, assez épais, en forme d'écusson.

*Tête* allongée, un peu plus large à la base; les lobes latéraux réunis en avant du lobe médian. *Rostre* médiocre, atteignant la moitié du corps, de quatre articles apparents, se logeant dans une rainure qui parcourt le dessous de la tête et toute la poitrine.



*Yeux* petits, saillants, globuleux. *Ocellles* distants, situés à la base du vertex en arrière de la ligne des yeux.

*Antennes* assez grêles, de cinq articles : le deuxième près de trois fois plus long que le troisième, celui-ci deux fois plus court que le suivant, le quatrième et cinquième subégaux.

*Prothorax* court, transversal, à côté assez profondément sinueux, et à angles postérieurs dilatés en forme d'oreillette arrondie.

*Ecusson* oblong, largement arrondi en arrière, aussi long mais un peu plus étroit que l'abdomen.

*Hémélytres* presque entièrement cachées par l'écusson, seulement visibles sur les côtés, à la base.

*Prosternum* muni en avant, de chaque côté de la rainure rostrale, d'une dent spiniforme un peu déjetée en dehors.

*Pieds* assez courts et assez robustes. *Tibias* spinosules en dessous. *Tarses* de trois articles, le deuxième beaucoup plus petit. *Ongles* garnis chacun en dessous d'un appendice membraneux.

*Oss.* L'espèce typique de ce genre s'éloigne des véritables *Ancyrosoma*, Am. et Sav. par ses pieds plus courts, plus distinctement spinosules, et surtout par son prosternum antérieurement bidenté. Ce dernier caractère représente en quelque sorte, mais à l'état de rudiment, cette plaque prosternale qui vient recouvrir la base des antennes dans les genres *Pachygoris*, *Psacasta*, *Trigonosoma* et *Eurygaster*. Notre nouvelle coupe fait donc le passage de ces quatre genres à ceux qui n'ont aucune trace de cette plaque prosternale (*G. Ancyrosoma*, *Euphrosoma*, *Podops*, etc.).

#### ***Sternodentus obtusus.***

*Scutiformis, postice rotundatus, convexus, crebre brunneo-rugoso-punctatus, fusco-grisco-testaceus; capitis unâ, prothoracis scutellique quinque lineis pallidis subclevalis; prothoracis angulis posticis obtuse rotundato-dilatatis, lineis pallidis intermediis intus arcuatis; ventre maculâ semicirculari incisurisque lateralibus nigris*

Long. 0,006 - 0,008 (2 2/3 à 3 l.). Larg. 0,004 - 0,005 (2 à 2 1/2 l.).

*Corps* en écusson , postérieurement arrondi , convexe , couvert de points enfoncés , rugueux , brunâtres.

*Tête* allongée , rugueusement ponctuée , testacée ; antérieurement entaillée à la réunion des deux lobes latéraux : ceux-ci rebordés sur les côtés , le lobe médian relevé en carène pâle , et n'occupant au plus que les trois quarts de la longueur totale. *Yeux* petits , saillants , d'un ferrugineux obscur. *Ocell*s petits , ferrugineux. *Rostre* roux , avec l'extrémité rembrunie.

*Antennes* assez grêles , atteignant à peine la moitié du corps ; testacées , avec le dernier article ordinairement ferrugineux : les premier à troisième presque glabres , les quatrième et cinquième légèrement pubescents.

*Prothorax* court , transversal , deux fois et demie plus large que long ; crénelé et assez fortement sinueux sur les côtés ; carrément échancré au bord antérieur , bissinueux à la base ; à angles postérieurs débordant sensiblement les hémélytres et dilatés en oreillette arrondie ; subdéprimé en avant où il présente quatre cicatrices transversalement disposées et réunies deux à deux ; convexe en arrière ; couvert de points rugueux obscurs , dont les intervalles , sur la partie antérieure du disque , se changent quelquefois en tubercules lisses ; paré en outre de cinq lignes élevées pâles , lisses ou légèrement ridées , ordinairement bordées de noir : la médiane droite , plus saillante et plus épaisse en avant , faisant suite à celle de la tête : les deux intermédiaires faibles , souvent réduites à des rangées de tubercules , et sensiblement arquées en dedans : les deux externes assez saillantes , divergeant en dehors dans la direction des angles.

*Écusson* en carré long , postérieurement largement arrondi ; longitudinalement convexe , couvert de points enfoncés rugueux et brunâtres ; d'un testacé plus ou moins obscur , avec cinq lignes

longitudinales pâles, ordinairement bordées de noir, lisses ou légèrement ridées : la médiane plus saillante, un peu plus épaisse en arrière, droite et faisant suite à celle de la tête et du prothorax ; les deux intermédiaires plus faibles, très-légèrement flexueuses et faisant suite à celles du prothorax ; les deux externes assez marquées, sensiblement flexueuses, faisant suite aux deux externes du prothorax.

*Partie visible des hémélytres*, faiblement sinueuse sur les côtés à la base ; testacée, marquée de points enfoncés obscurs, et chargée sur son milieu d'une carène oblique : celle-ci limitée en dedans, sur toute sa longueur apparente, par un trait brunâtre, et en dehors par un trait de la même couleur, mais seulement visible en arrière.

*Abdomen* légèrement dilaté sur les côtés, où il déborde visiblement les hémélytres et l'écusson ; marqué d'une tache noire à chaque intersection des segments.

*Ventre* convexe, rugueusement ponctué ; testacé avec une grande tache discoïdale, sémicirculaire, noire, plus ou moins effacée chez les ♂, plus marquée chez les ♀ ; paré en outre sur les côtés d'une petite tache noire à chaque intersection des segments. Les *stigmata* ocellés, rembrunis. *Poitrine* variolée de taches et de points enfoncés, obscurs.

*Pieds* assez courts, rugueux, d'un testacé obscur, densément ponctué de brun. *Cuisses* avec quelques taches noirâtres. *Tibias* spinosules. Premier article des *tarses* sensiblement dilaté.

**PATRIE** : Environs de Marseille. Assez rare.

**OBS.** La couleur varie dans cette espèce. Quelquefois, chez la ♀ surtout, la tête, le prothorax et l'écusson sont presque entièrement d'un brun ferrugineux, moins les lignes longitudinales pâles qui n'en ressortent que davantage.

Elle ressemble, au premier coup d'œil, à l'*Ancyrosoma albolineata*, FAB. Outre les caractères génériques, elle en diffère par ses angles prothoraciques moins saillants et arrondis, par les li-

gnes pâles internes du prothorax qui se recourbent intérieurement en avant , au lieu de se déjeter en dehors , et par son abdomen un peu plus dilaté sur les côtés et à intersections maculées de noir. Les lignes intermédiaires pâles de l'écusson sont aussi moins droites , et celui-ci est beaucoup plus largement arrondi postérieurement , ce qui donne à tout le corps une forme plus obtuse en arrière. Les pieds sont aussi plus obscurs , proportionnellement plus courts et moins grêles.

### GENRE *DERULA*.

( δερη , cou , ουλη , cicatrice ).

#### CARACTÈRES DU GENRE.

*Corpus* breve , postice rotundatum.

*Caput* oblongum. — *Rostrum* mediocre.

*Oculi* minuti , prominuli , subgiobosi. — *Ocelli* postici , distantes.

*Antennæ* subgraciles , articulis secundo , tertio et quarto subæqualibus.

*Prothorax* transversus , brevis , biplagiatus.

*Scutellum* magnum , postice rotundatum.

*Prosternum* antice simplex , nec dentatum , nec laminatum.

*Pedes* breves , sat validi , spinosuli.

*Corps* court , assez épais.

*Tête* en hémicycle allongé ; les lobes latéraux réunis en avant du lobe médian. *Yeux* petits , saillants , subglobuleux. *Ocelles* distants , placés à la base du vertex , en arrière de la ligne des yeux. *Rostre* assez grêle , atteignant la moitié du corps , de quatre articles apparents , se logeant dans une rainure qui parcourt le dessous de la tête et toute la poitrine.

*Antennes* assez grêles , de cinq articles : le premier le plus court : les deuxième , troisième et quatrième subégaux : le cinquième le plus long.

*Prothorax* court, transversal, avec ses côtés presque rectilignes, et ses angles postérieurs fortement arrondis, débordant à peine les hémélytres; marqué sur le dos de deux cicatrices transversales.

*Écusson* oblong, aussi long mais plus étroit que l'abdomen, arrondi à son extrémité.

*Hémélytres* presque entièrement recouvertes par l'écusson, seulement visibles sur les côtés à la base.

*Prosternum* simple, sans dent ni dilatation lamelliforme.

*Pieds* assez courts et assez robustes. *Tibias* spinosules en dessous. *Tarses* de trois articles, le deuxième beaucoup plus petit. *Ongles* garnis chacun en dessous d'un appendice membraneux.

Obs. Dans ce genre les deuxième, troisième et quatrième articles des antennes sont presque de la même longueur, tandis que le troisième est toujours sensiblement plus court que le quatrième, et toujours au moins une fois plus court que le deuxième dans tous les *Scutellérides* à grand écusson (*Orbiscuti*, АМҮОТ). Ce caractère le rapproche des *Pentatomites* (*Coniscuti*, АМҮОТ), et surtout des espèces de *Pentatoma* dont Hahn a composé son genre *Eysarcoris*.

### ***Derula flavoguttata.***

*Breviter ovalis, convexa, rugoso-punctata, fusco-testacea; capite vittis duabus longitudinalibus obscurioribus medio lineâ pallidâ elevatâ; thorace disco transversâ biplagiato tuberculisque duobus albidis munita; scutello basi albido biguttata vittisque tribus pallidis ornata; abdominis incisuris nigris; ventre vittis duabus fuscis; femoribus antè apicem maculatim nigro-annulatis, tarsis apice piccis.*

Long. 0,005 — 0,006 (2  $\frac{1}{4}$  à 2  $\frac{2}{3}$  l.). Larg. 0,004 — 0,005 (2 à 2  $\frac{1}{2}$  l.).

Corps court, convexe, postérieurement arrondi, rugueusement ponctué.



*Tête* en demi-cercle allongé, fortement ponctuée. testacée; légèrement entaillée au sommet; parée de deux bandes obscures, larges, qui se réunissent en avant; les lobes latéraux rebordés, enclosant le lobe médian qui est d'un quart plus court, pâle et relevé en carène. *Yeux* globuleux, assez saillants, noirâtres. *Ocelles* peu saillants, ferrugineux. *Rostre* ferrugineux, avec l'extrémité obscure.

*Antennes* assez grêles, atteignant à peine la moitié du corps, d'un testacé ferrugineux: le troisième article à peine plus court que le précédent: les deuxième et quatrième subégaux: les premier, deuxième et troisième presque glabres: les quatrième et cinquième légèrement pubescents: celui-ci d'une moitié plus long que le précédent.

*Prothorax* court, transversal, deux fois plus large que long; bissinueusement échaneré au sommet, bissinueux à la base; à côtés rectilignes, à angles antérieurs recourbés en une petite dent; à angles postérieurs fortement arrondis et un peu plus saillants que la base des hémélytres; transversalement convexe; rugueusement ponctué, chargé sur son disque de deux petits tubercules pâles, lisses, au-devant de chacun desquels se trouve une large cicatrice transversale, obscure; testacé, avec les bords latéraux, toute la partie antérieure médiane située entre les deux cicatrices, beaucoup plus pâles, et une teinte rembrunie vers les angles postérieurs.

*Ecusson* en carré long, postérieurement arrondi; longitudinalement convexe, rugueusement ponctué; testacé, avec deux taches basilaires d'un blanc vif, tuberculiformes, lisses, limitées de chaque côté par un trait noir, et donnant naissance chacune à une bande étroite, un peu plus pâle que la couleur foncière, extérieurement accompagnée d'une teinte un peu plus obscure, et souvent obsolète et peu apparente; paré en outre sur son milieu d'une autre ligne longitudinale pâle, quelquefois assez visible à la base, puis s'oblitérant pour reparaitre après le mi-

lien, mais plus étroite et encluse d'une teinte obscure qui se prolonge jusqu'au bout. Le milieu de la base est souvent étroitement pâle.

*Partie visible des hémélytres* ponctuée, testacée, chargée d'une carène oblique.

*Abdomen* légèrement dilaté en arrière sur les côtés, où il déborde visiblement les hémélytres et l'écusson; paré d'une tache noire à chaque intersection des segments.

*Dessous du corps* convexe, fortement ponctué; testacé, avec deux bandes obscures, plus effacées dans le ♂, plus apparentes dans la ♀, partant de l'angle prothoracique postérieur pour aller obliquement se réunir avant le sixième arceau ventral. Bords latéraux tachés de noirs. *Stigmates* obscurs, premier arceau noir au milieu de sa base. *Poitrine* avec quelques taches obscures auprès des hanches.

*Pieds* assez courts, rugueux, spinosules, testacés. *Cuisses* avec un anneau de taches noires avant leur sommet. *Tarses* d'un brun de poix à l'extrémité.

**PATRIE :** St-Loup près Marseille. Juin. Rare.

**Obs.** Cette espèce simule assez bien le *Pentatoma perlatum*. WOLF (*Eysarcoris perlatus*, HAHN) par sa taille, par son faciès, par la sculpture de son prothorax, et par la disposition des taches de l'écusson. Mais le développement de ce dernier qui est largement arrondi au sommet et cache presque entièrement les hémélytres, le range forcément dans la première division des *Scutellérides*, c'est-à-dire parmi les *Orbicusti* d'Amyot.

### **Sciocoris auritus.**

*Brevis, subdepressus, griseo-testaceus, densius nigro-punctatus; prothoracis hemelytrorumque lateribus anticis pallidioribus; prothorace transversim sulcato; abdominis lateribus fusco-maculatis; scutello basi utrinque puncto pallido notato; membranâ pellucidâ, obscuro-maculatâ.*

Long. 0,005-0,006 (2 à 2 1/2 lig.); larg. 0,0035 0,004 (1 1/4 à 1 1/2 l.).

*Corps* court, en carré un peu plus long que large, un peu rétréci en avant, largement arrondi en arrière; subdéprimé, d'un gris testacé, couvert de points enfoncés noirs, assez serrés.

*Tête* à peine plus longue que large, entaillée au devant des yeux, faiblement sinueuse sur les côtés; plane au milieu, légèrement relevée sur les bords, arrondie au sommet, où elle présente une petite fissure au point de réunion des lobes latéraux; le lobe médian enclos par ceux-ci et n'occupant que les trois quarts de la longueur totale; d'un gris testacé plus ou moins obscur, suivant que les points enfoncés sont plus ou moins brunâtres, avec un petit trait plus pâle, souvent imponctué, situé en dehors des *ocelles*. Ceux-ci arrondis, saillants, obscurs. *Yeux* bruns, globuleux, très-saillants. *Rostre* d'un testacé plus ou moins rembruni, avec la base ordinairement plus pâle et l'extrémité toujours plus foncée.

*Antennes* assez courtes, pas plus longues que la tête et le prothorax réunis; brièvement pubescentes; d'un testacé ferrugineux, avec les quatrième et cinquième articles un peu plus obscurs; à deuxième article sensiblement plus grand que le troisième, celui-ci plus court que le quatrième.

*Prothorax* faiblement convexe; court, transversal, deux fois et demie plus large que long; légèrement arrondi sur les côtés, subbissinueusement échancré au milieu de son bord antérieur. presque droit au milieu de sa base: celle-ci obliquement coupée sur les côtés, depuis l'écusson jusqu'aux angles postérieurs: ceux-ci arrondis, les antérieurs obtus; d'un gris testacé plus ou moins obscur, couvert de points enfoncés brunâtres, avec les côtés pâles, depuis l'angle antérieur jusqu'après le milieu; creusé sur le disque d'un sillon transversal plus ou moins marqué, non prolongé jusqu'aux bords latéraux, et devant lequel on remarque deux faibles cicatrices transversales, plus ou moins pâles et plus ou moins imponctuées; chargé en outre, vers les angles postérieurs, d'une espèce de gibbosité ou tubercule obtus

On aperçoit quelquefois chez certaines variétés de petites verrues pâles le long du sillon transversal, et, en arrière de celui-ci une ligne longitudinale très-fine, plus pâle que la couleur générale et souvent à peine visible.

*Ecusson* atteignant à peine les deux tiers de l'abdomen, en triangle allongé et arrondi au sommet, légèrement sinueux sur les côtés; paré de chaque côté de la base d'un petit tubercule lisse, pâle, extérieurement limité de noir; un peu convexe à la base, subdéprimé à sa dernière moitié, où il offre la trace affaiblie d'une carène longitudinale; d'un gris testacé plus ou moins obscur, couvert de points enfoncés brunâtres, avec l'extrémité ordinairement plus claire.

*Hémélytres* de la longueur du prothorax à leur base, rétrécies en arrière, où elles laissent à découvert une partie du dos de l'abdomen. *Corie* d'un gris plus ou moins obscur, couverte de points enfoncés brunâtres, et chargée d'une nervure longitudinale assez saillante, un peu plus pâle, oblique, et n'atteignant pas le bord postérieur. *Membrane* débordant souvent l'extrémité de l'abdomen, surtout chez les ♂; pâle, diaphane, ridée, et chargée de six ou sept nervures, plus ou moins arquées, dont les intervalles sont parés de taches brunes. *Tranche de l'abdomen* ornée, à chaque intersection des segments, de taches obscures, formées de points enfoncés noirâtres.

*Dessous du corps* faiblement convexe, d'un testacé ferrugineux; couvert de points enfoncés obscurs, et souvent de taches plus ou moins rembrunies sur les côtés de la poitrine et au ventre; celui-ci distinctement maculé de brun à sa tranche latérale.

*Pieds* spinosules, d'un testacé livide, ponctués de brun, avec le sommet des tarses et des tibias plus obscurs, et une ou deux taches brunâtres avant le sommet des cuisses.

**PATRIE :** Avignon, Marseille, Nîmes. Assez commun, sous les pierres, parmi les mousses qui couvrent les rochers, dans les lieux arides et escarpés.

Obs. Cette espèce diffère de tous ses congénères par sa membrane transparente, maculée de points bruns, et chargée de six ou sept nervures, tandis que les autres espèces en offrent cinq au plus, même chez les individus les plus complets. Elle est d'une taille plus courte que l'*umbrinus*, dont elle se distingue encore par les côtés du prothorax distinctement bordés de pâle en avant. De plus chez les ♂, l'échancrure du quatrième arceau ventral est aiguë, au lieu d'être arrondie.

### **Capsus Versini.**

*Elongatus, subdepressus, glaber, parùm nitidus; capite, prothoracis parte anticâ scutelloque luteis; hemelytris virescentibus, puncto interno nigro apice notatis; antennis apice fuscis, basi pallido-viridibus et nigro annulatis; pectore, ventre pedibusque pallido-luteis, his nigro punctatis; membranâ pellucidâ, cum maculâ magnâ, subquadratâ, apicali; cellulâ basali simplici, oblongâ, cornetâ, luteo-virescenti.*

Long. 0,0031 (1 2/5 l.), — Larg. 0,0010 (1/2 l.).

**Corps** allongé, subdéprimé, glabre.

**Tête** triangulaire, assez convexe; pubescente au sommet; d'un jaunâtre mat, avec deux séries de linéoles transversales, obscures, situées en avant de chaque côté du chaperon; marquée de chaque côté, en arrière, d'une impression joignant le bord interne des *yeux*. Ceux-ci grands, très-saillants, globuleux, plus ou moins obscurs. *Bec* grêle, atteignant le tiers de la longueur du corps; testacé, obscur au sommet.

**Antennes** finement pubescentes, grêles, presque aussi longues que le corps: à premier article subcylindrique, cinq fois plus court que le suivant, d'un vert très-pâle, avec la base et un anneau obscur après son milieu: le second très-grêle, linéaire, plus long que le suivant, obscur au sommet, avec la base d'un vert très-pâle, annelée de noir: les deux derniers obscurs, le dernier plus court que le précédent.

**Prothorax** transversal, une fois plus court que long, faible-



ment convexe; en cône largement tronqué au sommet, et légèrement arrondi aux angles postérieurs; d'un vert tendre, avec la partie antérieure jaunâtre; obsolètement chagriné en arrière, et marqué en avant de deux cicatrices transversales.

*Ecusson* assez grand, triangulaire, légèrement convexe; obsolètement ridé en travers; d'un jaune d'ocre.

*Hémélytres* subdéprimées, subparallèles, cinq fois plus longues que le prothorax, très-finement chagrinées; d'un vert tendre, avec la base un peu plus claire; parsemées de petits points, souvent peu visibles, d'un vert un peu plus foncé; offrant chacune à leur extrémité un point noir, situé vers le milieu du bord apical de la corie. *Membranes* diaphanes, ornées chacune d'une grande tache noire plus ou moins carrée, obliquement disposée, s'étendant depuis le bord apical jusqu'à la *cellule basilaire*. Celle-ci oblongue, de la même consistance que les hémélytres; d'un vert un peu jaunâtre; rectangulaire à sa partie postéro-interne.

*Dessous du corps* pâle.

*Pieds* d'un testacé pâle, marqués de points noirs. *Tarses* légèrement verdâtres, avec le sommet des angles obscur.

**PATRIE :** Cette espèce a été trouvée dans le département de l'Ardèche, par M. Forel. Nous l'avons dédiée à M. Yersin, naturaliste du canton de Vaud, connu par divers travaux pleins d'intérêt sur les Orthoptères.

**Oss.** Cette espèce ressemble au *Capsus Parlulli*, FALL. dont elle diffère par son corps glabre, plus allongé, par la couleur des antennes et des pieds, et par sa cellule basilaire unique.

### **Capsus Foreli.**

*Oblongus, subdepressus, glaber, nitidissimus, niger; antennarum articulis ultimis duobus ferrugineis; scutelli apice summo, hemelytrorum ventrisque basi, pectoraque medio luteo-albidis; pedibus membranâ fuscâ, cum cellulâ basali simplici.*

Long. 0, 0033<sup>m</sup> (1 1/2 l.). — Larg. 0,0017<sup>m</sup> (3/4 l.).

*Corps* allongé, subdéprimé, glabre, lisse ou très-obsolètement chagriné.

*Tête* triangulaire, convexe, noire, lisse, très-luisante; marquée sur le milieu du vertex d'un petit sillon longitudinal court, obsolète, visible seulement à un certain jour, et d'une très-faible impression, de chaque côté, vers l'angle postéro-interne des *yeux*. Ceux-ci grands, saillants, globuleux, brunâtres. *Bec* grêle, dépassant le tiers de la longueur du corps; testacé, avec la base ferrugineuse et le sommet noir.

*Antennes* plus longues que la moitié du corps, grêles, pubescentes : le premier article épais, subcylindrique, d'un noir luisant, presque glabre, offrant à sa tranche supérieure, avant le sommet, un poil raide, noir, assez long : le deuxième linéaire, noir, cinq fois plus long que le précédent, et une fois plus que le suivant : les deux derniers ferrugineux, le dernier plus court que le précédent.

*Prothorax* transversal, une fois plus court que large; en cône largement tronqué au sommet, et arrondi aux angles postérieurs; transversalement convexe en arrière, et subdéprimé en avant, où il offre deux faibles impressions transversales; d'un noir luisant; lisse à sa partie antérieure, et obsolètement chagriné à sa partie postérieure.

*Ecusson* grand; triangulaire; légèrement convexe; transversalement ridé; d'un noir peu brillant, avec la pointe apicale blanchâtre.

*Hémélytres* subdéprimées; trois fois plus longues que le prothorax; subparallèles ou faiblement rétrécies en arrière après leur milieu; obsolètement chagrinées; d'un noir luisant, ainsi que l'appendice, avec une grande tache d'un blanc jaunâtre mat, occupant toute la base moins le bord latéral et la pointe apicale de la clé. La partie qui avoisine les angles antérieurs de l'écusson,

reste légèrement enfumée. *Membrane* obscure, à deux nervures, et n'offrant qu'une seule cellule basilaire.

*Dessous du corps* convexe, d'un noir luisant, avec les hanches et toute la région médiane de la poitrine et de la base du ventre d'un blanc jaunâtre.

*Pieds* noirs ou d'un noir brun, avec la base des cuisses d'un blanc fauve, au moins jusqu'à la moitié de la longueur sur les cuisses antérieures, au moins jusqu'au tiers sur les postérieures.

Cette belle espèce a été trouvée dans le département de l'Ardèche, par M. Forel, zélé naturaliste du canton de Vaud, à qui nous l'avons dédiée. Elle a également été prise dans le midi de la France par M. Foudras.

## EXPLICATION DES FIGURES

DE LA PLANCHE QUI SE RATTACHE A CE TRAVAIL.

Figure 1 — Prosternum du *G. Sternodontus*.

— 2 — Prosternum du *G. Ancyrosoma*.

— 3 — Prosternum du *G. Pachycoris*.

— 4 — Antenne du *G. Derula*.

— 5 — Antenne du *G. Graphosoma*.

— 6 — *Capsus Yersini*.

— 7 — *Capsus Foreli*.

DESCRIPTION  
DE LA  
LARVE DE L'ELENOPHORUS COLLARIS,

COLÉOPTÈRE DE LA TRIBU DES LATIGÈNES,

PAR  
E. Mulsant et V. Mulsant.

(Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 12 mai 1856.)

---

*Larve* hexapode ; allongée ; semi-cylindrique ; d'un flave pâle. *Tête* paraissant composée de deux parties : l'antérieure plus étroite et plus courte , presque en demi-cercle une fois plus large que long , offrant en dessus le labre et l'épistome : la seconde , séparée de la première par un sillon transversal d'un rouge testacé , en parallélogramme une fois plus large que long , offrant un petit tubercule vers chacune des extrémités de son bord antérieur , et munie sur les côtés de poils blonds assez épais. *Epistome* et *labre* transverses ; séparés l'un de l'autre par un sillon d'un rouge testacé. Le premier, hérissé de soies raides , d'un blond testacé : le second , chargé sur les côtés d'un petit tubercule garni de soies semblables. *Mandibules* très-robustes ; cornées ; très-arquées ; terminées en pointe obtuse ; munies à la base d'une sorte de dent molaire , et d'une autre dent moins prononcée et un peu obtuse , entre celle-ci et l'extrémité ; d'un rouge testacé , avec l'extrémité et le côté interne , noirs. *Mâchoires* à un seul lobe , muni à son côté interne de poils spiniformes. *Palpes maxillaires* de trois articles : les premier et deuxième subcylindriques : le deuxième , le plus long : le dernier , conique , assez court. *Menton* en carré plus large que long ; avec la pièce prébasilaire

chargée à sa partie antérieure d'une saillie ou arête transverse , trois fois plus large. *Palpes labiaux* courts. *Antennes* plus longuement prolongées que la partie antérieure de la tête, quand les mandibules sont à l'état de repos ; de quatre articles : le basilaire, très-court : les deuxième et troisième, cylindriques, égaux : le dernier court. *Corps* revêtu d'une peau parcheminée ; d'un flave pâle ou d'un flave testacé livide , avec le bord postérieur des anneaux moins pâle par l'effet du repli de la peau ; de douze anneaux ; à peu près glabre, lisse et luisant sur les onze premiers : le prothoracique plus grand que le suivant d'un tiers ou de deux cinquièmes, et d'un tiers que le troisième : les quatrième à onzième presque égaux : le dernier rétréci en ligne courbe, obtriangulaire à côtés curvilignes , plus large à la base qu'il est long sur son milieu , hérissé de quelques poils postérieurement et à son extrémité : à bords repliés en dessous, moins largement sur les côtés qu'à sa partie postérieure, où le bord de ce repli constitue un arc dirigé en arrière , après lequel se montre la région anale ; pourvu au-devant de celle-ci de deux sortes de tubercules hérissés de poils raides dirigés en dehors et servant à la progression. *Dessous du corps* à peu près de la couleur du dessus. *Pieds* courts ; disposés par paires sous chacun des trois premiers anneaux : les antérieurs beaucoup plus robustes que les autres, extérieurement garnis de poils flexibles , et à leur côté interne de poils spinosules plus courts ; terminés chacun par un ongle long et robuste. *Stigmates* au nombre de neuf paires ; disposés comme chez la plupart des autres larves.

Elle se tient cachée dans la terre à la manière de celle des Blaps, ou n'en fait sortir que la partie antérieure de son corps sous les débris de substances animales ou sous les matières immondes qui lui servent de nourriture. Elle se pratique dans le sol une retraite pour y passer l'état de nymphe.



# ADDITIONS ET RECTIFICATIONS

AU

## CATALOGUE DES COCCINELLIDES,

PUBLIÉ EN 1853,

par

**E. Mulsant.**

(Présentées à la Société Linnéenne de Lyon, le 12 mai 1856).

### HIPPODAMIAIRES.

5<sup>u</sup>. *Hippodamia leporina*. En ovale allongé; peu convexe. Prothorax noir, paré, de chaque côté, d'une bordure blanche, presque interrompue dans son milieu. Elytres d'un jaune fauve, ornées d'une bande subbasilaire étendue d'un calus à l'autre, et chacune de deux taches, noires : l'antérieure presque en triangle transversal : la postérieure, moins grosse, obtriangulaire, liée à la précédente.

Long. 0,0056 (2 1/2 l.) Larg. 0,0042 (1 7/8 l.)

Corps oblong ou en ovale allongé; peu convexe; pointillé; luisant, en dessus. Tête noire, parée sur le milieu du front, d'une tache blanche, en losange. Prothorax noir, orné de chaque côté d'une bordure blanche, très-rétrécie ou presque interrompue dans son milieu. Ecusson noir. Elytres d'un jaune fauve ou d'un jaune roux, ornées d'une bande subbasilaire raccourcie à ses extrémités, et chacune de deux taches, noires : la bande, étendue transversalement d'un calus à l'autre, avancée dans son milieu jusqu'à l'écusson, échancrée en arc sur chaque élytre, entre l'écusson et le calus, enclosant un espace plus jaune que le reste de l'élytre, en arc bisiné à son bord postérieur, couvrant sur la suture près des deux septièmes de la longueur : la tache antérieure, presque en forme de triangle arrondi plus large que

long et arrondi à ses angles postérieurs, couvrant des deux cinquièmes aux cinq septièmes de la longueur, et du sixième juxta-sutural à peu près au bord externe : la deuxième, moins grosse, obtriangulaire, au moins aussi rapprochée de la suture, un peu moins voisine du bord externe et surtout du bord apical, commençant aux deux tiers de la longueur, ordinairement liée à la précédente vers les trois cinquièmes externes de son bord antérieur. *Dessous du corps et pieds noirs, Epimères des médi et postpectus, blanches.*

PATRIE : la Californie (collect. Buquet).

La *Naemia litigiosa* avait été décrite quelque temps auparavant (1847) sous le nom de *Coccinella seriata*, par M. Melsheimer, dans les procès-verbaux de l'Académie de Philadelphie, t. 3, (1848) p. 177, il convient de lui rendre ce nom spécifique. Voyez MELSHEIM. Catal. (1853) p. 129 (1).

## COCCINELLAIRES.

2. *Anisosticta Bohemiana*. Corps ovale oblong ; médiocrement convexe ; flave en dessus, avec le bord externe d'un flave rosé ; paré sur le prothorax, de chaque côté de la ligne médiane, de deux grosses taches noires trilobées ; orné sur chaque élytre d'une bordure suturale prolongée à peine au-delà de la moitié, anguleusement dilatée dans son milieu, et bilobée postérieurement, et chacune d'une bande longitudinale et de deux taches ponctiformes, noires : la bande naissant sur le calus, inégalement plus large jusqu'à un peu plus de la moitié, liée à une sorte de point : les taches ponctiformes, également juxta-suturales, situées l'une, aux trois quarts : l'autre, près de l'extrémité. *Dessous du corps noir. Pieds flaves.*

Long. 0,0033 (1 1/2 l.). Larg. 0,0020 (9/10 l.).

---

(1) Catalogue of the Described Coleoptera of the United States, by Frederick Ernest Melsheimer, revised by S. S. Haldeman and J. L. Le Conte. *Washington* Smithsonian Institution, July, 1853, in-8.

*Corps* ovale ou ovale oblong ; médiocrement convexe. *Tête* plus large que longue ; penchée ; ponctuée ; flave ou d'un flave rosé, parée sur sa partie postérieure, à partir du milieu du front, d'un bandeau noir, profondément entaillé dans son milieu. *Palpes maxillaires* et *antennes* d'un flave rosé, légèrement obscurs à l'extrémité. *Prothorax* bissinueusement échancré en devant ; à angles antérieurs avancés en forme de dent : les postérieurs plus faiblement dirigés en arrière ; arqué sur les côtés, à peine plus étroit aux angles de devant qu'à ceux de derrière ; bissinué à sa base, avec la partie médiane plus prolongée en arrière que les angles ; deux fois au moins aussi large à la base qu'il est long sur son milieu ; relevé en rebord sur les côtés, sans rebord apparent à la base ; médiocrement convexe en dessus ; plus finement ponctué que les élytres ; flave, avec les rebords d'un flave rosé ; paré de chaque côté de deux grosses taches noires, trilobées, paraissant formées de la réunion de trois points noirs obtriangulairement disposés. *Ecusson* petit ; noir ; en triangle à côtés curvilignes, plus large que long. *Elytres* d'un quart ou d'un tiers plus larges que le prothorax ; près de quatre fois aussi longues que lui ; arrondies aux épaules ; à peine élargies en ligne droite jusqu'à la moitié, en ogive obtuse postérieurement ; assez largement relevées en rebord ou en gouttière sur les côtés ; médiocrement convexes ; ponctuées ; d'un jaune pâle, avec le rebord d'un flave rosé, ornées d'une bordure suturale, à peine prolongée au-delà de la moitié, et chacune d'une bande longitudinale et de deux taches ponctiformes, noires : la bordure suturale, naissant de la base, couvrant environ le cinquième de la largeur de celle-ci, sur chaque élytre, parallèle jusqu'un peu au-delà du cinquième de la longueur de la suture, anguleusement dilatée dans son milieu, bilobée à son extrémité ou comme terminée par deux points unis transversalement : la bande commençant sur le calus par une sorte de point, prolongée jusqu'à un peu plus de la moitié de leur longueur sur une largeur d'environ les

deux cinquièmes de leur largeur, mais inégalement large, sinuée vers le tiers de leur côté interne, bissinuée au côté externe, puis liée après la moitié à une tache ponctiforme, ovale : les deux taches ponctiformes rapprochées de la suture : la postérieure, voisine de l'extrémité, presque en forme de virgule transverse, rétrécie de dedans en dehors, presque liée par son côté externe à la tache ponctiforme qui termine la bande longitudinale : la tache ponctiforme antérieure, située entre la postérieure et la bordure suturale. *Repli flave. Dessous du corps noir. Pieds flave ou d'un flave rosé.*

PATRIE : la Hongrie.

J'ai reçu cette belle espèce de mon ami M. Dohrn, l'un des entomologistes vivants à qui la science a le plus d'obligations, pour l'activité qu'il sait imprimer à la Société qu'il préside avec tant de zèle et de distinction.

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec l'*A. 19-punctata*, dont elle reproduit à peu près le même dessin, en sorte qu'on serait de prime à bord tenté de la considérer comme une variété de celle-ci, offrant les deux premières taches juxta-suturales de chaque élytre, unies entre elles et à la scutellaire pour constituer une bordure suturale, et dont les quatre premières taches juxta-marginales se sont également unies pour former la bande longitudinale ; mais la partie anguleuse de la bordure suturale, qui représenterait la première tache juxta-suturale, est située vers le quart de la longueur des étuis, chez l'espèce ci-dessus décrite, et vers le cinquième seulement chez la *19-punctata* : cette même tache s'étend à peine jusqu'au tiers de la largeur, chez la première, et presque jusqu'à la moitié, chez la seconde. Les autres taches juxta-suturales ont également des positions différentes : la deuxième ou celle qui termine la bordure suturale de la *Dohrniana* dépasse la moitié de la longueur ; la troisième est située aux trois quarts de la longueur ; la quatrième, aussi rapprochée de la suture que la précédente, près de l'ex-

trémité : chez la *19-punctata* au contraire , la deuxième n'arrive pas à son bord postérieur jusqu'à la moitié de la longueur des étuis : la troisième est située aux deux tiers à peine, et la quatrième, moins rapprochée de la suture que la troisième, est séparée de l'extrémité par un espace plus grand que son diamètre. Enfin les épimères et les côtés du ventre sont noirs, chez l'exemplaire de la *Dolniana* que j'ai eu sous les yeux.

**1<sup>d</sup>. *Adonia interrogans*.** *Ovale-oblongue. Prothorax noir, paré en devant et de chaque côté d'une bordure d'un blanc flavescent, et noté sur son disque, de deux lignes de même couleur, obliques, raccourcies, presque convergentes postérieurement. Elytres d'un jaune testacé, ornées d'une bordure suturale prolongée à peine jusqu'aux trois quarts, et chacune d'une bande longitudinale naissant du calus, formant postérieurement un arc à son côté externe et un angle rentrant à son côté interne, noires.*

Long. 0,0056 (2 1/2 l.). Larg. 0,0055 (1 1/2 l.).

*Corps* ovale-oblong; peu convexe. *Tête* noire, parée sur le milieu du front d'une tache ovale, d'un blanc flavescent, croisée par une ligne de même couleur, prolongée transversalement jusqu'aux yeux : épistome flave : mandibules noires. *Antennes* et *palpes maxillaires* d'un flave testacé ou livide, avec l'extrémité obscure. *Prothorax* noir; paré en devant et de chaque côté d'une bordure d'un blanc flavescent, orné sur son disque de deux lignes de même couleur, longitudinalement obliques, postérieurement presque convergentes, n'atteignant ni la bordure antérieure ni la base : la partie noire rétrécissant le milieu de chaque bordure latérale, comme si un point noir était lié à elle. *Elytres* d'un jaune pâle ou testacé; ornées d'une bordure suturale noire, à peine plus large en devant que la base de l'écusson, faiblement et graduellement élargie ensuite jusqu'au quart de la longueur, puis prolongée en se rétrécissant progressivement jusqu'aux deux tiers ou trois quarts; parées chacune d'une bande également noire, naissant du calus, égale au tiers de la



largeur de l'étui, longitudinalement prolongée jusqu'aux deux tiers, en formant une dilatation anguleuse vers la moitié de la longueur : cette bande liée par son bord externe, à partir de la moitié de la longueur de chaque élytre, à un arc obliquement dirigé vers les cinq sixièmes de la suture qu'il n'atteint pas : cet arc formant à son côté interne, avec l'extrémité de la bande longitudinale, un angle rentrant dirigé en dehors : cette bande et cet arc constituant sur l'élytre gauche une sorte de signe interrogatif, en regardant l'insecte d'avant en arrière. *Dessous du corps et pieds noirs* : épimères blanches. *Plaques abdominales en arc à peine prolongé jusqu'à la moitié de l'arceau.*

**PATRIE** : la Chine (collect. Buquet).

2<sup>e</sup>. **Harmonia dionca**. Ovale. *Prothorax et élytres d'un flave testacé* : le premier, paré d'une tache noire, couvrant les trois cinquièmes médiaires de la base, semi-circulaire en devant, avancée près du bord antérieur, liée à un point noir dans le milieu de chacun de ses côtés : les secondes, parées d'une bordure suturale graduellement réduite au rebord, d'un point sur le calus, et ordinairement d'une très-petite tache située, dans la même direction longitudinale, vers le milieu de la longueur, noirs.

Long. 0,0045 (2 l.). Larg. 0,0033 (1 1/2 l.).

*Corps ovale* ; très-médiocrement convexe. *Tête flave* ; marquée sur le milieu du front d'une tache obtriangulaire noire. *Prothorax* d'un flave testacé ; marqué d'une tache noire, semi-orbiculaire, couvrant les trois cinquièmes médiaires de la base, avancée jusqu'au sixième antérieur, liée à un point noir, vers le milieu de chacun de ses côtés. *Elytres* d'un flave testacé, ornées d'une bordure suturale, d'un point et d'une très-petite tache, noirs : la bordure suturale, à peine aussi large que la base de l'écusson, graduellement rétrécie à partir du cinquième de la largeur, réduite à peu près au rebord sutural à partir de la moitié ou un peu plus : le point, assez gros, couvrant le calus : la petite tache, ponctiforme ou presque linéaire, située vers la

moitié de la longueur, à égale distance du bord externe que le point du calus. *Dessous du corps* noir, avec les côtés de l'abdomen d'un jaune testacé. *Mésosternum* échancré jusqu'au tiers. *Plaques abdominales* presque en forme de V. *Epimères* d'un jaune testacé. *Pieds* de la même couleur.

PATRIE : la Chine (collect. Buquet).

Dans le même genre doivent être opérées les rectifications suivantes :

**II. venusta** ; MELSHEIMER, au lieu de **II. notulata**.

*Coccinella venusta*, MELS. Descript. in Proceed. of the Acad. of nat. scient. of Philadelph. t. 3 (1848), p. 178. — MELS. Catal. (1853) p. 129.

**III. picta** ; RANDALL, au lieu de **III. contexta**.

*Coccinella picta*, RANDALL, Descript., etc. in BOSTON, Journ. of the nat. Hist. t. 2, p. 5. *Coccinella concinnata*, MELSHEIM. Proceed. of the Acad. of nat. Scienc. of Philadelph. t. 3, p. 178. — MELSHEIM. Catal. (1853) p. 129.

**15<sup>e</sup>. Coccinella juliana.** *Ovale ; médiocrement convexe. Prothorax* noir, *paré sur les côtés d'une tache d'un blanc flavescent en carré large et irrégulier, et d'une bordure antérieure de même couleur (au moins chez l'un des sexes). Elytres* d'un jaune testacé, *parées chacune d'une bande noire, en arc dirigé en arrière, étendu depuis l'écusson jusqu'au calus, festonné postérieurement près de la suture.*

Long. 0,0036 (2 1/2 l.). Larg. 0,0045 (2 l.).

*Corps* brièvement ovale ; médiocrement convexe ; luisant. *Tête* noire, *parée sur le front d'une bande transversale blanche, rétrécie dans son milieu : mandibules blanches, avec l'extrémité noire. Antennes* d'un blanc flavescent, avec l'extrémité obscure. *Palpes maxillaires* noirs. *Prothorax* noir, orné en devant d'une bordure d'un blanc flavescent, égale environ au septième de la longueur : cette bordure, liée de chaque côté à une tache irrégulièrement quadrangulaire, plus large que longue, prolongée à

son côté interne environ jusqu'aux deux cinquièmes de la longueur, couvrant presque les deux tiers du bord latéral, un peu sinuée à son bord postérieur. *Écusson* noir. *Elytres* d'un jaune testacé ; parées chacune d'une bande noire, en forme d'arc transversal dirigé en arrière, naissant de l'écusson, étendu jusqu'au calus, offrant près de la suture, à son bord postérieur, une sorte de feston ou une sorte de dent très-obtuse : cette bande arquée laissant entre lui et la base un espace d'une teinte plus claire que le reste. *Dessous du corps* et *pieds* noirs. *Épimères des médi et postpectus*, blanches.

**PATRIE** : la Californie (collect. Buquet).

**OBS.** Je n'ai vu que l'un des sexes.

### HALYZIAIRES.

3. *Analis ciree*. Ovale ; médiocrement convexe. *Prothorax* d'un blanc flavescent ; marqué sur son disque d'une sorte de M noire. *Écusson* blanc. *Elytres* chargées d'un pli transverse vers les cinq sixièmes de la longueur ; d'un jaune testacé , ornées chacune de neuf points noirs : deux près de la base (l'externe sur le calus) : trois en rangée arquée en arrière vers le tiers de la longueur : trois en rangée transversale vers les deux tiers : le neuvième sur le milieu du pli.

Long. 0,0078 ( 3 1/2 l.). Larg. 0,0061 ( 2 5/4 l. ).

*Corps* ovale ; médiocrement convexe ; pointillé ; luisant en dessus. *Tête* noire , parée d'une bordure postérieure et d'une autre au côté interne des yeux, d'un blanc flavescent. *Antennes* et *palpes maxillaires* d'un jaune testacé : les premières , obtuses à l'extrémité. *Prothorax* d'un blanc livide ou flavescent ; paré sur le disque d'une sorte d'M noire, paraissant formée de taches unies. *Écusson* d'un blanc flavescent. *Elytres* d'un jaune testacé ; chargées d'un pli transverse vers les cinq sixièmes de la longueur ; ornées chacune de neuf taches ponctiformes , noi-

res : les première et deuxième formant avec leurs semblables une rangée très-faiblement arquée en arrière : la deuxième ou externe, sur le calus : la première ou interne, de moitié plus rapprochée de la deuxième que de la suture : les troisième, quatrième et cinquième, constituant sur chaque élytre une rangée arquée en arrière, vers le tiers de la longueur : la troisième, située près de la suture : la cinquième, voisine du bord externe : la quatrième, plus petite, plus postérieure, plus rapprochée de la cinquième que de la troisième : les sixième, septième et huitième constituant avec leurs pareilles une rangée transversale vers les deux tiers de la longueur : la sixième aussi voisine de la suture que la troisième : la huitième, à peine aussi voisine du bord extérieur que la cinquième : la septième, plus petite, un peu plus rapprochée de la huitième que de la septième : la neuvième, obliquement transversale, sur le pli, vers le milieu de la largeur : les troisième, cinquième, sixième et huitième, les plus grosses. *Dessous du corps et pieds* d'un jaune testacé : partie médiaire de la poitrine et du ventre, noire.

**PATRIE :** la Chine (collection Buquet).

**3. *Cleis lieia*.** *Brièvement ovale ; médiocrement convexe ; d'un roux testacé ou d'un jaune d'ocre, luisant en dessus, un peu plus pâle en dessous : prothorax marqué de cinq points obscurs. Ventre nébuleux sur son milieu.*

Long. 0,0045 ( 2 l.). Larg. 0,0016 ( 2/3 l.).

*Corps* brièvement ovale ; médiocrement convexe ; presque lisse sur la tête et sur le prothorax, superficiellement et finement ponctué sur les élytres ; d'un roux testacé ou d'un jaune d'ocre luisant, en dessus. *Tête, antennes et palpes* de même couleur. *Prothorax* marqué d'un point anté-scutellaire et de quatre autres disposés en demi-cercle autour de celui-ci, obscurs ou nébuleux. *Elytres* pourvues d'un rebord plan très-étroit. *Dessous du corps* un peu plus pâle que le dessus : médi et postpectus et partie

médiaire du ventre, d'une teinte nébuleuse ou un peu obscure. mésosternum échaneré à peine jusqu'au quart.

PATRIE : la Chine (collect. Buquet).

**3. *Propylea conglobata*.** *Brièvement ovale. Prothorax flave, au moins en devant, sur les côtés et sur les parties latérales de la base. Elytres flaves, avec la suture, un trait subapical, et chacune quatre taches disposées presque comme celles d'un damier, noires. Côtés du ventre et pieds flaves, ou d'un flave pâle.*

Long. 0,0045 (21.). Larg. 0,0033 (1 1/21.).

*Corps* brièvement ovale ; convexe ou médiocrement convexe ; glabre ; pointillé ; luisant. *Tête* flave , ornée sur le front d'une tache noire, en carré large ; un peu obscure sur le disque de l'épistome. *Antennes et palpes* en partie flaves , en partie brunâtres. *Prothorax* échaneré en devant, avec la partie médiaire de cette échancre en ligne droite ; élargi d'avant en arrière, sur les côtés, subeurvilinéairement près des angles, en ligne droite dans sa partie moyenne ; en arc médiocrement dirigé en arrière et peu sensiblement bissinué à la base ; convexe ; moins superficiellement pointillé que la tête ; flave en devant , sur les côtés et sur le sixième externe de la base , noir sur le reste : la partie noire , arquée en devant et entaillée sur la ligne médiane , dilatée de chaque côté comme si un point noir était lié à elle , couvrant les deux tiers médiaux de la base. *Ecusson* triangulaire ; noir. *Elytres* ornées d'une bordure suturale , d'un trait transversal subapical, et chacune de quatre taches presque carrées et disposées comme celles d'un damier , noires : la première , irrégulière , couvrant le calus , prolongée jusqu'au quart de sa longueur à son côté interne , plus prolongée à son côté externe et comme liée et confondue à une autre tache : la deuxième , carrée , liée à la bordure suturale , du quart presque à la moitié ; liée par son angle antéro-externe à l'angle postéro-externe de la première , et par son angle postéro-externe à l'angle antéro-in-



terne de la troisième : celle-ci , presque en parallélogramme de moitié plus long que large , située dans la direction longitudinale de la première , liée par son angle postéro-interne à la quatrième : celle-ci transversale , unie à la bordure suturale. *Dessous du corps* noir , avec les côtés du ventre largement flaves. *Pieds* de cette dernière couleur.

**PATRIE :** la Chine (collect. Buquet).

**OBS.** Elle a la plus grande analogie avec la *P. 14-punctata*, var. D, et peut-être n'en est-elle qu'une variété singulière. Elle se distingue toutefois de celle-ci , par la tache indiquée comme la troisième dans l'état normal de la *P. 14-punctata*, intimement confondue avec la quatrième ; par la sixième , nulle ; par la cinquième (correspondant à la troisième de la *14-punctata*) plus longue que large en raison de la nullité de la tache subexterne ; par les côtés du ventre et les pieds d'un flave à peu près uniforme.

### CARIAIRES.

**15<sup>o</sup>. *Leis calypso*.** Brièvement ovale. *Prothorax* d'un blanc flavescent , noir sur la partie médiale. *Elytres* noires , ornées chacune d'une tache subarrondie , jaune , couvrant le quart médiale de la longueur et du tiers aux cinq sixièmes de la largeur.

Long. 0,0067 (3 l.). Larg. 0,0056 (2 1/2 l.).

*Corps* brièvement ovale ; convexe ou médiocrement convexe ; pointillé ; brillant en dessus. *Tête* noire. *Antennes* et *palpes* testacés : les seconds , obscurs à l'extrémité. *Prothorax* d'un blanc flavescent , noir sur sa partie médiale : celle-ci , aussi large en avant que le bord postérieur de l'échancre , arquée en dedans à ses côtés , couvrant les deux tiers médiaux environ de la base. *Ecusson* noir. *Elytres* subarrondies postérieurement ; convexes ou médiocrement convexes , mais extérieurement peu déclives et formant une tranche égale environ au dixième de la

largeur, vers le tiers de la longueur; noires — parées chacune d'une tache jaune brièvement ou ovale transverse ou subarrondie, couvrant le quart médiane de la longueur et du tiers interne aux cinq sixièmes de la largeur : *repli* noir. *Dessous du corps* noir : côtés du ventre parés d'une large bordure d'un orange testacé, dentée à son côté interne. *Pieds* noirs : soles des tarses roussâtres.

PATRIE : la Chine (collect. Buquet).

### COELOPHORAIRE.

9n. *Cœlophora symbolica*. Subhémisphérique ; d'un jaune testacé en dessus. *Prothorax* paré de deux gros points noirs, liés à la base et situés chacun près de la ligne médiane. *Elytres* ornées d'une bordure suturale étroite, ovalairement dilatée aux cinq sixièmes de la longueur, liée vers le tiers à une tache dilatée jusqu'au tiers de la largeur ; parées d'un gros point sur le calus, et d'une bande longitudinale prolongée près de la tranche, depuis les deux jusqu'aux cinq septièmes de la longueur, noirs.

Long. 0,0051 ( 2 1/4 l. ). Larg. 0,0039 (13/4 l.).

*Corps* subhémisphérique ; pointillé ; d'un jaune testacé en dessus. *Tête*, *antennes* et *palpes* de même couleur ou d'une teinte rapprochée. *Prothorax* orné de deux gros points noirs, liés à la base, près de la ligne médiane, égaux chacun au cinquième au moins de la largeur du bord postérieur. *Elytres* ornées d'une bordure suturale, de deux taches et d'une bande longitudinale raccourcie à ses extrémités, noires : la bordure suturale, naissant à l'extrémité de l'écusson, où elle est à peine plus large que le rebord, un peu moins étroite ensuite ; liée au tiers de la longueur avec la deuxième tache, et ovalairement renflée vers les cinq sixièmes en forme de tache suturale : la première tache ponctiforme, située sur le calus, égale au cinquième de la largeur : la deuxième, plus grosse, liée à la bordure suturale, vers le tiers de la longueur, étendue jusqu'au

tiers interne de la largeur, figurant une courte bande transversale croisant la bordure suturale : la bande longitudinale, prolongée des deux aux cinq septièmes de la longueur, près de la tranche marginale à laquelle elle est presque parallèle, pouvant paraître formée de deux taches unies : fossettes du repli médiocrement prononcées. *Repli*, *dessous du corps* et *pieds* d'un jaune testacé : épimères du médipectus plus pâles : disque du postpectus noir ou obscur.

PATRIE : la Chine (collect. Buquet).

Obs. La tache juxta-suturale pourrait peut-être se montrer quelquefois isolée de la suture, et la bande longitudinale interrompue dans son milieu.

### CHILOCORAIRES.

10. *Chilocorus monachus*. Dessus du corps très-convexe et subcomprimé. Tête d'un rouge testacé. Prothorax noir. Elytres marron ou d'un brun marron, souvent d'une teinte graduellement plus claire sur un espace indéterminé, près de l'écusson. Repli noir extérieurement, d'un rouge testacé sur sa moitié interne. Dessous du corps et pieds de cette dernière couleur.

Long. 0,0042 (1 7/8 l.). Larg. 0,0033 (1 1/2 l.).

Corps subhémisphérique ; très-convexe et subcomprimé ; pointillé : luisant en dessus. Tête fauve ou d'un rouge testacé. Prothorax peu ou point émoussé aux angles ; en ligne droite sur les côtés ; de moitié à peine aussi long à ceux-ci que sur la ligne médiane ; faiblement relevé en rebord sur les côtés ; tronqué ou émoussé au devant de l'écusson et sinué de chaque côté de cette faible troncature, à la base ; noir ou brun, peu distinctement d'un brun rouge à son bord antérieur, entre chaque sinuosité postoculaire et les angles de devant. Elytres très-convexes, mais sensiblement moins déclives extérieurement ou offrant une tranche peu nettement limitée, assez étroite ; moins

finement ponctuées sur cette tranche que sur le dos ; d'un brun marron ou de couleur marron , avec le dos souvent d'une teinte plus claire, sur un espace indéterminé et à limites peu précises, couvrant parfois la moitié interne de la largeur depuis la base jusqu'à la moitié environ de la longueur. *Repli* noir sur la moitié externe, d'un rouge testacé sur l'interne. *Dessous du corps* et *pièds* d'un rouge testacé.

**PATRIE :** la Chine (collect. Buquet).

**Obs.** La teinte du dessus du corps pourrait peut-être se montrer parfois plus foncée et passer au noir , sans laisser de traces d'un espace plus clair.

Le *Chilocorus bivulnerus* est identique à la *Coccinella stigma*, SAY, Boston, journ. t. 1. p. 203. Il est nécessaire de lui conserver cette dénomination. Voyez MELSHEIM. Catal. (1853) p. 150.

### EXOCHOMAIRES.

8<sub>B</sub>. **Oreus cerberus.** Subhémisphérique. *Prothorax* et *élytres* noirs : le premier à peine bordé de jaunâtre aux angles de devant et à la sinuosité postoculaire : les secondes, sans taches. Tête, poitrine et pieds d'un rouge testacé. Ventre d'un jaune testacé.

Long. 0,0033 (1 1/2 l.). Larg. 0,0028 (1 1/4 l.).

*Corps* subhémisphérique, pointillé : brillant, en dessus. Tête d'un rouge testacé. *Prothorax* subarrondi sur les côtés ; à peine émoussé aux angles de devant ; sensiblement sinueux de chaque côté de la partie médiaire de la base ; noir, étroitement et souvent peu distinctement paré d'une bordure jaunâtre soit aux angles de devant, soit vers la sinuosité postoculaire. *Elytres* subarrondies ou largement en ogive postérieurement ; très-convexes ; à tranche inclinée et étroite ; sans tache : repli noir ; creusé de fossettes profondes pour loger l'extrémité des cuisses intermédiaires et postérieures. *Repli prothoracique* creusé d'une fossette. *Dessous*

du corps d'un rouge testacé sur la poitrine, d'un jaune testacé sur le ventre. *Pieds* d'un rouge testacé.

PATRIE : la Chine (collect. Buquet)

Ajoutez à la synonymie de l'*Ex. tripustulatus* :

*Chilocorus verrucatus*, MELSHEIM., Proceed. of the Acad. of nat. scient. of Philadelph. t. 3, p. 180. — MELSHEIM., Catal. (1853) p. 130.

Rectifiez de la manière suivante la synonymie de l'*Ex. marginipennis* :

***Exochomus marginipennis*; LE CONTE.**

*Coccinella marginipennis*, LE CONTE, Ann. of Lyceum of New-York, t. 1 p. 173.

*Exochorus pratextatus*, MELSH. Proceed. of the Acad. of nat. scienc. of Philadelph. t. 3, p. 180.

Voy. MELSHEIM. Catal. (1853) p. 130.

## BRACHYACANTHAÏRES.

Au genre *Brachyacantha* appartiennent les espèces suivantes :

***Brachyacantha albifrons*; SAY.**

*Coccinella albifrons*, SAY. Journ. of. the Acad. of Philadelph. t. 4, p. 94, 6. — MULS. Spec. p. 1049.

Voy. MELSHEIM. Catal. (1853) p. 130.

***B. 10-pustulata*; MELSHEIM.** Noire, avec la tête, les bords latéraux du prothorax et dix taches sur les élytres, fauves. *Pieds* d'un jaune testacé.

*Hyperaspis 10-pustulata*, MELSHEIM. Proceed. of the Acad. of the nat. scienc. of Philadelph. t. 3, p. 177, 2.

*Brachyacantha fulvopustulata*, MELSHEIM. l. c. p. 178, 2. — *Id.* Catal. (1853), p. 130.

PATRIE : les Etats-Unis.

Rectifiez de la manière suivante les noms des espèces ci-après.



**II. basalis** ; MELSHEIMER, au lieu de **II. confusa**.

*Brachyacantha basalis*, MELSH. in Proceed. of the Acad. of nat. scienc. or Philadelphia, t. 3 (1848) p. 179. 3. — *Id.* Catal. (1853) p. 130.

**II. quadripunctata** ; MELSH. au lieu de **B. diversa**.

*Brachyacantha quadripunctata*, MELSH. Proceed. loc. cit. p. 178. — *Id.* Catalogue (1853) p. 130.

### HYPERASPIAIRES.

Suivant M. Melsheimer, la *Cocc. undulata* de Say ( Journ. of the Acad. of Philadelph. t. 4, p. 92), est bien, ainsi que je l'avais indiqué, mon *Hyper. elegans*. Peut-être, selon le Catalogue du savant précité, est-ce la *Cocc. lugubris* de Randall? (Voy. MELSH. Catal. (1853) p. 151).

M. Melsheimer, quand mon Spéciès était à l'impression, publiait dans le t. 3, p. 180 des Procès-verbaux de l'Académie des Science de Philadelphie, sous le nom de **III. fimbriolata**, l'espèce que j'ai décrite sous le nom de **rufomarginata**. Le premier de ces noms doit lui être restitué. (Voy. MELSH., Catal. (1853), p. 151.

Ajoutez comme synonyme de l'**III. signata** ; OLIV.

*Hyperaspis leucopsis*, MELSHEIM. in Proceed. of the Acad. of nat. scienc. of Philadelphia. t. 3. (1848), 179. — MELSH. Catal. (1853), p. 131.

Mettez :

Au lieu de : **III. Guenèi**, MULS. Spec. p. 687. (Voy. MELSH. Catal. (1853) p. 131.

**III. bigeminata** ; RANDALL.

*Coccinella bigeminata*, RANDALL, Descript. of n. spec. of Coleopt. of Maine, in Boston, Journ. of. Nat. Hist. t. 2, p. 32. — MULS. Spec. p. 1050.

# EPILACHNAIRES.

112 B. *Epilachna serva*. Ovale ; pubescente. Prothorax et élytres d'un roux brunâtre ou d'un roux testacé brunâtre : le premier , paré sur ses côtés d'une bordure flave : les secondes , ornées chacune, depuis l'épaule jusqu'à l'angle sutural, d'une bordure flave et d'une bordure noire, au dedans de celle-ci. Suture noire.

Long. 0,0190 (4 l.). — Larg. 0,0067 (3 l.).

Corps ovale ; convexe ; garni d'un duvet cendré , d'un roux brunâtre ou d'un roux testacé brunâtre , en dessus. Tête , antennes et palpes, de même couleur. Prothorax paré sur les côtés d'une bordure flave ou d'un flave roussâtre , étendue en devant jusqu'à la sinuosité postoculaire , graduellement rétrécie jusqu'à l'angle postérieur ; offrant , au-dedans de celle-ci, une bordure noirâtre , plus ou moins marquée , prolongée derrière le bord antérieur. Ecusson de la couleur foncière. Elytres arrondies aux épaules presque à partir des angles du prothorax , offrant vers leur tiers leur plus grande largeur , rétrécies en ogive dans leur tiers postérieur ; convexes ; d'un roux testacé brunâtre ; parées, depuis l'épaule jusqu'à l'angle sutural, d'une bordure flave , presque uniforme , à peine égale au douzième de la largeur ; ornées au côté interne de celle-ci d'une bordure noire une fois plus large ; marquées d'une bordure suturale également noire, à peine plus large que la marginale flave. Repli d'un flave roussâtre sur sa moitié externe , d'un roux brun sur l'interne. Dessous du corps d'un roux brun. Plaques abdominales prolongées jusqu'aux trois cinquièmes de l'arceau. Pieds d'un roux testacé brunâtre.

PATRIE : Quito (collect. Buquet).

# ASPIDIMÉRAIRES.

2<sup>B</sup>. *Aspidimerus ? stellaris*. Ovale ; convexe ; pubescent ; noir en dessus. Elytres ornées chacune d'une tache d'un jaune orangé subarron-

die, plus large que longue, couvrant le sixième submédiale de la longueur et depuis le tiers environ jusqu'aux trois cinquièmes de la largeur. Dessous du corps et pieds, noirs.

Long. 0,0053 (1 1/2 l.) Larg. 0,0022 (1 l.).

Cet insecte est un Aspidiméraire. Il se rapproche du *Cryptogonus orbiculus*, dont il semble néanmoins différent; mais l'exemplaire que j'ai eu sous les yeux était trop englué de gomme pour pouvoir être décrit avec exactitude.

PATRIE : la Chine ? (collect. Buquet).

### SCYMNIAIRES.

Les *Scymnus ochroderns*, MULS. et *xanthaspis*, MULS. paraissent ne constituer qu'une même espèce offrant quelques variations, et doivent être réunies sous la première de ces dénominations. (Voy. MELSHEIM. Catal. (1853) p. 151.

Au sous-genre *Diomus* paraît appartenir l'espèce suivante :

**S. ornatus**; LE CORTE. Elliptique; convexe; dorsalement et légèrement ponctué; noir: élytres ornées chacune d'une grande tache oblique située avant le milieu, et, après celui-ci, d'une autre grande orbiculaire, d'un roux clair: base des antennes, tibias et tarses, d'un fauve roux. Plaques abdominales oblitérées extérieurement: mésosternum large, un peu échancré.

*Scymnus ornatus*, J. L. LE CORTE, Gen. Rem. up. the Coleopt. of Lak. sup. p. 259. 52.

PATRIE : les environs du lac Supérieur.

Au lieu de :

**Sc. chatchas**, MULS. mettez : **Sc. collaris**; MELSH.

*Scymnus collaris*, MELSH. in Proceed. of the Acad. of Nat. Scienc. of Philadelph. 1. 3 (1848) p. 180. 1. — MELSH. Catal. (1853) p. 151.

Peut-être l'espèce portant le nom de *Sc. creperus* (Spéciès, p. 985) est-elle la même que celle décrite quelque temps auparavant par M. Le Conte (Lak. super. p. 258), sous la dénomination de *caudalis* (Voy. MELSH. Catal. (1853), p. 181.

L'insecte considéré comme étant le ♂ du *Sc. caudalis* (loc. citat.), se rapporte au *Scym. fastigiatus*, MULS. (Spéciès, p. 986). (Voy. MELSH., catal. (1853), p. 181.

Au lieu de :

**Sc. fastigiatus**, MULS. Mettez **Sc. consobrinus** ; LE CONTE. Lak. Sup. p. 238. (Voy. MELSH. Catal. (1853) p. 131.

A la division AA. se rapporte l'espèce suivante :

**S. lacustris** ; LE CONTE. Brièvement ovale ; convexe ; ponctué ; noir. *Mésosternum* large , presque tronqué. Plaques abdominales entières , ponctuées à la base , atteignant presque le bord marginal du premier arceau.

*Scymnus lacustris* , J. L. LE CONTE , Gener. Remark. up. the Coleopt. of Lak. super. p. 239. 51.

Long. 0,0009 (1/2 l.).

♂ Dernier arceau de l'abdomen creusé d'une impression triangulaire profonde ; moins densément ponctué à la base. Pieds roux ou bruns bordés de roux.

♀ Dernier arceau de l'abdomen entier ; uniformément et densément ponctué. Antennes et pieds noirs : les dernières de ceux-ci , parfois roux.

PATRIE : les environs du Lac Supérieur.

# TABLE

## DES ADDITIONS ET DES RECTIFICATIONS

### A MON CATALOGUE DES COCCINELLIDES (1853) <sup>(1)</sup>.

---

#### **Hippodamiatres.**

HIPPODAMIA, Chevrr.	
Leporina, Muls. n. sp.	Californie.
{ Convergens, Guer.	
{ Modesta, Melsheim.	
NAEMIA, Muls.	
{ Seriata, Melsh.	
{ Litigiosa, Muls.	

#### **Coccinellatres.**

ANISOSTICTA, Chevrolat.	
Dohrniana, Muls. n. sp.	Hongrie.
ADONIA, Muls.	
Interrogans, Muls. n. sp.	Chine.
HARMONIA, Muls.	
Dionea, Muls. n. sp.	Chine.
{ Venusta, Melsh.	
{ Notulata, Muls.	
{ Picta, Randall.	
{ Contexta, Muls.	
COCCINELLA, Linné.	
Juliana, Muls. n. spec.	Californie.

#### **Halysiatres.**

ANATIS, Muls.	
Circe, Muls. n. sp.	Chine.
{ 15-punctata, Oliv.	
{ Mali, Say.	
{ Labiculata, Say.	

---

(1) Opuscles Entomol. 3<sup>e</sup> cahier. — Ann. de la Soc. Linn. de Lyon, 1853.



CLEIS, Muls.	
Licia, Muls. n. sp.	Chine.
PROPTLEA, Muls.	
Conglobata, Muls. n. spec.	Chine.

**Cariacaires.**

LEIS, Muls.	
Calypso, Muls. n. sp.	Chine.

**Cœlophoraires.**

COELOPHORA, Muls.	
Symbolica, Muls. n. sp.	Chine.

**Chilocoraires.**

CHILOCORTS, Leach.	
Monachus, Muls. n. sp.	Chine.
{ Bivulnerus, (Dej.) Muls.	
{ Stigma, Say.	

**Exochomaires.**

ORCUS, Muls.	
Cerberus, Muls. n. sp.	Chine.
EXOCHOMUS, Redtenb.	
{ Tripustulatus, de Geer.	
{ Verrucatus, Melsh.	
{ Marginipennis, Le Conte.	
{ Protextatus, Melsh.	

**Brachyacanthaires.**

BRACHYACANTHA, Chevr.	
Albifrons, Say	Etats-Unis.
{ Decempustulata, Melsh.	id.
{ Fulvopustulata, Melsh.	
{ Basalis, Melsh.	
{ Confusa, Muls.	
{ Quadri-punctata, Melsh.	
{ Diversa, Muls.	

**Hypéraspiaires.**

HYPERASPIS (Chevrolat), Redtenb.	
{ Fimbriolata, Melsh.	
{ Rufo-maginata, Muls.	

- { Signata , Oliv.
- { Leucopsis , Melsb.
- { Bigeminata , Randall.
- { Guexi , Muls.

**Epilachnaires.**

- EPILACHNA , Chevr.
- Serva , Muls. n. sp. Equateur.

**Aspidiméraires.**

- ASPIDIMERUS , Muls.
- Stellaris , Muls. n. sp. Chine

**Scymniaires.**

- SCYMNUS , Kugel.
  - (Dionus).
  - Ornatus , Le Conte. Lac supérieur
  - (Pullus).
  - { Collaris , Melsb.
  - { Chatchas , Muls.
  - { Caudalis , Le Conte.
  - { Creperus ? Muls.
  - { Consobrinus , Le Conte.
  - { Fastigiatus , Muls.
  - { Caudalis , Le Conte.
  - Lacustris , Le Conte. Lac supérieur.
-

# DESCRIPTION

D'UNE

## NOUVELLE ESPÈCE DE LONGICORNE

CONSTITUANT UN NOUVEAU GENRE

DANS CETTE TRIBU DE COLÉOPTÈRES ,

PAR

**E. Mulsant.**

Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 10 mars 1856.

---

Genre *Menesia*, MENESIE.

**CARACTÈRES.** *Elytres* presque planes longitudinalement sur le dos, convexement déclives sur les côtés ; presque parallèles dans leur seconde moitié ; subarrondies à l'extrémité ou obliquement coupées dans leur moitié interne. *Antennes* subfiliformes ou presque sétacées, un peu plus longues que le corps ; ciliées en dessous ; à troisième et quatrième articles à peu près égaux ; insérées dans l'échancrure des yeux. *Front* bombé. *Yeux* très-profondément échancrés, mais non divisés : la partie antérieure plus grosse, subarrondie. *Pieds* courts. *Jambes intermédiaires* échancrées vers l'extrémité de leur arête externe. *Ongles* simples.

L'insecte qui sert de base à ce genre s'éloigne, par ses yeux non divisés, des Polyopsies, dont il se rapproche par son port, par sa petitesse, par les troisième et quatrième articles de ses antennes presque égaux. Ce dernier caractère l'éloigne des Saperdes.

***Menesia Perrisi.***

*Corps* hérissé de poils fins et obscurs ; noir , avec les pieds d'un jaune orangé : deux taches subponctiformes sur la partie postérieure de la tête , une bande longitudinale médiane sur le prothorax , deux taches ponctiformes sur chaque élytre : l'une petite , près de la suture aux trois cinquièmes : l'autre ronde , plus grosse , entre celle-ci et l'extrémité , formées de poils blancs ; une bande longitudinale sur les postépisternums , une bordure interrompue dans son milieu sur le bord des quatre premiers arceaux du ventre , formées de poils semblables.

Long. 0,0036 (1 2/3 l.). Larg. 0,0016 à 0,0018 (2/3 à 5/4 l.).

*Corps* presque parallèle. *Tête* perpendiculaire ; pointillée ; hérissée de poils fins , obscurs ; bombée sur le front ; noire ou d'un noir un peu ardoisé , ornée sur sa partie supérieure de deux taches subponctiformes , produites par des poils blancs : labre noir. *Palpes* d'un fauve brunâtre. *Yeux* très profondément échancrés , mais non divisés en deux parties. *Antennes* insérées dans cette échancre ; au moins aussi longues que le corps ; de onze articles ; sétacées , grêles ; à premier article plus gros , un peu renflé dans son milieu : le troisième à peu près égal au quatrième ou à peine plus grand que lui ; brièvement pubescentes ; ciliées en dessous ; à premier article noir : les autres bruns ou d'un brun cendré. *Prothorax* moins long que large ; tronqué en devant , tronqué ou à peine bissubsinué à la base ; presque cylindrique ou à peine renflé dans le milieu de ses côtés ; sans rebord à ceux-ci ; très-étroitement rebordé à la base , à peine relevé en rebord dans le milieu de son bord antérieur ; pointillé ; hérissé de poils fins et obscurs ; noir , paré longitudinalement sur la ligne médiane d'une bande formée de poils d'un blanc de lait , et un peu relevée en carène. *Écusson* presque carré ; revêtu d'un duvet d'un blanc de lait. *Elytres* d'un tiers plus larges en devant que le prothorax ; quatre fois à peu

près plus longues que lui; parallèles jusqu'aux quatre cinquièmes; échancrées chacune dans la moitié interne de leur bord postérieur, et offrant par-là une sorte de petite dent au milieu de ce bord; planes sur le dos, perpendiculaires sur les côtés jusqu'aux trois quarts de leur longueur et graduellement convexement déclives vers l'extrémité; à fossette humérale légère; marquées à la base de gros points qui vont en s'affaiblissant, presque imponentuées à l'extrémité; hérissées de poils noirs fins et obscurs; noires; parées chacune de deux taches ponctiformes formées par un duvet blanc de lait: l'antérieure, petite, située près de la suture, vers les trois cinquièmes de la longueur: l'autre plus grosse, arrondie, située vers les six septièmes de la longueur. *Dessous du corps* hérissé de poils obscurs; presque imponentué; noir, avec les épimères du médipectus, les postépisternums et la partie latérale du bord postérieur des quatre premiers arceaux du ventre, couverts de poils blancs: la bordure des anneaux du ventre graduellement rétrécie à partir des côtés jusque près de la ligne médiane où elle s'efface. *Pieds* d'un jaune orangé.

Cette espèce a été trouvée dans les environs de Mont-de-Marsan (Landes), par M. Perris, l'une de nos gloires entomologiques.

Obs. Cet insecte paraît avoir beaucoup d'analogie avec la *Poly. bipunctata* décrite par Zubkoff et par Germar; mais elle s'en distingue par ses yeux non-divisés; par la tête ornée de deux taches ponctiformes formées par des poils; par les élytres parées chacune de deux taches semblables au lieu d'une; par la postérieure de ces taches, orbiculaire au lieu d'être en demi-lune.



# DESCRIPTION

DE DEUX

## NOUVELLES ESPÈCES DE COLÉOPTÈRES

CONSTITUANT UN GENRE NOUVEAU

DANS LA FAMILLE DES ULOMIENS ,

PAR

**P. PERROUD et E. MULSANT,**

(Présentée à la Société Linnéenne de Lyon, le 14 juillet 1886.)

---

Genre *Melasia* , MELASIE (Chevrolat).

(Μέλας ; noir.)

CARACTÈRES. *Antennes* grossissant graduellement à partir du cinquième article : le premier subcylindrique : le deuxième court : le troisième un peu plus étroit et à peine aussi long que le suivant : les quatrième et cinquième submoniliformes : les sixième à dixième plus sensiblement comprimés, transverses, presque en parallélipèdes à angles émoussés ou épointés, non en forme de coupe : le onzième, ovulaire. *Yeux* transverses ; échan-crés dans leur milieu. *Prothorax* bissinué à la base, avec le tiers médiaire de celle-ci arqué en arrière et plus prolongé que les angles postérieurs. *Repli* des élytres non prolongé jusqu'à l'angle sutural. *Menton* en ovale transverse. *Postépisternum* environ une fois plus large en devant qu'en arrière. *Jambes de devant* élargies depuis la base jusqu'à l'extrémité ; denticulées sur leur arête externe. *Premier article des tarses postérieurs* plus long

que les deux suivants réunis ; au moins aussi grand que le dernier. *Corps* environ une fois plus long que large.

Ces insectes se distinguent des *Ulomes*, avec lesquels ils ont beaucoup de rapports, par leur corps moins allongé ; par les articles sixième à dixième des antennes non en forme de coupe, n'ayant pas le bord antérieur de ces articles coupés en ligne droite, ni les angles de devant vifs ; surtout par la forme de leur menton, en ovale transverse, au lieu d'être obtriangulaire.

### 1. *M. gagatina.*

*Ovalaire oblongue ; une fois au moins plus longue que large ; peu fortement convexe ; d'un noir luisant ; parties de la bouche, antennes, extrémité des jambes et tarsi, d'un rouge testacé. Prothorax de deux tiers, au moins plus large en arrière qu'il est long sur son milieu ; muni sur les côtés d'un rebord un peu plus large dans le milieu de sa seconde moitié : pointillé. Elytres offrant vers le milieu leur plus grande largeur ; à neuf stries ponctuées et assez profondes : les deuxième à septième oblitérées à leur extrémité. Intervalles un peu crénelés par les points des stries ; presque pointillés, presque plans.*

Long. 0,0078 à 0,0081 (3 1/2 à 3 3/4 l.). Larg. 0,0045 (2 l.).

*Corps* ovalaire oblong ; une fois au moins plus long qu'il est large vers les deux tiers ; peu fortement ou assez médiocrement convexe ; d'un noir luisant ou brillant, en dessus. *Tête* subconvexe ; pointillée ; offrant entre les yeux les faibles traces d'un sillon transverse ; échancrée en arc assez faible au bord antérieur du front ; noire ou d'un noir brun, moins foncé en devant : *labre* et parties de la bouche d'un roux ou d'un rouge testacé. *Antennes* de même couleur. *Prothorax* assez faiblement échancré en devant avec les angles sensiblement avancés ; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié, subparallèle ensuite ; à angles postérieurs rectangulaires, peu ou point émoussés ; bispinué à la base, c'est-à-dire en arc ou presque en angle obtus dirigé en arrière dans le

tiers médiaire de celle-ci et plus prolongé que les angles ; assez faiblement sinué entre cette partie arquée et les angles postérieurs, presque en ligne droite sur la partie externe de sa base ; muni en devant d'un rebord très-faible, interrompu dans son milieu ; sans rebord à la base ; pourvu sur les côtés d'un rebord graduellement élargi jusque vers la moitié, presque uniformément plus large ensuite jusque près des angles postérieurs, où il se rétrécit et s'affaiblit ; de deux tiers ou de trois quarts plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; convexe ; d'un noir luisant ; peu densément et assez superficiellement pointillé. *Eusson* en triangle moins long que large, à côtés curvilignes ; noir ; presque impointillé. *Elytres* à peine élargies, dans leur milieu ; rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural, et plus sensiblement à partir des deux tiers ; peu fortement convexes ; d'un noir luisant ; à neuf stries non avancées tout-à-fait jusqu'à la base (seulement les sixième à huitième), ponctuées : les première ou deuxième à septième ou huitième oblitérées à leur extrémité ; les quatrième et cinquième plus courtes, prolongées à peine au-delà des trois quarts de la longueur ; à strie juxta-suturale rudimentaire, obsolète. *Intervall*s presque plans ou à peine subconvexes ; un peu crénelés par les points des stries ; presque impointillés. *Repli* non prolongé jusqu'à l'angle sutural. *Dessous du corps* noir ; luisant ; finement et longitudinalement rayé sur les côtés de l'antépectus ; offrant sur le ventre quelques rides obsolètes. *Prosternum* rebordé jusque vers l'extrémité des hanches ; dépassant un peu le bord de l'arceau. *Pieds* médiocres ; cuisses et jambes d'un noir brun, avec les genoux d'un rouge brun : tibias postérieurs graduellement fauves ou d'un fauve testacé : tibias antérieurs finement denticulés sur un peu plus de la seconde moitié de leur côté externe : tarses d'un rouge, d'un roux ou d'un fauve testacé, garnis de poils de même couleur, ainsi que l'extrémité des jambes. *Ongles* de même couleur.

Cette espèce, suivant M. Grué, habite la Sicile.

***M. tarsalis* (CHEVROLAT).**

Ovalaire, subparallèle, moins d'une fois plus longue que large ; assez médiocrement convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés ; d'un noir luisant, avec les mâchoires, les palpes, les deux premiers articles des antennes, d'un rouge brun ; les quatre premiers articles des tarses antérieurs et tous les ongles, d'un roux testacé. *Prothorax* une fois plus large en arrière qu'il est long sur son milieu, muni sur les côtés d'un rebord presque égal ; superficiellement pointillé. *Elytres* offrant vers les trois cinquièmes leur plus grande largeur ; à neuf stries assez profondes jusqu'à leur extrémité, ponctuées. Intervalles un peu crénelés par les points des stries ; à peu près impointillés.

*Melasia tarsalis* (CHEVROLAT) in collect.

Long. 0,0090 à 0,0100 ( $\frac{4}{5}$  à  $4 \frac{1}{2}$  l.) ; larg. 0,0051 à 0,0056 ( $2 \frac{1}{4}$  à  $2 \frac{1}{2}$  l.).

vers les trois cinquièmes des élytres.

Subparallèlement ovalaire ; moins d'une fois plus longue que large ; médiocrement convexe sur le dos, convexement déclive sur les côtés ; d'un noir luisant ou brillant, en dessus. *Tête* subconvexe ; superficiellement pointillée ; rayée d'un sillon transverse entre les yeux, dans la partie correspondant à leur échancrure ; obtuse ou faiblement échancrée au bord antérieur du front ; noire, avec le bord antérieur du labre d'un brun rouge ; mâchoires et palpes d'un rouge brun. *Antennes* brunes, avec le deuxième article et ordinairement aussi le premier, d'un rouge brun ou d'un rouge ferrugineux. *Prothorax* assez faiblement échancré en avant, avec les angles antérieurs sensiblement avancés et assez vifs ; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes ou trois septièmes de ses côtés, subparallèle ou faiblement élargi ensuite en ligne à peu près droite ; à angles postérieurs rectangulairement ouverts, peu ou point émoussés ; bis-sinué à la base, c'est-à-dire en arc ou presque en angle obtus,

dirigé en arrière dans le tiers médiaire de celle-ci et plus prolongé que les angles, assez faiblement sinué entre cette partie arquée et les angles postérieurs, presque en ligne droite sur la partie externe de sa base ; muni en devant d'un rebord très-faible, interrompu dans son milieu ; sans rebord à la base ; pourvu sur les côtés d'un rebord presque égal, rétréci à ses extrémités ; un peu plus d'une fois plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; convexe ; noir, luisant ; peu densément et superficiellement pointillé, surtout sur le disque. *Elytres* graduellement et faiblement élargies jusqu'aux trois cinquièmes, obtusément arrondies postérieurement, prises ensemble ; médiocrement convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés ; d'un noir luisant ; à neuf stries non avancées tout-à-fait jusqu'à la base (surtout les sixième à huitième), ponctuées et prononcées à leur extrémité : les quatrième et cinquième plus courtes, prolongées à peine jusqu'aux trois quarts, unies postérieurement et enclouées par les voisines : à strie juxta-suturale rudimentaire ou obsolète : *Intervalles* subconvexes ; un peu crénelés par les points des stries ; presque impointillés. *Repli* non prolongé jusqu'à l'angle sutural. *Dessous du corps* d'un noir luisant ; chargé de lignes longitudinales légères, ridé longitudinalement sur le milieu des trois premiers arceaux du ventre. *Prosternum* rebordé presque jusque vers l'extrémité des hanches ; dépassant un peu le bord de l'arceau. *Pieds* médiocres ; noirs, avec les genoux d'un brun rouge, les quatre premiers articles des tarses antérieurs, les poils de l'extrémité des tibias postérieurs, ceux du dessous des tarses et les ongles, d'un roux testacé : tibias antérieurs finement denticulés presque sur toute la longueur de leur côté externe.

Patrie : le Sénégal.

Obs. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la précédente ; mais elle s'en distingue par son corps proportionnellement plus court, plus large, moins régulièrement convexe, offrant vers les



trois cinquièmes ou un peu après plutôt que vers la moitié sa plus grande largeur, subparallèle dans la moitié médiaire de sa longueur au lieu d'être plus régulièrement ovale ; par son prothorax plus large relativement à sa longueur, muni sur les côtés d'un rebord plus régulier ; par les stries de ses élytres non oblitérées à leur extrémité ; par les intervalles de ces stries plus ou moins convexes ; par la couleur des antennes, des parties de la bouche et des tarses.

---

# ADDITIONS ET OBSERVATIONS

RELATIVES

## A LA MONOGRAPHIE DES PALPICORNES,

PAR

E. MULSANT,

(Présentées à la Société Linnéenne de Lyon, le 11 août 1855.)

---

Le genre *Trapisternus*, établi par Solier (1) dans la tribu des Palpicornes, paraissait jusqu'à ce jour ne devoir comprendre que des Coléoptères étrangers à l'Europe; or voici qu'une espèce de ce genre, et qui plus est une espèce mexicaine, vient d'être prise dans un ruisseau coulant dans la forêt des Maures, en Provence, par M. Robert, l'un de nos entomologistes méridionaux les plus zélés.

Avant de décrire cette espèce, pour les entomologistes qui n'auraient pas dans leur bibliothèque l'ouvrage de M. Chevrolat sur les Coléoptères du Mexique, rappelons la place que doit occuper dans la série zoologique la coupe générique à laquelle elle appartient.

Les Palpicornes compris dans ma famille des *Hydrophilions*, se distinguent des autres insectes de cette tribu, par le deuxième article des tarses postérieurs long : le premier étant très-court, suivant les caractères plus ou moins indiqués par M. Lacordaire dans son excellent *Genera*.

La première branche de cette famille ou celle des *Hydrophilulion*, se distingue par ses *mésa* et *mélasternum unis* et formant une saillie continue, terminée en pointe spiniforme. Ils ont aussi les tarses intermédiaires et postérieurs plus sensible-

---

(1) Annales de la Soc. entomol. de France, t. 3 (1834), p. 299 à 318.

ment comprimés et plus densément ciliés que chez les insectes de la branche suivante ; mais on trouve à cet égard des espèces qui forment des transitions presque insensibles entre ces deux divisions. L'épine ou la pointe métasternale se prolonge généralement au-delà de la hanche. Les Hydrophilites peuvent être partagés en deux rameaux :

Prosternum	court ; creusé d'une gouttière à sa partie postérieure ou supéro-postérieure.	HYDROPHILITES.
	relevé en carène, et sans gouttière à sa partie postérieure ou supéro-postérieure.	HYDRATES.

Les Hydrophilites se partagent eux-mêmes en deux genres :

Dernier article des palpes maxillaires	plus court que l'avant dernier. Septième et huitième articles des antennes lunulés. Pièce prébasilaire non creusée d'une fossette arrondie. Gouttière prosternale ordinairement presque horizontale ou déclive d'avant en arrière. Cinquième arceau ventral inerme. Ongles des pieds intermédiaires et postérieurs armés chacun en dessous d'une dent à moitié aussi longue que la branche principale.	<i>Hydrophilus.</i>
	presque aussi long, aussi long ou plus long que l'avant dernier. Septième et huitième articles des antennes non lunulés. Pièce prébasilaire creusée d'une fossette arrondie pour recevoir la tête du prosternum. Celui-ci creusé d'une fossette ordinairement verticale. Cinquième arceau du ventre généralement armé d'une épine, rarement réduite à une faible carène. Ongles des pieds intermédiaires et postérieurs munis chacun d'une dent presque nulle ou très-courte.	<i>Tropisternus.</i>

Genre *Tropisternus*, TROPISTERNE ; Solier (1).

(τρῑστής, carène, στέρνον, sternum.)

CARACTÈRES. Dernier article des palpes maxillaires presque aussi long, aussi long ou même un peu plus long que l'avant

(1) *Annales de la Soc. entom.*, t. 5, p. 302 et 303.

dernier. *Labre* et *épistome* transverses. *Mandibules* cachées ; bifides ou bidentées à l'extrémité. *Mâchoires* à deux lobes ; ciliées. *Menton* presque rectangulaire , un peu plus large que long. *Antennes* de neuf articles : le premier grand , déprimé , un peu arqué : le deuxième moins long , subcylindrique : les troisième à cinquième courts : le sixième élargi en entonnoir ou en ombelle : les septième à neuvième subcomprimés , transverses , constituant avec le précédent une massue à peu près aussi longue que les cinq premiers réunis : les septième et huitième , non lunulés : le neuvième moins court. *Ecusson* grand ; en triangle. *Pièce prébasilaire* creusée d'une fossette pour recevoir la tête du prosternum : celui-ci creusé à sa partie postérieure d'une gouttière verticale ou presque verticale , pour recevoir la partie antérieure du mésosternum. *Méso* et *métasternum* constituant une saillie continue : le métasternum terminé par une pointe prolongée au-delà de l'extrémité des trochanters. *Ventre* ordinairement de cinq arceaux , offrant parfois une partie du sixième visible : le cinquième généralement armé d'une épine , rarement réduite à une faible carène. *Pieds* comprimés. *Tarses intermédiaires* et *postérieurs* longuement ciliés d'un côté. *Ongles* sans dent ou munis seulement d'une dent rudimentaire ou très-courte à la base de chacune de leurs branches.

Oss. A en juger par vingt espèces différentes examinées dans la magnifique collection de mon ami M. Perroud , la fossette prébasilaire , la direction de la gouttière prosternale et l'épine du cinquième arceau ventral , seraient , avec la longueur proportionnelle et un peu variable du dernier article des palpes maxillaires , les caractères les plus saillants de ce genre.

Il est étonnant qu'aucun des auteurs qui ont décrit ces insectes n'aient fait mention de l'épine parfois si prononcée dont le cinquième arceau ventral est armé.

***Tropisternus apicalpis*, Chevrolat.**

Elliptique ; d'un noir olivacé , en dessus : palpes et antennes d'un rouge testacé : dernier article des premiers , noir à son extrémité : massue des secondes d'un noir grisâtre. Tête armée de deux rangées de points convergentes sur le milieu du front , avancées , puis courbées jusqu'au milieu du devant de chaque œil. Prothorax marqué près des côtés d'une rangée courte et oblique de points. Elytres presque lisses. Dessous du corps et pieds noirs : ceux-ci bruns ou d'un brun rougeâtre vers les genoux. Cinquième arceau du ventre orné sur la moitié antérieure de sa ligne médiane , d'une forte épine comprimée et mi-relevée.

*Hydrophilus apicalpis*, CHEVROLAT, Coléopt. du Mexique, première centurie, troisième fascicule (1851).

*Tropisternus apicalpis*, DE CASTELNAU, Hist. Nat. t. 2. p. 53. 3. — LACORDAIRE, Gener. t. 1. p. 432.

Long. 0,0125 à 0,0135 (3 1/2 à 6 l.). Larg. 0,0061 à 0,0067 (2 3/4 à 3 l.).

Corps elliptique ou ovale oblong ; médiocrement convexe ; glabre ; presque lisse ; d'un noir olivacé , en dessus. Tête penchée ; presque en triangle tronqué en devant ; médiocrement convexe ; d'un noir olivacé ; lisse , marquée d'une rangée de points naissant vers le milieu du bord antérieur de chaque œil , avancée et courbée du côté interne, puis prolongée en arrière jusque sur le milieu du front , où elle se réunit en courbe étroite à sa pareille. Parties de la bouche et palpes d'un rouge testacé pâle : dernier article de ceux-ci , noir sur son dernier tiers postérieur. Antennes d'un rouge testacé pâle , avec la massue d'un noir grisâtre. Yeux d'un blanc livide , au moins après la mort , échancrés à leur partie postérieure. Prothorax bissinué en devant , avec les angles antérieurs anguleusement avancés dans l'échancre postérieure des yeux ; élargi en ligne un peu courbe d'avant en arrière ; coupé à la base en ligne presque droite ou plutôt très-légèrement arquée en devant , tronquée au devant de l'écusson , et légèrement sinuée de chaque côté de cette tronea-



ture ; étroitement et à peine rebordé sur les côtés, dont les bords sont tranchants en dessous ; sans rebord à la base ; près d'une fois aussi large à cette dernière qu'il est long sur son milieu ; convexe ; lisse , marqué de chaque côté , d'une rangée oblique de points , naissant vers le tiers ou les deux cinquièmes de la longueur du segment prothoracique , près du bord latéral dont elle reste isolée, obliquement dirigée vers le centre, prolongée jusqu'aux trois cinquièmes environ de la longueur et le quart externe à peu près de la largeur ; d'un noir olivacé. *Ecusson* triangulaire , plus long qu'il est large à la base ; lisse ; d'un noir olivacé. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax à sa base ; trois fois environ aussi longues que lui ; à peine élargies jusque vers la moitié de leur longueur, rétrécies ensuite en ligne courbe jusque près de l'angle sutural , où elles sont obtuses ; très-étroitement rebordées ; médiocrement convexes ; presque lisses, offrant, à une forte loupe, des rangées de points longitudinales, superficielles et peu distinctes ; d'un noir olivacé. *Repli* réduit à peu près à une tranche, par suite de sa surface repliée en dedans, graduellement rétrécie d'avant en arrière, offrant une sinuosité vers le milieu de sa longueur. *Dessous du corps* noir ; garni d'un court duvet qui le fait paraître d'un noir légèrement olivâtre. Mésos et métasternum saillants, presque plats en dessus : le mésosternum élargi dans son milieu : le métasternum faisant suite au précédent graduellement rétréci en pointe prolongée un peu au-delà du premier arceau ventral. Cinquième arceau ventral armé sur la première moitié de la longueur de sa ligne médiane d'une épine comprimée, obliquement relevée. *Pieds* noirs ou d'un noir brun, passant graduellement vers l'extrémité des cuisses et surtout sur les genoux au brun rouge ou même au rouge brun. *Cuisses* pubescentes à la base et presque jusqu'à la moitié de la longueur, glabres ensuite. *Jambes* de devant lisses , ornées près du bord externe d'une rangée longitudinale de points donnant chacun naissance à un poil sou-

vent usé : jambes intermédiaires et postérieures ponctuées et garnies sur leurs deux tranches de poils spiniformes : les intermédiaires un peu moins longues que les trois premiers articles des tarsi réunis.

Cette espèce a été prise au nombre de deux exemplaires par M. Robert, dans un ruisseau des montagnes des Maures (Var).

En créant le genre *Sternolophus*, Solier n'a pas indiqué la longueur approximative de la pointe métasternale, et M. de Castelnau <sup>(1)</sup> dit que le sternum est prolongé en arrière en une pointe *très-courte*. Cette indication m'avait porté à établir le genre *Helobius* <sup>(2)</sup> sur une espèce de *Stenelophe*, ayant l'épine prolongée jusqu'un peu au-delà de la moitié du second arceau ventral. Mais ayant eu depuis cette époque l'occasion de revoir les insectes de la collection Dejean, acquis par M. le docteur Jourdan pour le Musée de Lyon, j'ai reconnu que les espèces rentrant dans le genre établi par Solier, avaient l'épine métasternale assez longuement prolongée. Le genre *Helobius* doit donc être supprimé.

Voici la description de l'espèce sur laquelle il était fondé.

***Sternolophus noticollis* ; Mulsant.**

Ovale allongé ; d'un brun olivâtre et brillant en dessus. Palpes et base des antennes d'un fauve testacé ; extrémité des premiers, noirâtre. Prothorax marqué de chaque côté de deux rangées de points, naissant presque du bord latéral : l'antérieure, arquée : la postérieure obliquement dirigée en arrière. Ecusson moins de moitié plus long que large. Elytres à quatre rangées striales de points : les deux internes, prolongées presque jusqu'à l'extrémité et postérieurement réunies. Dessous du corps brun : côtés du ventre tachés de fauve obscur. Pieds de devant fauves ; à base brune.

---

(1) Hist. nat. t. 2. p. 54.

(2) Mémoires de l'acad. des sc. de Lyon, nouv. série. t. 1. (1851) p. 75.

*Helobius noticollis*, Muls. Mém. de l'acad. des sc. de Lyon, nouv. série t. 1. (1851) (classe des sc.) p. 73.

Lon. 0,0107 (4 3/4 l.). Larg. 0,0056 (2 1/2 l.).

*Corps* elliptique ou en ovale allongé; d'un brun olivâtre; lisse et brillant, en dessus. *Tête* subconvexe; marquée de chaque côté du front d'une sorte de ligne enfoncée, arquée ou anguleuse, formée par des points, naissant vers le bord antéro-interne de chaque œil, plus densément ponctuée dans sa moitié antérieure et s'éloignant graduellement de l'œil, dont elle se rapproche progressivement dans sa seconde moitié; ornée sur l'épistome de deux arcs formés par des points, isolés l'un de l'autre par un espace égal environ au quart médiaire de la largeur, suivant chacun presque parallèlement le bord externe de l'épistome, jusque vers la partie postérieure de celui-ci. *Palpes* testacés ou d'un roux livide avec l'extrémité du dernier article brièvement noirâtre. *Antennes* d'un roux livide ou testacées, à massue d'un noir ou brun gris. *Prothorax* tronqué peu régulièrement en devant et en arrière; élargi en ligne presque droite, et très-étroitement rebordé sur les côtés; convexe; marqué de chaque côté de deux rangées de points: l'antérieure, arquée, naissant du bord externe, au septième de sa longueur, étendue jusqu'aux trois septièmes de sa largeur, d'abord presque parallèlement au bord antérieur, puis dirigée en arrière: la deuxième, naissant du bord latéral, un peu après le milieu de sa longueur, obliquement dirigée vers le quart interne de la largeur et les deux tiers de la longueur. *Ecusson* en triangle, moins de moitié plus long qu'il est large à la base; plus large à celle-ci que le tiers de chaque étui. *Elytres* faiblement plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs qu'elles embrassent un peu; faiblement élargies en ligne à peine courbe, jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus de leur longueur, terminées en ogive obtuse, prises ensemble; médiocrement convexes; marquées de quatre rangées

striales de points assez petits : ces rangées à peu près à égale distance : les deux internes , prolongées distinctement jusque près de l'extrémité et postérieurement réunies : page inférieure des élytres à neuf stries, jusqu'au repli au moins dans leur partie apparente. *Repli* réduit à peu près à une tranche , par suite de l'une de ses faces repliée en dedans. *Dessous du corps* noir ou d'un noir mat et brun ; garni d'un duvet court. *Prosternum* chargé d'une carène plus anguleusement prolongée en avant qu'en arrière. *Méso* et *métasternum* constituant une saillie continue, fauve ou d'un brun fauve, presque uniformément étroite dans la plus grande partie médiaire de sa longueur , comprimée et un peu rétrécie en avant, postérieurement terminée en pointe prolongée au moins jusqu'à la moitié du deuxième arceau ventral. *Ventre* orné sur le côté de chaque arceau , d'une tache fauve ou d'un fauve testacé ou obscur. *Pieds* antérieurs fauves , à base obscure et pubescente (les autres pieds manquent).

Cette espèce, communiquée par mon ami le capitaine Godart, a été prise dans les environs d'Oran.

Obs. Peut-être est-ce l'insecte décrit par M. de Castelnau, sous le nom de *Sternolophus Solieri*, et qu'il serait difficile de reconnaître au caractère indiqué d'une pointe sternale très-courte.

Quant au *Sternolophus rufipes* de Fabricius, en adoptant pour tel l'exemplaire de la collection Dejean inscrit sous ce nom, il peut être caractérisé ainsi :

### **Sternolophus rufipes ; FABRICIUS.**

Elliptique ou ovale allongé ; noir et luisant en dessus. *Palpes* et base des antennes, testacés : extrémité des premiers, noirâtre. *Prothorax* marqué de chaque côté de deux rangées de points transversalement un peu arquées en arrière, naissant du bord latéral : la première, vers le cinquième : la deuxième, un peu après la moitié. *Ecusson* de moitié au moins plus long qu'il

est large. Elytres offrant quatre rangées striales de points très-petits, et montrant entre celles-ci les traces d'une rangée plus superficielle. Dessous du corps brun : côtés du ventre tachés de fauve. Pieds d'un fauve roux ou d'un fauve testacé : base des cuisses antérieures brièvement noirâtre et pubescente.

*Hydrophilus rufipes*, FABR. Entom. Syst. t. I. 4. p. 433. 6. — Id. Syst. Eleuth. t. 4. p. 251. 8. — HERBST, Naturg. t. 7. p. 307. 44. — De CASTELN. Histoire naturelle, t. 2. p. 54. 2.

Long. 0,0407 (4 3/4 l.). Larg. 0,0056 (2 1/2 l.).

Patrie : les Indes Orientales, la Chine.

Chez les HYDROBIAIRES les *mésosternum* et *métasternum* ne forment pas une saillie continue. Leur *métasternum*, quand il se termine en pointe, atteint à peine le niveau du bord postérieur de la hanche.

Les parties sternales fournissent, au moins pour la distinction des espèces, des caractères qui n'ont pas été utilisés. Ainsi les Hydrobies décrits dans mon Hist. nat. des Palpicornes pourraient être divisés de la manière suivante.

- A. Epistome coupé en avant en ligne à peu près droite. Tête marquée au côté interne des yeux d'une fossette ponctuée ou d'une rangée oblique de points.
- B. *Métasternum* relevé en avant en une lame à tranche horizontale aussi saillante que celle du *mésosternum* ; postérieurement terminé par une pointe libre ou détachée des parties voisines. *Mésosternum* comprimé en forme de lame à tranche horizontale ; à peu près aussi long sur cette tranche qu'il l'est à sa base. — *Oblongus*.
- BB. *Métasternum* non relevé en avant en une lame à tranche horizontale aussi saillante que celle du *mésosternum* ; non terminé postérieurement en pointe libre.
- C. *Mésosternum* relevé en lame comprimée et presque triangulaire , aussi saillante que les hanches. — *Oblongus*.
- CC. *Mésosternum* à peine apparent, beaucoup moins saillant que les hanches. — *Fuscipes*.



# NOTICE


SUR

**JEAN-THÉODOSE DOUBLIER,**

PAR

**E. MULSANT.**

(Lue à la Société Linnéenne de Lyon).



Notre ancienne Provence dans laquelle l'Entomologie a fait, dans l'espace de peu de temps, des pertes si regrettables <sup>(1)</sup>, a vu s'éteindre encore une de ces existences d'élite qui semblent avoir pour essence l'amour du bien et du beau, et pour besoin l'étude ou l'admiration des œuvres de Dieu.

En esquisant la vie de celui sur la tombe duquel je veux essayer de jeter quelques fleurs, en vous parlant d'un naturaliste admis par la Société Linnéenne au nombre de ses correspondants, j'ai non-seulement pour but de remplir un devoir imposé aux fonctions que votre bienveillance m'a confiées, je tiens surtout à acquitter une des dettes les plus chères de l'amitié.

Jean-Théodose DOUBLIER naquit le 11 janvier 1814, à Draguignan, chef-lieu du département du Var, d'une famille honorable. Enfant, il montra des dispositions précoces et un vif désir de s'instruire; dès cet âge, il sut se distinguer par cette aménité et cette douceur qui firent toujours le fond principal de

---

(1) MM. Solier et Fonscolombe, et MM<sup>mes</sup> Marie Wachanru et Louise-Caroline d'Aumont.

son caractère, et dont tous ses traits portaient si vivement l'empreinte. Il fit avec succès ses études au collège de Draguignan.

Ses rapports de tous les jours avec son oncle <sup>(1)</sup>, naturaliste distingué, la vue des échantillons nombreux rassemblés par ce savant, lui inspirèrent de bonne heure cette admiration passionnée pour les œuvres de la création, qui ne devait s'éteindre en lui qu'avec la vie. Sous les yeux de son bon parent, il commença à s'occuper de Minéralogie; mais un peu plus tard, ayant eu l'occasion de recevoir un certain nombre de Coléoptères exotiques, leurs formes si variées et si singulières, la beauté de leurs élytres parées de teintes la plupart si brillantes, lui firent prendre l'Entomologie en affection toute spéciale.

Les insectes devinrent dès lors l'objet de ses recherches. Dans ce but, combien de fois n'a-t-il pas visité le bois de Maumont, ceux de Mascarelle et du Rouet, suivi les bords de la rivière d'Argens, exploré la plaine des Maures, poussé ses excursions jusqu'à la montagne de l'Esterel ou jusqu'aux plages sablonneuses de Saint-Raphaël. Chaque promenade lui offrait des conquêtes faciles et l'enchainait par des liens plus forts à cette étude attachante. Tel est l'avantage de l'histoire naturelle : les objets compris dans son domaine sont si nombreux, que sans sortir des limites d'un cercle assez restreint, elle peut sans cesse fournir des aliments nouveaux à la mobilité toujours renaissante de nos désirs.

La mort de son père <sup>(2)</sup> lui imposa une charge bien douce et bien facile pour son cœur, celle de servir à sa mère de protecteur

---

(1) Dominique Doublier, aujourd'hui président de la Société d'Etudes scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan, et membre de diverses autres Sociétés savantes.

(2) Il mourut le 27 mai 1859, âgé de soixante et un ans. Il était premier adjoint au maire de Draguignan, et l'un des membres de la maison de commerce établie sous la raison sociale de Clément frères et C<sup>ie</sup>.

et d'appui, de l'entourer encore de plus d'amour, s'il était possible, pour lui faire oublier son veuvage. Dès ce moment, il identifia pour ainsi dire sa vie avec la sienne. Malgré le bonheur apporté plus tard, dans son intérieur, par celle qu'il se plaisait à nommer un ange de vertu et de modestie, il ne put jamais se séparer de celle qui lui avait donné le jour, ni rien diminuer des soins affectueux qu'il lui prodiguait.

Un cœur doué d'une tendresse filiale si vive, ne pouvait être insensible aux peines des autres. Sa charité inépuisable envers les pauvres ne se bornait pas à ouvrir sa bourse aux misères notoires, sa main discrète allait surtout chercher celles qui se cachaient. Il semblait avoir des soulagements pour toutes les souffrances, des baumes pour toutes les douleurs : il se faisait tout à tous.

Il avait été investi, le 1<sup>er</sup> octobre 1859, de la charge de greffier du tribunal de Commerce de Draguignan, et malgré l'exactitude et la régularité avec lesquelles il s'acquitta toujours de ses fonctions, il sut distribuer ses heures de manière à donner à l'histoire naturelle une bonne partie de son temps.

Des circonstances particulières me fournirent, il y a plus de vingt ans, l'occasion d'être son premier correspondant. Les rapports qui s'établirent entre nous à cette époque, et qu'il sut toujours rendre si agréables, ne tardèrent pas à se changer en une amitié intime, dont le temps, loin d'altérer les douceurs, resserra de plus en plus les nœuds.

Je serais bien oublieux d'ailleurs, si je ne redisais ici de combien d'espèces rares ou même inédites <sup>(1)</sup> je lui ai été redevable, durant les quatre lustres de nos relations si nombreuses ; si je ne faisais rejaillir sur lui toute la gloire de ces découvertes. Puissent les deux Coléoptères <sup>(2)</sup> chargés de transmettre son

(1) *Oxypleurus Nodieri*, *Niphona picticornis*, *Bolbocerus gallicus*, etc.

(2) *Harmonia Doublieri*. — *Hymenorus Doublieri*.

nom aux entomologistes à venir, leur faire connaître aussi toute ma reconnaissance !

Vers le milieu d'octobre 1845, il vint visiter Lyon qu'il ne connaissait pas encore. Les jours qu'il passa dans nos murs furent pour tous les amis de l'Entomologie des moments de fête. Il visita ceux d'entre eux qui se trouvaient alors à la ville <sup>(1)</sup>, admira leurs belles collections, et s'en retourna plus attaché que jamais à l'étude de l'histoire naturelle.

L'année suivante, il voulut parcourir les montagnes de la Grande-Chartreuse, et recueillir de sa main les espèces alpines dont sa collection ne s'était jusqu'alors enrichie qu'avec le secours de ses amis. De Dranguignan, il se dirigea sur Saint-Bonnet, dans les Hautes-Alpes, butina sur une partie de sa route, visita Grenoble, et arriva le 20 juillet au monastère, où nous nous étions donné rendez-vous. La route si accidentée et si pittoresque qui depuis Fourvière se déroule en sinuosités nombreuses sur les rives du torrent ; les roches gigantesques et souvent perpendiculaires dont elle est bordée ; ces sapins qui semblent pendre sur la tête du voyageur, ou qui d'autres fois, échelonnés sur ces pics dentelés, offrent l'image des géants cherchant à escalader les cieux ; ces eaux, parfois profondément encaissées, qui descendent en se brisant contre les roches dont leur lit est obstrué ; l'horizon borné qu'on a devant soi, et dont le tableau mobile change presque à chaque pas ; l'imposante majesté du désert, tout contribua à électriser son imagination facilement impressionnable ; il arriva au couvent ému de plaisir et d'admiration. D'autres surprises l'attendaient bientôt. Ces forêts antiques, ces prairies émaillées de fleurs, allaient lui offrir une multitude de Coléoptères qui jamais ne s'étaient présentés vivants à ses yeux.

La Grande-Chartreuse sera toujours la terre promise pour nos entomologistes. Malgré les soins de l'administration forestière à

---

(1) MM. E. Armand, Foudras, Gacogne, Guillebeau, G. Levrat, Merck, Perroud et Rey.

tirer parti des bois en temps utile, à ne pas les abandonner aux outrages des ans et des vers rongeurs, une foule d'arbres de diverses essences, des sapins surtout, nés sur des points où la hache ne peut aller les frapper, deviennent à leur déclin le berceau d'un grand nombre d'insectes ; ceux-ci descendent ensuite de ces hauteurs, pour visiter les ombelles des prés.

Les trois jours passés dans ces lieux ne purent émousser ses jouissances. Longtemps après, il aimait à se rappeler les moments passés le soir à la fenêtre de sa cellule, à contempler, par un beau clair de lune, ces remparts naturels servant à enclore le désert, et sur lesquels viennent expirer les derniers bruits du monde ; à reposer ses regards sur les sombres rideaux de sapins déployés devant lui ; à les élever vers ce grand Som, dont la tête chauve semble soutenir la voûte des cieux ; à prêter l'oreille à ce silence, ailleurs inconnu, que troublaient seuls les cris lugubres de l'oiseau des ténèbres, ou la voix sonore de la cloche du couvent. Il vit encore une fois Lyon à son retour.

En 1845, dans un voyage entrepris avec deux de mes amis <sup>(1)</sup>, dans le midi de la France, nous arrivâmes à Draguignan dans la première quinzaine de juin. Nous reçûmes de la famille Doublier cet accueil d'une cordialité empressée dont l'amitié la plus affectueuse peut seule trouver le secret. Pendant trois jours, nous parcourûmes, sous la conduite de notre ami, les localités les plus favorisées, et nous trouvâmes à nous y enrichir de quelques-uns des insectes les plus rares de ces contrées privilégiées.

Peu de temps après notre départ, le cœur de Doublier, si bien fait pour aimer, se trouva livré à une préoccupation à laquelle se rattachait le bonheur de sa vie. L'amour et la raison, si rarement d'accord, semblaient s'être entendu cette fois pour le

---

(1) MM. Gacogne et Léon Olph-Galliard.



guider dans le choix d'une compagne. Après cinq mois d'espérances et de craintes, ses vœux finirent par être exaucés, et le 21 décembre 1845, il épousait M<sup>lle</sup> Marie-Adèle Porre.

Rien ne manqua dès lors à sa félicité, si ce n'est de voir un être nouveau venir resserrer encore les liens de son heureuse union. Après quatre ans et demi d'attente le Ciel exauça ses desirs ; il lui naquit une fille, le 18 mai 1850.

Quelques mois après, dans un nouveau voyage dans le midi, j'arrivai à Draguignan dans la soirée du mercredi 28 août ; je n'oublierai jamais cette date. Notre ami, prévenu de ma visite, m'attendait à la ville, pour me conduire à sa campagne, où se trouvait sa famille. Le plaisir d'être ensemble, les douces causeries, la diversité et la richesse des produits de ce sol méridional, nous firent parcourir, sans nous en douter, la distance à franchir. Le ciel était empourpré des derniers rayons du jour, quand nous touchions au but de notre promenade. Je revis là sa bonne mère, qui cinq ans auparavant avait eu pour nous des soins si attentifs et si délicats ; je donnai à sa jolie fillette un baiser, qui devait être aussi le dernier ; et je fus présenté à sa jeune femme qu'il me tardait de connaître. L'esquisse charmante qu'il m'en avait tracée n'avait rien de flatté ; si j'avais eu à peindre la douceur unie à la grâce, je n'aurais pas choisi d'autre modèle. Le souper nous attendait. L'amitié s'était chargée d'y ajouter tous ses charmes. La table avait été dressée dehors, devant la maison, sous le voile étoilé de la nuit, près du jardin, dont les fleurs caressées par la brise légère, nous envoyaient les parfums de leurs odorantes corolles. Des insectes crépusculaires inconnus à nos contrées <sup>(1)</sup>, attirés par l'éclat des flambeaux, venaient s'abattre sur la nappe et nous procurer les plaisirs d'une chasse facile. Jamais, je crois, jouissances plus douces ne me firent passer des mo-

---

(1) Des *Vesperus strepens* ♂.

ments plus délicieux. Hélas, qui m'aurait dit que peu d'années après, je serais le seul survivant de tous ceux avec lesquels j'étais alors si joyeusement attablé !

Le lendemain, après une visite à son frère, nous passâmes en revue les richesses de son cabinet. Outre les insectes, il offrait une petite collection d'oiseaux empaillés avec beaucoup d'art, des coquillages et diverses autres productions naturelles. Il me fit faire la connaissance de M. Jaubert, amateur plein de zèle et de talent, qui depuis a malheureusement délaissé l'entomologie pour l'étude des fossiles. Puis, pressé par le temps, il fallut m'arracher à ses instances et prendre la route de Toulon, sans avoir pu faire une excursion dans les alentours.

C'était pourtant là un des plaisirs qui avaient pour lui le plus de douceur, que celui de passer quelques journées avec d'autres amis de la nature, de les conduire dans les lieux les plus riches en espèces rares, de leur fournir l'occasion de se féliciter des moments passés près de lui. Combien de fois n'a-t-il pas ainsi piloté les entomologistes de passage <sup>(1)</sup> sur son département ? Sa générosité, pour ceux qui le favorisaient d'une visite, était souvent embarrassante. Dans son empressement à leur être agréable, il leur offrait jusqu'aux objets uniques de ses collections, il les forçait à les accepter, s'il avait cru lire dans leurs yeux le simple désir de les posséder.

Doublier se préparait à donner le Catalogue des Coléoptères du département <sup>(2)</sup>. Il aurait pu se faire plus spécialement connaître dans la science, en mettant au jour ses découvertes ou ses observations, si le manque d'ouvrages et une foule d'autres obsta-

---

(1) MM. Arias, Bompart, de Cérisy, Foudras, l'abbé Fournier, Gabillot, Gacogne, Guérin, Hanri, l'abbé V. Mulsant, Perroud, Rey, Robert, Schaum, etc. Outre les personnes déjà nommées, il avait eu divers correspondants : MM. Billot, de Haguenau ; Ecoffet, de Nîmes ; d'Aumont ; Donzel, de Lyon ; Gaubil ; Wachanra, de Marseille, etc.

(2) Dans le second volume du *Prodrome d'histoire naturelle*, dont le premier tome venait alors de paraître.

cles ne rendaient toute publication bien difficile pour un habitant de la province, surtout pour celui qui est éloigné des grands centres de population. Ses penchants d'ailleurs ne le poussaient pas vers la renommée. L'étude de l'Histoire naturelle était une distraction qui plaisait à ses goûts ; il ne cherchait rien au-delà des jouissances agréables qu'elle lui procurait. La Société Linnéenne de Lyon l'avait admis au nombre de ses correspondants ; sa modestie ne lui avait jamais permis d'ambitionner l'honneur d'appartenir à un autre corps savant.

J'en aurais sans doute dit assez pour faire connaître l'entomologiste, et surtout l'homme aimable et bon par excellence ; peut-être devrais-je me borner à raconter comment s'est terminée cette existence si douce et néanmoins si bien remplie. Mais quelques uns des détails qui vont suivre m'ont paru si touchants, que je n'ai pu résister au désir de les rapporter. Ils serviront d'ailleurs à compléter cette notice.

Doué de cette droiture de cœur qui semble devenir de plus en plus rare, doté des qualités les plus aimables, de toutes celles qui constituent l'homme de bien, il ne manquait, faut-il le dire, il ne manquait à Doublier, distrait par les occupations de la vie, que de remplir plus exactement tous les devoirs de la religion, pour être en tous points le modèle le plus accompli. Le voir arriver à cet état de perfection, était le rêve de M<sup>me</sup> Doublier, l'objet incessant de ses prières. C'était trop peu pour elle que d'être unie à lui durant les jours si courts que nous avons à passer sur la terre, elle voulait avoir l'assurance de n'être pas séparée de son ami pendant cette vie future, au sein de laquelle la mort n'aura plus d'empire.

Un soir du mois de janvier 1852 <sup>(1)</sup>, tourmentée d'une manière plus vive par cette pensée, elle se jette à genoux aux pieds de son lit, et les yeux humides de larmes : Mon Dieu ! mon

---

(1) Epoque durant laquelle avaient lieu, à Draguignan, les exercices du Jubilé.

Dieu ! s'écrie-t-elle dans son cœur, serais-je destinée, après avoir goûté ici bas avec mon époux un bonheur sans mélange, à ne pas le voir partager avec moi la félicité promise à ceux qui vous auront servi fidèlement ? Ah ! plutôt qu'il en soit ainsi, coupez le fil de cette vie qui se montre encore à moi sous un jour si riant ; exigez, s'il le faut, un sacrifice plus pénible encore ; mais ô mon Dieu ! prêtez l'oreille aux supplications que je vous adresse pour cet autre moi-même. Elle se relève alors avec confiance. Sa prière était animée d'une foi trop vive pour n'être pas écoutée... Le lendemain ses vœux étaient exaucés !

Hélas ! le bonheur parfait ne peut durer sur la terre. Celui dont jouissaient ces époux fut mis, un an après, à une rude épreuve. La fille que le Ciel leur avait accordée après cinq ans environ d'attente et de prières, cette enfant dont les qualités aimables et précoces faisaient l'admiration de tous, cet objet de leur joie et de leur orgueil, leur fut enlevée le 31 janvier 1855.

Pour faire diversion à cet événement cruel, et pour se distraire tous les deux de la pensée d'une perte si douloureuse, le voyage de Rome fut résolu ; mais captivé par les obligations de la recette municipale <sup>(1)</sup> qui lui avait été confiée depuis quelques années, notre ami fut obligé de renoncer, pour son compte, à ce projet, dont la non réalisation lui causa de profonds regrets jusqu'à la fin de sa vie. Son épouse partit donc seule avec son oncle. Elle s'embarqua à Marseille ; visita Gènes et Florence. Dans la capitale du monde catholique, elle assista aux cérémonies si émouvantes de la semaine sainte. Notre ambassadeur à Rome, dont Doublier avait l'honneur d'être personnellement connu, M. le comte de Rayneval, si obligeant pour tous,

---

(1) Il avait cédé sa charge de greffier du tribunal de Commerce de Draguignan le 20 mai 1844, et avait été nommé receveur municipal le 25 mai 1847, fonctions qu'il a exercées jusqu'à sa mort.



lui procura toutes les facilités possibles pour augmenter les agréments de son séjour dans la ville éternelle ; il lui fit même obtenir, le mercredi après Pâques, une audience particulière du Souverain Pontife. Elle poursuivit sa route jusqu'à Naples, où MM. Costa, ces naturalistes si connus, eurent pour elle et pour son oncle ces attentions délicates qu'on est si heureux de trouver sur une terre étrangère. Depuis Gênes, leur petite caravane s'était enrichie de la compagnie de M. l'abbé Claire, doyen de la faculté de théologie de Paris ; il voulut bien partout leur servir de cicérone ; il sut leur faire oublier une partie des ennuis et des longueurs du voyage. M<sup>me</sup> Doublier rentra le 10 mai, à Dragaïgnan, émerveillée de tout ce qu'elle avait vu.

Pendant l'absence de son épouse, notre ami cherchait dans la chasse aux insectes une distraction à ses chagrins ; mais le coup qu'il avait reçu avait été si rude, qu'il se plaignait de ne pouvoir plus faire de longues excursions.

Ses sentiments, depuis la mort de sa fille, avaient pris un caractère plus profondément religieux. Il aimait à se la figurer au milieu des esprits célestes qui entourent le trône de Dieu. Dès ce jour, il ne cessa de l'invoquer comme un ange protecteur, de la conjurer de lui servir de guide, et de venir à sa dernière heure lui adoucir le passage de cette vie à l'autre. Quelquefois après cette prière : Il me semble, répétait-il à sa bien-aimée, il me semble que je ne craindrais pas la mort ! On aurait dit qu'il pressentait sa fin prématurée. Et cependant tout était fait pour l'attacher encore à ce monde !

Il venait d'avoir depuis peu l'espérance d'obtenir un nouveau gage de la fécondité de son épouse, quand après une course faite par un temps froid, une pneumonie se déclara. À peine commençait-il à être hors de danger, qu'une autre maladie, la suette, le jeta bientôt dans un délire prolongé. Il recouvra enfin assez de lucidité pour recevoir et apprécier les consolations et les secours que la religion accorde au chrétien mourant. Puis,



tout à coup, ses yeux prirent une vivacité extraordinaire ; les bras tendus , il s'efforçait de soulever son corps affaibli ; ses lèvres murmuraient le nom de sa fille chérie. Il voyait sans doute alors cet ange qu'il avait si souvent invoqué, venir au-devant de son âme pour la conduire dans les voies de l'éternité. Après dix minutes de ce spectacle saisissant, pendant lequel les assistants attendris fondaient en larmes , il abandonna sa main à celle qu'il avait tant aimée, pour lui faire sentir les derniers mouvements d'un cœur qui n'avait cessé de battre pour elle. Bientôt les ombres de la mort commencèrent à l'envelopper , et quelques moments après il exhalait son dernier soupir. C'était le dimanche 15 janvier 1854 , vers les dix heures du soir.

La nouvelle de ce douloureux événement ne plongea pas seulement dans le deuil ses parents et ses amis. Le nom de Doublier inspirait tant de sympathie, il était si universellement aimé, que la population de la ville presque tout entière, se porta spontanément à ses funérailles. Riches et pauvres , chacun voulut se faire un devoir de lui dire un suprême adieu. Aucun discours ne fut prononcé sur sa tombe ; mais la tristesse peinte sur tous les visages , les larmes abondantes qui coulaient des yeux , exprimaient avec une éloquence plus saisissante que les paroles , la perte cruelle que le pays venait de faire.

Quand l'ange de la mort a pris son vol vers une maison , il est rare qu'il ne revienne pas frapper d'autres coups , à des distances plus ou moins rapprochées. Qui de nous a vécu un peu de temps sans en faire la triste expérience ! La famille Doublier en offrit une nouvelle preuve. Une des tantes de notre ami, veuve de l'ancien bibliothécaire de la ville , le suivit de près. Sa pauvre mère , qui aurait donné mille fois sa vie pour la sienne , termina son existence le 15 décembre suivant. Dans les premiers mois de 1855 , l'un de ses oncles, receveur de l'hospice et son successeur en qualité de receveur municipal , paya son tribut. Enfin le 25 septembre de la même année , sa veuve désolée,

subit le même sort. Depuis le printemps , elle s'était retirée à la campagne pour y sevrer son enfant né cinq mois après le décès de son père. Elle n'y put échapper au fléau qui décimait Draguignan ; elle fut atteinte de la suette , et mourut en tournant ses derniers regards sur sa fille, qu'elle laissait orpheline à seize mois !

Pauvre enfant ! dont le front , à votre naissance , a été voilé d'un crêpe funèbre ! Vous, qui n'avez jamais connu la douceur des baisers d'un père ; vous , qui avez vu s'éteindre une mère si parfaite , au moment où à peine vous commenciez à bégayer son nom , et à sentir le prix de ses soins et de son amour ! Si jamais ces lignes tracées par l'amitié venaient à tomber sous vos yeux , puissent-elles vous dire de quels excellents parents vous êtes issue ! Lorsqu'on sait , comme eux , passer sur la terre en y faisant le bien, s'y concilier l'estime et l'affection, on laisse, dans le cœur de ceux qui nous ont connu , des regrets vivement sentis, et que le temps, destructeur de toutes choses, ne saurait complètement effacer !

---

## DESCRIPTION

DE

### DEUX NOUVELLES ESPÈCES D'OISEAUX MOUCHES,

PAR

**J. BOURCIER et E. MULSANT,**

---

#### **Trochilus Idallae.**

*Bec* médiocre ; assez faiblement arqué ; subcylindrique ; graduellement et peu sensiblement rétréci jusque près de l'extrémité, où il est subcomprimé et terminé en pointe ; à mandibule supérieure noire, un peu incurbée à l'extrémité : l'inférieure, d'un blanc flavescent ou carné, à extrémité brune ou d'un brun noir. *Tête* brune ; parée au-dessus des yeux d'une bande sourcilière d'un roux très-pâle. *Cou* orné de plumes en partie d'un mi-doré cuivreux, à barbes basilaires et terminales brunes, voyant en partie la couleur mi-dorée. *Dos* vert, luisant. *Couvertures caudales* à plumes vertes sur le disque, avec l'extrémité de chaque barbe allongée, grêle ou linéaire et d'un roux très-pâle ou d'un pâle roussâtre. *Ailes* falciformes, étroites ; aussi longuement prolongées que les rectrices intermédiaires ; d'un brun violacé, à couvertures vertes. *Queue* à dix rectrices ; assez étroites ; luisantes : les médiaires d'un vert cendré : les submédiaires à externes passant graduellement au vert noir ou au brun noir : toutes progressivement blanches à l'extrémité : les médiaires, à peine plus longues que tout le corps depuis l'extrémité du bec ; les submédiaires à externes graduellement plus courtes : les ex-

ternes, à peine égales, depuis leur base, à la moitié de la longueur des médiaires. *Dessous du corps* roux ou d'un roux canelle assez vif sur la gorge et la poitrine, passant graduellement au roux pâle et au blanc roussâtre, postérieurement. *Couvertures sous-caudales* flexibles; assez longues; d'un blanc sale. *Page inférieure de la queue* un peu plus pâle que la supérieure, à reflet légèrement violâtre. *Pieds* d'un blanc sale, ou livides; non emplumés.

Cette espèce habite l'intérieur du Brésil.

Elle appartient au même groupe que le *Davidianus* de Lesson.

### **Trochilus Aspasie.**

*Bec* médiocre; faiblement arqué; graduellement et faiblement rétréci jusque près de l'extrémité où il est subcomprimé et terminé en pointe; à mandibule supérieure noire; à mandibule inférieure blanche ou d'un blanc flavescent dans sa première moitié, noire dans la seconde. *Tête* brune; parée au-dessus des yeux d'une bande sourcilière d'un blanc roussâtre naissant vers le milieu de chaque œil, et prolongée en arrière, peu marquée en devant. *Cou* revêtu de plumes en partie brunes, en partie d'un bronzé mi-doré. *Dos* d'un vert brun. *Couvertures caudales* formées de plumes soyeuses, allongées, d'un roux foncé, prolongées jusqu'à la moitié des rectrices médiaires. *Ailes* falciformes, étroites; à peine prolongées jusqu'à l'extrémité des rectrices sub-externes; offrant les deux baguettes extérieures plus fortes; brunes, avec les couvertures légèrement bronzées ou d'un bronzé mi-doré. *Queue* à dix rectrices; assez étroites; luisantes: les médiaires bronzées à la base, puis d'un brun noir légèrement bronzé, avec l'extrémité d'un blanc roussâtre passant graduellement au blanc: les submédiaires à externes offrant progressivement noires les parties bronzées, avec les bords d'un blanc roux

ou d'un roussâtre moins pâle près de la base que vers l'extrémité : les médiaires aussi longues que les deux cinquièmes de toute la longueur du corps depuis l'extrémité : les submédiaires un peu moins longues que les médiaires : les autres, graduellement plus courtes : les externes, à peine égales aux trois cinquièmes des médiaires. *Dessous du corps* entièrement d'un roux foncé, paré d'une bande suboculaire noire, naissant vers la moitié inférieure de chaque œil et prolongée en arrière. *Couvertures sous-caudales* rousses, soyeuses, prolongées presque jusqu'à l'extrémité des rectrices externes. *Page inférieure de la queue* offrant les parties foncées d'un noir violâtre sur les médiaires, d'un brun noir violâtre sur les autres. *Pieds* blancs ; dénudés.

PATRIE : la Nouvelle-Grenade.

Cette espèce appartient au même groupe que la précédente.

---



DESCRIPTION  
DE LA  
LARVE DU LUDIVS FERRUGINEVS, LINN.

PAR  
M. MULSANT et GUILLEBEAU.

(Lue à la Société Linnéenne de Lyon, le 14 juillet 1836.)

---

*Larve* allongée ; presque cylindrique ; hexapode ; de douze anneaux outre la tête ; revêtue d'une peau coriace ou parcheminée, lisse, luisante, en majeure partie d'un flave testacé ou d'un flave orangé, suivant l'âge ou les circonstances, avec les extrémités, et divers signes plus foncés sur les autres anneaux. *Tête* d'un roux fauve ; au moins aussi longue que large ; à peine arquée sur les côtés ; un peu rétrécie d'arrière en avant ; échancrée et denticulée à son bord antérieur ; dirigée en avant ; déclive et moins épaisse d'arrière en avant ; déprimée en dessus, un peu inégale ; rayée de deux sillons longitudinaux, un peu en zig-zag, situés chacun près de la ligne médiane, naissant vers le bord antérieur et prolongés jusque vers les deux tiers de la longueur ; marquée de chaque côté, près de son bord postérieur, de trois points enfoncés, transversalement disposés, donnant chacun naissance à un poil souvent usé ; à suture cervicale, représentée par deux lignes postérieurement réunies presque en demi-cercle, formant une figure ovalaire ouverte en devant et avancée jusqu'à la moitié de la longueur, où chaque ligne se dirige transversalement vers le bord latéral. *Epistome* marqué de chaque côté de la ligne médiane, d'un point enfoncé vers la base du labre : celui-ci, court, étroit, situé dans une échancrure de l'épistome. *Mandibules* saillantes ; arquées ; cornées ; noires ; terminées en pointe à leur extrémité ; armées d'une forte dent au milieu de leur

côté interne. *Antennes* insérées au côté externe de la base des mandibules : de quatre pièces : la basilaire, subglobuleuse, membraneuse, blanchâtre : les autres d'un flave roux ou d'un roux fauve : la deuxième grosse, presque cylindrique, plus longue que les deux suivantes prises ensemble : la troisième, presque cylindrique, offrant de chaque côté à son extrémité, une saillie, courte, conique, membraneuse : la quatrième, grêle, conique, terminée par un poil. *Echancrure progéniale* prolongée jusqu'aux deux tiers du dessous de la tête ; remplie par les mâchoires et par le menton, et par trois petites pièces situées en arrière des précédentes, et disposées d'avant en arrière dans l'ordre ci-joint : deux, une : les trois pièces antérieures d'un flave orangé, allongées, presque parallèles : les mâchoires un peu plus étroites postérieurement que le menton. *Mâchoires* bi-articulées ; garnies au côté interne d'une membrane ciliée. *Palpes maxillaires* dépassant en devant les mandibules dans l'état de repos ; d'un roux fauve ; coniques ; de quatre articles. *Palpes labiaux* de même couleur que les précédents ; de moitié plus courts ; coniques ; de deux articles. *Corps* presque cylindrique jusqu'au onzième anneau inclusivement ; rayé d'une ligne longitudinale médiane ; offrant sur chacun des onze premiers anneaux : 1° un point enfoncé, latéral, près du bord antérieur : 2° deux lignes obscures en forme de V incomplet postérieurement, situées près du bord antérieur, et de chaque côté, une autre un peu plus en dehors : 3° un anneau linéaire obscur, situé près du bord postérieur : 4° deux points enfoncés donnant chacun naissance à un poil souvent usé, situés près du bord postérieur, l'un, vers le bord latéral : l'autre, entre celui-ci et la ligne médiane : 5° une ligne longitudinale située de chaque côté et raccourcie à ses extrémités sur chaque arceau : le premier segment ou prothoracique plus foncé, d'un roux fauve, aussi long environ que les deux suivants réunis, offrant de plus que les autres de chaque côté de la ligne médiane : 1° deux points

enfoncés près du bord antérieur : l'un, près de la ligne du milieu : l'autre, entre celui-ci et le latéral : 2° deux lignes transversales, formant avec leurs pareilles une sorte d'arc interrompu et dirigé en arrière, près du bord antérieur : 2° un faisceau de lignes longitudinales courtes et obscures, près de l'anneau linéaire, entre la ligne du milieu et le bord latéral : sur cet anneau les deux lignes en forme de V sont situées près de la moitié de la longueur, et les lignes latérales manquent ou sont peu marquées : anneaux cinq à onze presque égaux : le douzième plus long que le onzième, en cône obtus ; marqué de points enfoncés un peu irrégulièrement disposés, donnant chacun naissance à un poil ; offrant son arceau inférieur à peine prolongé au-delà du sixième basilaire de sa longueur, arrondi en demi-cercle à son extrémité : cet arceau raccourci offrant, outre l'an us, un petit mamelon exsertile servant à la marche de la larve. *Dessous du corps* plus pâle que le dessus ; montrant sur le premier arceau une pièce en angle très-ouvert, dirigée en arrière et appuyée contre la première paire de pieds : cette pièce paraissant représenter le prosternum. *Pieds* au nombre de six, disposés par paire sous chacun des trois premiers segments ; de longueur médiocre ; formés de quatre pièces, garnies en dessous de poils spinosules : la dernière terminée par un ongle assez long. *Stigmates* au nombre de neuf paires : la première ou thoracique, située près du bord antérieur du deuxième anneau, ou joignant la ligne longitudinale servant à séparer les arceaux supérieurs des inférieurs : les huit autres paires, un peu plus en dehors, sur les quatrième à onzième segments.

Long. 0,0247 (14 l.).

Cette larve vit dans les parties gâtées ou dans le terreau de divers arbres, et y subit sa métamorphose en nymphe. L'insecte parfait paraît en juin ou juillet.

## INTRODUCTION.

### HÉTÉROMÈRES.

#### DEUXIÈME DIVISION.

La deuxième division des Hétéromères de France, a pour caractères: *Hanches antérieures* oblongues et allongées, obliques ou contiguës. *Antennes* insérées à découvert ou peu voilées à la base. *Ongles* rarement peclinés et dans ce cas, tête inclinée, soit paraissant appliquée contre le prothorax, soit séparée de lui par un nodule ou sorte de cou, mais non enfoncée dans ce segment.

Les insectes de la division précédente, les premiers Latigènes du moins, destinés par leur défaut d'ailes à une existence toute terrestre, avaient besoin d'une conformation en harmonie avec leur genre de vie. Obligés de chercher une retraite soit dans le sol, soit sous divers corps chargés de les cacher ou de leur offrir un abri durant leur repos, les joues forment sur les côtés de leur tête un rebord plus ou moins large, qui parfois se prolonge sur les yeux en forme de canthus pour protéger ces organes de la vision. Leurs pieds, uniquement destinés à la marche, ont les hanches de devant globuleuses et le plus souvent séparées par le prosternum.

Ici, ces hanches qui déjà chez les derniers Pectinipèdes ont offert des modifications dans leur forme, sont oblongues ou allongées, obliques et presque toujours contiguës, pour répondre aux besoins d'une vie de relation différente, et les antennes sont insérées à découvert, ou à peine voilées à leur base par un rebord à peine indiqué.

Ces derniers Hétéromères peuvent être répartis dans les Tribus suivantes :

Tête			
	non prolongée en forme de museau.	Base du prothorax généralement aussi large que celle des élytres.	<p>Tête toujours engagée dans le prothorax ; plus étroite que celui-ci ; le plus souvent verticale ou inclinée. Antennes insérées vers le milieu du côté interne des yeux : ceux-ci, oblongs, situés longitudinalement ou obliquement sur les côtés de la tête. Palpes maxillaires généralement longs ; à dernier article plus ou moins allongé.</p> <p style="text-align: right;">Tribus.</p> <p style="text-align: right;">BARDIPALPES.</p>
	Base du prothorax plus étroite que celle des élytres.	Antennes filiformes ou plus grosses vers l'extrémité	<p>Tête accolée contre le prothorax, c'est-à-dire ne paraissant ni engagée dans ce segment, ni séparée de lui par un nodule ou sorte de cou ; verticale ou inclinée. Prothorax plus large à sa partie postérieure ; souvent bispinué à la base. Pieds postérieurs ordinairement allongés.</p> <p style="text-align: right;">LONGIPÈDES.</p>
		Ongles simples.	<p>Tête penchée. Premier arceau du ventre ordinairement moins long près de l'origine des cuisses que le second. Elytres larges, surtout après la moitié de leur longueur.</p> <p style="text-align: right;">LATIPENNES.</p>
			<p>Tête verticale ou inclinée ; le plus souvent séparée du prothorax par un nodule ou sorte de cou. Premier arceau du ventre ordinairement plus long vers l'origine des cuisses que le deuxième. Elytres de largeur médiocre.</p> <p style="text-align: right;">COLLIGÈRES.</p>
			<p>Ongles divisés. Tête inclinée ; séparée du prothorax par un nodule ou sorte de cou.</p> <p style="text-align: right;">VÉSICANTS.</p>
			<p>Antennes sétacées ou plus minces vers leur extrémité. Tête penchée ; engagée dans le prothorax ou non séparée de lui par un nodule. Prothorax plus étroit près de sa base que vers sa partie antérieure. Corps ordinairement allongé, souvent étroit.</p> <p style="text-align: right;">ANGUSTIPENNES.</p>
	prolongée en forme de museau.	Antennes grossissant plus ou moins vers l'extrémité ; insérées en avant des yeux : ceux-ci, semi-globuleux.	<p style="text-align: right;">ROSTRIFÈRES.</p>



## TRIBU

## DES

## BARBIPALPES.

**CARACTÈRES.** *Tête* non prolongée en devant en forme de museau ; toujours engagée dans le prothorax : plus étroite que celui-ci ; le plus souvent verticale ou inclinée. *Antennes* insérées vers le milieu, ou souvent un peu après, du côté interne des yeux : ceux-ci oblongs, situés longitudinalement ou obliquement sur les côtés de la tête ; rarement d'une manière subtransversale. *Palpes maxillaires* généralement longs, souvent inclinés ; à dernier article plus ou moins allongé , le plus souvent en forme de coute ou de hache. *Hanches antérieures* obliques ou allongées, le plus souvent contiguës ou non séparées par un prosternum aussi saillant qu'elles. *Ventre* de cinq arceaux, ou offrant rarement chez quelques ♂ une partie du sixième arceau visible. *Tarses* antérieurs et intermédiaires de cinq articles : les postérieurs de quatre. *Ongles* ordinairement simples ; rarement armés d'une dent.

De tous les caractères particuliers à ces Hétéromères, la longueur de leurs palpes maxillaires souvent pendants ou inclinés comme la barbe d'un vieillard, semble leur signe le plus distinctif, et justifier le nom de *Barbipalpes* donné aux insectes de cette tribu.

## ETUDE DES PARTIES EXTÉRIEURES DU CORPS.

Les pièces dont se compose l'enveloppe extérieure du corps de ces petits animaux offre, comme dans toutes les autres tribus, des modifications plus ou moins sensibles qui concordent avec le genre de vie de ces insectes.

La *tête*, parfois simplement penchée, le plus souvent subperpendiculaire ou inclinée, se rapproche ordinairement soit de la forme arrondie, soit de celle d'une sorte de triangle tronqué en devant et presque équilatéral ; mais d'autres fois elle est plus ou moins brusquement rétrécie en devant, à partir du bord antérieur des yeux. En général elle s'enfonce profondément dans le prothorax, quelquefois au point d'être voilée par ce dernier comme par un capuchon, quand l'insecte est examiné

perpendiculairement en dessus : chez quelques espèces au contraire, comme les Mélandryes en offrent l'exemple, elle se dégage sensiblement du segment thoracique.

Le *labre*, toujours très-visible, affecte habituellement la forme d'un parallélogramme transverse, parfois faiblement échancré au milieu de son bord antérieur.

Les *mandibules*, cornées, courtes, très-arquées, voilées par le labre ou ordinairement peu visibles dans l'état de repos, sont tantôt en pointe, tantôt bidentées à l'extrémité, et parfois armées en outre, près de celle-ci, d'une autre dent qui les semble montrer tridentées en devant.

Les *mâchoires* sont presque membraneuses et divisées en deux lobes, dont l'extérieur presque droit, chez quelques-uns, courbé sur l'interne chez le plus grand nombre, est généralement plus gros et plus cilié.

Les *palpes maxillaires*, habituellement allongés, souvent pendants ou inclinés, sont composés de quatre articles, dont les trois premiers offrent dans leur conformation plus de diversité que chez la plupart des insectes des autres tribus. Le dernier, comprimé et plus ou moins allongé, est tantôt en forme de cône, comme dans les Conopalpes; tantôt subparallèle dans sa moitié basilaire et obliquement coupé dans la seconde, comme chez les Tétratomes; tantôt enfin il affecte la figure d'un couteau ou d'une hache. Souvent alors son bord inférieur ou le plus long est membraneux ou presque pulpeux et creusé d'un sillon longitudinal, indiquant que le bord de chacun des côtés cornés est resté libre dans ce point, ou ne s'est qu'imparfaitement soudé à son pareil.

Le *menton*, toujours assez étroit pour laisser à découvert la base des mâchoires, s'élargit d'arrière en avant chez les uns, se montre presque carré ou parallélipipède chez les autres, avec son bord antérieur entier ou peu échancré.

La *languette*, membraneuse ou d'une faible consistance, est souvent presque entière; d'autres fois échancrée, comme chez les Osphyes.

Les *palpes labiaux*, toujours courts, cachés chez un grand nombre, par suite de l'inclinaison de la tête et de son rapprochement de la poitrine, sont composés de trois articles dont le dernier est ordinairement le moins gros.

Les *joues*, en général peu développées, n'entament quelquefois pas les yeux d'une manière sensible; chez quelques-uns, comme chez les Serropalpes, elles forment une sorte de sillon, élargi d'arrière en avant, que semble rendre plus prononcé le bord latéral et tranchant du front.

L'épistome est toujours transverse et séparé du labre et du front par un sillon ou du moins par une suture plus ou moins distincte.

Le front, parfois très-rétréci par les yeux, comme quelques Orchésies en offrent l'exemple, montre chez les autres une étendue variable.

Les yeux, situés sur les côtés de la tête, y affectent une direction un peu variable. Chez les uns, ils suivent à peu près la ligne longitudinale des côtés ; chez d'autres, ils vont s'écartant l'un de l'autre vers leur partie antérieure, et se montrent ainsi plus ou moins obliques ; plus rarement ils se rapprochent de la disposition transversale ; jamais hémisphériques, comme chez les derniers Hétéromères, ils sont le plus souvent oblongs ou ovalaires, soit entiers, soit faiblement échancrés par les joues vers le milieu de leur côté interne ; d'autres fois cette échancre plus profonde leur donne la figure réniforme. A peine saillants et parfois même en partie voilés par le bord antérieur du prothorax, chez les espèces lucifuges, comme chez les Orchésies et les Hétéromères, ils jouissent de toute leur liberté et se montrent sensiblement proéminents chez les espèces diurnes, comme on le voit chez les Mélandryes.

Les antennes, à base toujours découverte ou à peine ombragée par le bord très-légèrement saillant du front, sont insérées vers le milieu, soit un peu avant, soit un peu après, du côté interne des yeux. Tantôt elles sont presque attenantes au bord entier de ces organes ; tantôt elles naissent dans la sinuosité de leur échancre. Souvent plus ou moins courtes, elles se prolongent rarement comme chez les Osphyes jusqu'au delà de la moitié de la longueur du corps. Quelle diversité n'offrent-elles pas selon les genres ! Grêles et presque sétacées chez les Serropalpes, subuliformes et plus épaisses chez les Dircées, elles grossissent très-faiblement chez les Mélandryes et les Hypules ; sont presque fusiformes chez les Eumorphes ; se terminent chez d'autres par une massue soit renflée dans son milieu, comme chez les Orchésies, soit brusquement presque égale et perfoliée comme chez les Tétratomes. Sous le rapport de la longueur et de la forme de leurs articles, elles fournissent des différences souvent caractéristiques ; ainsi les deuxième, troisième et quatrième articles ont des proportions variables suivant les genres. Les articles sont allongés chez les Serropalpes ; courts et presque moniliformes chez les Abdères ; en général, ils sont au nombre de onze et souvent même le dernier est appendicé ou comme composé de deux articles soudés ; ils sont réduits à dix, chez les Conopalpes.

Le prothorax, habituellement plus large que long, montre parfois à

cette règle des dispositions exceptionnelles. Sa figure offre des variations nombreuses ; en demi-cercle chez les Eustrophes , en ogive chez les Orchésies , en trapèze chez les Mélandryes , il passe presque au carré chez les Hypules , et se rapproche de l'ovale transversal chez les Osphyes. Dans les premières de ces formes, ses angles antérieurs s'infléchissent et restent invisibles en dessus ; ses bords latéraux s'émoussent en devant, se montrent tranchants seulement dans leur moitié postérieure, et fournissent par là des caractères faciles à utiliser. Chez plusieurs, comme chez les Eustrophes et les Orchésies, il voile de son bord antérieur la tête qu'il embrasse comme une sorte de capuchon , chez d'autres, comme les Mélandryes, il la laisse plus ou moins dégagée ; ordinairement il offre à la base sa plus grande largeur ; quelquefois comme chez les Osphyes et surtout les Mycétomes, il se rétrécit un peu au devant d'elle. Ses angles de derrière, souvent vifs et prononcés, se prolongent parfois en arrière comme chez les Eustrophes, ou d'autres fois s'arrentissent comme chez les Osphyes. A son bord postérieur ou près de celui-ci, il est à peu près de la largeur des élytres ; tantôt ce bord est presque en ligne droite, tantôt il est plus ou moins sensiblement hissinué. Quelquefois, au devant de chaque sinuosité ou près d'elle, il est creusé d'une fossette profonde, comme chez les Hypules et les Marolies. Ses côtés, le plus souvent sans rebord, en montrent un chez les Tétratomes ou se relèvent en poutrière chez les Osphyes. Plus ou moins convexe, chez les uns, seulement en devant, il se rapproche chez d'autres, de la surface presque plane. Sa ligne médiane est rarement sillonnée. Souvent garni de poils fins et soyeux, il est d'autres fois complètement glabre. Chez plusieurs , les intervalles de ses points semblent offrir l'apparence de fines écailles.

L'écusson , toujours apparent, montre toutes les transitions entre le triangle et le carré transverse.

Les élytres, toujours libres, voilent chez presque tous des ailes bien développées. Leur forme varie un peu ; parfois presque parallèles jusque près de l'extrémité, elles commencent souvent à se rétrécir à partir de la moitié ou un peu plus ; d'autres fois elles vont s'élargissant sensiblement vers les deux tiers. En général leur convexité est médiocre ou assez faible. Elles n'offrent souvent point de traces de fossette humérale, elles montrent rarement leur surface glabre ; tantôt sans stries comme chez les Osphyes et les Gomopalpes, tantôt unistriées ou rayées de stries assez faibles, mais d'autres fois celles-ci sont plus prononcées, comme les Mélandryes et les Mycétomes en offrent des exemples. Leur repli toujours étroit se réduit généralement à une tranche

avant son extrémité, et fréquemment à partir des hanches postérieures.

Le dessous du corps, dont l'étude est généralement trop délaissée, fournit des caractères importants.

Les hanches antérieures par suite de leur allongement, ont de la tendance à se rapprocher, à comprimer, à annihiler le *prosternum*, qui le plus souvent ne les sépare pas d'une manière visible; quelquefois cependant, comme chez les *Hallomènes* et quelques autres, il leur empêche d'être contiguës et se montre aussi saillant qu'elles.

Le *mésosternum*, ordinairement rétréci d'avant en arrière et terminé en pointe, est à peu près parallèle dans sa seconde moitié chez les *Mycétomes*. Sa longueur proportionnelle fournit des caractères qui ne doivent pas être négligés; prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité des hanches chez les *Diretés* proprement dites, il se distingue par son raccourcissement chez les *Xylites*.

Les *postépisternums* ou *épisternums* du *postpectus* habituellement allongés, sont tantôt presque parallèles, comme chez les *Mélandryes*, tantôt rétrécis progressivement d'avant en arrière et terminés en pointe obtuse; rarement tronqués, comme chez les *Eustrophes*.

L'épimère postérieure est souvent peu distincte.

Le ventre, ordinairement de cinq arceaux, laisse rarement apparaître une faible portion du sixième, comme chez les ♂ des *Serropalpes*. Le dernier ne fournit pas, comme chez les *Pectinipèdes*, des signes aussi tranchés pour la séparation des sexes.

Les pieds ont une longueur variable suivant le rôle qu'ils doivent jouer.

Les hanches antérieures, ovoïdes ou oblongues, n'atteignent jamais le développement qu'elles offriront souvent dans quelques-unes des tribus suivantes.

Les hanches intermédiaires, parfois presque globuleuses, affectent plus ordinairement une figure allongée.

Les hanches postérieures, transversales chez les uns, sensiblement obliques chez les autres, ont quelquefois une importance remarquable; ainsi, chez les espèces destinées à sauter, comme les *Orchésies*, où elles doivent servir d'attache aux muscles puissants chargés de faire mouvoir la cuisse, elles ont au moins autant de développement dans le sens de la longueur de l'insecte, que le premier arceau ventral.

Les cuisses, ordinairement peu épaisses, souvent comprimées, quelque-



fois un peu arquées, sont démesurément renflées chez divers mâles des espèces du genre *Osphyæ*.

Les *jambes*, plus que les cuisses, offrent des dimensions variables. Le plus souvent, leur longueur est proportionnée à celle de la pièce qui les précède : mais chez les *Orchésies*, elles ont été raccourcies, pour agir avec plus d'énergie sur les éperons chargés de chasser l'insecte en avant. Chez les *Eustrophes*, elles contribuent elles-mêmes à donner à la progression plus d'énergie, grâce aux dentelures dont elles sont munies.

Les *éperons* qui les terminent ont un développement et une structure relatifs à l'usage pour lequel ils sont destinés ; d'une brièveté insignifiante chez quelques-uns, ils s'allongent plus ou moins quand ils doivent offrir à l'insecte le moyen d'échapper par des sauts à l'ennemi dont il est menacé. Chez les *Orchésies* auxquelles ils servent à bondir, non seulement ceux des quatre derniers pieds ont acquis une longueur anormale, les postérieurs surtout, mais ils sont pectinés en dessous pour trouver des points d'appui plus nombreux et agir avec une puissance plus énergique. Presque toujours, les derniers sont les plus développés ; chez les *Anisoxyes*, par exception, les intermédiaires sont les plus allongés. Ordinairement, ils sont insérés sur la même ligne ; chez les *Mélandryes* et les *Serropalpes*, dont les tibias antérieurs semblent échancrés en dessous, l'un des deux naît visiblement d'un point moins avancé.

Les *tarses* composés d'un article de moins aux pieds postérieurs qu'aux autres, offrent dans la forme et la longueur proportionnelle de leurs pièces des caractères souvent trop négligés. La première, généralement la plus longue, ordinairement plus courte que le tibia, en dépasse la grandeur aux pieds postérieurs des *Orchésies*. Le plus souvent, dans cette tribu, elle égale ou surpasse en longueur tous les articles suivants pris ensemble ; quelquefois, comme chez les *Tétratomes*, elle présente un développement moins remarquable. La plupart de ces petites pièces tarsiennes affectent une structure grêle ; chez un grand nombre, cependant, l'avant-dernière se montre triangulairement dilatée et s'avance sous la dernière en forme de sole, ou d'autres fois est distinctement bilobée. Chez les tarses antérieurs, les quatre premiers articles sont quelquefois plus ou moins sensiblement dilatés, soit dans les deux sexes, soit seulement chez le mâle, et garnis alors de poils soyeux ou faisant ventouse. Chez d'autres espèces, chez les sauteuses surtout, les articles des tarses de derrière sont munis de petites pointes terminales, destinées à concourir à l'action des éperons.

Les *ongles*, habituellement simples ou munis à la base de leur côté interne d'une petite saillie insignifiante, sont terminés à leur extrémité par deux ou trois dents chez les Osphyes (1).

#### VIE ÉVOLUTIVE.

Au sortir de l'œuf, les insectes dont j'essaie d'esquisser l'histoire n'ont pas tous cette presque uniformité de configuration que présentent les Latigènes ; cependant les larves qui nous sont connues de nos Barbi-palpes, présentent des caractères communs servant à montrer les relations plus ou moins rapprochées qu'elles ont entre elles.

Leur corps, ordinairement glabre ou presque glabre, tantôt presque semi-cylindrique, tantôt moins convexe ou plus élargi, se compose outre la tête de douze segments, dont les trois thoraciques portent chacun en dessous une paire de pieds semi-cornés et terminés par un ongle. Elles ont la tête presque arrondie, subécailleuse ; le labre et l'épistome distincts du front ; les mandibules peu ou point saillantes, larges, cornées, surtout à leur extrémité, ordinairement échancrées à cette dernière ; les mâchoires à un seul lobe cilié ; les palpes coniques ; les maxillaires de trois articles : les labiaux, courts, de deux seulement ; les antennes insérées près de la base des mandibules, de quatre articles : le premier gros et court : les deux suivants assez allongés, souvent presque égaux : le dernier, grêle et court ; les ocelles nuls ; les trois segments thoraciques peu différents : l'antérieur ordinairement le plus grand ; les stigmates au nombre de neuf paires : le premier, entre le premier et le deuxième arceau inférieur : les autres sur les parties latérales du dos de chacun des huit premiers segments abdominaux.

Toutes ces larves ont pour mission de vivre de matières végétales. Les unes rongent et perforent les bolets implantés sur le tronc de nos arbres ulcérés, ou se nourrissent des substances cryptogamiques qui s'étendent sous les écorces. Les autres, auxiliaires du temps et des divers agents destructeurs des bois, attaquent les parties ligneuses de ces végétaux ornements de nos champs ou de nos forêts, de ceux principalement dont le déclin ou la décrépitude semblent appeler les outrages. La Providence leur a donné une conformation et des instruments appropriés au rôle qui leur a été assigné. Leur bouche a été

---

(1) Chez les *Scotodes*, étrangers à la France, ils sont divisés longitudinalement, comme chez divers Longipèdes ou chez les Vésicants.

armée de tenailles assez robustes pour déchirer les fibres déjà moins tenaces de ces troncs altérés ; leur corps tantôt semi-cylindrique et revêtu d'une peau lisse, semble fait pour glisser avec facilité dans les dédales creusés par elles, tantôt moins convexe et pourvu de pieds dirigés en dehors, paraît fait pour ramper avec moins de peine dans ces chemins couverts. Souvent l'extrémité de leur abdomen est pourvu d'appendices rétractiles ou de deux crochets recourbés chargés de faciliter leurs mouvements.

Quand elles sont arrivées au terme de la vie laborieuse à laquelle elles sont condamnées dans la première phase de leur existence, elles se pratiquent une retraite dans ces lieux protecteurs de leur jeune âge, pour y cacher dans le repos et dans l'obscurité les jours consacrés à l'état de nymphe.

Sous cette forme, on peut déjà, comme chez les autres Coléoptères, reconnaître les principaux organes de l'insecte futur, en dépit des bandelettes qui enveloppent son corps comme celui d'une momie, et au bout d'un espace de temps variable, mais toujours assez court, l'animal rejette ces sortes de voiles désormais inutiles, pour se montrer sous sa forme la plus intéressante.

#### GENRE DE VIE DES INSECTES PARFAITS.

Débarrassés enfin des langes du jeune âge, la plupart des Barbipalpes sont réservés en général à un rôle obscur ou peu brillant. Ceux qui rongeaient, à l'état de larve, ces bolets dont la vie parasite s'entretient aux dépens de nos arbres maladifs, restent le plus souvent attachés à ces substances cryptogamiques, qu'ils ont reçu la mission de détruire.

D'autres qui sous leur figure vermiforme rampaient sous les écorces ou se pratiquaient des galeries dans le sein de nos grands végétaux, dont ils hâtaient ainsi la vieillesse ou la mort, viennent encore chercher sous leur ombre un abri protecteur.

Les uns, ennemis du jour, se réfugient durant les heures diurnes, dans les crevasses des arbres, sous les portions de leur enveloppe corticale détachées des couches ligneuses, dans les obscures retraites de leurs flancs excavés, ou d'autres fois se bornent à se tenir collés contre leurs troncs rembrunis, dans les points inaccessibles aux rayons directs de l'astre du jour. Quelques autres, amis de la lumière, montrent une activité proportionnée à l'état élevé de l'atmosphère ; on les voit, sous un ciel ardent, parcourir quelquefois les airs d'un vol rapide, ou, plus

souvent, se plaire sur les troncs vieillis ou desséchés, à se réchauffer aux feux bienfaisants du soleil.

Les premiers, en général, ont des couleurs lugubres ou obscures. C'est le noir, le brun, le marron, le fauve ou le testacé, dont leur robe offre principalement les nuances à peine variées ; parfois quelques taches plus claires viennent seules faire quelque diversion à la monotonie habituelle de leur corsage. Leurs yeux presque sans saillie et parfois en partie voilés par le bord antérieur du prothorax, leur tête inclinée et plus ou moins encapuchonnée dans le prothorax, trahissent leurs habitudes lucifuges. Leur corps est le plus souvent revêtu de poils fins et soyeux destinés à leur permettre de glisser avec plus de facilité dans les dédales étroits qu'ils ont pratiqués.

Les derniers montrent ordinairement sur leur enveloppe extérieure des teintes moins tristes ; souvent même leur cuirasse brille d'un éclat métallique. Leurs yeux faisant saillie, leur tête dégagée et penchée en avant, suffisent pour révéler leur diurne activité.

Les Barbipalpes ont reçu de la nature des moyens divers de tromper l'œil de leurs ennemis ou de se soustraire à leurs poursuites. Les espèces amies du jour, en déployant leurs ailes avec prestesse, parviennent parfois à échapper aux dangers dont elles sont menacées. Les crépusculaires ou nocturnes, se confondent souvent par la couleur de leur manteau avec celle des corps sur lesquels ces petits animaux reposent. Plusieurs, à l'approche du péril, se laissent choir dans le gazon et s'y tiennent immobiles. Quelques autres, plus favorisés, sont pourvus de pattes longues et robustes, d'éperons allongés et même pectinés, à l'aide desquels ils peuvent, par des sauts étonnants, éviter la main prête à les saisir, ou glisser entre les doigts qui déjà les tiennent captifs.

Toutes les zones de notre pays sont appelées à fournir leur contingent à cette tribu. Mais si quelques-uns de ces Coléoptères ne semblent se plaire qu'aux chaleurs du midi, les autres, en plus grand nombre, recherchent d'une manière plus spéciale les parties plus atténuées ou plus froides de notre territoire. La plupart de nos grands végétaux à leur déclin et même les modestes arbrisseaux de nos haies, sont exposés à leurs outrages. Parmi les arbres, les saules et les aunes, amis des eaux, les chênes séculaires, ou les conifères qui couvrent d'un sombre manteau le sommet de nos montagnes, paraissent en nourrir le plus grand nombre dans leurs flancs, ou les porter dans les bolets attachés à leurs troncs.

Nos Barbipalpes ne sauraient être comptés parmi les courtisans des

fleurs; le vulgaire a rarement l'occasion de les voir. Aucun d'eux n'a reçu un de ces noms populaires qui se perpétuent dans chaque province par la tradition. Mais pour l'ami de la Nature, pour celui qui cherche à admirer les desseins de la Providence dans les œuvres de la création, leur étude n'en est pas moins digne d'intérêt. Pour le moraliste ou le philosophe, l'obscurité dont leur existence est couverte pourrait rappeler cette vie modeste et retirée dans laquelle le sage aime à se cacher et qui offre souvent les voies les plus sûres pour arriver au bonheur.

#### HISTORIQUE.

Voyons maintenant les différentes phases qu'a subies la classification de ces insectes.

1761. Le législateur des sciences naturelles, le grand Linné, dont les travaux nous serviront toujours de point de départ, colloqua dans son genre *Chrysomela* <sup>(1)</sup> la seule espèce de nos Barbipalpes connue de lui.

1775. Cette espèce, qui pendant quelque temps fut aussi la seule inscrite dans les ouvrages de Fabricius, fut placée par cet illustre naturaliste avec les *Helops*.

1787. Le professeur de Kiel, dans sa *Mantissa Insectorum*, augmenta le genre précité d'une autre espèce de nos Barbipalpes, et en plaça, parmi les *Lymexylons*, une troisième, confondue par Schaller avec les *Mordelles*, et pour laquelle Hellenius, dans les Mémoires de l'Académie des sciences d'Upsal, avait, l'année précédente (1786), créé le genre *Serropalpus*.

Trois ans plus tard, en 1790, Fabricius, dans les Mémoires de la Société des Naturalistes de Copenhague, formula les caractères du genre *Tetratoma*, sur la proposition d'Helwig, qui lui avait communiqué deux espèces inédites, pour servir à l'établissement de cette coupe.

1792. Le savant écrivain danois, dans son *Entomologia systematica*, égara parmi les genres *Elater*, *Notoxus* et *Mycetophagus* quelques autres espèces appartenant à cette tribu.

Deux ans plus tard (1794) Panzer, dans le seizième cahier de sa Faune des Insectes, donna les caractères du genre *Hallomenus* indiqué par Helwig.

(1) *Chrysomela caraboides*, LAMM.



1796. Latreille, dont les essais de classification étaient loin de révéler le coup d'œil admirable et l'esprit méthodique dont il devait bientôt faire preuve, Latreille, conduit par les caractères tirés du nombre des tarses à rapprocher les uns des autres tous nos Hétéromères, fit entrer le genre *Serropalpus* dans sa douzième famille.

1798. Les autres écrivains entomologiques de la seconde moitié du dix-huitième siècle <sup>(1)</sup>, méconnaissant les affinités qui lient nos Barbipalpes, en avaient disséminé les espèces connues et jusqu'alors peu nombreuses, dans les genres *Helops*, *Lymexylon*, *Mordella*, *Tenebrio*, *Cantharis*, *Elater*, *Elateroides*, *Ips*, *Ptilinus*, *Megatoma*, *Dermestes*, avec lesquels elles n'ont que des rapports très-équivoques ou peu sensibles, lorsque Paykull, dans sa Fauna suecica, les rassembla dans les genres *Serropalpus* et *Tetatomia* indiqués précédemment, et dans ceux de *Xylita*, *Hallominus* (*Hallomenus* de Panzer) et *Hypulus* <sup>(2)</sup> qu'il établissait ou dont il donnait les caractères.

Toutefois si le savant suédois montrait qu'il avait saisi les rapports existants entre les espèces comprises dans chacune de ces coupes génériques, en éloignant celles-ci les unes des autres, il prouvait assez que les liens qui les rattachent lui avaient échappé.

Illiger, vers le même temps (1798) fit donc faire à la science un pas plus marqué, en réunissant nos Barbipalpes connus de lui dans le genre *Serropalpus*, et dans celui de *Hallomenus* indiqué par Helwig et caractérisé quelques années auparavant par Panzer.

1800. M. Duméril, à qui l'on doit avec Latreille la division des insectes en familles naturelles, fit entrer, avons nous dit <sup>(3)</sup>, le genre *Serropalpus* d'abord dans la famille des *Lucifuges* et peu de temps après dans celle des *Ornéphiles*.

1801. Fabricius, dans son *Systema Eleutheratorum*, fut entraîné par le travail d'Illiger à réunir, sous un même nom générique, les insectes de cette tribu qu'il avait égarés parmi les *Lymexylon*, les *Notoxus* et les *Elater*; mais par un esprit de contradiction dont il a

(1) Schaller (*Abhandl. de hallisch. Naturf. Gesellsch.* t. 1. 1783.) — Gmelin. (*C. Linn. Syst. Natur.* t. 1. 1788.) — de Villers (*C. Linn. Entomol.* 1789.) — Queensel (*Dissertat* 1790). — Rhea, Schneider, Kugelann (*Schneider's N. Magaz.* 1792.) — Panzer. (*Entomol. german.* 1794 et *Faun. Insect. German.*) — HERBST. (*Natursyst.* t. 4 Käf. 1792) etc.

(2) Kugelann avait indiqué sous le nom de *Mystaxis* une coupe semblable (voy. *ILLIGER Verzeich.*, p. 123.)

(3) *Hist. nat. des Coléopt.* de Fr. (Latigènes p. 3.)

malheureusement donné plusieurs fois des preuves, au lieu d'adopter le nom de *Serropalpus*, il créa celui de *Dircæa*. Ce genre fut partagé en deux divisions : la seconde comprit les espèces sauteuses, ou les Hallomènes de l'entomologiste prussien. Quant à ceux de nos Barbipalpes qu'il avait confondus avec les *Helops*, il les éloigna de ses Dircées et fonda pour elles le genre *Melandrya*.

1804. Latreille, dans son Histoire naturelle des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avait partagé, avons-nous dit <sup>(1)</sup>, les Coléoptères ayant les tarses de devant et ceux du milieu de cinq articles, et les postérieurs de quatre, en deux tribus : les Obscurs et les Versicolores. Les premiers furent divisés en *Sabulicoles* et en *Herbicoles*. Ceux-ci comprirent quatre familles : les *Diapériales*, les *Cossypheurs*, les *Hélopiens* et les *Macrogastres*.

Le genre *Tetraloma* prit place dans la première de ces familles : dans la troisième figurèrent les Hallomènes, les Serropalpes et les Mélandryes, conjointement avec les Pythes, les Hélops, les Lagries et les Notoxes.

Dans cet ouvrage, où Latreille a souvent montré ce coup d'œil admirable qui l'a élevé à un si haut rang, quoique la plupart des espèces de nos Barbipalpes décrits par les entomologistes du nord lui fussent inconnues, il les a en général assez naturellement réparties dans les trois genres précités. Il restreignait celui de *Serropalpus* à ses limites naturelles ; rapportait avec raison aux Mélandryes l'espèce désignée sous le nom de *variée*, jusqu'à ce jour laissée à tort avec les Dircées, et joignant à cette coupe une autre espèce <sup>(2)</sup>, à l'aide de laquelle il devait fonder le genre *Scraphia*, dans son Genera.

1807. Dans ce dernier ouvrage, il modifia les bases des familles composant sa tribu des Obscurs *herbicoles*. Il réunit les *Cossypheurs* aux *Diapériales*. Sa famille des *Hélopiens*, qui était la troisième dans son Histoire naturelle, devenue la seconde par cette suppression, s'enrichit d'un genre nouveau, celui d'*Orchesia*, démembré des Hallomènes d'Helwig et de Panzer, et s'appauvrit de celui de *Notoxus* qui fut placé ailleurs.

1809. Dans ses *Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux* Latreille remania d'une manière moins heureuse cette partie de sa classification. Nos Barbipalpes compris dans sa famille des *Ténébrionites*, s'y trouvèrent en compagnie d'une foule d'insectes offrant avec eux des différences frappantes.

(1) Hist. nat. des Coléopt. (Latigènes p. 4.)

(2) *Melandrya fusca*.

Deux ans auparavant (1807) Illiger établissait dans la famille des Hélopiens de Latreille, sous le nom d'*Osphia*, un genre nouveau qu'Olivier créait quatre ans plus tard sous celui de *Nothus*.

1810. Gyllenhal, dans le deuxième volume de ses *Insecta suecica*, suivit en partie, en la modifiant selon ses vues, la division des Hétéromères établie par Latreille dans son *Histoire naturelle*. Le savant suédois, dont les descriptions serviront toujours de modèle, partagea cette grande section des Coléoptères en sept familles. En voici le tableau, qui devait trouver place dans l'introduction qui précède nos Latigènes.

1<sup>o</sup> Quatre palpes ; à dernier article un peu plus épais, ovalaire : celui des palpes antérieurs parfois sécuriforme. Languette presque entière. Antennes moniliformes, souvent plus épaisses vers l'extrémité. Tête grande, infléchie, plus large que le thorax, unie à celui-ci par un col étroit. Élytres flexibles. Ongles des tarses bifides. *Meloïdes*.

(Genres *Meloe*, *Apalus*, *Lytta*, *Anthicus*, *Lagria*.)

2<sup>o</sup> Quatre palpes inégaux : les antérieurs beaucoup plus longs, à dernier article plus épais, subsécuriforme. Antennes filiformes ou sétacées, souvent dentées en scie ou pectinées. Corps oblong, subdéprimé, souvent dilaté postérieurement. Thorax plus étroit que les élytres. *Pyrochroïdes*.

(Genres *Pyrochroa*, *Pytho*, *Calopus*.)

3<sup>o</sup> Palpes inégaux : les antérieurs beaucoup plus grands ; à dernier grand, le plus souvent sécuriforme. Mâchoires membraneuses, bifides. Antennes filiformes, à deuxième article court : les derniers souvent moniliformes. Corps le plus souvent oblong, convexe. Tête enfoncée. Thorax presque de la largeur des élytres. *Hélopiens*.

(Genres *Serropalpus*, *Dircaea*, *Hallomenus*, *Melanchrya*, *Helops*, *Allecula*, *Mycetophyla*, *Conopalpus*.)

4<sup>o</sup> Antennes plus épaisses vers l'extrémité, en massue, parfois presque brusquement ; ordinairement insérées sur le rebord saillant de la tête. Corps glabre, convexe, soit ovale, soit presque orbiculaire, soit linéairement allongé. *Diapériales*.

(Genres *Diaperis*, *Tetratoma*, *Anisotoma*, *Cossyphus*, *Hypophidoleus*, *Boros*, *Phaleria*.)

5<sup>o</sup> Antennes bréviusculées ; moniliformes, insérées sous le rebord

saillant de la tête, un peu plus épaisses vers l'extrémité. Mandibules fortes, cornées, ne couvrant pas la mâchoire. Corps oblong ou ovale ; revêtu d'une enveloppe dure ; pourvu d'un écusson. *Ténébrionites*.

(Genres *Tenebrio*, *Upis*, *Blaps*, *Opatrum*, *Bolitophagus*.)

6° Antennes un peu plus épaisses extérieurement, le plus souvent dentées en scie ou flabellées, libres à la base, non insérées sous le rebord de la tête. Corps épais, arqué, atténué postérieurement. Tête sessile, très-infléchie. Abdomen conique. *Mordellones*.

(Genres *Mordella*, *Rhipiphorus*.)

7° Antennes allongées, filiformes ou sétacées, libres à la base. Bouche avancée, quelquefois prolongée en museau. Corps oblong, souvent allongé. Pieds assez longs. *Cistélins*.

(Genres *Cistela*, *Necydalis*, *Salpingus*.)

Dans ce travail, nos Barbipalpes presque tous compris dans la troisième famille, où ils se trouvent accolés à quelques-uns de nos Latigènes et de nos Pectinipèdes, s'enrichirent du genre *Conopalpus*.

1817. Latreille, dans la partie entomologique du Règne animal de Cuvier, retoucha de nouveau sa classification des insectes. Il réunit en une seule famille, sous le nom de *Mélasomes*, celle des Ténébrionites. Celle des Diapériales devint celle des *Taxicornes* ; et les Hélopiens prirent le nom de *Sténélytres*. Nos Barbipalpes presque tous compris dans ceux-ci, y furent assez malheureusement unis, dans deux divisions différentes, à d'autres insectes ayant avec eux des rapports peu nombreux.

1818-1819. Peu de temps après, sans changer l'ordre qu'il venait d'établir, il jeta un nouveau jour sur l'histoire méthodique de plusieurs de ces insectes, dans la seconde édition du *Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle*, et, guidé par Illiger, exposa à l'article *Mélandrye* de cet ouvrage, les variations nombreuses qu'avait jusqu'alors subies la dénomination générique de quelques-uns de ces petits animaux.

1825. Déjà mieux inspiré dans ses *Familles naturelles du règne animal*, il commença à comprendre les rapports nombreux existants entre les divers Coléoptères de cette tribu. La plupart furent englobés dans sa famille des *Sténélytres* ; mais d'autres restèrent encore égarés dans celle des *Taxicornes*, savoir : les *Hallomènes* et les *Eustrophes*, parmi les *Diapériales* : les *Tétratomes* et les *Orchésies*, avec les *Crassicornes*.

1829. Enfin dans la seconde édition du Règne animal, nos Barbi-palpes, à part le premier et le dernier des genres que nous y avons admis, composèrent sa tribu des *Serropalpides*, la troisième de sa famille des *Sténélytres*.

1832. Stephens, dans ses *Illustrations*, avait donné pour caractères à ses *Mélandrydes* : tête non cordiforme, enfoncée dans le prothorax. Élytres libres, n'embrassant pas les côtés du ventre. Penultième article de tous les tarses bifide (1). Antennes courtes, à peine prolongées au-delà du prothorax.

Il les divisa de la manière suivante :

GENRES.	
A. Avant dernier article des tarses bilobé.	
B. Tête et prothorax plus étroits que les élytres.	<i>Lagriæ</i>
BB. Tête et prothorax aussi larges ou à peine moins larges que les élytres.	
C. Palpes maxillaires à dernier article ovale ou linéaire, concave à son côté interne.	
D. Corps ovale, déprimé, plus étroit en avant.	<i>Melandryæ.</i>
DD. Corps oblong, convexe.	<i>Phloiotryæ.</i>
CC. Palpes maxillaires à dernier article ovale, non concave à son côté interne	
E. Prothorax rétréci à sa partie postérieure.	<i>Hapulus.</i>
EE. Prothorax plus large en arrière qu'en avant.	<i>Abdera</i>
CCC. Palpes maxillaires à dernier article sécuriforme.	
F. Prothorax transverse, semi-circulaire.	<i>Scaptia.</i>
FF. Prothorax transverse, non semi-circulaire.	<i>Xylita.</i>
FFF. Prothorax oblong.	<i>Dircæa.</i>
AA Tarses postérieurs à dernier article entier.	
G. Tibias postérieurs munis d'éperons très-courts.	<i>Hallomenus.</i>
GG. Tibias postérieurs armés d'éperons allongés.	<i>Orchesia.</i>

1839. Dans son Manuel, le même auteur se borna à peu près à modifier l'ordre d'après lequel quelques-uns des genres étaient disposés.

1845. M. le docteur L. Redtenbacher, en publiant les genres de la Faune des Coléoptères d'Autriche, disposés d'après une méthode analytique, donna aux *Serropalpes* les caractères suivants.

*Tarses* postérieurs de quatre articles : les antérieurs de cinq. *Ongles* simples. *Hanches antérieures* coniques, saillantes au-dessus de la cavité dans laquelle elles sont reçues. *Palpes maxillaires* allongés ; dentés au

(1) Caractère qui ne convient pas à tous.



côté interne ; terminés par un article sécuriforme. *Prothorax* presque toujours arrondi sur les côtés ou n'offrant que près de sa base un bord tranchant. Tête verticale et enclosée jusqu'aux yeux dans le prothorax.

Il la divisa comme suit :

	GENRES.
A. Prothorax aussi long ou plus long que large, rétréci à sa base.	
B. Antennes grossissant insensiblement.	<i>Hypulus.</i>
BB. Antennes avec les trois derniers articles plus grands. Elytres deux fois aussi larges en devant que le prothorax à sa base.	<i>Agnathus.</i>
AA. Prothorax beaucoup plus large que long.	
C. Articles des antennes généralement deux fois au moins aussi longs chacun qu'ils sont larges.	<i>Serropulpus.</i>
CC. Articles des antennes à peu près aussi longs chacun qu'ils sont longs.	
D. Quatrième article des tarsi intermédiaires très-petit et bilobé.	
E. Corps presque cylindrique. Elytres notablement rétrécies à leur partie postérieure. Prothorax sans fossette.	<i>Dircaea.</i>
EE. Corps plus ou moins faiblement convexe ou subdéprimé, Elytres presque toujours élargies postérieurement. Prothorax presque toujours creusé de fossettes.	
F. Prothorax trapézoïdique, rétréci en devant, faiblement bisinué à la base. Antennes cambrées. Elytres à stries séparées par des intervalles saillants.	<i>Melandrya.</i>
FF. Prothorax non trapézoïdique, transversal, élargi et arrondi dans le milieu de ses côtés. Antennes non cambrées. Elytres densément et rugueusement ponctuées.	<i>Phryganophilus.</i>
DD. Quatrième article des tarsi intermédiaires simple, cylindrique.	
G. Tibias postérieurs armés à leur extrémité de deux épérons allongés presque aussi longs que le premier article des tarsi.	
H. Corps également obtus ou obtusément arrondi en devant et en arrière. Angles postérieurs du prothorax prolongés en pointe spiniforme.	<i>Eustrophus.</i>
III. Corps rétréci postérieurement. Angles postérieurs du prothorax non prolongés en pointe.	<i>Orchesia.</i>
GG. Tibias postérieurs munis à leur extrémité de deux épérons courts.	
I. Elytres presque planes, élargies postérieurement.	<i>Pytho.</i>
II. Elytres convexes, rétrécies postérieurement.	<i>Hallomenus.</i>

1845. La même année, M. Blanchard donnait pour caractères à sa famille des *Melandryides*, faisant partie de sa tribu des *Cantharidiens* :

Crochets des tarses simples. Palpes maxillaires très-grands, à dernier article très-sécouriforme <sup>(1)</sup>.

Il la divisait ainsi :

## GENRES.

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1 <sup>o</sup> Antennes de onze articles, presque filiformes, à dernier article ovulaire. Palpes à premier article conique; le deuxième très-grand.  | <i>Melandrya.</i>  |
| 2 <sup>o</sup> Antennes de onze articles, épaississant graduellement vers l'extrémité. Palpes à premiers articles grêles.  | <i>Scotodes.</i>   |
| 3 <sup>o</sup> Antennes longues, de dix articles, un peu en scie : les trois derniers cylindriques. Palpes très-longs, prolongés intérieurement en forme de dent. Corps allongé.               | <i>Conopalpe.</i>  |
| 4 <sup>o</sup> Antennes longues, filiformes, très-grêles. Palpes très-grands : les deuxième et troisième articles prolongés en dedans : le dernier très-large. Corps long. Pattes très-grêles. | <i>Serropalpe.</i> |
| 5 <sup>o</sup> Antennes moniliformes, de onze articles. Palpes ayant les trois derniers articles en massue ovale.  | <i>Hypule.</i>     |
| 6 <sup>o</sup> Antennes de onze articles, coniques, grossissant peu vers l'extrémité. Palpes à premiers articles cylindriques. Pattes grêles. Tarses à avant-dernier article bilobé.           | <i>Dircaea.</i>    |
| 7 <sup>o</sup> Antennes presque filiformes, de douze articles <sup>(2)</sup> . Palpes médiocres, à dernier article élargi, peu sécuriforme.  | <i>Hallomene.</i>  |
| 8 <sup>o</sup> Antennes de onze articles, terminées en massue. Palpes à dernier article très-sécouriforme. Pattes postérieures propres au saut.  | <i>Orchesia.</i>   |
| 9 <sup>o</sup> Antennes un peu élargies vers l'extrémité, de onze articles, le dernier un peu pointu. Palpes assez courts, médiocrement élargis à leur extrémité. Corcelet large.              | <i>Eustrophe.</i>  |
| 10 <sup>o</sup> Antennes filiformes, de onze articles: le dernier conique, un peu pointu. Palpes longs, à dernier article sécuriforme.   | <i>Seraptia.</i>   |

1849. M. L. Redtenbacher, dans sa Faune d'Autriche, ajouta au tableau précité entre AA et C :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| α Dernier article des palpes très-long, conique. | <i>Conopalpus.</i> |
| α α Dernier article des palpes sécuriforme.      |                    |

(1) Caractère qui ne se retrouve pas chez tous.

(2) Ces insectes n'ont réellement que onze articles : le dernier est appendicé comme chez beaucoup d'autres insectes de cette tribu.

Après avoir déroulé l'histoire des progrès à l'aide desquels les insectes objets de ce travail ont fini par être réunis en une Tribu assez naturelle, il me reste à exposer la manière dont j'ai cru devoir les diviser. L'étude que j'ai faite de ces petits animaux m'a porté à ajouter quelques coupes génériques nouvelles à celles déjà nombreuses établies auparavant. De quelque manière qu'on les envisage, elles contribueront, je l'espère, à indiquer la marche de la Nature, et à conduire par des voies plus sûres et peut-être plus faciles à la connaissance des espèces.

Nous partageons nos Barbipalpes en sept petites familles :

Ongles simples ou munis seulement d'une dent rudimentaire à la base de leurs branches,	Antennes brusquement terminées par une massue perfoliée de quatre articles, plus longue que tous les articles précédents réunis,	TÉT RATOMIENS.
	Antennes non brusquement terminées par une massue perfoliée de quatre articles, plus longue que tous les articles précédents réunis.	ORCHÉSIENS.
	Antennes de onze articles.	
	Hanches de devant ordinairement contiguës; parfois séparées par un prosternum aussi saillant qu'elles, mais alors tête en majeure partie visible en dessus.	SERROPALPIENS.
	Hanches de devant contiguës.	
	Tête inclinée ou subperpendiculaire, complètement ou en majeure partie voilée par le prothorax, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus. Prothorax ordinairement presque en ligne droite à la base.	MELANDRYENS.
	Tête penchée, en majeure partie visible, quand l'insecte est vu en dessus. Prothorax creusé de deux fossettes longitudinales au devant de la base; ordinairement bissinué à cette dernière.	MYCÉTOMIENS.
	Hanches de devant séparées par un prosternum aussi saillant qu'elles. Tête penchée en majeure partie visible en dessus.	CONOPALPIENS.
	Antennes de dix articles allongés. Dernier article des palpes maxillaires long et conique.	OSPHYENS.
	offrant chacune de leurs branches terminée par deux ou trois dents.	

## PREMIÈRE FAMILLE.

## TÉTRATOMIENS.

CARACTÈRES. *Ongles* simples ou munis seulement, à la base de chacune de leurs branches, d'une dent rudimentaire. *Antennes* de onze articles ; brusquement terminées par une massue perfoliée de même grosseur, composée de quatre articles, plus longue que tous les articles précédents réunis. *Tête* subperpendiculaire ; en majeure partie voilée par le prothorax quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus. *Hanches de devant* séparées par un prosternum aussi saillant qu'elles. *Hanches postérieures* un peu obliquement transverses ; moins développées longitudinalement que chacun des arceaux du ventre.

Ces insectes se réduisent au genre suivant :

Genre *Tetratoma*, TÉTRATOME ; (HELVIG) FABRICIUS (1).

(τέτρας, quatre ; μέρος, pièce)

CARACTÈRES. *Antennes* assez courtes ; insérées à découvert vers le milieu de la partie antéro-interne des yeux ; de onze articles : le premier un peu renflé : le deuxième ovulaire, un peu moins étroit que le suivant : les troisième à septième inégalement étroits : les troisième et quatrième subcylindriques : les cinquième à septième submoniliformes : les huitième à onzième brusquement plus gros, constituant une massue perfoliée, d'égale grosseur : les huitième à dixième, subcylindriques, moins longs que larges : le onzième, ovoïde. *Tête* rétrécie au devant des yeux. *Epistome* et labre transverses. *Mandibules* cachées dans le repos ou ne dépassant pas le labre ; inégalement bifides à l'extrémité. *Palpes maxillaires* assez longs ; subcomprimés ; à deuxième article obtriangulaire, un peu arqué : le troisième, transverse : le quatrième subparallèle dans sa première moitié, obliquement coupé dans la seconde. *Menton* élargi d'arrière en avant, tronqué à son bord antérieur ; plus large que long. *Yeux* un peu obliquement transverses ; faiblement entamés par les joues. *Prothorax* transverse ; rebordé sur les côtés ; tranchant sur toute la longueur de ses bords latéraux ; bis-

---

(1) Skivter af Natur. Selesk. t. 4. cah. 1<sup>re</sup> (1790). — SCHNEIDER'S Neuest. Magazin. p. 79 et p. 591.

subsinué à la base. *Elytres* voilant le pygidium. *Arceaux du ventre* au nombre de cinq : le premier le plus grand : les deuxième à quatrième à peu près égaux. *Pieds* médiocres. *Eperons* des tibias, très-courts. *Tarses* à avant-dernier article entier.

α. Prosternum ne dépassant pas les hanches de devant.

β. Prothorax subéchancré au devant de l'écusson, à sa base.

1. *T. fungorum* ; FABRICIUS. Corps oblong ; ponctué, glabre en dessus. Tête et massue des antennes, noires. Palpes, sept premiers articles des antennes, prothorax, dessous du corps et pieds, d'un flave ou d'un jaune roux. *Elytres* d'un bleu foncé verdâtre. Prothorax subtrisinué à la base.

*Tetratoma fungorum*, FABR. in Skrivi, af Natur. Selsk. t. 1. cah. 1. (1790). — *Id.* in SCHNEIDER's neuest. Magaz. p. 20. — *Id.* Entom. syst. t. 1. part. 2. p. 507. 1. — *Id.* Syst. eleuth. t. 2. p. 574. 1. — PANZER, Faun. germ. 9. 10. — *Id.* Entom. germ. 543. 1. — KUGELANN, Verzeichn. in SCHNEIDER's Magaz. p. 553. 1. — CEDERN, Faun. ingri. prod. p. 115. 351. — PAYR, Faun. suec. t. 3. p. 557. 1. — WALCK, Faun. par. t. 1. p. 239 (*tetratoma* pour *fungorum*). 1. — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 315. 1. pl. 89. fig. 4 et pl. 10 fig. 1. — *Id.* Gener. t. 2. p. 180. 1. — *Id.* Dict. class. d'hist. nat. t. 16, p. 197. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2, p. 554. 1. — LAVARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 587. 1. — DUMÉRIL, Dict. des sc. nat. 53. p. 534. 1. — MULS. Lettr. t. 2. p. 287. 2. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 223. 1. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 202. 1.

*Tetratoma dermestoides*, HERBST, Natur. t. 4 (Käuf.) p. 88. 7. pl. 38. fig. 7 et c.

Long. 0,0056 à 0,0054 (1 2/3 à 2 2/5.). Larg. 0,0012 à 0,0022 (3/5 à 1 l.).

Corps oblong ; subparallèle ; médiocrement convexe, luisant et glabre en dessus. Tête presque perpendiculairement inclinée ; marquée de points assez gros et peu rapprochés sur le front, plus petits et plus serrés sur l'épistome, donnant naissance, principalement sur le dernier, à des poils rousseâtres ; noire : partie antérieure de l'épistome roux ou d'un roux obscur. Palpes d'un jaune roux. Antennes de même couleur sur les sept premiers articles : à massue noire ou d'un noir grisâtre, pubescente. Prothorax à peine échancré en arc, en devant ; élargi sur les côtés en ligne irrégulièrement arquée, un peu anguleuse vers les deux tiers, rétrécie en ligne courbe à partir de ce point ; subarrondi aux angles postérieurs, muni à ceux-ci d'une très-petite dent ; en arc dirigé en arrière, subsinué au devant de l'écusson et à peine plus légèrement entre celui-ci et les angles postérieurs ; à peine rebordé en devant ; rebordé sur les côtés et à la base ; creusé d'une



fossette au devant de chaque sinuosité latérale de celle-ci ; une fois au moins plus large dans son diamètre transversal le plus grand que long dans son milieu ; convexe ; marqué de points assez gros et peu rapprochés ; d'un jaune roux ou d'un jaune roussâtre. *Écusson* presque pentagonal ; plus large que long ; ponctué ; d'un bleu noir. *Elytres* presque parallèles jusqu'aux deux tiers, subarrondies ou en ogive obtuse postérieurement ; munies d'un rebord étroit sur les côtés et moins sensiblement dans la partie postérieure de la suture ; médiocrement ou peu fortement convexes ; creusées d'une fossette humérale ; couvertes de points un peu plus gros et plus rapprochés que ceux du prothorax ; d'un bleu foncé verdâtre. *Repli* étroit, graduellement réduit à une tranche à l'extrémité. *Dessous du corps* d'un roux testacé ou d'un roux flave, souvent nébuleux sur les medi et postpectus ; ponctué ; garni de poils peu apparents. *Prosternum* ne dépassant pas les hanches. *Pieds* d'un jaune pâle ; les tarses d'un roux jaune : premier article des postérieurs aussi long que le dernier.

Cette espèce a été découverte par Helwig dans les environs de Brunswick. Elle habite durant l'automne les champignons qui vivent en parasite, principalement sur le peuplier et le saule ; souvent, surtout pendant l'hiver, on la trouve sous les écorces sous lesquelles végètent des substances cryptogamiques. Elle est médiocrement commune dans les environs de Lyon.

ββ. Prothorax non subéchancré au devant de l'écusson, à sa base.

♀. **T. Desmarestii** ; LATREILLE. *Corps* oblong ; ponctué ; d'un vert noir, luisant et garni de poils peu serrés, en dessus et en dessous : *pâpes* et base au moins des antennes, fauves. *Pieds* d'un flave roussâtre. *Prothorax* tronqué au devant de l'écusson et sinueux de chaque côté de cette troncature, à la base.

*Tetratoma Desmarestii*, LATR. Gener t. 2. p. 180. 2. — *Id.* Dict. class. d'hist. nat. t. 16. p. 197. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 387. 2. — Muls. Lettr. t. 2. p. 287. 5.

Long 0,0036 (1 2/5 l.). Larg. 0,0015 (3/5 l.).

*Corps* oblong ; subparallèle ; médiocrement d'un vert noirâtre luisant, et garni de poils fauves peu épais ou clairsemés, en dessus. *Tête* couverte de poils très-serrés : moitié antérieure de l'épistome, labre et *pâpes* d'un fauve testacé. *Antennes* parfois entièrement presque de même couleur, ordinairement à premier et deuxième article d'un

fauve livide : les troisième à septième, fauves ou d'un fauve obscur : les quatre derniers d'un gris sombre ; pubescentes. *Prothorax* tronqué ou à peine échancré en devant ; élargi sur les côtés en ligne irrégulièrement arquée, un peu anguleuse vers les deux tiers, rétréci en ligne courbe à partir de ce point ; à angles postérieurs très-ouverts et munis d'une très-petite dent ; en arc dirigé en arrière, tronqué ou obtus au-devant de l'écusson et sinueux entre cette troncature et chaque angle postérieur, à la base ; à peine rebordé en devant, rebordé sur les côtés et à la base ; creusé d'une fossette au devant de chaque sinuosité basilaire ; une fois au moins plus large dans son diamètre transversal le plus grand que long dans son milieu ; convexe ; marqué de points un peu plus gros et sensiblement moins rapprochés que ceux de la tête, donnant chacun naissance à un poil assez long, couché, fauve. *Ecusson* pentagonal ; ponctué. *Elytres* presque parallèles jusqu'aux deux tiers, en ogive un peu obtuse postérieurement ; munies latéralement d'un rebord étroit ; moins sensiblement rebordées dans la partie postérieure de la suture ; médiocrement ou peu fortement convexes ; creusées d'une fossette humérale ; marquées de points au moins aussi gros que ceux du prothorax, mais un peu plus rapprochés et également pilifères. *Dessous du corps* d'un noir verdâtre ; ponctué ; garni de poils courts et peu apparents. *Prosternum* ne dépassant pas les hanches de devant. *Pieds* d'un jaune pâle ou d'un flave roussâtre : premier article des tarses postérieurs aussi long que le dernier.

Cette espèce est rare dans les environs de Lyon, et assez généralement en France. On la trouve principalement en automne, sous les écorces des chênes et de divers autres espèces d'arbres, envahies par des substances cryptogamiques ; quelquefois dans les troncs des saules pourris ou imprégnés de matières fongueuses.

αα. *Prosternum* dépassant les hanches de devant.

**B. T. ancora** : FABRICIUS. *Corps* oblong ; ponctué ; presque glabre, *en dessous*. *Tête et prothorax* testacés, d'un flave ou d'un fauve testacé : *massue des antennes* obscure. *Elytres* noires, ornées chacune de cinq taches d'un jaune testacé : la première, arrondie, à l'épaule : la deuxième sur le disque, liée ou presque liée à la première : la troisième, étroite, sur la suture, liée ou presque liée à la deuxième : la quatrième, liée au milieu du bord externe : la cinquième, oblique, située sur le disque, vers les deux tiers : ces taches de formes variables et diversement unies.

*Tetratoma ancora*, FABR., Skriver af Natur. Selsk. t. 4, 1er cah. — *Id.* in SCHNEIDER'S n.

Magaz. p. 20. 2. — *Id.* Ent. syst. t. 1, 2. v. 508. 2. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2, p. 575. 4. — HERBST, Natusyt. t. 4, p. 89. 8. pl. 58. f. 8, 11, insecte grossi. — PANZ. Faun. germ. 9. 9. — *Id.* Ent. germ. p. 345. 2. — KUGEL. Verzeich. in SCHNEIDER'S Mag. p. 554. 2. — LATR. Hist. nat. t. 10, p. 515. 2. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 555. 2. — ZETTERST. Faun. lapp. p. 257. 1. — *Id.* Ins. lapp. p. 155. 1. — SAHLB. Ins. fen. p. 460. 1. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 225. 2. pl. 19, fig. 4.

Long. 0,0033 à 0,0036 (1 1/2 à 1 2/3 l.). Larg. 0,0012 à 0,0014 (1/2 à 5/5 l.).

*Corps* oblong ; subparallèle ; médiocrement ou peu fortement convexe ; luisant, en dessus. *Tête* penchée ; couverte de points assez serrés, donnant chacun naissance à un poil d'un fauve livide ; testacée ou d'un fauve testacé : épistome, labre et *palpes* ordinairement un peu plus pâles. *Antennes* un peu prolongées au delà des angles postérieurs du prothorax ; testacées sur les six ou sept premiers articles ; à massue grise ou d'un gris obscur ou noirâtre. *Prothorax* tronqué ou à peine échancré en devant ; arqué sur les côtés ; un peu plus large en arrière qu'en avant ; subarrondi aux angles antérieurs ; à angles postérieurs ouverts, assez prononcés, ou munis d'une très-petite dent souvent peu apparente ; à peu près sans rebord en devant ; muni sur les côtés d'un rebord tranchant, à peine denticulé vu à une forte loupe, relevé de manière à former une gouttière très-étroite ; rebordé à la base ; presque tronqué ou très-légèrement sinué au devant de l'écusson, sub-sinué entre ce point et chaque angle postérieur ; une fois au moins plus large dans son diamètre transversal le plus grand que long dans son milieu ; médiocrement convexe ; marqué de points assez gros, médiocrement rapprochés, donnant chacun naissance à un poil peu distinct, souvent usé ; ordinairement marqué d'une très-petite fossette au devant de chaque sinuosité du quart externe de la base ; testacé, d'un fauve testacé ou d'un roux fauve. *Écusson* presque en carré plus large que long, épointé à ses angles postérieurs et un peu arqué en arrière, ou presque pentagonal ; d'un jaune testacé, ponctué. *Elytres* presque parallèles jusqu'aux deux tiers ou un peu plus, en ogive un peu obtuse postérieurement ; munies latéralement d'un rebord étroit ; paraissant plus étroitement rebordées à la partie postérieure de la suture ; très-médiocrement convexes ; glabres ; garnies de points au moins aussi gros que ceux du prothorax et presque moins rapprochés ; d'un jaune testacé à taches noires, ou noires ou d'un brun noirâtre, ornées chacune de cinq taches d'un jaune testacé : la première subarrondie, à l'épaule : la deuxième, tantôt presque carrée ou subarrondie, tantôt presque triangulaire, du deuxième au troisième sixième de la

longueur, très-voisine de la suture par son angle antéro-interne, séparée du bord externe par un espace à peu près égal à son diamètre, presque liée ou souvent largement liée par son angle antéro-externe à l'angle postéro-interne de la première : la troisième suturale, allongée, obtriangulaire, étroite, du quart à la moitié de la longueur, parfois liée à la deuxième : la quatrième liée au bord externe du tiers aux trois cinquièmes, mais quelquefois prolongée en se rétrécissant jusque près de l'angle sutural, étroite, entaillée en avant ; souvent unie en avant à la partie postérieure de la première, dont elle semble alors la continuation : la cinquième, transverse, un peu obliquement dirigée de dedans en dehors, des trois cinquièmes aux deux tiers de la longueur, un peu plus rapprochée de la suture que du bord externe : ces taches variables dans leur développement et conséquemment dans leur forme et leur union, de telle sorte que les étuis paraissent quelquefois d'un jaune testacé, ornés d'une tache scutellaire cordiforme et chacun de deux autres grosses, noires ou brunes : la tache cordiforme, entourant l'écusson, étendue jusqu'à la moitié de la base, prolongée jusqu'au cinquième de la suture : la première tache particulière à chaque étui, presque transverse, avancée en forme de dent assez longue, à chacune de ses extrémités antérieures, brièvement bidentée dans sa moitié postérieure externe, couvrant du quart aux quatre septièmes de la longueur ou un peu plus, et du huitième juxta-sutural aux trois quarts ou un peu plus de la largeur en avant, plus rapprochée de la suture et du bord externe postérieurement, liée ou à peu près, par sa dent antéro-interne à la tache cordiforme, unie par ses angles postérieurs à la deuxième qui est apicale ; ces deux taches enclosant entre elles un espace d'un jaune testacé, oblique, arqué en arrière. *Dessous du corps* noir ou d'un noir brun ; ponctué : antépectus testacé. *Proster-num* dépassant les hanches de devant. *Pieds* d'un jaune pâle ou d'un flave roussâtre. *Premier article des tarsi postérieurs* aussi grand à peu près que le dernier.

Cette espèce a été découverte par Helwig, dans les environs de Brunswick. Elle est rare en France : on la trouve dans les parties froides ou élevées. Je l'ai prise à la Grande-Chartreuse, dans les mois de juin et de juillet dans les bolets de sapins. Elle a été trouvée en mai dans le Bugey, par M. Cl. Rey, sur les troncs pourris des hêtres.

Obs. La couleur de cette espèce varie. Parfois le vertex et le disque du prothorax sont obscurs. Les parties brunes des élytres passent quelquefois au noir. Le dessous du corps et les pieds montrent aussi leur couleur plus ou moins modifiée : les cuisses postérieures surtout sont

les plus prompts à se rembrunir. Dans ces variétés foncées quelquefois la tache pâle et suturale des élytres disparaît.

## DEUXIÈME FAMILLE.

### ORCHÉSIENS.

CARACTÈRES. *Ongles* simples ou seulement munis, à la base de chacune de leurs branches, d'une dent rudimentaire. *Antennes* de onze articles ; non brusquement terminées par une massue de quatre articles, de grosseur uniforme, aussi longues que tous les articles précédents réunis. *Tête* inclinée ou subperpendiculaire ; voilée en totalité ou presque en totalité par le bord antérieur du prothorax, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus. *Yeux* situés longitudinalement sur les côtés de la tête ; non saillants ; échancrés à leur côté interne. *Hanches antérieures* obliques, ovoïdes, rétrécies postérieurement ; séparées par un prosternum aussi saillant qu'elles.

Ces insectes se divisent en deux branches.

Eperons des tibias postérieurs		<i>Branches.</i>
{	au moins aussi longs que le tiers du premier article des tarsi, Tibias postérieurs soit comprimés, parallèles, et denticulés sur leur arête externe, soit armés d'éperons pectinés en dessous.	ORCHÉSIAIRES.
	très-courts. Tibias postérieurs ni denticulés sur leur arête externe, ni munis d'éperons pectinés.	HALLOMENAIRES.

### PREMIÈRE BRANCHE.

#### ORCHÉSIAIRES.

CARACTÈRES. Eperons des tibias postérieurs au moins aussi longs que le tiers du premier article des tarsi. *Tibias postérieurs* soit parallèles, comprimés et denticulés sur leur arête externe, soit armés d'éperons pectinés en dessous.



Ces insectes se partagent en deux genres :

GENRES.

Tibiae postérieurs plus longs que le premier article des tarses postérieurs ; denticulés sur leur arête externe ; munis d'éperons moins longs que la moitié du premier article des tarses postérieurs , non pectinés en dessous. Hanches postérieures moins développées longitudinalement que le premier arceau ventral.

*Eustrophus.*

Tibiae postérieurs moins longs que le premier article des tarses postérieurs ; non denticulés sur leur arête externe ; armés d'éperons pectinés en dessous, aussi longs au moins que les deux tiers du premier article des tarses postérieurs. Hanches postérieures aussi développées longitudinalement que le premier arceau ventral.

*Orchesia.*

Genre *Eustrophus*, EUSTROPHE ; (Illiger) <sup>(1)</sup> Latreille <sup>(2)</sup>

(*ευστροφος*, mobile.)

CARACTÈRES. *Antennes* de onze articles ; assez courtes ; subcomprimées et un peu dentées à partir du cinquième article, graduellement et faiblement élargies depuis celui-ci jusque vers le milieu de leur seconde moitié, progressivement rétrécies ensuite ; à premier article comprimé, le plus long : le deuxième, de moitié plus court que le suivant : les quatrième à dixième , à peine aussi longs ou moins longs que larges : le onzième moins court que le dixième, rétréci à son extrémité, paraissant presque formé de deux articles soudés. *Tête* petite ; inclinée ; à peu près entièrement voilée par le bord antérieur du prothorax, quand l'insecte est vu en dessus. *Yeux* longitudinalement situés sur les côtés de la tête ; ordinairement contigus au bord du prothorax ; échancrés à leur côté interne ; séparés l'un de l'autre par un espace plus grand que le diamètre transversal de l'un d'eux. *Palpes maxillaires* subcomprimés ; à articles assez serrés, grossissant graduellement : le dernier tronqué à son extrémité. *Prothorax* en demi-cercle plus large que long : à côtés déclives et tranchants sur toute leur longueur. *Postépisternums* faiblement rétrécis d'avant en arrière ; un peu obliquement tronqués à l'extrémité. *Pieds* comprimés ; de médiocre

(<sup>1</sup>) ILLIGER, Magaz. t. 6, p. 335

(<sup>2</sup>) LATREILLE, Gener, t. 4, p. 379. — *Id.* Regu. Anim. de Cuv. t. 3 (1817), p. 304.

longueur. *Hanches postérieures* moins développées dans le sens de la longueur de l'insecte, que le premier arceau ventral. *Cuisses* comprimées. *Tibias* parallèles ; comprimés, les postérieurs plus longs que le premier article des tarses des mêmes pieds ; munis d'éperons non pectinés en dessous, égaux à peu près au tiers de la longueur du premier article des tarses. *Tarses* à pénultième article entier : le premier des postérieurs aussi grand que tous les suivants pris ensemble. *Corps* ovalaire ou oblong.

Ces insectes paraissent vivre à toutes les époques de leur vie active dans les substances cryptogamiques.

La larve de la seule espèce connue n'a pas encore été décrite.

**1. E. dermestoides**, FABRICIUS. *Ovalaire ou oblong ; médiocrement convexe ; noir ou d'un noir châtain ; ponctué d'une manière fine, ruguleuse ou presque squammiforme ; garni en dessus de poils fauves, fins, soyeux et couchés. Palpes, antennes et pieds, d'un rouge brun. Elytres à dix stries très-légères ou à dix rangées striales de points graduellement plus faibles d'avant en arrière,*

*Mycetophagus dermestoides*, FABR. Entom. Syst. t. 1, 2. p. 498, 3. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2, p. 368, 13. — OLIV. Encycl Méth. t. 8 (1821), p. 71, 14.

*Eustrophus dermestoides*, ILLIG. Mag. t. 6 (1807), p. 363. — LATR. Gener. t. 4, p. 379. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2, p. 248. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 610.

Long. 0,0036 à 0,0061 (2 1/2 à 2 3/4 l.). Larg. 0,0029 à 0,0032 (1 1/3 à 1 2/3 l.)

*Corps* ovalaire ou oblong ; obtusément arqué longitudinalement ; médiocrement convexe ; en dessus, noir ou d'un noir châtain ; ponctué d'une manière fine, ruguleuse ou faisant paraître les intervalles presque squammiformes : chaque point donnant naissance à un poil fauve, fin, soyeux, couché. *Tête* petite. *Palpes* et *antennes* d'un rouge brun ou d'un brun rouge. *Prothorax* obtusément arqué en devant ; à angles antérieurs presque nuls, inclinés et invisibles en dessus ; à côtés déclives, sans rebords, et tranchants en dessous sur toute leur longueur ; paraissant, vu en dessus, par l'effet de la déclivité de ses bords, en demi-cercle près d'une fois plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; rayé au devant de son bord postérieur et paraissant, par-là, muni d'une sorte de rebord moins étroit dans son milieu que près des côtés ; obtus au devant de l'écusson et sinué près de chaque angle postérieur : chacun de ceux-ci, dirigé en arrière et embrassant un peu les angles huméraux des élytres ; peu convexe sur

le dos, convexement déclive sur les côtés. *Ecusson* en triangle subéquilateral; à côtés un peu curvilignes. *Elytres* à peine moins larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; près de trois fois aussi longues que lui: graduellement et presque insensiblement rétrécies jusqu'aux deux tiers, en ogive obtuse ou subarrondies à l'extrémité; rebordées; peu convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés; à dix stries très-légères, ou plutôt à dix rangées striales de points moins petits en devant, graduellement plus légers et moins apparents postérieurement, longitudinalement séparés les uns des autres par un espace à peine plus grand que leur diamètre; offrant en outre une rangée rudimentaire prolongée depuis l'écusson jusqu'au tiers environ de la longueur. *Intervalles* plans; ponctués et garnis de poils comme le reste du dessus. *Dessous du corps* noir ou d'un noir châtain, parfois brun châtain; peu pubescent sur la poitrine; garni sur le ventre de poils plus apparents, souvent d'un fauve mi-doré à certain jour. *Pieds* bruns, d'un brun rouge ou d'un rouge brun. *Postépisternums* trois fois aussi longs ou un peu plus qu'ils sont larges dans leur milieu. *Cuisses antérieures* et *intermédiaires* presque parallèles: les postérieures, un peu arquées.

Cette espèce, assez rare en France, se trouve principalement dans les parties froides ou montagneuses. Elle a été prise, par M. le capitaine Gaubil, dans les environs de Bitche, en Alsace.

Genre *Orchesia*, ORCHÉSIE; LATREILLE (1).

(ὄρχησαί, je saute).

CARACTÈRES. *Antennes* insérées vers le milieu ou un peu avant du côté interne des yeux, dans une échancrure de ces organes; assez courtes; de onze articles; le deuxième à peine moins long que le troisième: les quatrième à dixième un peu moins longs que larges: les cinq derniers constituant une massue: le dernier, plus long que large, souvent rétréci ou comme appendicé à son extrémité. *Tête* petite; inclinée; voilée presque entièrement par le bord antérieur du prothorax, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus. *Mandibules* bifides. *Palpes maxillaires* allongés; à articles serrés: le troisième, court, transverse: le quatrième cultriforme. *Yeux* longitudinalement situés sur les côtés de la tête; peu ou point

---

(1) LATREILLE, Gener. t. 2, p. 195. — Id. t. 4, p. 379.

saillants; échancrés vers le milieu de leur côté interne. *Prothorax* arqué en avant; à côtés tranchants dans leur moitié postérieure seulement. *Repli des élytres* latéral. *Prosternum* séparant les hanches de devant; aussi saillant qu'elles. *Mésosternum* prolongé entre les hanches, en se rétrécissant graduellement. *Postépisternums* rétrécis d'avant en arrière, terminés en pointe obtuse. *Pieds postérieurs* allongés. *Hanches postérieures* à peu près aussi développées, dans le sens de la longueur de l'insecte, que le premier arceau ventral. *Cuisses postérieures* comprimées; un peu arquées, subéchanquées dans la seconde moitié de leur arête inférieure; cette arête tranchante, épointée ou subcanaliculée postérieurement, pour permettre au tibia, dans la flexion, de se loger en partie sous elle. *Tibias postérieurs* plus courts que le premier article des tarses des mêmes pieds. *Eperons* des tibias antérieurs courts: ceux des intermédiaires et des postérieurs pectinés d'un côté: les intermédiaires médiocres: les postérieurs au moins aussi longs que les deux tiers du premier article des tarses postérieurs. *Tarses antérieurs* assez épais, subparallèles: les derniers graduellement rétrécis: avant-dernier article des antérieurs et des intermédiaires presque bilobé, avancé en forme de sole sous l'article suivant: avant-dernier article des tarses postérieurs entier. *Corps* arqué longitudinalement, rétréci postérieurement.

Les Orchésies, soit dans leur jeune âge, soit sous leur forme parfaite, vivent aux dépens des substances cryptogamiques, principalement de celles qui s'attachent en parasites aux troncs des arbres.

Dans leur dernier état, grâce à leurs pieds postérieurs plus longs, à leurs quatre derniers éperons pectinés, et dont les derniers surtout sont si allongés, elles jouissent de la faculté de bondir, c'est-à-dire d'envoyer leur corps à une certaine distance. Leurs hanches de derrière ont reçu un développement remarquable, pour concourir à ces actes, en fournissant aux muscles chargés de faire mouvoir la cuisse des points d'attache plus nombreux.

α Yeux séparés l'un de l'autre, dans leur point le plus rapproché, par un espace à peine plus grand que le tiers de celui compris entre la base des deux antennes. Trois derniers articles des antennes plus longs chacun et plus gros que le huitième.

1. ♂. *micans*; PANZER. Corps ordinairement d'un brun de poix, généralement plus clair, fauve ou d'un fauve brunâtre à l'extrémité; ruguleusement ponctué; pubescent et soyeux en dessus. Trois derniers articles des antennes plus longs, formant avec les deux précédents une

massue fusiforme. Yeux séparés, dans leur point le plus rapproché, par un espace à peine plus grand que le tiers de l'espace compris entre les antennes. Pieds souvent plus clairs que le reste du corps.

*Megatona picea*, HERBST. *Naturs.* t. 4, p. 97. 5. pl. 39. fig. 5, a, b, c.

*Dermestes piceus*, PANZ. *Entom. German.* p. 97. 11.

*Hallomenus micans*, PANZ. *Faun. Germ.* 16. 18. — *Id.* *Ent. Germ.* p. 370. 2. —

ILLIG. *Kaef. Pr.* p. 135. 3. — PAYK. *Faun. Suec.* t. 2. p. 181. 2. — GYLLENH. *Ins.*

*Suec.* t. 2. p. 552. 6. — *Id.* t. 4. p. 510. 6. — SAHLB. *Ins. Fenn.* p. 453. 6.

*Hallominus micans*, WALCK. *Faun. par.* t. 1, p. 175. 2. — DEFTSCH. *Faun. Austr.* t. 2. p. 267. 1.

*Dircaea micans*, FABR. *Syst. Eleuth.* t. 2. p. 91. 11.

*Mordella boleti*, MARSH. *Entom. brit.* p. 494. 20.

*Anaspis clavicornis*, LATR. *Hist. nat.* t. 10. p. 417. 1.

*Orchesia micans*, LATR. *Gener.* t. 2. p. 195. 1. — SCHÖNH. *Synon. Ins.* t. 2. p. 51. 1.

— LAMARCK, *Anim. s. vert.* t. 4, p. 586. 1. — GOLDFUSS, *Handb.* p. 555. — GUÉRIN,

in *Dict. class. d'hist. nat.* t. 12. p. 301. — CURTIS, *Brit. Entom.* t. 5. 197. —

ZETTERST. *Faun. lapp.* p. 285. 1. — *Id.* *Ins. lapp.* p. 164. 1. — STEPH. *Brit.*

*Entom.* t. 5. p. 41. 1. — *Id.* *Manual*, p. 350. 2590. — DE CASTELN. *Hist. nat.*

t. 2. p. 247. 1. — L. REUTENB. *Faun. aust.* p. 611.

Long. 0,0039 à 0,0050 (1  $\frac{3}{4}$  à 2  $\frac{1}{4}$  l.). Larg. 0,0014 à 0,0016 (2/3 à 7/10 l.).

*Corps* oblong; longitudinalement arqué; médiocrement ou faiblement convexe; ordinairement brun ou d'un brun de poix, généralement plus clair ou d'un brun fauve ou fauve vers l'extrémité, parfois presque entièrement de cette dernière couleur; ponctué d'une manière fine, ruguleuse, faisant paraître les intervalles presque squamiformes: chaque point donnant naissance à un poil fauve, soyeux, fin et couché. *Tête, palpes* et *antennes* d'un fauve brunâtre, fauves ou d'un fauve testacé: les antennes, à premier article renflé: le deuxième plus gros et un peu plus court que le troisième, comme lui un peu plus long que large: les quatrième à huitième, plus larges que long: les neuvième et dixième au moins aussi longs chacun que le troisième: le onzième, le plus long, rétréci en pointe à son extrémité: les trois derniers plus longs chacun et plus gros que le huitième, constituant avec les deux précédents qui sont courts une massue subfusiforme, offrant vers le quart basilaire du dernier sa plus grande largeur. *Yeux* bruns; séparés l'un de l'autre, dans leur point le plus rapproché, par un espace à peu près égal au tiers du diamètre transversal de l'un d'eux, à peine plus grand que le tiers de l'espace compris entre les antennes, à leur base. *Prothorax* obtusément arqué ou subarrondi en



devant; à angles antérieurs presque nuls, inclinés et invisibles en dessus; élargi en ligne courbe un peu irrégulière sur les côtés, offrant vers les angles postérieurs sa plus grande largeur; d'un tiers environ moins long sur son milieu qu'il est large à la base; tronqué ou obtus et un peu prolongé en arrière sur le cinquième ou sur le quart médiale de celle-ci, légèrement sinué de chaque côté de cette troncature, avec les angles postérieurs un peu courbés en arrière; médiocrement convexe en devant, peu convexe en arrière; parfois marqué d'une légère fossette au devant de chaque sinuosité basilaire, rendant celles-ci moins indistinctes; brun ou d'un brun fauve; pointillé; garni de poils fauves. *Ecusson* en demi-cercle plus large que long et un peu obtus postérieurement. *Elytres*, en devant, de la largeur du prothorax à ses angles postérieurs; quatre fois au moins aussi longues que lui; à peine élargies depuis la base jusqu'à leur milieu; rétrécies ensuite jusqu'à l'angle sutural; peu convexes sur le dos; relevées à la suture ou munies d'une sorte de rebord sutural, plus apparent depuis le quart ou le tiers de leur longueur à peu près jusqu'à l'extrémité, paraissant, par là, rayées d'une sorte de strie juxta-suturale. *Dessous du corps* d'un rouge brun ou d'un fauve brun ou brunâtre; finement ponctué; parcimonieusement pubescent. *Mésosternum* presque parallèle ou graduellement moins étroit. *Postépisternums* trois fois aussi longs qu'ils sont larges à la base. *Pieds* d'un brun fauve, fauves ou d'un fauve testacé, surtout sur les jambes et sur les tarses; premier article des tarses postérieurs à peu près ou à peine aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce paraît habiter presque toutes les parties de la France. Elle vit dans les bolets parasites des chênes, des noyers, des sapins, etc. M. Guérin, dans le Dictionnaire classique d'histoire naturelle, t. 12, p. 301, a le premier fait connaître les premiers états de cet insecte. Sa larve a été décrite depuis par MM. Waterhouse (1), Braselmann (2) et plus complètement par MM. Chapuis et Candèze (3). Elle n'est pas bien rare dans les environs de Lyon.

(1) Entomolog. Magaz. t. 3. (1834), n. 9. p. 576. pl. 10. fig. 2.

(2) Verhandl. der Naturforsch. Verein de Preuss-Rheinl. t. 1, p. 17.

(3) Catalogue des Larves des Coléoptères, p. 180. pl. 6. fig. 8. 8, a et 8, b', détails.

αα. Yeux séparés l'un de l'autre, dans leur point le plus rapproché, par un espace plus grand que la moitié de celui compris entre les antennes : quatre derniers articles de celles-ci plus longs chacun que le septième.

β. Elytres unicolores.

2. *O. sepicola*; ROSENHAUER. Corps ordinairement brun sur la tête, fauve ou d'un brun fauve sur le prothorax et les élytres; ruguleusement pointillé et garni de poils soyeux. Quatre derniers articles des antennes plus longs chacun que le septième, formant une massue grossissant jusqu'à la moitié du dernier. Yeux séparés, dans leur point le plus rapproché, par un espace égal à plus de la moitié de celui compris entre les antennes. Prothorax bissubsinné à la base; creusé vers chaque sinuosité d'une fossette profonde. Dessous du corps brun ou fauve. Pieds fauves ou d'un fauve testacé.

*Orchesia sepicola*, ROSENHAUER, Beitrag. zur Insekten-Faun. Europ. 1<sup>er</sup> cah. (1847,) p. 52. (suivant le type, obligeamment communiqué par l'auteur).

Long. 0,0033 (1 1/2 l.) Larg. 0,0011 à 0,0013 (1/2 à 3/5 l.)

Corps oblong; longitudinalement arqué; médiocrement ou faiblement convexe; d'un brun fauve ou d'un fauve brun sur la tête, fauve sur le prothorax et sur les élytres; ponctué, d'une manière fine, ruguleuse, faisant paraître les intervalles presque squamiformes; chaque point donnant naissance à un poil fauve, fin, couché. Tête brune ou d'un brun fauve. Palpes d'un testacé pâle. Antennes d'un testacé pâle à la base, plus obscur à l'extrémité; à premier article renflé: le deuxième un peu plus gros et au moins aussi long que le troisième, comme lui un peu plus long que large: les quatrième à septième plus larges que longs: les huitième à dixième, plus longs chacun que le troisième: les quatre derniers constituant avec le précédent, qui est court, une massue presque fusiforme ou plutôt grossissant graduellement jusque vers la moitié du onzième: celui-ci, le plus long de tous, rétréci en pointe à son extrémité. Yeux bruns; séparés l'un de l'autre, dans leur point le plus rapproché, par un espace à peu près égal au diamètre transversal de l'un d'eux, égal environ aux deux tiers de celui compris entre les antennes, à leur base. Prothorax obtusément arqué ou subarrondi en devant; à angles antérieurs inclinés et invisibles en dessus; élargi sur les côtés en ligne courbe assez régulière, offrant sa plus grande largeur vers les angles postérieurs ou plutôt un peu au devant; d'un tiers environ plus large à la

base qu'il est long sur son milieu : presque en ligne droite a son bord postérieur, avec les angles un peu courbés en arrière, à peine plus prolongé en arrière sur le tiers médiaire de ladite base, et à peine sinué de chaque côté de cette partie qui est plus sensiblement en ligne droite ; médiocrement convexe en devant, peu convexe en arrière ; marqué d'une fossette très-prononcée, vers chaque subsinuosité basilaire, c'est-à-dire vers chaque quart externe environ de la base ; cette fossette avancée jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes postérieurs de la longueur ; fauve ; pointillé ; garni de poils concolores. *Ecusson* plus large que long, un peu rétréci d'avant en arrière, obtusément tronqué à l'extrémité : fauve ou d'un fauve nébuleux : pointillé ; pubescent. *Elytres*, en devant, au moins de la largeur du prothorax à ses angles postérieurs ; quatre à cinq fois aussi longues que lui ; à peine élargies depuis la base jusqu'à leur milieu, rétrécies ensuite jusqu'à l'angle sutural ; peu convexes sur le dos ; relevées à la suture, ou munies d'une sorte de rebord sutural, moins distinct près de la base et prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité, paraissant, par là, rayées d'une strie juxta-suturale ; fauves ou d'un fauve testacé plus clair vers leur extrémité ; pointillées ; garnies de poils fauves, soyeux, fins et couchés. *Repli* réduit à une tranche presque à partir des hanches postérieures. *Dessous du corps* ordinairement d'un fauve brun ou brunâtre ; finement ponctué : parcimonieusement pubescent. *Mésosternum* graduellement rétréci. *Postépisternums* quatre fois au moins aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. *Pieds* fauves ou d'un fauve testacé : premier article des tarses postérieurs au moins aussi longs que tous les suivants réunis.

Cette espèce habite les parties froides ou montagneuses de quelques-unes de nos provinces. Elle a été prise dans les Alpes de la Grande-Chartreuse par M. Foudras, et dans les montagnes du Bugey par M. Cl. Rey.

Obs. Elle se distingue de l'*O. micans* par sa taille plus petite ; par le huitième article de ses antennes à peu près aussi long que le neuvième ; par son prothorax creusé de deux fossettes longitudinales très-marquées, vers chaque quart externe de sa base ; par l'espace interoculaire.

♂♂. *Elytres* ornées de bandes noires ou noirâtres.

3. *O. fasciata*; PAYKULL. *Corps* oblong ; garni de poils soyeux. *Yeux* séparés, dans leur point le plus rapproché, par un espace au moins

égal à leur diamètre transversal. Quatre derniers articles des antennes plus longs chacun que le précédent, et constituant avec celui-ci une massue graduellement plus grosse jusqu'aux deux tiers du dernier. *Prothorax* bisinnué et marqué de deux fossettes, à la base. Élytres d'un fauve testacé ou testacées, parées chacune de trois bandes noires ou brunes : la première, longitudinale, non liée au bord externe, plus avancée dans son tiers médiane : les deuxième et troisième, transversales : la deuxième, courant depuis la moitié jusqu'aux deux tiers : la troisième, apicale.

*Hallomenus fasciatus*, PAYK. FAUN. SUEC. t. 2. p. 182. 4. — ILLIG. KAEF. PREUSS. p. 135. 2. — SCHÖNH. SYN. INS. t. 2. p. 52. 2. — GYLLENH. INS. SUEC. t. 2. p. 551. 5. — *Id.* t. 4. p. 509 5.  
*Orchesia fasciata*, ZETTERST. FAUN. LAPP. p. 285. 2. — *Id.* INS. LAPP. p. 164. 2. — STEPH. MAN. p. 331. 2592. — L. DEFOUR, EXCURS. ENTOM. p. 67. 411. — L. REDTENS. FAUN. AUSTR. p. 611.

Long. 0,0045 (2 l.). Larg. 0,0015 (2/3 l.)

Corps oblong ; longitudinalement arqué ; médiocrement ou faiblement convexe ; ponctué d'une manière fine, ruguleuse, faisant paraître les intervalles presque squammiformes : chaque point donnant naissance à un poil fin, soyeux, couché, fauve ou d'un fauve obscur sur les parties foncées, d'un fauve cendré sur les bandes testacées des élytres. Tête fauve ou d'un fauve testacé. Palpes et antennes ordinairement de cette dernière teinte : les antennes, à premier article peu renflé, presque d'égale grosseur : le deuxième, un peu plus court que le troisième : les cinquième et sixième presque de même grosseur : le septième un peu plus gros de la base à l'extrémité : les quatre derniers plus longs chacun que le septième, et formant avec celui-ci une massue subcomprimée, grossissant graduellement un peu jusqu'aux deux tiers du dernier article : celui-ci en ogive obtuse à son extrémité. Yeux bruns : séparés l'un de l'autre, sur le milieu du front, par un espace à peine égal au diamètre de l'un d'eux, quand l'insecte est vu en dessus, ou un peu moins grand que ce diamètre, égal environ aux deux tiers de l'espace compris entre les antennes, à leur base. *Prothorax* obtusément arqué en devant ; élargi en ligne courbe un peu irrégulière sur les côtés ; à angles antérieurs presque nuls et invisibles en dessus ; élargi en ligne courbe un peu irrégulière sur les côtés ; offrant vers les angles postérieurs sa plus grande largeur ; d'un tiers environ moins long sur son milieu qu'il est large à la base ; tronqué ou obtus et un peu prolongé en arrière sur le cinquième ou le quart

médiaire de celle-ci ; faiblement sinué entre le milieu de son bord postérieur et les angles : ceux-ci, émoussés, presque rectangulaires ou à peine dirigés en arrière ; convexe en devant, peu convexe en arrière ; rayé, au devant de chaque sinuosité basilaire, d'un sillon longitudinal assez faible ou un peu obsolète, avancé jusqu'au tiers postérieur de la longueur ; ordinairement d'un noir brun ou d'un brun noir, avec le bord antérieur passant souvent au brun rouge ou au fauve brunâtre, quelquefois entièrement fauve, quand la matière colorante ne s'est pas suffisamment développée ; ponctué et garni de poils comme il a été dit. *Ecusson* obtusément arqué en arrière ; une fois plus long que large. *Elytres*, en devant, de la largeur du prothorax à ses angles postérieurs ; quatre fois environ aussi longues que lui ; à peine élargies depuis la base jusqu'à leur milieu ; rétrécies ensuite ; peu convexes sur le dos ; ordinairement testacées ou d'un roux testacé, parées chacune de trois bandes noires ; la première, plus longue que large, liée à la suture du cinquième aux deux cinquièmes de la longueur, non prolongée jusqu'au bord externe, comme composées de trois taches longitudinales, parallèles : la médiane d'un tiers plus prolongée en avant que les autres, avancée jusque près de la base : les deuxième et troisième transverses : la deuxième, couvrant de la moitié aux deux tiers de la longueur : la troisième, apicale ; ponctuées comme il a été dit ; garnies de poils fauves sur les parties obscures, testacées sur les parties de cette couleur. *Dessous du corps* d'un brun rouge ; luisant ; pointillé ; garni de poils soyeux. *Mésosternum* rétréci d'avant en arrière. *Postépisternums* trois fois environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. *Pieds* fauves ou d'un fauve brunâtre, avec les cuisses ordinairement plus obscures ou moins claires que les jambes et les tarses. *Eperons* des tibias postérieurs peu inégaux : le plus long prolongé jusqu'aux trois quarts de la longueur du premier article des tarses : cet article au moins aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce, généralement peu commune en France, se plaît principalement dans les parties humides, froides ou montagneuses. Elle vit dans les bolets.

Obs. Dans l'état normal, le prothorax et les bandes des élytres sont d'un noir brun ; mais cette couleur varie suivant le développement de la matière colorante, et souvent la teinte se montre dégradée jusqu'à passer au fauve : les parties testacées des élytres sont alors ordinairement plus pâles. Le dessous du corps et les pieds se ressentent également alors de ce défaut de matière colorante.



A cette division se rapporte l'espèce suivante, qu'on trouve en Autriche, mais qui n'a, je crois, pas encore été trouvée en France.

*Orchesia undulata*, KRAATZ. Corps garni de poils soyeux en dessus ; fauve sur la tête et sur le prothorax, d'un fauve testacé sur les élytres ; le prothorax plus obscur sur la ligne médiane, à deux fosselles basilaires : les élytres ornées sur leur moitié antérieure d'une figure ovale, formée par la réunion de quatre taches ; dont l'antérieure s'avance presque jusqu'à la base, et postérieurement de deux bandes noires. Yeux séparés l'un de l'autre, dans leur point le plus rapproché, par un espace plus grand que leur diamètre. Massue des antennes de cinq articles, subfusiforme, grossissant jusqu'au tiers basilaire du onzième ; les huitième à dixième, plus grands chacun que le septième. Pieds d'un fauve testacé.

*Orchesia undulata*, KRAATZ ; in Entomol. Zeit. t. 14. (1853) p. 235. pl. 3. fig. 3.  
*Orchesia fasciata*, CURTIS, Brit. entom. t. 5. 157 ?

Long. 0,0052 (2 1/3 l.). Larg. 0,0016 (2/3 l.).

Corps oblong ou suballongé. Yeux séparés l'un de l'autre, dans leur point le plus rapproché, par un espace plus grand que le diamètre de l'un d'eux, égal environ aux deux tiers de celui compris entre les antennes à la base. Antennes d'un fauve testacé à la base et à l'extrémité, avec leur partie intermédiaire brune ou noirâtre ; à massue subfusiforme, grossissant jusqu'au tiers basilaire du dernier article : celui-ci, le plus long, conique dans la seconde moitié. Prothorax tronqué au devant de l'écusson, subsinué de chaque côté de cette troncature ; creusé d'une fosselle au devant de chaque quart externe de la base ; plus obscur sur sa ligne médiane et sur ses côtés. Elytres ornées chacune d'une figure ovale et de deux bandes noires ou d'un noir brun : la figure ovale couvrant au moins les deux tiers submédiaux de chaque élytre, prolongée presque jusqu'à la moitié, formée de quatre taches : l'antérieure, parallèle, naissant presque de la base, vers le milieu de celle-ci, prolongée presque jusqu'au cinquième de leur longueur : les deuxième et troisième, linéaires, parallèles : la deuxième ou interne naissant environ du cinquième de la longueur : la troisième un peu plus avancée : la quatrième ou postérieure, transverse, prolongée postérieurement en pointe à son angle postéro-interne : la bande antérieure, transversale, naissant un peu après la moitié, couvrant jusqu'aux deux tiers, anguleuse en devant : la bande postérieure,

apicale, couvrant le dernier cinquième. *Dessous du corps* noir sur les parties pectorales, d'un fauve testacé sur le ventre. *Pieds* d'un fauve testacé : le plus long des tibias postérieurs au moins aussi long que les deux tiers du premier article des tarses : cet article aussi long que tous les suivants réunis.

A ce genre se rapporte encore l'espèce suivante, qu'on trouve également en Allemagne, mais qui ne paraît pas avoir été signalée en France.

**Or. grandicollis**; ROSENHAUER. *Aptère*; proportionnellement plus large; garnie de poils soyeux; d'un noir brun, en dessus et en dessous. *Antennes, palpes et pieds* d'un fauve ou roux testacé. *Massue* des premières grossissant graduellement jusqu'à la moitié au moins du dernier article : de cinq articles : les huitième à dixième un peu plus longs chacun que le septième. *Yeux* séparés l'un de l'autre, dans leur point le plus rapproché, par un espace presque égal au diamètre transversal de tous les deux, quand l'insecte est vu en dessus. *Prothorax* un peu arqué en devant, à la base; sans fossettes basilaires.

*Orchesia grandicollis*, ROSENHAUER, Beitr. zur Insekten-Faun. Europ. 1<sup>er</sup> cah. p. 33. (suivant le type).

Long. 0,0045 à 0,0051 (2 à 2 1/4 l.). Larg. 0,0016 à 0,0019 (2/5 à 3/4 l.).

**Obs.** Cette espèce se distingue des précédentes par son corps proportionnellement plus large; d'un noir brun, en dessus, avec les bords du prothorax et des élytres paraissant parfois d'un brun rougeâtre : par l'espace séparant les yeux dans leur point le plus rapproché, plus large, à peu près égal au diamètre transversal des deux yeux ou du moins de leur partie visible en dessus : cet espace d'un cinquième ou d'un quart moins large que celui qui sépare les antennes à la base; par le prothorax proportionnellement moins long ou plus large, offrant plus sensiblement vers les trois cinquièmes de la longueur sa plus grande largeur; offrant les angles postérieurs prolongés en arrière, et paraissant, par là, coupé en arc dirigé en devant, à la base, ou à peine anguleusement prolongé en arrière au devant de l'écusson; sans fossettes basilaires; par ses ailes nulles ou rudimentaires.

## DEUXIÈME BRANCHE.

## HALLOMÉNAIRES.

CARACTÈRES. *Eperon des tibias postérieurs* très-courts. *Tibias postérieurs* ni denticulés, ni armés d'éperons pectinés.

Ils se réduisent au genre suivant :

Genre *Hallomenus*, HALLOMÈNE ; (Helwig) Panzer (1).

(ἀλλομυζαί, je saute).

CARACTÈRES. *Antennes* de onze articles ; insérées dans l'échancrure des yeux ; subcomprimées ; à peu près de même grosseur à partir du quatrième article : le deuxième, de moitié au moins plus court que le suivant : le troisième plus long que les quatrième à dixième : ceux-ci faiblement élargis de la base à l'extrémité, paraissant, par là, légèrement dentés, à peine aussi longs qu'ils sont larges à l'extrémité : le onzième, ovoïde, rétréci dans sa seconde moitié ou comme appendicé ou formé de deux articles soudés. *Palpes maxillaires* à dernier article plus grand, comprimé ; subparallèle ; obliquement tronqué à son extrémité. *Yeux* très-échancrés à leur côté interne ; notablement séparés l'un de l'autre, dans leur point le plus rapproché. *Prothorax* élargi d'avant en arrière ; aussi large à la base que les élytres ; peu ou point tranchant en avant sur les côtés. *Mésosternum* graduellement rétréci en pointe ; aussi longuement prolongé que les hanches postérieures. *Postépisternums* rétrécis d'avant en arrière. *Hanches postérieures* obliquement transversales ; plus courtes, au moins sur les côtés, que l'arceau ventral. *Cuisses* comprimées ; presque planes en dessous. *Eperons* des jambes intermédiaires et postérieures très-courts ; non pectinés. *Tarses* à articles tous entiers.

1. **II. humerollis** ; PANZER. Suballongé ; médiocrement convexe ; ruguleusement pointillé ; garni de poils fins et couchés. *Prothorax* d'un testacé rou-sâtre, paré de deux bandes longitudinales noires, raccourcies ; marqué au devant de la base de deux lignes enfoncées longitudinales et courtes. *Elytres* parfois brunes, avec la base et plus longuement la partie

---

(1) Faun. Insect. German. Initia. cah. 16. (1794.) n° 17.

*humérale d'un testacé roussâtre, quelquefois entièrement d'un fauve roussâtre ou testacé; offrant de légères stries raccourcies à leurs extrémités. Antennes, palpes et cuisses flaves ou d'un flave roussâtre. Dessous du corps d'un testacé roussâtre. Premier article des tarses postérieurs au moins aussi long que tous les suivants réunis.*

*Mordella ? humeralis* RIEN, Bemerk. in SCHNEIDER's Neu. Magaz. p. 238.

*Elateroides boleti*, (KUGELANN) in SCHNEIDER's Neu. Magaz. p. 239.

*Ips elateroides*, KUGELANN, in SCHNEIDER's Neu. Magaz. p. 239.

*Hallomenus humeralis*, PANZER, Faun. germ. 16. 17. — *Id.* Entom. germ. p. 569. 1. — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 334. 1. — *Id.* Gen. t. 2. p. 194. 1. — SCHONH. Syn. Ins. t. 3. p. 51. 1. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 380. 1. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 527. 1. — GOLDFUSS, Handbuch. p. 332. — SAHLB. Ins. fenn. p. 451. 1. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 348. 1. — GUÉRIN Icon. du Regn. anim. de Cuv. p. 126. pl. 32. fig. 10. et fig. a à c. détails. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 610.

*Hallominus bipunctatus*, PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 179. 1. — WALCK. Faun. par. t. 1. p. 172. 1.

*Serropalpus (Hallomenus) humeralis*, ILLIG. Käf. Preus. p. 134. 1.

*Dircaea humeralis*, FABR. Syst. Eleuth. t. 2. p. 91. 10.

*Dinophorus humeralis*, (ILLIG.) Magaz. t. 6. p. 302. 10.

*Hallominus humeralis*, DUFTECH. Faun. austr. t. 2. p. 268. 2. — AUBOUIN, in Dict. class. d'Hist. nat. t. 8. p. 25.

Var.  $\alpha$ . Prothorax testacé, sans taches.

*Hallominus humeralis*, PANZ. Entom. germ. p. 369. 1.

Long. 0,0045 à 0,0056 (2 à 2 1/2 l.). Larg. 0,0011 à 0,0018 (1/2 à 4/5 l.).

*Corps* suballongé; médiocrement convexe; pointillé d'une manière ruguleuse ou squammuliforme; garni de poils soyeux, fins et couchés, à peu près de même couleur que le fond. *Tête* petite; subarrondie; infléchie; pointillée; pubescente; ordinairement brune, parfois d'un fauve obscur ou même fauve: épistome et labre d'une teinte plus claire. *Palpes maxillaires* d'un flave ou d'un testacé roussâtre. *Yeux* d'un noir brun; échancrés au milieu de leur côté interne. *Antennes* prolongées un peu au-delà des angles postérieurs du prothorax; d'un testacé roussâtre; pubescentes; à premier et deuxième articles un peu plus grêles: grossissant de la base à l'extrémité. *Prothorax* tronqué en devant à son bord antérieur et voilant jusqu'aux yeux la partie postérieure de la tête; à angles de devant déclives, invisibles en dessus, émoussés et plus ouverts que l'angle droit; élargi en ligne un peu courbe jusqu'aux angles postérieurs qui sont rectangulairement ouverts, vifs et un peu couchés en arrière: bissubsinné à la base;

muni à cette dernière d'un rebord très-étroit et à peine apparent ; sans rebord sur les côtés, qui sont plus obtusément tranchants sur leur première moitié que sur la seconde : près d'une fois plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; convexe en devant, graduellement peu convexe en arrière ; squammuleusement pointillé ; marqué au devant de la partie de la base correspondant à chaque subsinuosité, d'une ligne longitudinale courte et enfoncée ; d'un testacé roussâtre ; orné de deux bandes longitudinales noires ou d'un noir brun, dans la direction de chaque ligne enfoncée, à peine prolongées jusqu'à la base, non avancées jusqu'au bord antérieur ; garni de poils soyeux, fins et couchés, de la couleur du fond. *Ecusson* rétréci d'avant en arrière, presque en triangle tronqué, à peine aussi long que large ; fauve ; pubescent. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; quatre fois aussi longues que lui ; subparallèles jusqu'au-delà de la moitié, rétrécies ensuite en ligne un peu courbe, faiblement d'abord, d'une manière plus prononcée en approchant de l'extrémité ; médiocrement convexes ; pointillées d'une manière squammuleuse ; ordinairement brunes, tantôt avec une tache humérale d'un testacé roussâtre ou d'un rouge brun testacé, plus ou moins restreinte, tantôt avec cette tache plus étendue, peu nettement limitée, d'autres fois avec la base de même couleur, parfois enfin uniformément d'un châtain testacé ou d'un rouge brun testacé ; offrant, sur la moitié interne de leur disque, de légères stries à peine avancées jusqu'à la base et non prolongées jusqu'à l'extrémité, moins distinctement striées sur la moitié externe ; garnies de poils fins, soyeux, couchés, de la couleur du fond. *Repli* subgraduellement rétréci et réduit à une tranche, à partir de l'extrémité du troisième arceau ventral. *Dessous du corps* d'un roux jaune ou d'un roux testacé, avec les côtés des médi et postpectus ordinairement bruns ou d'un brun rougeâtre ; pointillé ; peu pubescent. *Postépisternums* rétrécis d'avant en arrière ; quatre fois environ aussi longs qu'ils sont larges en devant. *Pieds* flaves ou d'un jaune pâle sur les cuisses, d'un jaune roux sur les tibia et surtout sur les tarses. *Tarses* à articles entiers : le premier des postérieurs au moins aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce vit aux dépens de diverses substances cryptogamiques principalement parasites des sapins et des pins. Elle aime les parties froides ou tempérées. Je l'ai prise à la Grande-Chartreuse (Isère) et dans les environs du Logis du Pin, commune de la Doire (Var).

OBS. La couleur varie suivant le développement de la matière



colorante. Quelquefois les bandes noires du prothorax sont réduites à des taches de dimensions variables; parfois même elles disparaissent, comme on le voit dans la variété, ci-devant citée, décrite par Panzer. Les taches humérales des élytres n'ont point de limites précises, et se confondent insensiblement avec la couleur foncière; quand elles ont pris un certain développement, la base des élytres est parfois aussi de la même couleur; d'autres fois la couleur claire semble s'être confondue avec la couleur brune de telle sorte que les élytres sont uniformément d'une couleur d'un brun roux ou testacé.

### TROISIÈME FAMILLE.

#### SERROPALPIENS.

CARACTÈRES. *Ongles* simples ou munis seulement d'une dent basilaire rudimentaire. *Antennes* subfiliformes; de onze articles. *Hanches de devant* contiguës. *Tête* inclinée ou subperpendiculaire, complètement ou en majeure partie voilée par le prothorax, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus. *Prothorax* ordinairement en ligne presque droite ou à peine bissinué à la base.

Ces insectes se répartissent en deux branches :

*Branches.*

Dernier article des palpes maxillaires

le plus souvent soit ovoïde ou anguleusement dilaté à son côté interne, soit presque en cône comprimé ou en triangle, quelquefois en forme de coudre, c'est-à-dire comprimé, plus ou moins allongé, à peu près d'égale largeur sur la majeure partie basilaire de sa longueur, rétréci ensuite en ligne courbe à son côté interne, débordant alors à sa base le côté interne ou inférieur du troisième article,

DICÉAIRES.

soit fortement en hache, soit en forme de coudre, avec l'angle postéro-interne ou postéro-inférieur vif et plus ou moins prolongé en arrière; ne débordant pas ou débordant à peine à sa base le côté interne ou inférieur du troisième article.

SERROPALPAIRES.

## PREMIÈRE BRANCHE.

## DIRCÉAIRES.

Ils peuvent être divisés en deux rameaux :

Rameaux.	Dernier article des palpes maxillaires	
DRYALATES.		
	soit ovoïde ou anguleusement dilaté au milieu de son côté interne, soit presque en forme de cône comprimé ou de triangle.	
	en forme de coutre, c'est-à-dire comprimé, plus ou moins allongé, à peu près d'égale largeur sur une partie basilaire variable de sa longueur, rétréci ensuite en ligne courbe à son côté interne ou inférieur, sillonné longitudinalement sur sa tranche interne, plus large à sa base que le troisième article, le débordant visiblement à son angle postéro-interne ou inférieur.	
DIRCÉATES.		

## PREMIER RAMEAU.

## DRYALATES.

CARACTÈRES. *Dernier article des palpes maxillaires* soit ovoïde ou anguleusement dilaté au milieu de son côté interne, soit presque en forme de cône comprimé ou de triangle. A troisième article des mêmes palpes moins large ou à peine aussi large que le quatrième, dans son diamètre transversal le plus grand.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

GENRES.	Eperons des tibias intermédiaires au moins aussi courts que ceux des tibias postérieurs.	
<i>Anisoxya.</i>		
	plus longs que ceux des tibias postérieurs : le plus grand des tibias intermédiaires, au moins aussi long que le tiers du premier article des tarsi. Antennes insérées dans une échancrure des yeux.	
<i>Abdera.</i>	Deuxième article des antennes à peu près égal en longueur au troisième. Dernier article des palpes maxillaires anguleusement dilaté au côté interne ou en triangle. Yeux entiers ou à peu près.	
<i>Dryala.</i>	Deuxième article des antennes plus court que le troisième.	Yeux assez profondément échancrés.
<i>Carida.</i>		Yeux entiers.

Genre *Anisoxya*, ANISOXYE.

(ἀνίσωτος, inégale; ὀξύ, pointe).

CARACTÈRES. *Antennes* insérées dans une faible échancrure des yeux, vers le milieu du bord interne de ceux-ci ou un peu plus en arrière; subfiliformes; de onze articles: les deuxième et troisième à peu près égaux, un peu plus étroits: les quatrième à dixième à peine aussi longs ou à peine plus longs qu'ils sont larges: le onzième ovoïde, légèrement appendicé. *Palpes maxillaires* assez allongés: les trois premiers articles serrés: le troisième transverse: le quatrième anguleusement dilaté à son côté interne, c'est-à-dire en triangle, à côté externe le plus long: les deux autres côtés presque égaux; non sillonné sur sa tranche interne. *Mandibules* courtes, peu apparentes dans le repos. *Prothorax* tranchant sur toute la longueur de ses côtés. *Mésosternum* court, triangulaire, à peine prolongé jusqu'au tiers de la longueur des hanches intermédiaires, qui sont ensuite contiguës. *Postépisternums* presque fusiformes, graduellement plus étroits à leurs extrémités, surtout à la postérieure, que dans le milieu. *Cuisses* comprimées, légèrement arquées sur leur arête antérieure. *Eperons* des tibias intermédiaires plus longs que ceux des tibias postérieurs; un peu inégaux: le plus grand égal au tiers ou aux deux cinquièmes du premier article des tarses des mêmes pieds. *Tarses* grêles: avant-dernier article de tous les tarses avancé en forme de sole sous l'article suivant.

Ces insectes semblent dans ce rameau les représentants des Orchésies. Ils peuvent aussi bondir, mais plus faiblement; les éperons des pieds intermédiaires paraissent ici jouer un rôle plus important que ceux des postérieurs.

1. **A. tenuis**; ROSENHAUER. Suballongé; pointillé d'une manière squamuleuse; garni de poils soyeux, fins et couchés, d'un flare testacé; ordinairement d'un brun de poix en dessus, avec la partie antérieure de la tête et le bord antérieur du prothorax d'un roux testacé; quelquefois plus pâle. *Antennes* brunâtres, avec la base d'un testacé jaunâtre. *Prothorax* marqué de chaque côté sur sa seconde moitié, d'une dépression oblique; à peine bissubsinné à la base. Dessous du corps brun ou brun testacé. *Mésosternum* prolongé jusqu'au tiers des hanches. *Postépisternums* rétrécis à leurs extrémités, six fois aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu.

*Dircaea tenuis*, ROSENHAUER, Beitr. zur Insektenn. Faun. Europ. p. 34. (suivant un exemplaire typique obligeamment communiqué par l'auteur).

Long. 0,0026 à 0,0036 (1  $\frac{1}{3}$  à 1  $\frac{2}{3}$  l.) Larg. 0,0008 à 0,0014 (1/3 à 3/5 l.)

*Corps* suballongé; médiocrement convexe; pointillé, avec les intervalles squamuliformes; garni d'un duvet soyeux, fin, couché, médiocrement épais, d'un flave testacé. *Tête* brune sur sa partie postérieure d'un roux testacé en devant: palpes et bouche d'un roux jaune. *Yeux* noirs ou d'un noir brun; ordinairement un peu voilés par le bord antérieur du prothorax; offrant, vers le milieu de leur côté interne, une faible échancrure, suffisante pour y loger l'insertion des antennes. *Antennes* à peu près aussi longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax; testacées ou d'un testacé jaunâtre sur les deux ou trois premiers articles, quelquefois sur un plus grand nombre, brunes ou d'un brun testacé sur les autres, avec le dernier parfois plus pâle; hérissées de poils fins et plus épais; à premier article plus long que large: les deuxième et troisième à peu près égaux, un peu plus courts et un peu plus étroits que les suivants: les quatrième à dixième, subcomprimés, presque égaux, un peu moins longs ou à peine aussi longs qu'ils sont larges, presque carrés: le onzième ovoïde. *Prothorax* arqué en devant à son bord antérieur et voilant la partie postérieure de la tête; incliné et émoussé à ses angles de devant qui sont très-ouverts, chargé d'avant en arrière en ligne plus sensiblement courbe dans la première moitié de ses côtés que dans la seconde; presque en ligne droite à sa base, avec la partie antéscutellaire et les angles postérieurs faiblement prolongés en arrière: ces derniers rectangulairement ouverts; d'un quart environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu; sans rebord; à côtés tranchants en dessous sur toute leur longueur; convexe en devant et plus médiocrement en arrière; marqué de chaque côté d'une dépression obliquement dirigée du milieu des bords latéraux vers la partie de la base voisine du côté externe de l'écusson, mais sans atteindre ni la base ni le bord latéral; pointillé d'une manière squamuleuse; garni de poils fins, soyeux et couchés, d'un jaune testacé; ordinairement d'un brun de poix, avec le bord antérieur testacé, quelquefois d'un brun tirant sur le testacé, au moins près des bords antérieur et latéraux. *Écusson* en triangle obtus, à côtés curvilignes, presque équilatéral; brun de poix; pointillé; pubescent. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax; trois fois et quart ou trois fois et demie aussi longues que lui; presque parallèles jusqu'à la moitié de leur lon-

gueur, faiblement rétrécies jusqu'aux trois quarts et plus sensiblement de ce point jusqu'à l'extrémité; médiocrement convexes; ordinairement d'un brun de poix, quelquefois d'un brun de poix tirant sur le testacé; pointillées et garnies de poils comme le prothorax. *Repli* étroit sur les côtés de la poitrine, à peu près réduit ensuite à une tranche. *Dessous du corps* d'un brun de poix ou d'un brun de poix rouge testacé, ou testacé: pointillé; pubescent. *Prosternum* invisible entre les hanches. *Mésosternum* triangulaire, à peine prolongé jusqu'au tiers des hanches intermédiaires, qui sont ensuite contiguës. *Postépisternums* presque fusiformes; six fois environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu, un peu moins étroits à ce dernier qu'à leurs extrémités. *Pieds* d'un fauve testacé. *Hanches de devant* presque piriformes; contiguës; convexes en dessus, planes en dessous. *Cuisses* presque parallèles, planes ou presque planes en dessous. *Tibias* comprimés; à peine élargis ou presque parallèles; éperons des tibias intermédiaires un peu inégaux; le plus long égal au tiers ou aux deux cinquièmes du premier article des tarses des mêmes pieds: éperons des tibias postérieurs plus courts. *Premier article des tarses postérieurs* aussi long que tous les suivants réunis. *Ongles* simples ou à peine munis d'une dent basilaire.

Cette espèce habite diverses parties de la France. Elle a été prise dans les environs de Lyon par mon ami Cl. Rey. Elle m'a été envoyée du département des Landes par M. Perris. Je l'ai vue dans les collections de MM. Chevrolat, Fairmaire, Guillebeau, Reiche, etc., avec indications de localités très-diverses.

#### Genre *Abdera*, ABDÈRE; Stephens (1).

**CARACTÈRES.** *Antennes* insérées vers la moitié de la longueur du côté interne des yeux; subfiliformes; de onze articles; assez épaisses, avec les trois premiers articles ordinairement un peu plus grêles: le deuxième aussi long ou à peu près que le troisième; les quatrième à dixième, submoniliformes ou presque carrés, à peine plus larges que longs ou à peu près aussi longs que larges. *Palpes maxillaires* à deuxième et troisième article grêles: le deuxième obconique: le troisième, transverse, court, à peine aussi large que le dernier à sa base: celui-ci subcomprimé, soit ovoïde ou anguleusement dilaté à son côté interne ou inférieur, soit triangulaire. *Yeux* sans échancrure. *Prothorax*

---

(1) Illustr. t. 5. p. 52. et p. 57.



tranchant sur les deux tiers postérieurs de ses côtés. *Hanches postérieures* très-courtes, dans le sens de la longueur de l'insecte. *Eperons* des tarsi intermédiaires plus longs que ceux des postérieurs : le plus grand des intermédiaires au moins égal au tiers de la longueur du premier article des tarsi. *Ongles* simples ou munis d'une dent basilaire rudimentaire.

$\alpha$ . Dernier article des palpes maxillaires ovoïde ou anguleusement dilaté dans le milieu de son côté interne ; non sillonné sur sa tranche interne. Prothorax presque en ligne droite à la base (*G. Abdera*).

1. **A. triguttata** ; GYLLENHAL. Oblongue ; médiocrement convexe ; à pubescence soyeuse ; rugueusement ponctuée, surtout sur les élytres ; ordinairement d'un brun de poix ou même d'un brun noir, avec les élytres ornées depuis les trois quarts jusque près de l'extrémité d'une tache suturale pâle, et ordinairement chacune d'une autre de même teinte, près de la base. Mésosternum assez large, graduellement rétréci, obtusément tronqué à l'extrémité.

*Dicaea triguttata*, GYLLENH. INS. SUEC. t. 2. p. 524. 7. — SCHONH. SYN. INS. t. 3. p. 49. 9. — SAHLB. INS. FENN. p. 450. 7.

Long. 0,0028 à 0,0053 (1 1/4 à 1 1/2 l.) Larg. 0,0010 (2/3 l.)

*Corps* oblong ou suballongé ; médiocrement convexe ; ponctué d'une manière plus rugueuse sur les élytres que sur le prothorax, avec les intervalles plus squamiformes sur les dernières que sur celui-ci ; garni de poils fins, cendrés et couchés, et à fond ordinairement d'un brun noir ou d'un brun de poix en dessous. *Tête* subarrondie ; subperpendiculaire ou inclinée ; convexe ; pointillée ; pubescente ; ordinairement d'un brun obscur ou brunes ou d'un brun de poix, avec le labre testacé, parfois d'un nébuleux brunâtre, d'un fauve testacé, ou même d'un testacé nébuleux, avec le labre plus pâle. *Palpes maxillaires* testacés ou d'un flave livide ou testacé. *Antennes* insérées près du côté interne des yeux, presque au niveau de leur partie antérieure ou rapprochées de ce point ; à peine prolongées jusqu'au quart des élytres ; pubescentes ; ordinairement brunes, avec les deux premiers articles d'un testacé plus ou moins obscur, quelquefois d'un gris testacé, avec les deux premiers articles flaves ou d'un flave livide ; à deuxième et troisième articles à peu près égaux : les suivants submoniliformes, à peu près de même grosseur

ou grossissant à peine vers l'extrémité. *Prothorax* arqué en avant ; à angles antérieurs déclives, invisibles en dessus et assez ouverts ; élargi d'avant en arrière en ligne un peu arquée, avec les bords latéraux en partie invisibles en dessus et plus arqués ; tranchant seulement sur les deux tiers postérieurs de ces bords ; très-émoussé ou subarrondi aux angles postérieurs ; faiblement en arc dirigé en arrière à la base, à peine tronqué au devant de l'écusson ; muni sur les côtés d'un rebord très-étroit, invisible au moins en majeure partie, en dessus, sans rebord bien sensible à la base ; une fois au moins plus large à celle-ci qu'il est long sur son milieu ; médiocrement convexe, surtout en arrière ; pubescent ; ruguleusement ponctué, avec les intervalles squamuliformes ; ordinairement brun ou même brun noir. *Ecusson* en triangle plus large que long ; pubescent ; rugueusement ponctué ; d'un brun noir. *Elytres* à peine plus larges que le prothorax ; quatre fois aussi longues que lui ; subparallèles ou à peine élargies jusqu'aux deux tiers, rétrécies ensuite en ligne peu courbe jusqu'à l'angle sutural ; médiocrement convexes ; garnies de poils testacés ou cendrés, fins et couchés, plus apparents ou moins courts que ceux du prothorax ; plus rugueusement ponctuées que ce dernier, avec les intervalles plus visiblement squamiformes ; variant du brun noir au brun testacé ou au nébuleux brunâtre ; ornées ordinairement d'une tache commune, et chacune d'une autre, pâle, roux pâle ou parfois d'un livide testacé : la tache commune, suturale, tantôt subarrondie, prolongée des trois quarts jusque près de l'extrémité, tantôt plus allongée et alors ovulaire ou elliptique : chacune des taches particulières à chaque étui, parfois subarrondie, petite, rapprochée de la base, quelquefois nulle ou peu distincte. *Repli* très-étroit, réduit à une tranche au moins depuis les hanches postérieures. *Dessous du corps* pointillé ; garni de poils plus courts et moins apparents que le dessus ; d'un brun noir. *Hanches antérieures* contiguës ; les *intermédiaires* séparées par un prosternum proportionnellement assez large, graduellement rétréci d'avant en arrière, obtusément tronqué. *Pieds* bruns sur les cuisses et d'un brun testacé sur les jambes et les tarses. *Eperons* très-courts. *Tarses* garnis de poils flexibles : avant-dernier article de tous les tarses en forme de sole avancée sous l'article suivant : premier article des postérieurs au moins aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce paraît peu commune en France ; peut-être même ce type, décrit d'après un exemplaire venu de Suède, et faisant partie de

la belle collection de M. Aubé, n'a-t-il pas été trouvé dans notre pays.

Obs. Elle se distingue des espèces voisines par sa punctuation beaucoup plus rugueuse ; par son mésosternum beaucoup moins étroit ; par la coloration et le dessin de ses élytres. Elle offre quelques variations dans l'étendue de ses taches et dans la couleur foncière. Celle-ci est parfois moins foncée. La tache antérieure de chaque élytre, ordinairement petite, est parfois nulle ou peu distincte <sup>(1)</sup> : la tache suturale, tantôt subarrondie et prolongée des trois quarts jusque près de l'extrémité, se montre d'autres fois ovalaire ou elliptique.

2. *A. scutellaris*. *Oblongue ; médiocrement convexe ; à pubescence soyeuse ; rugueusement ponctuée surtout sur les élytres. Prothorax brunâtre, avec les bords antérieurs et postérieurs plus pâles. Elytres livides ou d'un livide flavescent, ornées d'une tache scutellaire obtriangulaire et chacune d'une bande transverse, brunâtres.*

Long. 0,0028 (1 1/4 l.) Larg. 0,0010 (2,5 l.)

*Corps à fond brunâtre ou d'un testacé brunâtre, sur la tête et le prothorax : celui-ci, avec la base et surtout le bord antérieur plus pâle. Elytres livides ou d'un livide flavescent, ornées d'une tache scutellaire, et chacune d'une bande transverse, brunâtre, ou d'un testacé brunâtre : la tache obtriangulaire, couvrant la majeure partie de la base, prolongée jusqu'au cinquième de la suture : la bande transverse, naissant vers la moitié de la longueur, parfois à peine étendue jusqu'à la suture. Dessous du corps testacé. Pieds nébuleux ou d'un nébuleux brunâtre sur les cuisses, d'un testacé livide sur le reste.*

Cette espèce se trouve dans les environs de Lyon, sous l'écorce des vieux pins.

*L. A. scutellaris* a tant d'analogie avec *L. A. trifasciata*, par la taille et la punctuation que, peut-être, n'en est-elle qu'une variété très-décolorée. Mais ayant eu l'occasion de voir plus de vingt individus conformes pour la teinte, et à peu près pour le dessin des élytres, on est naturellement porté à se demander si une différence si frappante avec le

---

(1) SCHONH. loc. cit. Var.  $\beta$ ,

dessin typique de l'*A. trifasciata* est le produit d'une variation profonde, ou le cachet d'une espèce particulière.

En prenant l'*A. triguttata* que j'ai décrite, pour type de l'espèce, la tache antérieure de chaque élytre, ordinairement petite ou presque nulle, a pris chez l'*A. scutellaris* une telle extension, qu'elle forme avec sa pareille un arc en demi-cercle, prolongé d'une épaule à l'autre, en coupant la suture depuis le cinquième jusqu'aux trois septièmes de sa longueur. La tache suturale postérieure s'est alors très-étendue, et souvent a pris un tel développement, que la partie foncière, de couleur brunâtre ou d'un testacé brunâtre, ne constitue ordinairement qu'une bande, arrivant parfois à peine jusqu'à la suture, paraissant souvent formée de deux taches unies : l'externe, allongée, couvrant environ le tiers médiaire de la longueur ; l'interne, ovale, couvrant des quatre aux cinq septièmes de la longueur des étuis : la tache suturale et commune de l'*A. triguttata* se serait donc étendue alors presque jusqu'au bord latéral et jusqu'à l'extrémité. Cette tache offre bien chez celle-ci quelques variations dans sa forme et dans son développement, mais je n'ai pas eu l'occasion d'observer les transitions qui conduisent au développement extrême qu'elle affecte chez la *scutellaris*.

3. *A. quadrifasciata* ; CURTIS. Suballongée ; médiocrement convexe ; ruguleusement pointillée ; à pubescence soyeuse ; ordinairement d'un brun noir sur le prothorax et les élytres : le premier, bordé à la base de roux flave ou testacé et moins largement en devant. Élytres ornées chacune de deux bandes transversales ondulées de même couleur : l'une vers le quart ; l'autre un peu avant les deux tiers de leur longueur. Pieds d'un roux flave. Mésosternum assez large, graduellement rétréci, obtusément tronqué à l'extrémité.

*Hypulus quadrifasciatus*, CURTIS, Brit. Entomol. t. 6. (1829) 253, 3.

*Abdera quadrifasciata*, STEPHENS, Illustr. t. 3. p. 38. pl. 24. fig. 6. — *Id.* Man. p. 330. 2585.

Long. 0,0028 à 0,0036 (1 1/4 à 1 2/3 l.) Larg. 0,0007 à 0,0009 (1/3 à 3/7 l.)

Corps suballongé ; médiocrement convexe ; ruguleusement pointillé, avec les intervalles squammuliformes ; garni de poils fins, couchés, soyeux, médiocrement épais, fauves ou d'un fauve livide, ou presque de la couleur du corps sur ses parties obscures. Tête subarrondie ; subperpendiculaire ou inclinée ; convexe ; pointillée ; brièvement



pubescente ; ordinairement brune, avec l'épistome et le labre testacés ou d'un livide ou flave testacé, quelquefois entièrement testacés ou d'une nuance rapprochée. *Palpes maxillaires* d'un testacé livide ou d'un flave testacé. *Antennes* insérées près du côté interne des yeux, vers la moitié de la longueur de celui-ci ; subfiliformes ; prolongées un peu au-delà des angles postérieurs du prothorax ou au moins jusqu'à ceux-ci ; pubescentes : ordinairement brunes, avec les trois premiers articles d'un roux livide ou d'un flave testacé, quelquefois de l'une de ces teintes, avec le quatrième article et quelques-uns des suivants, nébuleux ; à deuxième article ovalaire, un peu ou à peine plus court que le troisième : celui-ci plus grêle, même à la base, graduellement élargi : les suivants, plus épais, tronqués à l'extrémité, à peu près aussi larges que longs : le dernier, ovoïde. *Prothorax* arqué à son bord antérieur et voilant la tête quand l'insecte est vu en dessus ; à angles antérieurs, déclives, invisibles en dessus, émoussés et très-ouverts ; paraissant en dessus élargi en ligne un peu arquée, sur les côtés, c'est-à-dire offrant vers la moitié de sa longueur sa plus grande largeur, mais à bords latéraux invisibles en dessus en majeure partie ou presque en totalité, paraissant, à ces bords, rétréci presque en ligne droite d'avant en arrière, et tranchant presque jusqu'aux angles de devant ; subarrondi ou très-émoussé aux angles postérieurs ; en ligne presque droite à la base ; ordinairement entaillé ou échancré faiblement et très-étroitement au devant de l'écusson ; rebordé faiblement sur les côtés, et plus étroitement et moins distinctement à la base ; environ aussi long sur son milieu qu'il est large à la base ; convexe ; pubescent ; ruguleusement pointillé, avec les intervalles squammuliformes ; ordinairement noir, paré en devant et à la base d'une bordure d'un roux testacé ou d'un flave testacé : la postérieure, couvrant les deux septièmes postérieurs : l'antérieure, un peu moins développée : la partie noire quelquefois seulement brune, brunâtre ou d'un testacé brunâtre ; sans fossettes basilaires. *Ecusson* près d'une fois moins long que large ; tantôt arqué, tantôt subéchancré à son bord postérieur ; pointillé ; pubescent ; d'un flave testacé ou d'un testacé nébuleux. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax à sa base ; deux fois à deux fois et quart aussi longues que lui ; subparallèles jusqu'aux deux tiers, rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural ; munies latéralement d'un rebord qui s'efface vers l'extrémité ; médiocrement convexes ; pointillées, avec les intervalles squammuliformes ; garnies de poils fins, soyeux, couchés, médiocrement épais ; noires, ornées chacune de deux bandes transversales d'un



roux fauve, d'un roux testacé ou d'un roux flavescent : la première, couvrant du sixième ou un peu plus aux deux cinquièmes de leur longueur, liée au bord externe près duquel elle se dirige un peu en arrière, ordinairement un peu isolée de la suture, près de laquelle elle se rétrécit, entaillée à son bord postérieur, vers les deux cinquièmes externes de la largeur, anguleuse à ce même bord vers le tiers interne, souvent obtusément bisanguleuse en devant : la deuxième, souvent d'un tiers moins développée que la précédente, dans le sens de la longueur, parfois presque égale à celle-ci, située vers les deux tiers ou un peu moins de la longueur, obtusément bisanguleuse à son bord antérieur (au tiers interne de la largeur et près du bord latéral) et entaillée entre ces deux points, entaillée à son bord postérieur vers le tiers interne, et obtusément anguleuse vers les deux cinquièmes ou le tiers externes du même bord, étendue depuis celui-ci jusqu'à la suture. *Repli* assez étroit; latéral, sur les côtés de la poitrine, réduit à une tranche presque à partir des hanches postérieures. *Dessous du corps* brun ou brun testacé, parfois d'un testacé ou d'un roux testacé brunâtre; pointillé; garni de poils soyeux. *Hanches antérieures* contiguës : les intermédiaires, séparées par un prosternum proportionnellement assez large, graduellement rétréci d'avant en arrière, obtusément tronqué à son extrémité. *Postépisternums* subparallèles, faiblement rétrécis d'avant en arrière, obtus à l'extrémité; cinq à six fois aussi longs qu'ils sont larges. *Pieds* pubescents; d'un roux flave ou d'un flave testacé. *Eperons* des tibias assez courts. *Tarses* garnis de poils flexibles : avant-dernier article de tous les tarses avancé sous le suivant : celui des tarses antérieurs presque bilobé : celui des autres tarses, en forme de sole : le premier des postérieurs au moins aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce habite principalement les parties froides ou tempérées. Elle n'a jamais été prise encore dans les environs de Lyon : on la trouve dans ceux de Paris et dans diverses autres localités. Suivant M. Chevrolat, elle vit principalement, dans les environs de la capitale, sur le bois de bouleau.

Obs. Elle varie suivant le développement de la matière colorante. Quand celle-ci a moins abondé, les parties noires passent au brun ou même à des teintes plus claires. Ainsi les antennes sont parfois à peine nébuleuses ou brunâtres sur les articles bruns ou noirâtres dans l'état normal. La tête et le prothorax changent aussi leurs parties foncées contre du testacé plus ou moins nébuleux. Les élytres su-

bissent en général des altérations moins profondes dans la couleur de leur robe ; mais leurs bandes varient un peu de teintes, de développement et de configuration, suivant que les parties anguleuses s'émoussent plus ou moins.

Néanmoins cette espèce est facile à distinguer de ses voisines, et même de toutes celles de cette tribu.

4. **A. griseo-guttata** ; FAIRMAIRE. *Suballongée ; ruguleuse ; finement ponctuée ; brune ou d'un brun noir ; pubescente, ces poils formant, à certain jour, une bordure cendrée, sur les côtés et à la base du prothorax. Elytres ornées chacune de deux bandes transverses d'un livide blanchâtre ou flavescent, étranglées dans leur milieu : l'une du quart au tiers ; l'autre, vers les deux tiers de la longueur : ces bandes composées chacune de deux taches unies ou isolées. Jambes et tarses pâles. Mésosternum linéaire.*

*Dircaea undulata*, (DEJ.) Cat. (1821) p. 69.—Id. (1833) p. 201 — Id. (1857) p. 225.  
*Dircaea griseo-guttata*, FAIRMAIRE, Ann. Soc. Entom. de Fr. 2<sup>e</sup> série, t. 7. (1849). p. 423.

*Dircaea undata*, PERRIS, 2<sup>e</sup> Excursion dans les grandes Landes, in Annales de la Soc. Linnéenne de Lyon 1850-52, p. 188.

Long. 0,0024 à 0,0029 (1 1/4 à 1 2/5 l.) Larg. 0,0007 à 0,0008 (1/3 à 2/5 l.)

Corps suballongé ; médiocrement convexe, ; marqué de points très-fins, faisant paraître les intervalles squammuliformes ; garni en dessus de poils fins, soyeux, couchés, médiocrement épais, fauves ou presque de la couleur du corps sur les parties obscures, d'un livide flavescent sur les taches. *Tête* subconvexe ; subperpendiculaire ; ordinairement brune, avec le labre généralement moins obscur ou d'un flave testacé. *Palpes* fauves ou d'un roux brunâtre, quelquefois d'un flave testacé ou d'un flave pâle ; à dernier article non visiblement canaliculé en dessus. *Yeux* d'un brun noir ; sans échancrure. *Antennes* insérées vers le milieu du côté interne des yeux ou un peu après ; prolongées jusqu'aux angles postérieurs du prothorax ; pubescentes ; brunes, avec les trois premiers articles d'un flave livide ou d'un flave testacé ou brunâtre : le deuxième, un peu plus long qu'il est large, à peu près aussi long ou au moins aussi long que le troisième : les cinquième à dixième, élargis en ligne courbe et tronqués au sommet, à peine plus longs qu'ils sont larges à l'extrémité : le onzième, ovoïde. *Prothorax* un peu arqué à son bord antérieur et voilant à peu près

toute la tête, quand l'insecte est vu perpendiculairement en dessus ; à angles antérieurs inclinés, émoussés, plus ouverts que l'angle droit et invisibles en dessus ; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes, subparallèle ou à peine rétréci ensuite ; à angles postérieurs rectangulairement ouverts et peu ou point émoussés ; légèrement bissinué à la base, avec la partie médiaire aussi prolongée en arrière que les angles ; très-étroitement rebordé sur les côtés et moins distinctement à la base ; à bord latéral tranchant presque jusqu'en devant ; à peine aussi large à la base qu'il est long sur son milieu ; plus convexe en devant qu'en arrière ; brun, d'un brun noir ou d'un noir gris, avec le bord antérieur ordinairement plus pâle ou passant parfois au livide testacé ; finement ponctué ; garni de poils fins et couchés : ces poils formant, à certain jour, sur les côtés et à la base, une bordure irrégulière cendrée ou d'un cendré livide ou flavescent ; plus ou moins distinctement déprimé au devant de chaque sinuosité basilaire ; offrant ordinairement les traces d'un sillon sur la ligne médiane, ou du moins vers l'extrémité de celle-ci. *Ecusson* plus large que long ; presque carré, soit obtusément tronqué, soit arqué en arrière à son bord postérieur, parfois légèrement échanuré au milieu de celui-ci ; brun ; pubescent. *Elytres* aussi larges à la base que le prothorax à ses angles postérieurs ; près de trois fois aussi longues que lui ; à angle huméral incliné et invisible en dessus ; presque parallèles jusqu'aux deux tiers ou à peine élargies dans leur milieu, postérieurement rétrécies en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural ; munies latéralement d'un rebord étroit, invisible en dessus et qui s'efface postérieurement ; pointillées ou subruguleusement pointillées ; garnies de poils soyeux, fins et couchés, de la couleur de leurs diverses parties ; brunes, d'un brun noir ou d'un brun gris, ornées chacune de deux bandes transverses onduleuses, d'un blanc livide ou cendré ou d'un cendré flavescent : l'antérieure, liée au bord externe, vers le quart ou un peu plus de la longueur, non étendue jusqu'à la suture, dont elle reste habituellement distante d'un cinquième de la largeur, offrant à son bord antérieur un angle rentrant vers les deux cinquièmes à partir de la suture, et un angle avancé vers les trois quarts de la largeur, offrant à son bord postérieur un angle rentrant correspondant à l'angle avancé précité, et anguleusement dirigée en arrière à ses extrémités : cette bande, parfois réduite à deux taches de formes variables : l'externe, ordinairement ovalaire, liée au bord marginal vers le quart de la longueur de celui-ci : l'interne, un peu plus postérieure, située entre la précédente et la suture : la bande postérieure,

située entre les trois cinquièmes et les deux tiers de la longueur des étuis, ordinairement étendue depuis le bord externe jusqu'à la suture ou jusque près d'elle, offrant son bord antérieur anguleusement avancé vers le quart interne de la largeur et vers le bord marginal, échancrée ou arquée en arrière entre ces deux points, offrant son bord postérieur anguleusement dirigé en arrière vers les deux cinquièmes ou un peu plus de la largeur : cette seconde bande plus rarement divisée en deux taches. *Dessous du corps* ordinairement brun noir ou brun, quelquefois moins obscur ; pointillé ; pubescent. *Hanches antérieures* contiguës : les intermédiaires, séparées par un sternum prolongé presque jusqu'à leur extrémité, presque linéaire ou presque réduit à une tranche dans sa moitié postérieure. *Postépisternums* subparallèles, étroits, six fois environ aussi longs qu'ils sont larges. *Pieds* ordinairement bruns ou brunâtres sur les cuisses, plus ou moins pâles sur les autres parties. *Avant-dernier article de tous les tarses* avancé sous le suivant : celui des tarses antérieurs presque bilobé : celui des autres tarses, en forme de sole : le premier des postérieurs aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce paraît habiter la plus grande partie des provinces de la France. On la trouve en fauchant les herbes ou en battant les vieux arbres et les vieilles haies. Dejean l'avait reçue des parties occidentales de notre pays ; elle a été prise dans les environs de Bordeaux par M. Perroud ; dans la forêt de Saint-Germain par M. Fermaire ; sur les pins des montagnes de notre département par M. Cl. Rey ; dans le département des Landes par M. Perris.

OBS. Les bandes des élytres varient, ainsi que je l'ai dit, suivant le développement de la matière noire. Quand elle a en partie fait défaut, les bandes, l'antérieure surtout, sont parfois réduites à deux taches ; quelquefois même ces taches sont moins blanches ou nébuleuses ; parfois même elles deviennent plus faiblement distinctes : l'externe des antérieures semble la plus sujette à disparaître.

xx Dernier article des palpes maxillaires triangulaire, sillonné sur sa tranche interne. Prothorax bissinué à la base, avec la partie médiaire plus prolongée en arrière que les angles. (*G. Adobia*).

5. **A. bifasciata**; MARSHAM. Oblongue ; médiocrement convexe ; ruguleusement ponctuée ; à pubescence soyeuse ; prothorax et élytres d'un noir brun ou d'un brun noir : le premier, bissinué à la base, avec la partie médiaire plus prolongée en arrière : les secondes, ornées de deux bandes



*transversales fauves ou d'un fauve testacé : l'antérieure couvrant presque de l'épaule jusqu'au quart, moins développée à son bord antérieur en se rapprochant de la suture : la deuxième, vers les trois cinquièmes, parfois réduite à une tache suturale et à une autre tache. Antennes, palpes et pieds, testacés ou d'un fauve testacé.*

*Mordella bifasciata*, MANSU. Entom. brit. p. 493. 18.

*Hypulus biflexuosus*, CURTIS, Brit. entom. t. 6. (1829) 255. 2. fig.

*Abdera bifasciata*, STEPH. Illustr. t. 5. p. 38. 1. — *Id.* Man. p. 330. 2. 82.

Long. 0,0033 (1 1/4 l.) Larg. 0,0016 (2/3 l.)

*Corps* oblong ; médiocrement convexe ; ruguleusement pointillé, avec les intervalles squammuliformes ; garni de poils fins, soyeux, couchés, peu épais, courts, d'un fauve cendré ou nébuleux. *Tête* petite ; subarrondie ; inclinée ; subconvexe ; pointillée ; brièvement pubescente ; ordinairement brune ou noire, avec le labre testacé. *Palpes maxillaires* testacés ou d'un testacé livide ; à dernier article comprimé, en triangle près d'une fois plus long qu'il est large à la base, à angle postéro-interne vif, presque rectangulairement ouvert, débordant notablement le troisième, longitudinalement sillonné sur la tranche de son bord interne ou inférieur. *Yeux* ovalaires ou oblongs ; noirs ; entiers ou peu sensiblement échancrés. *Antennes* faiblement prolongées au delà des angles du prothorax ; subfiliformes ou à peine grossissant vers l'extrémité ; fauves ou testacées ; assez épaisses ; pubescentes ; à deuxième article faiblement moins court que le troisième : les quatrième à dixième à peu près aussi longs que larges : le onzième ovoïde. *Prothorax* arqué en devant et voilant complètement la tête, quand l'insecte est examiné perpendiculairement en dessus ; à angles antérieurs déclives, invisibles en dessus, émoussés et notablement plus ouverts que l'angle droit ; paraissant, vu en dessus, assez fortement élargi jusqu'à la moitié de sa longueur, et subparallèle ensuite ; à bords latéraux moins tranchants en dessous dans leur moitié antérieure que dans la postérieure ; bissinué à la base, avec la partie médiale plus prolongée en arrière que les angles postérieurs ; ceux-ci vifs et rectangulairement ouverts ; sans rebords sur les côtés et sur les côtés de la base, à peine rebordé sur la moitié médiale de celle-ci ; de moitié ou d'un tiers plus large à cette dernière qu'il est long sur son milieu ; pointillé d'une manière plus légèrement ruguleuse que les élytres ; brièvement pubescent ; ordinairement d'un brun noir, quelquefois brun avec des transparences fauves,



surtout vers les parties postérieures des côtés. *Ecusson* assez petit; presque en demi-cercle; pubescent; ruguleux; d'un brun noir. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; trois fois environ aussi longues que lui; presque parallèles jusqu'au quart, graduellement et faiblement rétrécies jusqu'aux quatre cinquièmes, plus sensiblement ensuite et en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural; munies latéralement d'un rebord très-étroit, prolongé jusqu'à l'extrémité; médiocrement convexes; brièvement pubescentes; ruguleusement pointillées, avec les intervalles squammuliformes; ordinairement noires ou d'un brun noir; parées chacune de deux bandes transversales fauves ou d'un fauve testacé: la première couvrant le bord latéral depuis un peu après l'angle huméral jusqu'au quart de la longueur, graduellement un peu rétrécie à son bord antérieur en s'étendant jusqu'à la suture, offrant ainsi avec sa pareille une bande un peu échancrée en arc à son bord antérieur: la seconde bande située vers les trois cinquièmes environ de la longueur, parfois réduite à deux taches, l'une ovale, suturale, commune aux deux étuis: l'autre entre celle-ci et le bord externe. *Dessous du corps* noir ou d'un brun noir; pubescent; pointillé. *Hanches de devant* contiguës; les intermédiaires, séparées par un sternum prolongé à peu près jusqu'à leur extrémité, assez étroit, graduellement rétréci en pointe. *Pieds* fauves ou d'un fauve testacé, ou testacés, avec les cuisses souvent moins claires à la base. *Eperons* assez courts. *Avant-dernier article des tarses* peu ou pas distinctement avancé sous le suivant: premier article des tarses postérieurs à peu près aussi long que tous les suivants pris ensemble.

Cette espèce paraît rare en France. On la trouve dans les parties élevées des Alpes, sur les vieux sapins.

Obs. Elle se distingue de celles du même genre par la forme du dernier article de ses palpes maxillaires; par son prothorax visiblement bisinué à la base, avec la partie médiaire plus prolongée en arrière que les angles postérieurs, sans rebords sur les côtés, rebordé seulement dans le milieu de sa base; par la forme de son écusson, etc.

#### Genre *Dryala*, DRYALE.

CARACTÈRES. *Antennes* insérées dans une échancrure des yeux; subfiliformes; de onze articles; le deuxième court: le troisième une fois environ plus long; grêle à la base, grossissant graduellement: les quatrième à dixième, un peu moins longs que larges à leur extrémité. *Palpes maxillaires* assez allongés; à dernier article presque conique,

de moitié environ plus long que large; non sillonné sur sa tranche interne. Yeux assez profondément échancrés vers le milieu, ou un peu après, de leur côté interne. *Prothorax* tranchant à peu près sur toute la longueur de ses côtés; marqué près de la base de deux points-fossettes. *Mésosternum* prolongé presque jusqu'à l'extrémité des hanches intermédiaires. *Postépisternums* graduellement rétrécis d'avant en arrière, terminés en pointe obtuse. *Eperons* courts. *Tarses* grêles : à avant-dernier article entier.

Les insectes de cette coupe, par leurs yeux échancrés, par leurs fossettes prothoraciques, semblent, dans ce rameau, correspondre aux Hallomènes; comme ces derniers, ils vivent aux dépens des substances cryptogamiques.

**1. *Id. fusca* ; GYLLENHAL.** *Suballongée; médiocrement convexe; squamuleusement pointillée; à pubescence soyeuse; d'un brun de poix ou parfois d'un brun testacé en dessus: base et bord antérieur des élytres moins obscurs ou plus pâles: antennes, palpes et pieds, testacés. Prothorax* bissubsinué à la base; marqué au devant de celle-ci de deux fossettes ponctiformes. Yeux assez profondément échancrés.

*Hallominus bipunctatus*, var.  $\beta$ . PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 180. 1.

*Mordella picea*, MARSH. Ent. brit. 1. p. 491. 21.

*Dinophorus axillaris*, ILLIG. Mag. t. 6. p. 333.

*Halloménus fuscus*, GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 578. 2. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 51. 2. — ZETTERST. Faun. lapp. p. 286. 2. — *Id.* Ins. lapp. p. 164. 2. — STEPH. Illustr. t. 3. p. 40. 1. — *Id.* Man. p. 330. 2587. — CURTIS, Brit. entom. t. 10. 474. — SAHLB. Ins. fenn. p. 431. 2. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 248. 2. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 610.

Long. 0,0033 à 0,0045 (1 1/2 à 2 l.) Larg. 0,0009 à 0,0011 (2/3 à 1/2 l.)

*Corps* suballongé; médiocrement convexe; garni en dessus de poils soyeux, couchés, fauves ou nébuleux, médiocrement épais. *Tête* petite; subarrondie; infléchie; finement ponctuée; à pubescence micouchée; ordinairement brune, parfois d'un brun testacé: épistome et labre testacés ou d'un fauve testacé, quelquefois d'un flave testacé. *Palpes maxillaires* de l'une de ces teintes, ordinairement de la dernière. Yeux d'un noir brun; assez profondément échancrés dans le milieu de leur côté interne, entamés par les joues vers les deux tiers postérieurs ou un peu plus du même côté. *Antennes* insérées vers la moitié du côté interne des yeux ou un peu plus postérieurement; prolongées un peu au-delà des angles postérieurs du prothorax;

testacées, d'un fauve testacé ou d'un testacé roussâtre; pubescentes; à premier et deuxième articles un peu plus grêles; le troisième, grossissant de la base à l'extrémité: les quatrième à dixième assez épais. *Prothorax* un peu arqué en devant à son bord antérieur et voilant jusqu'aux yeux la partie postérieure de la tête; à angles de devant déclives et à peine visibles en dessus, émoussés et plus ouverts que l'angle droit; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié, et plus faiblement ensuite jusqu'aux angles postérieurs, qui sont peu vifs et un peu moins ouverts que l'angle droit; bissubsinué à la base; muni à cette dernière d'un rebord très-étroit et à peine apparent; sans rebords sur les côtés, qui sont tranchants en dessous sur toute leur longueur, mais moins vivement dans leur première moitié; près d'une fois plus large à la base qu'il est long sur son milieu; convexe en devant, graduellement moins convexe en arrière; finement ponctué, avec les intervalles squammuleux; garni de poils fauves, fins et couchés; ordinairement d'un brun de poix, parfois d'un brun testacé; noté de deux fossettes ponctiformes situées un peu au devant de la base, chacune presque au tiers externe de la largeur. *Ecusson* en triangle obtus à son extrémité; pointillé; brun ou brun testacé; pubescent. *Elytres* à peine plus larges en devant que le prothorax à sa base; quatre fois aussi longues que lui; subparallèles jusqu'au-delà de la moitié, rétrécies ensuite en ligne un peu courbe, faiblement d'abord, d'une manière plus prononcée en approchant de l'extrémité; médiocrement convexes; pointillées d'une manière subquammuliforme; garnies de poils fauves, fins et couchés; ordinairement d'un brun fauve sur le dos, avec la partie antérieure et les parties latérales plus ou moins largement fauves ou d'un fauve testacé, quelquefois entièrement d'un brun roussâtre, fauves ou d'un fauve testacé. *Repli* subgraduellement rétréci, réduit à une tranche sur son tiers postérieur. *Dessous du corps* ordinairement brun ou d'un brun rougeâtre sur la poitrine, d'un brun fauve ou fauve sur le ventre; pointillé; pubescent. *Postépisternums* graduellement rétrécis d'avant en arrière; quatre fois aussi longs qu'ils sont larges en devant. *Pieds* testacés, flavescents ou d'un flave testacé. *Tarses* à articles entiers: le premier des postérieurs ordinairement un peu moins long que tous les suivants réunis.

Cette espèce vit, comme la précédente, aux dépens des substances cryptogamiques. On la trouve, mais rarement, à la Grande-Chartreuse et dans les montagnes voisines de la Suisse ou du Piémont. Elle vit dans les bolets, principalement dans ceux qui sont parasites du sapin.

Obs. Paykull l'avait confondue avec l'*Hallomenus humeralis*, dont elle diffère par une taille plus petite; par son corps moins finement pointillé; par les impressions voisines de la base du prothorax offrant l'image d'un point enfoncé arrondi, dans le fond duquel se dessine souvent un trait court et longitudinal; par le même segment non paré de deux bandes longitudinales noires, n'offrant pas ses angles postérieurs courbés en arrière, et surtout par ses hanches antérieures non séparées par le prosternum.

Elle offre aussi quelques variations suivant le développement plus ou moins complet de la matière colorante. Ordinairement les élytres sont brunes, avec la base et les côtés de chacun d'un testacé blanchâtre ou plus ou moins obscur; mais quelquefois leur teinte est à peu près uniforme.

#### Genre *Carida*, CARIDE.

CARACTÈRES. *Antennes* insérées près du côté interne des yeux, vers la moitié ou un peu plus de la longueur de celui-ci; subfiliformes: à deuxième article court: le troisième, près d'une fois plus long, élargi de la base à l'extrémité: les quatrième à dixième, un peu moins longs ou à peine aussi longs que larges. *Palpes maxillaires* à dernier article anguleusement dilaté à son côté interne, paraissant presque en cône comprimé, quand cet article s'accole au troisième: de moitié à peine plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. *Yeux* entiers: ovalaires. *Prothorax* presque en ligne droite à la base; sans fossettes profondes, près de celle-ci; à bord latéral tranchant seulement dans sa seconde moitié. *Mésosternum* prolongé presque jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* presque parallèles. *Eperons* courts. *Tarses intermédiaires* et *postérieurs* grêles.

Les insectes de cette coupe ont beaucoup d'analogie avec les précédents, dont ils se distinguent facilement par leurs yeux entiers.

**1. C. affinis**; PAYKULL. *Suballongée; assez convexe; presque lisse; à pubescence très-courte et soyeuse. Prothorax et élytres ordinairement testacés ou d'un fauve testacé: le premier, souvent: les secondes plus rarement, enfumés ou obscurs sur leur disque. Antennes, palpes et pieds testacés. Avant-dernier article des tarses postérieurs peu sensiblement saillant en dessous.*



*Hallomenus affinis*, PAYK. Faun. suec. t. 2, p. 181. 3. — LAT. Hist. nat. t. 10. p. 538. obs. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2, p. 529. 5. — SCHONH. Syn. ins. t. 2. p. 51. 4. — ZETTERST. Faun. lapp. p. 287. 3. — *Id.* Ins. lapp. p. 165. 3. — SAHLB. Ins. lapp. p. 452. 5. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 248. 3. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 610.

Long. 0,0055 à 0,0045 (1 1/2 à 2 l.) Larg. 0,0009 à 0,0013 (2/5 à 3/5 l.)

*Corps* suballongé; médiocrement convexe; pointillé, avec les intervalles presque squammuliformes; garni de poils fins, soyeux, couchés, médiocrement épais, en dessus. *Tête* assez petite; subtriangulaire; perpendiculaire ou un peu inclinée: convexe; pointillée; brièvement pubescente; ordinairement noire, avec le labre fauve ou testacé, quelquefois noire ou brune sur le front ou seulement sur la moitié postérieure de celui-ci, et graduellement moins obscure et plus claire en devant, d'autres fois noirâtre sur le milieu du front ou même presque entièrement fauve ou d'un fauve testacé. *Palpes maxillaires* d'un fauve testacé: comprimés: à deuxième article dilaté en forme de dent dans le milieu de son côté interne: le troisième obtriangulaire, aussi large en devant que la base du dernier: celui-ci en cône comprimé. *Antennes* insérées près du bord interne des yeux, vers la moitié ou plutôt un peu après de la longueur de celui-ci; prolongées environ jusqu'au cinquième ou au quart des élytres: assez grêles; subfiliformes; un peu pubescentes; à troisième article le plus long: les suivants presque égaux: les quatrième à dixième, presque obtriangulaires ou un peu élargis de la base à l'extrémité; le dernier ovoïde; testacées ou d'un fauve testacé. *Yeux* d'un brun noir; ovalaires ou oblongs; non échancrés. *Prothorax* arqué en devant; à angles antérieurs déclives, à peine ou faiblement visibles en dessus, plus ouverts que l'angle droit; élargi en ligne un peu arquée sur les côtés; émoussé aux angles postérieurs; en ligne presque droite ou faiblement arquée en arrière et à peine bissubsinuée à la base; muni à celle-ci et latéralement d'un rebord très-étroit; à rebord latéral tranchant dans sa seconde moitié, obtus ou peu tranchant en devant; de moitié environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu: moins convexe en arrière qu'en avant; à pubescence courte, soyeuse et luisante; noir, avec ses bords testacés, plus largement ou moins brièvement en devant que sur les côtés et à la base; sans fossettes basilaires ou n'en offrant que des traces peu distinctes. *Ecusson* de moitié plus large que long; presque en carré transverse, émoussé à ses angles postérieurs, soit un peu arqué en arrière, soit parfois subéchancré à



son bord postérieur; soyeux; testacé ou d'un fauve testacé. *Elytres* à peu près aussi larges en devant que le prothorax à sa base: trois fois au moins aussi longues que lui sur son milieu: subparallèles jusqu'à la moitié, rétrécies en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural à partir des deux tiers; munies latéralement d'un rebord étroit qui s'efface postérieurement; médiocrement convexes: à pubescence courte, soyeuse et luisante; tantôt entièrement fauves ou d'un fauve testacé, tantôt enfumées ou obscures sur leur disque; lisses, mais offrant parfois des traces de rangées striales de points qui paraissent exister sur leur face interne. *Repli* testacé; très-étroit, réduit à une tranche presque à partir des hanches postérieures. *Dessous du corps* fauve ou testacé sur les côtés de l'antépectus et parfois sur toute sa surface, souvent d'un noir brun sur les médi et postpectus et sur le ventre; à pubescence courte et soyeuse, qui donne aux parties noires une teinte d'un noir ardoisé. *Mésosternum* obtriangulaire, subgraduellement rétréci d'avant en arrière, un peu caréné; prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* subparallèles; six fois environ aussi longs qu'ils sont larges. *Hanches de devant* contiguës. *Hanches postérieures* peu obliquement transversales. *Pieds* testacés ou d'un testacé livide. *Avant-dernier article des tarsi antérieurs* presque bilobé, avancé sous le suivant: celui des tarsi intermédiaires à peine avancé en forme de sole sous le suivant: celui des postérieurs plus court ou parfois sans saillie bien distincte: premier article des tarsi postérieurs un peu plus long que tous les suivants réunis.

Cette espèce vit principalement aux dépens des substances cryptogamiques. Elle habite surtout les parties froides ou humides. On la trouve dans les bolets fixés aux troncs de l'aune, du sapin et de diverses autres espèces d'arbres.

**OBS.** Elle varie un peu de coloration suivant le développement de la matière colorante. Les antennes, souvent testacées ou même d'un testacé pâle, sont parfois d'un fauve brun, avec la base testacée ou d'un fauve cendré. Quand on les regarde d'avant en arrière, elles semblent moins foncées ou plus claires. La tête est habituellement noire ou brune, mais quand le pigmentum a été moins abondant, le front n'est noir qu'à moitié ou même fauve ou testacé. La partie noire du disque du prothorax qui constitue ordinairement une bande presque transversale, s'éclaircit, se restreint ou disparaît; les élytres, parfois obscures ou enfumées sur le disque, sont plus habituellement d'un fauve testacé. Le dessous du corps se ressent aussi du défaut de la matière colorante, et parfois il est entièrement fauve ou d'un fauve testacé.

2. **C. flexuosa** ; PAYKULL. Suballongée ; médiocrement convexe ; à pubescence soyeuse. Prothorax et élytres d'un roux testacé : le premier orné d'une bande transverse, noire : les secondes parées chacune de deux bandes transversales et flexueuses, de même couleur : l'antérieure liée au quart du bord externe, bidentée en avant, prolongée en arrière vers son milieu, formant avec sa pareille sur la suture un angle dirigé en arrière : la seconde, liée au bord externe vers la moitié de celui-ci, anguleusement avancée vers son tiers interne. Avant-dernier article des tarses postérieurs en forme de sole.

♂. Cinquième arceau ventral entier.

♀. Cinquième arceau ventral entaillé dans son milieu,

*Hallomenus flexuosus*, PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 182. 5.

*Hallomenus flexuosus*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 535. observ. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 529. 4. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 51. 5. — ZETTERST. Faun. lapp. p. 286. 1. — *Id.* Ins. lapp. p. 164. 1. — SAHLB. Ins. fenn. p. 452. 4. — CURTIS, Brit. entomol. t. 10. p. 1. 474. — STEPH. Illustr. t. 5. 426. — *Id.* Man. p. 356. 2588. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 248. 4. — L. REDTENBACH. Faun. austr. p. 610. — PERRIS, in Ann. Soc. entom. de Fr. 2<sup>e</sup> série t. 10. p. 507.

*Hallomenus undatus*, PANZ. Faun. germ. 68. 25. — *Id.* Krit. revis. 4. p. 97.

*Melandrya undata*, ILLIC. Magaz. t. 6. p. 335.

*Dircaea flexuosa*, DERTSCH. Faun. aust. t. 2. p. 265. 4.

Long. 0,0036 à 0,0045 (1  $\frac{2}{3}$  à 2 l.) Larg. 0,0014 à 0,0015 (1/2 à  $\frac{2}{3}$  l.)

*Corps* oblong ou suballongé ; médiocrement convexe ; pointillé, avec les intervalles presque squammuleux garni de poils fins, soyeux, couchés, de la couleur des diverses parties du corps, en dessus. *Tête* subtriangulaire ; subperpendiculaire ; enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux ; ordinairement noir ou d'un noir brun, avec le labre et souvent aussi l'épistome d'un jaune roux. *Palpes* flaves ou d'un jaune pâle. *Antennes* insérées au côté interne des yeux, un peu au delà de la moitié de la longueur de celui-ci ; prolongées un peu au delà des angles postérieurs du prothorax ; assez épaisses, avec les deux premiers articles un peu plus étroits : le deuxième des deux tiers environ plus court que le suivant : celui-ci un peu élargi de la base à l'extrémité : les quatrième à dixième subfiliformes, en partie plus longs que larges ; le onzième ovoïde, appendicé ; d'un flave testacé sur les trois premiers articles, ordinairement noires ou brunes sur les suivants, avec le dernier testacé, quelquefois moins obscures ou même d'un flave testacé à partir du

septième article. *Yeux* ovulaires ; non échanerés ; noirs. *Prothorax* obtusément arqué en devant et voilant la partie postérieure de la tête ; à angles antérieurs déclives, un peu émoussés et plus ouverts que l'angle droit ; élargi d'avant en arrière en ligne arquée, arrondi aux angles postérieurs ; faiblement en arc bissubsnué, à la base ; muni sur les côtés d'un rebord très-étroit et peu distinct, prolongé jusqu'aux sinuosités de la base, sans rebord sur le reste de cette dernière ; tranchant en dessous sur les deux tiers postérieurs de ses bords latéraux ; d'un tiers plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; médiocrement convexe ; squammuleusement pointillé ; brièvement pubescent ; testacé, d'un roux ou d'un fauve testacé, orné d'une large bande transverse noire, étendue jusque près des bords latéraux, ordinairement prolongée en arrière aux extrémités de son bord postérieur, laissant de couleur foncière le tiers ou les deux cinquièmes antérieurs de la longueur et le quart ou le tiers postérieur ; offrant sur la ligne médiane un léger sillon longitudinal, souvent oblitéré à ses extrémités, surtout à l'antérieure ; noté d'une légère dépression vers chaque subsinuosité basilaire ; souvent marqué d'une fossette ponctiforme près de chaque bord latéral, vers le milieu de la longueur. *Ecusson* presque en carré plus large que long, obtusément arqué à son bord postérieur ; brun ou brun noir. *Elytres* à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; près de quatre fois aussi longues que lui ; subparallèles, rétrécies en ligne courbe vers l'extrémité ; munies latéralement d'un rebord graduellement plus étroit, presque nul postérieurement, peu visible en dessus dans sa partie antérieure ; médiocrement convexes ; d'un roux testacé ou d'un fauve testacé, ornées chacune de deux bandes noires ou brunes, flexueuses ou onduleuses : la première égale environ au neuvième de la longueur, liée au bord externe, vers le quart de sa longueur, offrant à son bord antérieur deux courbures ou dents obtuses peu avancées : l'une, joignant le bord latéral, l'autre vers le milieu de la largeur, offrant, entre les deux dents, à son bord postérieur, une branche ou un appendice longitudinal prolongé en arrière jusqu'à la moitié de la longueur des étuis ; cette même bande dirigée en arrière vers la suture, où elle forme avec sa pareille un angle aigu prolongé jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes de la longueur des étuis : la deuxième bande, moins grêle, liée au bord externe vers la moitié de sa longueur, courbée en arrière jusqu'aux deux cinquièmes ou au tiers de la largeur de chaque étui, offrant dans ce point, à son bord antérieur, une dent avancée jusqu'au niveau de l'extrémité de la branche postérieure de la première bande, entre cette

branche et la suture, formant sur celle-ci, avec sa pareille, un angle rentrant ou une entaille, offrant à son bord postérieur une dent obtuse, vers le tiers interne de sa largeur. *Repli* graduellement rétréci depuis la base, réduit à peu près à une tranche à partir des hanches postérieures. *Dessous du corps* testacé sur l'antépectus, brun ou d'un brun noir sur le reste; pointillé; pubescent. *Mésosternum* rétréci d'avant en arrière, prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches postérieures. *Post-épisternums* rétrécis d'avant en arrière; près de cinq fois aussi longs qu'ils sont larges à la base. *Hanches de devant* contiguës; presque piriformes; convexes. *Hanches postérieures* un peu obliquement transversales. *Pieds* d'un testacé, d'un fauve ou d'un roux testacé livide. *Avant-dernier article de tous les tarses* entier ou un peu sensiblement avancé sous le suivant en forme de sole: premier article des postérieurs aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce vit comme la précédente aux dépens de diverses espèces de bolets. Elle a été prise par M. Perris, dans les Landes, dans le *Boletus pini*, THOR. Elle est généralement moins rare que la *C. affinis*.

Obs. Elle varie suivant le développement de la matière colorante noire. Quand celle-ci a plus ou moins fait défaut, le front passe du noir au testacé; la bande prothoracique pâlit et acquiert moins de développement; les bandes des élytres se montrent plus étroites ou plus obsolètes, elles finissent même quelquefois par disparaître entièrement.

## DEUXIÈME RAMEAU.

### DICÉATES.

CARACTÈRES. *Dernier article des palpes maxillaires* en forme de coudre, c'est-à-dire comprimé, plus ou moins allongé, à peu près d'égale largeur ou légèrement arqué sur une partie basilaire variable de sa longueur, rétréci ensuite en ligne courbe à son côté interne ou inférieur, sillonné longitudinalement sur sa tranche interne, plus large à la base que le troisième article, le débordant visiblement à son angle postéro-inférieur ou interne. *Ongles* simples ou munis d'une dent basilaire rudimentaire.

Ces insectes se distinguent principalement des précédents par le dernier article des palpes maxillaires en forme de coudre, plus large à la base, au côté interne, que le troisième article. Chez la *D. 4-guttata*, le quatrième article est émoussé à son angle postéro-interne: chez la



*D. laevigata*, au contraire, il est vif, rectangulairement ouvert, et semble, par là, faire la transition avec la forme qu'il affectera chez les Serropalpiens, chez lesquels cet angle commencera à se diriger en arrière. Le prothorax, chez la même *D. laevigata* offre déjà près de sa base des fossettes rudimentaires, qui laissent pressentir celles plus prononcées que montreront les Mélandryens.

Chez les Dircéates, les articles des palpes commencent à présenter à leur côté interne ces angles qui semblent les faire paraître presque dentés en scie, disposition qui a valu aux insectes de cette tribu le nom de SERROPALPIDES, dénomination qui m'a paru impropre à les caractériser, parce qu'elle est loin d'être commune à tous.

Ces Coléoptères peuvent être réduits au genre suivant :

Genre *Dircaea*, DIRCÉE; Fabricius (1).

(Διρκεία, nom mythologique).

CARACTÈRES. *Antennes* insérées vers le milieu, ou un peu après, du côté interne des yeux, dans le faible sillon formé par les joues; de longueur très-médiocre; subfiliformes, un peu grêles à la base; de onze articles: le deuxième, court: le troisième, plus long, obconique: les septième à dixième, moins longs que larges: le onzième, appendicé. *Palpes maxillaires* subcomprimés; à deuxième article obtriangulaire: le troisième, court, anguleusement dilaté à son côté interne, mais moins que la base du quatrième article: celui-ci, cultriforme, sillonné sur sa tranche interne. *Yeux* presque entiers ou faiblement échancrés. *Tête* enfoncée au moins jusqu'aux yeux dans le prothorax; voilée par celui-ci, quand l'insecte est examiné en dessus. *Prothorax* presque mitréforme; plus ou moins sensiblement bissinué à la base; à bords tranchants sur plus des deux tiers postérieurs de sa longueur. *Elytres* presque parallèles sur leurs deux tiers antérieurs. *Mésosternum* prolongé d'une manière variable. *Postépisternums* allongés; faiblement rétrécis d'avant en arrière, obtus à leur extrémité. *Pieds* médiocres. *Eperons* assez courts. *Avant-dernier article de tous les tarsi* avancé sous le suivant: premier article des tarsi postérieurs à peine aussi long que tous les suivants réunis. *Corps* presque semi-cylindrique.

---

(1) Fabr. System. Eleuther. t. 2. p. 88.



α. Mésosternum prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité des hanches.

1. **Id. quadri-guttata** ; PAYKULL. Allongée, presque semi-cylindrique ; à pubescence soyeuse ; finement ponctuée, avec les intervalles squammuliformes ; noire, ornée sur chaque élytre de deux taches orangées ou jaunes, courant environ les deux tiers submédianes de la largeur de chaque étui : l'antérieure, du neuvième au quart, avancée dans le milieu de son bord antérieur : la postérieure, des quatre aux cinq septièmes de la longueur, échancrée dans le milieu de son bord postérieur. Palpes, base des antennes et derniers articles des tarsi, testacés. Antennes un peu plus grosses vers leur moitié. Mésosternum prolongé presque jusqu'à l'extrémité des hanches.

*Hypulus 4-guttatus*, PAYK. Faun. succ. t. 1. p. 251. 4.

*Serropolpus 4-maculatus*, ILLIG. Kae. preus. p. 150. 6.

*Dirinea 4-guttata*, FABR. Syst. Eleuth. t. 2. p. 89. 3. — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 336.

obs. — GYLLENH. Ins. succ. t. 2. p. 520. 30. — DUFTECH. Faun. aust. t. 2. p. 264.

2. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 49. 3. — GERMAR, Faun. Ins. Europ. 6. 6. —

SAHLB. Ins. fenn. p. 449. 4. — L. REDTENBACHER, Faun. austr. p. 609.

Long. 0,0072 à 0,0090 (3 1/4 à 4 l.) Larg. 0,0022 à 0,0053 (1 à 1 1/2 l.)

Corps allongé ; presque semi-cylindrique, médiocrement convexe sur le dos ; marqué d'une ponctuation très-fine, légèrement râpeuse ou ruguleuse, faisant paraître les intervalles squammuliformes ; garni d'un duvet ou de poils soyeux, fins, couchés, médiocrement épais, de la couleur des diverses parties du corps, peu apparents sur les parties obscures. Tête entièrement voilée par le prothorax, quand l'insecte est vu en dessus ; noire, avec le bord antérieur de l'épistome et le côté externe des mandibules d'un rouge brun ou d'un rouge testacé. Palpes maxillaires d'un roux livide ou testacé ou d'une teinte rapprochée ; à dernier article émoussé à son angle postéro-interne. Antennes prolongées à peu près jusqu'aux angles postérieurs du prothorax ; pubescentes ; légèrement plus grosses vers leur milieu ; à quatrième et cinquième articles au moins aussi longs que le quatrième ; ordinairement noires, avec les deux premiers articles, souvent une partie du troisième et l'extrémité des autres, d'un testacé ou d'un flave testacé, parfois avec les quatre premiers articles testacés, et les autres moins obscurs. Prothorax paraissant en dessus presque en forme de mitre obtuse et à côtés curvilignes, ou en ogive obtuse sur sa moitié ou ses trois cinquièmes antérieurs, subparallèle ou à peine rétréci en ligne un peu courbe sur son tiers postérieur ; arqué en devant ; à angles

antérieurs infléchis, très-ouverts, peu prononcés et invisibles en dessus; à bords latéraux munis d'un rebord étroit, invisible en dessus: ces bords obtus en devant, tranchants d'une manière graduellement plus prononcée, à partir du cinquième ou du quart antérieur jusqu'à l'extrémité; obtusément tronqué à la base au devant de l'écusson, subsinné entre cette partie et chacun des angles postérieurs, qui sont un peu courbés en arrière sur les angles huméraux des élytres; muni à la base d'un rebord étroit, ordinairement interrompu en devant de l'écusson; à peu près aussi large à la base qu'il est long sur son milieu; convexe en devant, graduellement moins convexe en arrière; noir; squammuleusement ponctué. *Ecusson* plus large que long; obtusément arrondi en arrière; coloré et ponctué comme le prothorax. *Elytres* à peu près aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; moins larges que celui-ci dans son milieu; deux fois et quart à deux fois et tiers aussi longues que lui; subparallèles jusqu'aux trois cinquièmes, rétrécies ensuite en ligne un peu courbe, faiblement d'abord, mais plus sensiblement après, jusqu'à l'angle sutural: très-étroitement rebordées sur les côtés; médiocrement convexes sur le dos, convexement déclives latéralement; pubescentes et ponctuées comme le prothorax, mais d'une manière plus finement squammuleuse; marquées d'une légère fossette humérale; offrant ordinairement les traces plus ou moins sensibles de deux à quatre nervures longitudinales ou côtes peu saillantes, indistinctes postérieurement: la troisième à partir de la suture naissant de l'épaule; noires, parées chacune de deux taches ordinairement orangées, quelquefois plus pâles, de forme un peu variable, n'atteignant ni la suture, ni le bord externe: l'antérieure, prolongée du neuvième au quart de la longueur, le plus souvent subarrondie, avec la partie médiaire interne de son bord antérieur plus avancée, couvrant ordinairement du cinquième juxta-sutural au sixième juxta-marginal: la deuxième, prolongée environ des quatre aux cinq septièmes de la longueur, échancrée dans le milieu de son bord postérieur, irrégulièrement arquée en devant, rarement trilobée, habituellement subarrondie ou transverse, couvrant du sixième juxta-sutural ou un peu moins au sixième juxta-marginal ou un peu moins, de la largeur. *Repli* obliquement déclive; de moitié plus étroit en devant que le postépisternum, graduellement rétréci, réduit à une tranche près de l'extrémité. *Dessous du corps* noir; garni de poils concolores: moins finement ponctué sur ses parties pectorales que sur le ventre. *Hésosternum* rétréci d'avant en arrière, prolongé à peu près jusqu'à l'extré-

mité des hanches intermédiaires. *Postépisternums* rétrécis d'avant en arrière, quatre fois aussi longs qu'ils sont larges à la base, six fois aussi longs qu'ils sont larges à l'extrémité. *Pieds* ordinairement noirs ou d'un brun noir, avec partie des hanches, les genoux et la base des jambes d'un rouge testacé ou d'un testacé brunâtre, et au moins les derniers articles des tarsi intermédiaires et postérieurs, et la presque totalité des antérieurs, testacés : premier article des postérieurs un peu plus long que les trois suivants réunis.

Cette espèce se trouve dans nos provinces méridionales.

Obs. Quand la matière colorante a été moins abondante, les parties noires des antennes et des pieds passent au brun ou au brun tirant sur le testacé ; les élytres même au lieu d'être noires, sont brunes.

Les nervures des étuis sont plus ou moins apparentes. Quelquefois on n'en peut distinguer que deux, le plus souvent les deux plus internes ; d'autres fois on en compte trois ou quatre, quelquefois même les quatre sont assez prononcées : ces nervures, comprises entre la suture et le bord externe, sont séparées par des intervalles à peu près égaux ; elles s'effacent au moins à partir des trois quarts de la longueur des étuis : la troisième naît de l'épaule : la quatrième, entre l'épaule et le bord externe.

Les taches varient de forme et de couleur. Ordinairement elles sont de couleur orangée ; mais quand la matière colorante a été moins abondante, elles passent au jaune pâle. Quant à leur forme, elle est très-variable : la première est ordinairement subarrondie, d'autres fois plus rapprochée du carré, avec la partie médio-interne de son bord antérieur plus ou moins avancée, de manière à faire paraître la partie plus externe du même bord échancrée. J'en ai vu des exemplaires dont le bord postérieur de la même tache était profondément échancré jusqu'aux deux cinquièmes postérieurs de la longueur de la tache, qui se prolongeait en pointe de chaque côté de l'échancrure. La tache postérieure est habituellement plus large que longue, irrégulièrement arquée en avant, presque en ligne droite et plus développée longitudinalement à son côté externe, réduite et subarrondie à l'interne, échancrée dans le milieu de son bord postérieur ; mais parfois elle affecte une forme plus visiblement transverse ; d'autres fois, au contraire, elle est presque arrondie ; rarement, par une anomalie angulaire, elle est trilobée ou comme formée de deux taches ovales dont l'interne plus petite, et, au milieu du bord antérieur de ces taches unies, s'avance un prolongement de largeur presque uniforme, de longueur égale à celui de la tache interne.

Les exemplaires du nord sont ordinairement d'une taille moins avantageuse que ceux des provinces du midi. J'en ai vu, dans la collection de M. Foudras, deux individus qui lui avaient été envoyés par feu le comte Mannerheim, dont les taches, par leur teinte d'un jaune pâle, rappellent la description donnée par Gyllenhal. A voir la couleur de ces taches et la taille plus petite de ces exemplaires, on serait tenté de considérer les individus provenant de nos provinces méridionales comme constituant une espèce particulière (*D. 4-signata*); mais les taches de ces variétés finlandaises occupent si exactement la même place, elles ont si bien les signes distinctifs et la forme générale qui se retrouvent chez les autres, ces individus ont d'ailleurs si régulièrement tous les caractères de l'espèce, qu'il est visible que la décoloration des taches est un défaut de matière colorante, défaut que viennent accuser aussi les antennes et les pieds. Quelquefois alors la tache antérieure se trouve assez restreinte, n'a pas assez de développement pour arriver jusqu'à la première nervure qu'elle dépasse ordinairement. J'ai reçu d'ailleurs de Suède un exemplaire qui ne diffère en rien de ceux du midi, si ce n'est par une taille moins avantageuse. Il a, comme les nôtres, la tache antérieure plus avancée vers le milieu de son bord antéro-interne, et la postérieure échancrée dans le milieu de son bord postérieur, caractère général de ces taches, et qui vient ainsi confirmer l'identité de l'espèce.

αζ. Mésosternum à peine prolongé jusqu'à la moitié des hanches intermédiaires (*G. Xylita*, PAYK. (1) ).

2. ***D. laevigata*** ; HELLENUS. Allongée ; presque semi-cylindrique ; à pubescence soyeuse ; ordinairement brune ou d'un brun noir, avec la base des antennes et les tarsi testacés, mais parfois fauves ou d'un fauve testacé sur quelques parties au moins de son corps. Antennes grossissant un peu vers l'extrémité. Prothorax rugueusement ponctué ; bissubsinné à la base ; marqué de deux fossettes peu profondes. Mésosternum prolongé à peine jusqu'à la moitié des hanches.

*Serropalpus laevigatus* HELLEN, in Vetensk. Acad. nya Handl. (1786) p. 312. 2. —

GUEL. C. LINN. Syst. nat. t. 1. p. 1901. 2. — LUG. Kaef. pr. p. 151. 8.

*Lymexylon laevigatum*, PANZ. Entom. germ. p. 206. 8. — *Id.* Faun. germ. 24. 16.

1<sup>o</sup> édit. — *Id.* Krit. Rev. d. Ins. Faun. 1. p. 96.

---

(1) Faun. succ. t. 1. p. 249.



- Xylita buprestoides*, PAYK. Faun. suec. t. 1. p. 249. 1. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 35. note. — *Id.* Man. p. 329. 2579.
- Dircaea discolor*, FABR. Suppl. p. 121. 2. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 89. 2. — PANZ. Faun. germ. 2<sup>e</sup> édit 24. 16. et 97. 6. — *Id.* Index, p. 145. 1. — DUFTSCH. Faun. aust. t. 2. p. 264. 3. — ZETTERST. Faun. lapp. p. 284. 1. — *Id.* Ins. lapp. p. 165. 1. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 248. 1. — L. DUFOUR, Excurs. entom. p. 69. 412.
- Dircaea laevigata*, GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 517. 1. — SAHLB. Ins. fenn. p. 448. 1. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 609.

Long 0,0036 à 0,0090 (2 1/2 à 4 l.) Larg. 0,0022 à 0,0035 (1 à 1 1/2 l.)

*Corps* suballongé; subsemi-cylindrique; médiocrement convexe; marqué de points plus grossiers sur le prothorax, plus fins sur les élytres; garni de poils soyeux, fins, couchés, fauves, médiocrement épais. *Tête* ordinairement brune ou d'un brun noir, depuis sa partie postérieure jusqu'à la base des antennes ou jusqu'à l'épistome, d'un fauve testacé ou testacée en devant; parfois presque entièrement de cette couleur, quand la matière colorante a fait défaut. *Antennes* prolongées à peu près jusqu'aux angles postérieurs du prothorax; graduellement un peu plus épaisses vers leur extrémité; brièvement pubescentes; de onze articles: le deuxième un peu moins long que le troisième: les quatrième à dixième, à peine aussi longs ou à peine plus longs que larges: le onzième appendicé; ordinairement d'un brun livide, testacées ou d'un roussâtre testacé sur les trois premiers articles et brunes sur les autres; mais parfois presque entièrement brunâtres ou testacées. *Palpes maxillaires* testacés ou d'un brun testacé: à dernier article à angle postéro-interne vif ou non émoussé. *Venc* noirs; faiblement échancrés. *Prothorax* un peu arqué en devant à son bord antérieur; à angles de devant déclives, invisibles en dessus et ouverts; à bords latéraux arqués, mais paraissant par suite de la déclivité de ses angles de devant presque mitréforme, c'est-à-dire élargi en ligne un peu courbe jusqu'aux trois cinquièmes de sa longueur, subparallèle ensuite: à bords latéraux moins tranchants dans leur moitié antérieure et obtus près des angles de devant; bis-subsinué à la base, avec les angles postérieurs légèrement dirigés en arrière; un peu moins long sur son milieu qu'il est large à la base; assez convexe en devant, graduellement moins convexe en arrière; ordinairement brun ou brun noir, parfois avec le bord antérieur et la base, ou du moins la partie médiale de celle-ci, d'un fauve roussâtre, quelquefois entièrement d'un brun fauve ou testacé; grossière-



ment ponctué, avec les intervalles squamuliformes; marqué d'une fossette longitudinale et triangulaire, peu ou médiocrement profonde, au devant de chacune de ses sinuosités basilaires. *Ecusson* presque en carré de moitié plus large que long; pubescent; ruguleusement ponctué; brun ou brun fauve. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax; deux fois et demie à trois fois aussi longues que lui; sub-parallèles jusqu'aux deux tiers, rétrécies ensuite en ligne courbe; laissant souvent un peu à découvert une partie du pygidium; munies d'un rebord très-étroit, qui s'efface postérieurement; médiocrement convexes; marquées d'une légère fossette humérale; plus finement ponctuées et plus pubescentes que le prothorax; ordinairement brunes ou d'un brun noir, parfois d'un brun fauve ou testacé. *Repli* réduit à une tranche presque à partir des hanches postérieures. *Dessous du corps* ordinairement brun ou d'un brun noir, quelquefois brun seulement sur l'antépectus et d'un brun fauve ou testacé sur le reste; rugueusement ponctué et presque glabre sur les côtés de l'antépectus, assez finement ponctué sur les autres parties pectorales, plus finement ponctué et plus pubescent sur le ventre. *Mésosternum* prolongé à peine jusqu'à la moitié des hanches intermédiaires. *Postépisternums* subparallèles ou à peine plus larges vers leur milieu, faiblement rétrécis en arrière; cinq fois environ plus longs qu'ils sont larges dans leur milieu. *Pieds* ordinairement bruns sur les cuisses, d'un brun fauve sur les jambes, et testacés sur les tarses, quelquefois entièrement de l'une de ces teintes. *Eperons* assez courts. *Avant-dernier article de tous les tarses* avancé en forme de sole: celui des antérieurs bilobé: premier article des tarses postérieurs au moins aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce paraît habiter toutes les parties froides ou tempérées de la France. Je l'ai prise dans les bois du Mont-Pilat et à la Grande-Chartreuse.

**Obs.** Elle offre dans sa coloration des variations suivant le développement de la matière colorante. Ordinairement elle est d'un brun noir ou d'un brun de poix, avec la base des antennes, les tarses et parfois les jambes, testacés ou d'une nuance rapprochée. Quelquefois la tête et le prothorax sont bruns et les élytres fauves ou d'un fauve testacé; le dessous du corps et les pieds montrent alors aussi une couleur moins obscure. Plus rarement tout le corps ou presque tout le corps est fauve ou d'un fauve testacé.

Elle se distingue de la précédente non-seulement par la couleur de sa robe, mais encore par ses antennes graduellement plus épaisses vers

l'extrémité, à deuxième article moins court proportionnellement ; par le dernier article de ses palpes maxillaires à angle vif et rectangulairement ouvert à sa partie postéro-interne ; par son prothorax marqué de deux fossettes basilaires apparentes ; par son mésosternum prolongé à peine jusqu'à la moitié des hanches.

Sa larve, suivant Erichson (1), a beaucoup d'analogie avec celle de la *Melandrya caraboides*, mais elle a le dernier segment abdominal armé de deux crochets recourbés.

J'ai vu dans la belle collection de M. le D<sup>r</sup> Aubé, sous le nom de *D. Parreyssii*, une *Direce* ayant beaucoup d'analogie avec l'espèce précédente, mais qui semble distincte de celle-ci. Elle peut être caractérisée ainsi :

**Id. Parreyssii.** Allongée ; presque semi-cylindrique ; à pubescence soyeuse ; uniformément et finement ponctuée en dessus ; fauve ou d'un brun testacé : base des antennes, dessous du corps et pieds, d'un testacé roussâtre ou flavescent. Antennes un plus grosses vers l'extrémité. Prothorax légèrement arqué en arrière à la base, à angles postérieurs éroussés et moins prolongés en arrière que le milieu. Mésosternum en triangle presque équilatéral, prolongé presque jusqu'à l'extrémité des hanches.

Long. 0,0061 à 0,0067 ( 2 3/4 à 3 l.) Larg. 0,0017 (3/4 l.)

PATRIE : la Hongrie ?

Obs. Cette espèce par ses angles du prothorax émoussés avoisine les *Carides* ; sous d'autres rapports, elle paraît faire la transition entre la *D. 4-guttata* et la *D. laevigata*. Elle diffère de cette dernière dont elle se rapproche par la couleur de sa robe, par la ponctuation du dessus de son corps uniforme et plus fine ; par les articles cinq à dix de ses antennes en forme de coupe, c'est-à-dire élargis presque en demi-cercle dans leur moitié postérieure, tronqués en avant ; par son prothorax tronqué presque en ligne droite en avant, sensiblement arqué en arrière et sans sinuosités à la base, avec les angles postérieurs émoussés ou presque subarrondis et moins prolongés en arrière que le milieu de la dite base, n'offrant que des traces peu apparentes de légères fossettes ; par son mésosternum beaucoup plus large que chez les deux autres espèces, offrant

---

(1) Zur systematisch. Kennt. d. Insekten Larv. in Archiv. f. Naturgesch. t. 8. 1842) 1<sup>re</sup> partie, p. 368.

l'image d'un triangle presque équilatéral, ayant la base en avant, et le sommet prolongé presque jusqu'à l'extrémité des hanches intermédiaires; par ses pieds uniformément d'un testacé pâle ou flavescent.

La couleur de ces pieds, du dessous du corps et même du dessus pourrait peut-être varier; mais les caractères indiqués serviront à faire distinguer cette espèce des deux autres.

## DEUXIÈME BRANCHE.

### LES SERROPALPIRES.

**CARACTÈRES.** Dernier article des palpes maxillaires, soit fortement en hache, avec l'angle postéro-interne ou postéro-inférieur vif et plus ou moins prolongé en arrière; ne débordant pas ou débordant à peine à sa base le côté interne ou inférieur du troisième article; sillonné longitudinalement sur sa tranche interne. *Hanches de devant* obliques, ovoïdes, rétrécies postérieurement, convexes en dessus, planes en dessous, contiguës. *Corps* presque semi-cylindrique.

**OBS.** L'angle postéro-inférieur du dernier article des palpes maxillaires qui déjà était vif et rectangulairement ouvert chez la *Dircaea laevigata*, se montre ici plus ou moins sensiblement dirigé en arrière et conséquemment aigu. Le troisième article est aussi dilaté à son côté interne que la base du quatrième, caractère qui sert à distinguer les Serropalpires des Dircéates. Déjà, chez les Serropalpes, qui terminent cette division, la tête est moins voilée par le prothorax que chez les autres espèces de la même famille, et laisse pressentir la liberté plus grande dont elle jouira dans les Mélandryens, chez lesquels elle est moins décline et en grande partie découverte.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

#### GENRE.

Dernier article des palpes maxillaires } en forme de coute, peu ou à peine prolongé en arrière à son angle postéro-interne. Sixième à dixième articles des antennes une fois à peine plus longs qu'ils sont larges, Tête voilée par le prothorax. Avant-dernier article de tous les tarses prolongé en forme de sole sous le suivant.

*Phloiotrya.*

Dernier article des palpes maxillaires } fortement en hache ou en triangle à côté interne le plus long, plus longuement prolongé en arrière à son angle postéro-interne ou postéro-inférieur que le quart de la longueur du même côté. Sixième à dixième articles des antennes trois fois aussi longs qu'ils sont larges. Tête un peu découverte. Avant-dernier article de tous les tarses non avancé sous le suivant.

*Serropalpus.*

Genre *Phloiotrya*, PHLOIOTRYE; Stephens (1).

(φλοιός, écorce; τρύω, j'use).

CARACTÈRES. *Antennes* insérées vers le milieu, ou un peu après, du côté interne des yeux, dans les sillons formés par les joues; de longueur médiocre; subfiliformes; de onze articles: les trois premiers un peu plus grêles: le deuxième, visiblement moins long que le suivant: les sixième à dixième, de moitié plus longs ou moins d'une fois plus longs qu'ils sont larges: le onzième, appendicé. *Dernier article des palpes maxillaires* une fois plus long que large; en forme de coudre; à angle postéro-interne ou postéro-inférieur vif et un peu dirigé en arrière: à troisième article en triangle un peu transverse, moins de moitié aussi large qu'il est long à son côté externe ou supérieur. *Tête* voilée par le prothorax. *Yeux* à peine échancrés. *Pieds* médiocres. *Avant-dernier article de tous les tarsi* avancé sous le suivant: celui des antérieurs bilobé: celui des autres tronqué. *Corps* allongé; presque semi-cylindrique.

1. *P. rufipes*; GYLLENHAL. Allongé; subsemi-cylindrique; à pubescence soyeuse; ponctué ruguleusement avec les intervalles squamuliformes sur le prothorax, plus finement sur les élytres; variant du brun de poix au fauve: pieds d'un fauve testacé: base des antennes pâle. Deuxième article des palpes, émoussé à son angle antéro-interne. Deuxième article des antennes au moins aussi long que les deux tiers du suivant. Prothorax obtus en avant; offrant vers les deux tiers sa plus grande largeur, bissubsinué à la base; à deux légères fossettes antébasilaires obliques.

*Dicaea rufipes*, GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 519. 2. — SCHÖNH. Syn. ins. t. 3. p. 49. 2.

*Phloiotrya rufipes*? STEPH. Illustr. t. 5. p. 35. pl. 24. fig. 4. — Id. Man. p. 329. 2578.

Long. 0,0061 à 0,0067. (2 3/4 à 3 l.) Larg. 0,0019 (7/8 l.)

*Corps* allongé; presque cylindrique; médiocrement convexe sur le dos; ruguleusement ponctué, plus finement sur les élytres que sur

---

(1) STEPHENS, Illustr. t. 5. p. 32 et p. 35.



le prothorax ; garni de poils fins, soyeux, couchés, fauves, grisâtres ou d'un fauve cendré ; variant du brun au brun fauve ou même parfois à une teinte plus pâle. *Tête* petite ; subarrondie ; engagée jusqu'aux yeux dans le prothorax ; brièvement pubescente ; à pubescence courte ; peu convexe sur le front ; marquée d'une fossette au milieu de ce dernier ; ordinairement brune, avec l'épistome et le labre plus pâle. *Palpes maxillaires* testacés ou d'un livide testacé. *Antennes* prolongées un peu au-delà des angles postérieurs du prothorax : subcomprimées ; pubescentes ; de onze articles ; plus grêles à la base ; à deuxième article égal au moins aux deux tiers du troisième : les sixième à dixième élargis en ligne courbe, à peine aussi longs ou à peine plus longs qu'ils sont larges à leur sommet : le dernier, appendicé ; ordinairement pâles ou testacés sur les trois premiers articles, ordinairement obscures ou brunes sur les autres, avec l'extrémité de chaque article cendrée. *Yeux* bruns ; à peine ou faiblement échancrés à leur côté interne. *Prothorax* obtusément arqué en devant ; à angles antérieurs déclives, ouverts et invisibles en dessus ; à côtés un peu anguleusement dilatés dans leur milieu, mais paraissant en dessus, par l'effet de la déclivité de ces côtés, élargi en ligne presque droite jusqu'aux deux tiers, puis un peu rétréci en ligne courbe ; à bords latéraux tranchants à peu près jusqu'aux angles de devant, mais moins vivement près de ceux-ci ; légèrement bissinué à la base, avec les angles postérieurs un peu ouverts et peu ou point émoussés ; un peu moins large à son bord postérieur qu'il est long sur son milieu ; convexe en devant, graduellement peu convexe à la base ; ruguleusement ponctué, avec les intervalles squamuliformes ; marqué près de cette dernière de deux dépressions ou fossettes légères, obliques ou subtransversales, plus faciles à apercevoir quand on examine l'insecte d'avant en arrière : ces fossettes naissant chacune vers chaque tiers externe de la base ; ordinairement brun ou brun testacé, parfois avec le bord antérieur et quelquefois même les latéraux graduellement fauves ou testacés ; offrant quelquefois les traces légères d'une ligne médiane. *Ecusson* presque en parallélogramme transverse, arqué en arrière à son bord postérieur ; près d'une fois plus large que long ; pubescent ; pointillé. *Elytres* à peine ou à peu près aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; deux fois et demie à trois fois aussi longues que lui ; subparallèles jusqu'aux deux tiers ou à peine élargies vers la moitié de leur longueur, postérieurement rétrécies en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural ; munies sur les côtés d'un rebord étroit qui s'efface postérieurement ; à bord externe



incliné en dehors de l'épaule et invisible en dessus dans ce point jusqu'au tiers de sa longueur; médiocrement convexes; marquées d'une fossette humérale linéairement allongée; offrant parfois les faibles traces de quatre nervures longitudinales postérieurement raccourcies: la troisième plus saillante en avant et rendant plus prononcée la fossette humérale qu'elle borde à son côté externe; d'un brun fauve ou d'un fauve brunâtre ou testacé; plus finement ponctuées que le prothorax; plus visiblement pubescentes que lui. *Repli* étroit, réduit à une tranche presque à partir des hanches postérieures. *Dessous du corps* à peu près de la couleur des élytres, ou un peu plus clair, surtout sur le ventre; pointillé; pubescent. *Mésosternum* prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches ou à peu près. *Postépisternum* un peu rétrécis postérieurement: quatre à cinq fois aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. *Pieds* fauves, d'un fauve ou d'un roux testacé. *Cuisses* comprimées; presque parallèles. *Eperons* assez courts. *Tarses antérieurs* offrant, surtout chez le ♂, les quatre premiers articles dilatés et hérissés en dessous de duvet. *Avant-dernier article de tous les tarses* avancé sous le suivant en forme de sole: celui des antérieurs, et moins visiblement celui des intermédiaires, bilobé: celui des postérieurs, tronqué: premier article des tarses postérieurs au moins aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce paraît rare en France. Je l'ai vue dans la collection de M. Fairmaire comme provenant des environs de Grenoble. Elle m'a été envoyée des environs de Draguignan par M. Jaubert.

Obs. Elle a quelque analogie avec la *Dircaea laevigata*, dont elle diffère par le troisième article de ses palpes maxillaires aussi large au côté interne que la base du quatrième; par son mésosternum prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité des hanches; par les fossettes de son prothorax obliques et plus légères, etc.

La larve, qu'il considérerait comme étant celle de la *Dircaea laevigata*, a été décrite par M. Mac-Leay <sup>(1)</sup>. Suivant cet auteur, elle a le corps blanchâtre; allongé; écailleux; un peu plus large vers le milieu que vers l'extrémité; convexe en dessus, un peu concave en dessous; la tête hémisphérique; les antennes courtes, à trois articles; les mandibules courtes; le segment prothoracique le plus grand: l'avant-dernier épineux; le dernier armé de deux crochets recourbés; les pieds anté-

---

(1) *Horae Entomol.* t. 2. p. 464. — Voy. aussi WESTWOOD, *Introd. to the modern Classif. of Ins.* t. 1. 1839, p. 397. — CHAPUIS et CHANDEZE, *Catal.* p. 179.

rieurs comprimés et crochus, plus longs et plus robustes : les quatre postérieurs plus grêles.

Cette larve avait été trouvée dans le tronc d'un chêne par M. Samouelle.

2. **P. Vaudoueri.** Allongé ; subsemi-cylindrique ; à pubescence soyeuse ; ponctué ruguleusement avec les intervalles squammuliformes, sur le prothorax, plus finement sur les élytres ; ordinairement brun ou d'un brun châtain sur la tête et le prothorax, brun fauve ou testacé sur les élytres : antennes, palpes et pieds d'un flave roussâtre. Deuxième article des palpes à angle antéro-interne vif. Deuxième article des antennes à peine plus grand que la moitié du suivant. Prothorax arqué en avant ; offrant vers sa moitié sa plus grande largeur ; bissubsinué à la base ; à trois fortes fossettes antébasilaires.

*Serropalpus Vaudoueri*, (LATREILLE) (DEJ.) Catal. 1821. p. 70. — *Id.* (1833) p. 202. — *Id.* (1837) p. 225.

Long. 0,0123 à 0,0133 (5 1/2 à 6 l.) Larg. 0,0033 (1 1/2 l.)

*Corps* allongé ; subsemi-cylindrique ; garni de poils fins, soyeux, couchés et concolores. *Tête* inclinée ; voilée par le prothorax, quand l'insecte est vu en dessus ; finement ponctué ; d'un brun tirant sur le fauve, plus foncé sur la partie postérieure, plus noir sur l'antérieur. *Labre* et *palpes* testacés ou d'un fauve livide : deuxième article de ces derniers en dent de scie non émoussée à son angle antéro-interne. *Antennes* de même couleur ; à peine prolongées au delà des angles postérieurs : subfiliformes ; un peu pubescentes ; à deuxième article à peine plus long que la moitié du suivant : le troisième plus court que le quatrième. *Prothorax* arqué en avant ; déclive et émoussé à ses angles antérieurs qui sont très-ouverts ; paraissant, vu en dessus, faiblement arqué sur les côtés, offrant vers la moitié de sa longueur sa plus grande largeur ; tranchant en dessous sur toute la longueur de ses côtés ; muni à ceux-ci d'un rebord étroit, invisible en dessus, si ce n'est vers son extrémité postérieure ; en ligne presque droite ou faiblement bis-subsinuée à la base, moins large à celle-ci qu'il est long sur son milieu ; convexe en avant, médiocrement convexe en arrière ; ordinairement brun ou d'un brun tirant sur le châtain ou le testacé, avec le bord antérieur testacé, quelquefois entièrement de cette couleur, finement ponctué, avec les intervalles paraissant squammuliformes ; garni de

poils fins, courts et couchés; offrant sur les deux tiers postérieurs de la ligne médiane une raie légère; noté à l'extrémité de cette ligne d'une fossette antéscutellaire très-prononcée; marqué au devant de la base de deux autres fossettes, naissant chacune près des angles antérieurs de l'écusson, et obliquement dirigées de côté jusqu'à la moitié de l'espace compris entre la ligne médiane et le côté externe: ces fossettes avancées seulement jusqu'au quart postérieur de la longueur du prothorax. *Ecusson* en carré près d'une fois plus long qu'il est large; tronqué postérieurement; de la couleur des étuis; pointillé; pubescent. *Elytres* à peine plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs; trois fois et demie environ aussi longues que lui: subparallèles ou graduellement et faiblement élargies ensuite jusqu'aux deux tiers, rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural: munies sur les côtés d'un rebord latéral étroit, à peine saillant et invisible en dessus sur la majeure partie de sa longueur, affaibli et à peu près nul postérieurement: médiocrement convexes sur le dos, convexement déclives sur les côtés; de couleur châtain ou d'un brun testacé, parfois de cette dernière couleur; garnies de poils fins et concolores; ponctuées d'une manière graduellement plus fine d'avant en arrière, avec les intervalles squammuleux. *Dessous du corps* brun ou d'un brun testacé sur les côtés de l'antépectus, d'un testacé roux ou roussâtre sur le reste; garni de poils concolores; pointillé. *Mésosternum* graduellement rétréci d'avant en arrière; prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité des hanches postérieures. *Postépisternums* graduellement et faiblement rétrécis; cinq fois environ aussi longs qu'ils sont larges à la base. *Pieds* d'un testacé roux ou roussâtre. *Tarses* antérieurs offrant leurs quatre premiers articles dilatés et garnis d'une pubescence soyeuse, en dessous: avant-dernier article de tous avancé sous le suivant en forme de sole: celui des antérieurs, et moins sensiblement celui des intermédiaires, bilobés: celui des postérieurs presque tronqué.

Cette espèce habite diverses parties de la France; mais elle semble rare partout. Elle paraît avoir été découverte dans les alentours de Nantes, par Vandouer ou plutôt Vandrouer, à qui Latreille l'a dédiée; elle a été prise dans les environs de Paris par M. Chevrolat; dans ceux de Lyon, sur le charme, par MM. Cl. Rey et Guillebeau.

Obs. Elle varie de couleur. Quelquefois elle est presque entièrement d'un fauve orangé ou d'un roux orangé, quand la matière colorante a plus ou moins fait défaut.

Elle se distingue du *P. rufipes*, par sa taille généralement plus

grande; par le deuxième article de ses palpes non émoussé, en dent de scie à son angle antéro-interne; par le deuxième article de ses antennes à peine plus long que la moitié, c'est-à-dire moins grand que les deux tiers du suivant; par son prothorax régulièrement arqué en avant, au lieu d'être obtusément arqué ou obtusément tronqué, offrant vers la moitié et non vers les deux tiers sa plus grande largeur, marqué à sa base de trois fossettes profondes ou très-prononcées : les deux latérales, obliques : la médiane, vers l'extrémité de la ligne médiane; par sa taille ordinairement plus avantageuse; par ses antennes entièrement d'un flave roussâtre.

Genre *Serropalpus*; SERROPALPE; Hellenius (1).

(*Serro*, je scie ; *palpus*, palpe.)

CARACTÈRES. *Antennes* insérées dans une assez faible échancrure des yeux, vers le milieu ou un peu après de leur côté interne; de longueur médiocre; presque sétacées, grêles; de onze articles : le premier, le plus grand : le deuxième, court : les sixième à dixième, trois fois aussi longs qu'ils sont larges : le dernier subappendicé. *Dernier article des palpes maxillaires* fortement en hache ou en triangle à côté interne le plus long; plus longuement prolongé, en angle vif et aigu, à son angle postéro-interne ou postéro-inférieur, que le quart de la longueur dudit côté : le troisième article, en triangle transverse et sublunulé, une fois plus large qu'il est long à son côté supérieur ou externe. *Tête* un peu découverte. *Prothorax* à bords latéraux tranchants sur leurs deux tiers postérieurs au moins. *Pieds* allongés. *Avant-dernier article de tous les tarsi* non avancé sous le suivant : celui des antérieurs, et moins sensiblement celui des intermédiaires, élargi de la base à l'extrémité et tronqué à cette dernière (♂) : celui des postérieurs, grêle. *Corps* allongé; presque semi-cylindrique.

**1. *S. striatus*;** HELLENIUS. *Allongé; semi-cylindrique; à pubescence soyeuse; pointillé, avec les intervalles squamuliformes sur le prothorax et à la base des élytres; d'un brun marron, ordinairement plus clair sur les étuis et en dessous; antennes et palpes testacés. Prothorax sans rebords; à angles postérieurs vifs et un peu dirigés en arrière; à deux faibles*

---

(1) Mémoires de l'Acad. des sc. de Stockholm. (1786) p. 310.



*fossettes antébasilaires obliques. Elytres cinq fois aussi longues que lui; faiblement striées.*

♂. Deuxième à quatrième articles des tarses antérieurs, élargis; garnis en dessous de poils soyeux plus serrés. Partie du sixième arceau ventral, visible.

♀. Articles des tarses antérieurs, grêles. Ventre de cinq arceaux.

*Mordella barbata*, SCHALLER, Neu. Insekt. in Abhandl. d. hall. Gesellsch. t. 1. (1785) p. 322. pl. 1. fig. 7. et 7, a.

*Serropalpus striatus*, HELLEN. in Vetensk. Acad. nya Handl. t. 7. (1786) p. 318. pl. 8. fig. 3. 5. — GMEL. CAR. LINN. Syst. Natur. t. 1. p. 1901. 1. — ILLIG. Kaef. preus. p. 150. 7. — PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 163. 1. — LATR. Hist. nat. t. 10. 338. 1. — *Id.* Gener. t. 2. p. 193. 1. pl. 9. fig. 12. — *Id.* Nouv. Dict. t. 19. (1819) p. 90. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 515. 1. — SCHON. Syn. ins. t. 3. p. 47. 1. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 379. 1. — GOLDFUSS, Handb. p. 352. — SAINT-FARGEAU et A. SÉRVILLE, Encycl. méth. t. 10, (1825) p. 428. — MELS. Lettr. t. 2. p. 283. 1. — SAHLB. Ins. fenn. p. 447 1. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 250. — GUÉRIN, Iconogr. du Règn. anim. p. 157, pl. 53. fig. 3, insecte. 3, a et 3, b, détails, — L. REDTENB. Faun. austr. p. 609.

*Lynezyon barbatum*, FABR. Mant. t. 1. p. 165. 3. — *Id.* Ent. syst. t. 2, p. 192. 4. — OLIV. Encycl. méth. 7. p. 600, 3. — *Id.* Entom. t. 2, n. 25. p. 5. 3. pl. 1 fig. 3, a, b. *Cantharis barbata*, GMEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 1900. 70. — DE VILLERS, C. LINN. Entom. t. 4. p. 324.

*Dircaea barbata*, FAB. Suppl. Ent. syst. p. 421. 1. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 88. 1. — DUFFSCH. Faun. austr. t. 2. p. 264. 1.

*Serropalpus barbatus*, ZETTERST. Faun. lapp. p. 285. 1. — *Id.* Ins. lapp. p. 162. 1.

Long. 0,0100 à 0,0157 (4 1/2 à 7 l.). Larg. 0,0022 à 0,0033 (1 à 1 1/2 l.),

*Corps* allongé; presque cylindrique; ruguleusement pointillé, avec les intervalles un peu squammuliformes; garni de poils fins, soyeux, couchés, assez courts, d'un fauve testacé ou presque de la couleur du fond; d'un brun marron, ou marron. *Tête* subarrondie; enfoncée à peu près dans le prothorax jusqu'aux yeux; subperpendiculaire; pointillée; brièvement pubescente; parfois notée d'une fossette sur le milieu du front; de couleur marron ou d'un marron testacé, surtout sur la moitié antérieure: *labre* et *palmes maxillaires* d'un testacé un peu livide: *mandibules* noires. *Antennes* prolongées presque jusqu'à la moitié du corps; filiformes ou presque sétacées, grêles; testacées ou d'un testacé pâle. *Yeux* d'un noir brun. *Prothorax* tronqué en



devant; à angles antérieurs inclinés, presque nuls, invisibles en dessus; paraissant en dessus, par l'effet de cette déclivité, élargi en ligne presque droite jusque vers la moitié de sa longueur, subparallèle ensuite ou à peine rétréci en ligne droite; à bords latéraux tranchants seulement sur leurs deux tiers ou trois quarts postérieurs, émoussés en avant; faiblement arqué en avant, à la base, avec les angles postérieurs vifs, rectangulairement ouverts et dirigés un peu en arrière; sans rebords; de moitié plus large à la base qu'il est long sur son milieu; convexe en avant, graduellement moins convexe en arrière; ruguleusement et moins finement ponctué que la tête, avec les intervalles plus sensiblement squammuliformes; pubescent; marqué vers chaque tiers externe de la base d'une dépression très-oblique ou obliquement subtransversale, plus facile à apercevoir quand on examine l'insecte d'avant en arrière; d'un brun marron ou d'une teinte rapprochée. *Ecusson* presque en carré aussi long que large, à bord postérieur obtusément arqué en arrière; brun marron; pointillé; pubescent. *Elytres* à peu près de la largeur du prothorax à sa base; cinq fois environ aussi longues que lui; subparallèles jusqu'à la moitié, postérieurement rétrécies en ligne un peu courbe; à peine rebordées latéralement; convexes; d'un brun marron graduellement un peu plus clair vers l'extrémité; pubescentes; pointillées d'une manière ruguleuse à la base, avec les intervalles squammuliformes, graduellement plus unies et plus finement ponctuées postérieurement; sans fossette humérale; à neuf stries légères, qui s'évanouissent avant l'extrémité. *Repli latéral*; graduellement rétréci jusque vers l'extrémité du premier arceau ventral, réduit postérieurement à une tranche ou à peu près. *Dessous du corps* ordinairement d'une teinte un peu plus claire que le dessus; plus luisant; plus brièvement pubescent; finement pointillé. *Mésosternum* caréné; prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* graduellement rétrécis, obtus à l'extrémité; quatre fois ou un peu plus aussi longs qu'ils sont larges en avant. *Pieds* allongés; de la couleur du dessous du corps: premier article des tarses postérieurs au moins aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce vit principalement dans le sapin. On la trouve à la Grande-Chartreuse et dans les montagnes plus ou moins élevées couvertes de cette essence de bois. Quelquefois elle éclot dans les villes, au sein des arbres qui y sont transportés.

Obs. La forme de ses palpes et la longueur des articles de ses

antennes suffisent pour permettre de la reconnaître facilement entre toutes les autres espèces de cette tribu.

Le *S. striatus*, par sa tête moins voilée ou un peu découverte, semble faire la transition aux Mélandryens, chez lesquels elle sera seulement penchée et moins enfoncée dans le prothorax.

## QUATRIÈME FAMILLE.

### MÉLANDRYENS.

**CARACTÈRES.** *Ongles* simples, ou munis seulement d'une dent rudimentaire à la base de chacune de leurs branches. *Antennes* subfiliformes ou grossissant à peine vers l'extrémité; de onze articles. *Tête* penchée, en majeure partie visible en dessus. *Yeux* obliquement transverses; très-écartés; un peu saillants. *Prothorax* creusé de deux fossettes au devant de la base; ordinairement bissinué à cette dernière. *Hanches de devant* contiguës.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

		GENRES.
Prothorax	à peine aussi large ou moins large près de la base que vers le tiers ou les deux cinquièmes de sa longueur.	
	Elytres subparallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur.	
	Prothorax de moitié moins long qu'il est large à la base. Mésosternum proiongé à peu près jusqu'à l'extrémité des hanches.	<i>Zilora.</i>
	Prothorax au moins aussi long qu'il est large à la base. Mésosternum prolongé environ jusqu'à la moitié de la longueur des hanches.	<i>Hypulus.</i>
	Elytres ovalaires. Mésosternum prolongé un peu au-delà de la longueur des hanches.	<i>Marolia.</i>
	élargi d'avant en arrière au moins jusqu'aux trois quarts de sa longueur. Mésosternum non prolongé jusqu'à la moitié des hanches.	<i>Melandrya.</i>

#### Genre *Zilora*, ZILORE.

**CARACTÈRES.** *Antennes* insérées vers la moitié du côté interne des yeux; médiocres; grossissant un peu vers l'extrémité; de onze articles: le deuxième, court: les quatrième à dixième, presque semblables,

à peine plus longs qu'ils sont larges à l'extrémité : le dernier, ovulaire. *Tête* penchée ; en majeure partie visible en dessus. *Palpes maxillaires* à deuxième article obconique : le troisième, court, plus étroit à son côté interne que la base du quatrième : celui-ci, cultriforme, de moitié plus long qu'il est large à sa base, non sillonné sur sa tranche. *Yeux* peu ou point échancrés. *Prothorax* de moitié au moins plus large que long ; offrant vers les deux tiers sa plus grande largeur ; marqué de deux fossettes antébasilaires. *Elytres* subparallèles jusqu'aux deux tiers ; un peu plus larges en devant que le prothorax. *Mésosternum* prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité des hanches. *Avant-dernier article des tarses* sensiblement avancé sous le suivant. *Corps* suballongé.

1. *Z. ferruginea* ; PAYKULL. *Suballongée* ; subparallèle ; médiocrement convexe ; marquée de points râpeux, un peu plus gros sur les élytres que sur le prothorax ; hérissée de poils médiocrement épais ; d'un brun rouge ou roux. *Prothorax* de moitié plus large que long ; élargi en ligne courbe jusqu'aux deux cinquièmes, à peine rétréci ensuite en ligne droite ; bissubsinué à la base ; à peine déprimé au devant de celle-ci et creusé de deux fossettes. *Elytres* un peu plus larges que le prothorax ; presque sérielement ponctuées près de la suture.

*Xylita ferruginea*, PAYK. FAUN. SUEC. t. 1. p. 250. 2.

*Dicaea ferruginea*, GYLLENH. INS. SUEC. t. 2. p. 521. 4. — ZETTERST. FAUN. LAPP. p. 284. 2. — *Id.* INS. LAPP. p. 163. 2. — SAULB. INS. FENN. p. 450. 5.

Long. 0,0067 (3 l.) Larg. 0,0021 (1 l.)

*Corps* suballongé ; médiocrement convexe ; grossièrement ponctué à la base des élytres, moins grossièrement sur le prothorax ; d'un brun rouge ; mi-hérissé de poils assez longs. *Tête* subarrondie ; penchée ; non enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux ; ponctuée ; hérissée de poils peu épais ; d'un rouge testacé ou d'une teinte rapprochée. *Palpes maxillaires* plus pâles. *Yeux* noirs ; un peu saillants ; peu ou point échancrés. *Antennes* prolongées un peu au-delà des angles postérieurs du prothorax ; épaisses, avec la base plus grêle ; grossissant un peu vers l'extrémité ; hérissées de poils peu épais ; d'un rouge testacé ou d'un fauve testacé. *Prothorax* arqué en devant ; à angles antérieurs déclives et invisibles en dessus ; à bords latéraux arqués, et offrant vers les deux cinquièmes leur plus grande largeur, mais paraissant, par l'effet de la déclivité de ses côtés, élargi en ligne

courbe jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes et subparallèle ensuite ou plutôt faiblement rétréci en ligne droite; bissinué à la base près de chaque angle, avec la partie médiaire arquée et un peu plus prolongée en arrière que les angles, qui sont vifs et un peu ouverts; sans rebords ou à peine rebordé; tranchant sur les deux tiers postérieurs de ses côtés et faiblement sur l'antérieur; convexe en devant, presque plan en arrière; de moitié plus large à la base qu'il est long sur son milieu; marqué de points un peu moins gros que ceux des élytres, médiocrement rapprochés et donnant chacun naissance à un poil mi-relevé; creusé d'une fossette profonde, au devant de chaque sinuosité basilaire; offrant les traces d'une ligne longitudinale médiaire; d'un rouge brun ou d'un fauve brunâtre. *Ecusson* petit; semi-orbulaire; d'un fauve brunâtre; presque lisse. *Elytres* un peu plus larges à la base que le prothorax à la sienne, faiblement plus larges que lui dans son milieu; près de quatre fois aussi longues que ce dernier; subparallèles jusqu'aux deux tiers, arrondies postérieurement, prises ensemble; à peine rebordées; inclinées en dehors de l'épaule; médiocrement convexes; d'un brun de poix rouge ou d'un fauve brun de poix; marquées de points profonds, un peu plus gros que ceux du prothorax, formant près de la suture trois ou quatre sortes de rangées striales; hérissées de poils assez longs d'un fauve cendré; creusées d'une fossette humérale peu profonde. *Repli* étroit; latéral; réduit à peu près à un tranche à partir des bandes postérieures. *Dessous du corps* d'un brun rouge sur les parties pectorales, fauve ou d'un fauve testacé sur le ventre; pubescent; ponctué assez fortement sur les premières, pointillé sur les secondes. *Mésosternum* prolongé en se rétrécissant jusqu'à l'extrémité ou à peu près des bandes. *Postépisternums* rétrécis d'avant en arrière; cinq fois environ aussi longs qu'ils sont larges à la base. *Pieds* d'un fauve testacé. *Premier article des tarses postérieurs* au moins aussi long que tous les suivants réunis: avant-dernier article de tous les tarses sensiblement avancé sous le suivant.

Cette espèce a été prise, sur des pins, dans les environs de Bordeaux, par M. Charles Perroud; elle paraît très-rare en France.

Ocs. Elle avait été comprise par Paykull, dans son genre *Xylita*, dont le type semble avoir été, dans l'esprit de cet auteur, la *Dircaea lucrigata*.

Genre *Hypulus*, HYPULÉ ; Paykull <sup>(1)</sup>.

(ὕπουλος, qui a une apparence trompeuse.)

CARACTÈRES. *Antennes* insérées vers la moitié du côté interne des yeux ; médiocres ; subfiliformes ou plutôt grossissant un peu vers l'extrémité ; de onze articles : le deuxième, court : les quatrième à dixième, presque égaux, un peu plus longs que larges : le onzième, rétréci ou subappendicé à son extrémité. *Tête* penchée, en majeure partie visible en dessus. *Palpes maxillaires* à deuxième article obtriangulaire : le troisième, en triangle transverse, à peu près aussi large que la base du quatrième : celui-ci, cultriforme, une fois plus long qu'il est large, peu ou point sensiblement sillonné sur sa tranche inférieure. *Yeux* un peu échancrés. *Prothorax* un peu plus long que large ; presque carré, un peu moins large à la base qu'aux deux cinquièmes de sa longueur ; creusé de deux fossettes antébasilaires. *Elytres* subparallèles. *Mésosternum* prolongé jusqu'à la moitié ou un peu plus des hanches intermédiaires. *Postepisternums* allongés ; presque parallèles. *Avant-dernier article des tarses* avancé sous le suivant. *Corps* suballongé.

1. III. *quercinus* ; PAYKULL. Allongé ; peu convexe ; à pubescence soyeuse, couchée, luisante, en partie mi-dorée. *Prothorax* noir ou noir brun. *Elytres* d'un fauve testacé, ornées d'une bordure suturale depuis la base presque jusqu'au quart, plus ou moins liée à une tache en hameçon ; d'une large bande transverse, couvrant de la moitié aux trois quarts, entaillée en devant ; et d'une bande apicale, noires. Dessous du corps brun ou fauve. Pieds d'un fauve testacé.

*Elater quercinus*, QUENSEL. Dissert. (1790), p. 47.

*Elater? blekingensis*, (THUNBERG), *Tenebrio bleckengensis*, RHEN, Bemerk. in SCHNEID. Neust. Magaz. p. 241.

*Helops? fasciatus*, (HELVIG), voy. SCHNEID. N. Magaz. p. 242.

*Nothoxus dubius*, FABR. Eutom. syst. t. 1. p. 211. 4. — PANZ. Faun. germ. 11. 13. — *Id.* Entom. germ. p. 86. 2.

*Hypulus quercinus*, PAYK. Faun. suec. t. 1. p. 252. 2. — PANZ. Index, p. 146. 4. — S. FARG. et A. SERV. Encycl. méth. t. 10. p. 419. 2. pl. 373. bis fig. 21. — CURTIS,

---

(1) PAYK. Faun. suec. t. 1. p. 251.



- Brit. entom. t. 6. 255. fig. — STEPH. Illustr. t. 8. p. 337. 1. pl. 24. fig. 5. — *Id.*  
 Man. p. 350. 2581. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 608.  
*Hallomenus quercinus*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 357. obs,  
*Serropalpus dubius*, ILLIG. Kaef. preus. p. 128. 4.  
*Dircaea dubia*, FAB. Syst. Eleuth. t. 2. p. 70. 6. — PANZ. Krit. Revis. p. 62. — DUFTSCH.  
 Faun. austr. t. 2. p. 265. 5.  
*Melandrya ? quercina*, LATR. Gen. t. 4. p. 339.  
*Melandrya dubia*, ILLIG. Magaz. t. 6. p. 335.  
*Dircaea quercina*, GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 523. 6. — SCHONH. Syn. Ins. t. 3.  
 p. 50. 13.  
*Hypulus dubius*, DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 249. 2.

Long. 0,0048 à 0,0059 (2 1/8 à 2 2/3 l.) Larg. 0,0012 à 0,0015 (1/2 à 2/3 l.)

*Corps* allongé ; subparallèle ; presque plan ou peu convexe ; garni de poils fins, couchés, cendrés ou d'un cendré fauve, luisants, en partie mi-dorés à certain jour. *Tête* penchée ; subarrondie ; finement ponctuée ; creusée d'une petite fossette sur le milieu du front ; pubescente ; noire, avec le labre d'un fauve ou d'un rouge testacé. *Palpes* de cette dernière couleur. *Yeux* bruns. *Antennes* prolongées environ jusqu'au quart des élytres ; d'un fauve ou d'un rouge testacé. *Prothorax* un peu arqué en devant, avec les angles antérieurs déclives, presque confondus avec le repli ; faiblement élargi en ligne courbe jusqu'au tiers de ses côtés, puis un peu rétréci postérieurement ; à bords latéraux repliés en dessous et arrondis sur plus de la moitié de leur longueur, tranchants seulement vers leur partie postérieure ; tronqué ou à peine bissinué à la base, avec la partie médiaire en arc faiblement dirigé en arrière ; à angles postérieurs presque droits et très-prononcés ; peu convexe ; creusé de chaque côté à la base, d'une fossette profonde, triangulaire, longitudinale, égale aux deux cinquièmes postérieurs de sa longueur, aboutissant au côté interne des angles postérieurs, relevée en carène à son côté externe comme chez les Taupins ; moins finement ponctué que la tête ; noir ; garni d'un duvet pâle, soyeux, luisant, à teinte légèrement dorée à certain jour, plus apparent sur les trois cinquièmes postérieurs qu'en devant. *Ecusson* une fois plus large que long ; obtusément tronqué ou un peu arqué en arrière à son bord postérieur ; d'un noir brun : pubescent. *Elytres* un peu plus larges à la base que le prothorax, à peu près aussi larges en devant que le prothorax dans son diamètre transversal le plus grand ; quatre fois aussi longues que lui ; presque parallèles jusqu'aux deux tiers (♂) ou un peu plus élargies dans leur milieu (♀), rétrécies

postérieurement ; obtusément arrondies à l'extrémité, prises ensemble : peu convexes ; plus grossièrement ponctuées et d'une manière plus ruguleuse à leur base que le prothorax, aussi finement ponctuées postérieurement ; d'un fauve clair ou d'un fauve testacé ; ornées chacune d'une bordure suturale, d'une tache et de deux bandes transverses, noires : la bordure suturale, naissant de la base, dont elle couvre environ du tiers à la moitié interne, prolongée jusqu'au cinquième de leur longueur, sur un cinquième de leur largeur le long de la suture, dont elle se détache souvent ensuite en se rétrécissant, liée ou presque liée à une tache postérieure en forme de hameçon tourné en dehors, prolongée presque jusqu'aux trois septièmes de la longueur : cette courbure séparée du bord externe, à son côté extérieur, par un espace égal au quart de la largeur : la première bande, transverse, couvrant de la moitié environ aux trois quarts au moins de la longueur, liée à la suture, couvrant les quatre cinquièmes ou cinq sixièmes de la largeur, entaillée en devant, arquée en arrière : la bande postérieure, en forme de tache apicale, couvrant environ le dixième de leur longueur ; garnies d'un duvet noir sur les parties noires, et cendré ou cendré mi-doré à certain jour sur les autres : ce duvet offrant les poils dirigés en dehors près de la suture, et constituant une sorte d'épi, du quart à la moitié de la longueur et des trois quarts à l'extrémité. *Dessous du corps* pointillé : pubescent ; ordinairement noir, ou d'un noir brun, tirant sur le fauve, avec les bords des arceaux du ventre fauves ou testacés ; quelquefois entièrement de l'une de ces dernières nuances. *Pieds* d'un fauve testacé ou presque d'un testacé rougeâtre ; garnis de poils d'un cendré mi-doré : premier article des tarses postérieurs presque aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce paraît habiter la plupart des provinces de la France. On la trouve dans les environs de Lyon, sous les écorces ou dans les vieilles souches des chênes, des châtaigniers, etc.

Obs. Elle offre quelques variations dans la teinte de son corps et dans le dessin de ses élytres. Quand la matière colorante a été abondante, les élytres ont leur fond d'un fauve testacé ; quand elle est moins développée, elles sont flavescentes : le prothorax est alors souvent testacé à ses bords antérieur et postérieur ; le dessous du corps passe du brun noir au testacé. La bordure suturale est tantôt liée à la tache en forme de hameçon, tantôt séparée d'elle.

2. **H. bifasciatus**; FABRICIUS. Allongé ; médiocrement convexe ; à pubescence soyeuse, cendrée, luisante. Prothorax et élytres fauves ou d'un fauve testacé : le premier, orné à son bord antérieur d'une tache noire, prolongée au moins jusqu'au tiers de la ligne médiane ; à deux fossettes basilaires profondes : les secondes, parées de deux bandes transversales noires, communes ; la première, couvrant depuis la moitié ou un peu après jusqu'aux deux tiers : la seconde apicale ; souvent notées au devant de celle-là, d'une tache nébuleuse. Dessous du corps et pieds d'un rouge ou fauve testacé.

*Notoxus bifasciatus*, FABR. Entom. syst. t. 1. p. 210. 3. — PANZ. Entom. germ. p. 86. 1.

*Ptilinus alni*, (KUGELANN)<sup>1</sup>, voy. SCHNEID. N. Mag. p. 242.

*Ptilinus bifasciatus*, KUGEL. Verzeich. in SCHNEID. N. Magag. p. 492. 4.

*Helops fasciatus*, PANZ. Faun. gerin. G. 3.

*Hypulus bifasciatus*, PAYK. Faun. succ. t. 1. p. 253. obs. — PANZ. Ind. p. 146. 2. — S. FARG. et A. SERV. Ency. méth. t. 10. p. 419. 3. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2, p. 249. 1. — L. REDTENR. Faun. aust. p. 608.

*Serropalpus bifasciatus*, ILLIG. Kaef. preus. p. 129. 5.

*Dircacea bifasciata*, FABR. Syst. Eleuth. t. 2. p. 90. 5. — PANZ. Krit. Revis. p. 61. — GYLLENH. Ins. succ. t. 2. p. 522. 5. — SCHONH. in Vetensk. (1809) p. 55. — Id. Synon. ins. t. 3. p. 50. 12. — DUFTSCH. Faun. austr. t. 2. p. 266. 6. — SAHLB. Ins. fenn. p. 450. 6.

*Haltomenus bifasciatus*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 336. obs.

Long. 0,0056 (2 1/2 l.) Larg. 0,0015 (3/5 l.)

Corps suballongé ; peu convexe ; garni en dessus de poils pâles, couchés, luisants, soyeux, peu ou médiocrement épais. Tête un peu plus longue que large ; penchée dans sa moitié postérieure, déclive et un peu plus étroite dans l'antérieure ; en majeure partie visible en dessus ; non tout à fait enfoncée jusqu'aux yeux dans le prothorax ; finement ponctuée ; garnie de poils raides et couchés ; fauve ou d'un fauve testacé, avec la partie postérieure obscure ou noirâtre, quelquefois parée d'une tache noirâtre sur le milieu du front ; peu convexe : ordinairement déprimée transversalement après la naissance des antennes. Palpes testacés ou d'un fauve testacé. Antennes prolongées jusqu'au quart environ des élytres ; épaisses ; testacées ou d'un fauve testacé ; pubescentes ; à troisième article à peine aussi grand que le quatrième ; les cinquième à dixième presque égaux : le onzième ovoïde. Prothorax tronqué en devant ; à angles antérieurs déclives, invisibles en dessus, confondus avec le repli ; élargi en ligne courbe jusqu'au tiers environ

de ses côtés, rétréci ensuite en ligne presque droite ou légèrement sinuée ; à angles postérieurs rectangulairement ouverts ; tronqué à la base ; sans rebords ; à côtés repliés en dessous et subarrondi en devant, tranchants seulement sur leur tiers postérieur ; un peu plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand ; assez fortement convexe en devant, plus faiblement en arrière ; creusé, à la base, près de chaque angle, d'une fossette triangulaire, occupant chacune plus du quart de la largeur, un peu moins longue que le tiers total de sa longueur ; ordinairement noté d'une petite fossette au devant de l'écusson finement et assez densément ponctué ; garni de poils fins, cendrés, couchés, luisants, peu épais ; fauve ou d'un fauve testacé, orné en devant d'une tache noire, presque étendue jusqu'aux parties latérales de son bord antérieur, de forme un peu variable, souvent prolongée, en se rétrécissant, jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes de sa longueur. *Écusson* petit ; presque en carré près d'une fois plus large que long ; fauve ; ponctué. *Elytres* un peu plus larges en devant que le prothorax à sa base, à peine aussi larges que lui dans son diamètre transversal le plus grand ; deux fois et quart à deux fois et demie aussi longues que lui ; perpendiculairement déclives aux épaules ; graduellement un peu plus larges vers le milieu de leur longueur, rétrécies ensuite ; subarrondies chacune à leur extrémité ; médiocrement convexes ; souvent déprimées transversalement un peu après leur base ; marquées de points plus gros ou moins petits, près de leur base, que ceux du prothorax, graduellement plus petits postérieurement ; garnies de poils analogues à ceux du prothorax ; fauves ou d'un fauve testacé ; ornées d'une bande transversale commune, couvrant depuis un peu après la moitié environ jusqu'aux deux tiers de leur longueur, subsinuée près de la suture à son bord postérieur, atteignant à peine le bord externe ; également noires à leur extrémité, sur le dixième environ de leur longueur ; ordinairement marquées d'une sorte de bande ou de tache transverse, nébuleuse ou obscure, couvrant le tiers médiaire de la longueur ou un peu plus, entre la bande transversale postmédiaire et la base. *Repli* très-étroit, postérieurement réduit à une tranche. *Dessous du corps* d'un rouge testacé, parfois avec l'extrémité du ventre obscure ; pointillé ; pubescent. *Mésosternum* prolongé jusque un peu au delà de la moitié des hanches. *Pieds* médiocres ; assez robustes ; testacés ou d'un rouge testacé pâle : premier article des tarses postérieurs presque aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce, beaucoup plus rare en France que l'autre, se trouve à la Chartreuse et dans quelques autres parties froides ou élevées.



Genre *Marolia*, MAROLIE.

CARACTÈRES. *Antennes* insérées vers la moitié du côté interne des yeux ; médiocres ; filiformes ; de onze articles : le deuxième court : les quatrième à dixième, plus longs que larges : le onzième ovale. *Tête* penchée ; en partie visible en dessus. *Palpes maxillaires* à deuxième article court, obconique ou obtriangulaire : le troisième, en triangle transverse, à peine aussi large que la base du quatrième : celui-ci, cultriforme, une fois et demie plus long qu'il est large à sa base, sillonné sur sa tranche inférieure. *Yeux* à peine échancrés. *Prothorax* plus large que long ; à peine aussi large ou un peu moins large à la base que vers les deux cinquièmes de sa longueur ; creusé de deux fossettes antébasilaires. *Elytres* ovales. *Mésosternum* prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* rétrécis d'avant en arrière ; allongés. *Avant-dernier article des tarses* avancé sous le suivant, et bilobé. *Corps* oblong ou suballongé.

**1. *M. variegata* ; Bosc.** En ovale très-allongé ; garnie de poils fins et couchés ; brune ou d'un brun fauve sur la tête et le prothorax ; ce dernier, bissiné à la base et creusé d'une fossette longitudinale très-marquée au devant de chaque sinuosité. *Elytres* fauves ou d'un fauve testacé, ornées chacune de divers signes noirs ou bruns, offrant entre autres deux figures ovales : l'une basilaire, terminée par deux prolongements : l'autre, sur le disque, située après le milieu, terminée par un prolongement dirigé vers la suture. *Pieds* d'un testacé livide.

*Senropalpus variegatus*, Bosc, Actes de la Soc. d'Hist. nat. de Paris t. 1. 1<sup>re</sup> partie p. 40 et 41. pl. 10. fig. 2.

*Dircaca variegata*, Fabr. Syst. Eleuth. t. 2. p. 90. S. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 49. 7. — SAINT-FARJEAU et AUD. SERVILLE, Encycl. méth. t. 10. p. 419. 2. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 36. 1. — *Id.* Man. p. 330. 258.

*Melandrya variegata*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 342. 3. — *Id.* Gener. t. 2. p. 192. obs. — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 2. (1818) p. 42. — LAMARCK, Anim. s. ver. t. 4. p. 378. 2.

Long. 0,0035 à 0,0056 (1 1/2 à 2 1/2 l.) Larg. 0,0009 à 0,0015 (2/5 à 2/3 l.) à la base des élytres : 0,0011 à 0,0025 (1/2 à 1 1/8 l.) vers la moitié des élytres.

*Corps* en ovale très-allongé ; médiocrement convexe ; marqué en dessus de points fins, avec les intervalles squammuleux ; garni de



poils fins, soyeux, couchés, médiocrement épais, fauves ou d'un fauve cendré. *Tête* d'un noir brun ou parfois d'un brun fauve. *Labre, épistome et palpes*, d'un fauve testacé, d'un roux testacé ou d'un testacé livide. *Mandibules* noires à l'extrémité. *Antennes* prolongées jusqu'au quart ou à la moitié du corps; filiformes; pubescentes; ordinairement brunes, parfois presque entièrement d'un roux livide ou testacé, ou avec les articles intermédiaires d'un roux brunâtre ou d'un fauve brun; à deuxième article à peine de moitié aussi long que le suivant: les troisième et quatrième à peu près égaux: les troisième à dixième de moitié au moins plus longs qu'ils sont larges: le dernier, ovalaire. *Prothorax* tronqué en avant; à angles antérieurs déclives; paraissant en dessus élargi en ligne courbe jusqu'au tiers de sa longueur, légèrement rétréci ensuite en ligne à peu près droite; muni à la base d'un rebord très-étroit et peu apparent; bissinué à cette dernière, avec les angles postérieurs un peu plus prolongés en arrière et en forme de dent, que la partie médiane: à peine plus long dans son milieu que large dans son diamètre transversal le plus grand; creusé au devant de chaque sinuosité basilaire d'une fossette très-marquée avancée jusqu'au tiers postérieur de sa longueur; à bords latéraux tranchants en dessous dans leur seconde moitié seulement; médiocrement convexe; d'un brun fauve, avec le bord antérieur souvent testacé. *Écusson* transverse, deux fois au moins aussi large que long; d'un testacé brunâtre. *Elytres* en ovale très-allongé, élargies en ligne peu courbe jusqu'aux trois cinquièmes, rétrécies ensuite; médiocrement convexes; fauves ou d'un fauve roussâtre ou d'un testacé tirant sur le fauve; ornées chacune de divers signes ou traits noirs ou bruns, parmi lesquels deux figures ovales ou parfois presque en parallélogramme allongé: 1° la première, liée à la base, voisine de l'écusson, étendue jusqu'aux trois cinquièmes ou deux tiers de la base, prolongée presque jusqu'au sixième de leur longueur, terminée par deux lignes longitudinales: l'externe de celles-ci, liée à son extrémité, à une autre ligne longitudinalement oblique, avancée jusqu'au huitième antérieur du bord externe: 2° la deuxième figure, ovalaire, prolongée sur le disque, des quatre septièmes presque aux trois quarts de la longueur, prolongée à sa partie postéro-interne par une ligne longitudinalement oblique dirigée vers la suture, où elle s'unit avec sa pareille vers les sept huitièmes de sa longueur; offrant entre les figures ovalaires précitées une sorte de bande oblique courte, formée de traits unis souvent liés à d'autres traits longitudinaux confondus en forme d'espèce de bordure marginale brune, inégale, prolongée du

quart aux quatre cinquièmes de leur longueur. *Repli* graduellement rétréci, réduit à peu près à une tranche à partir des hanches postérieures. *Dessous du corps* brun ou brun fauve sur la poitrine, fauve ou d'un fauve testacé sur le ventre; assez fortement ponctué sur les côtés de la poitrine, plus finement sur le ventre; garni de poils fins et couchés, d'un fauve testacé ou d'un fauve testacé livide. *Mésosternum* rétréci d'avant en arrière; non prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches intermédiaires. *Postépisternums* étroits, graduellement rétrécis d'avant en arrière; quatre fois au moins aussi longs qu'ils sont larges en devant. *Pieds* d'un testacé livide. *Hanches postérieures* un peu obliquement transversale.

Cette espèce a été découverte, en juillet, par Bosc (1), dans la forêt de Montmorency. Elle paraît habiter la majeure partie de la France. On la trouve dans nos environs principalement au printemps et en automne, en battant les haies touffues et les arbres.

Elle offre des variations nombreuses dans le dessin, suivant le développement de la matière colorante. Quand celle-ci a abondé, les signes ou lignes du dessin des élytres se dilatent, se lient ou se confondent; dans le cas contraire, elles se rétrécissent, s'oblitérent et disparaissent plus ou moins, et rendent alors l'état normal plus ou moins défectueux.

#### Genre *Melandrya*, MÉLANDRYE; Fabricius (1).

(Étymologie obscure).

CARACTÈRES. *Antennes* insérées vers la moitié du côté interne des yeux; médiocres ou assez courtes; assez épaisses; subfiliformes ou grossissant à peine vers l'extrémité; de onze articles: le deuxième, court: le troisième, un peu moins long que le quatrième: les septième à dixième, presque égaux, un peu plus longs que larges: le onzième, appendicé. *Tête* subhorizontale sur sa partie postérieure, penchée ou subperpendiculaire sur l'antérieure; ordinairement non engagée jusqu'aux yeux dans le prothorax. *Palpes maxillaires* à deuxième article obconique: le troisième, en triangle dont le côté

(1) Louis Augustin Guillaume Bosc, né à Paris le 29 janvier 1759, mort professeur de culture au Jardin des plantes, en 1828.

(2) FABR. Syst. Eleuther. t. 1. p. 165.

externe forme la base, presque aussi large que le quatrième à sa base : celui-ci, cultriforme, creusé sur sa tranche d'un sillon évasé antérieurement. *Mandibules* terminées en pointe. *Yeux* à peine échancrés. *Prothorax* élargi d'avant en arrière ; plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; bissubsinué à la base ; creusé de deux fossettes antébasilaires. *Elytres* un peu élargies après la moitié. *Mésosternum* non prolongé jusqu'à la moitié des hanches intermédiaires. *Postépisternums* presque parallèles, quatre fois aussi longs qu'ils sont larges. *Avant-dernier article des tarses* avancé sous le suivant : celui des postérieurs au moins tronqué. *Ongles* entiers ou munis d'une dent basilaire rudimentaire. *Corps* allongé ou suballongé ; peu ou médiocrement convexe.

A. Elytres d'un bleu vert ou d'un bleu d'acier. Prothorax non sillonné sur la ligne médiane ; noté de fossettes basilaires ne dépassant pas ordinairement le tiers postérieur de sa longueur.

**1. M. caraboides ; LINNÉ.** Noire ou d'un noir bleuâtre, avec les élytres d'un bleu d'acier ou d'un bleu vert : palpes, extrémité des antennes, tarses antérieurs et deux derniers articles des autres tarses d'un flave orangé. Prothorax bissubsinué à la base ; creusé vers chaque quart externe de celle-ci d'une fossette triangulaire avancée jusqu'au tiers postérieur ; déprimé au devant de l'écusson. Celui-ci en triangle obtusément tronqué. Elytres striées : intervalles faiblement relevés ; le dernier subparallèle au bord externe.

*Chrysomela caraboides*, LINN. Faun. suec. p. 175. 574. — *Id.* Syst. Nat. t. 1. p. 602.

116. — DE VILLERS, CAR. LINN. Entom. t. 1. p. 166. 196. pl. 1. fig. 27. — MARTYN, Entom. pl. 17. fig. 58.

*Helops serratus*, FABR. Syst. entom. p. 257. 3. — *Id.* Spec. ins. t. 1, p. 325. 3. — *Id.* Mant. t. 1. p. 215. 4. — *Id.* Entom. syst. t. 1, p. 118. n° 8. — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 45. 6. — PANZ. Faun. germ. 9. 5. — *Id.* Ent. germ. p. 42. 2. — PAYK. Faun. suec. t. 1. p. 94. 1.

*Tenebrio rufibarbis*, SCHALLER, Neue. Insek. in Abhandl. d. hall. Gesell. t. 1, p. 324.

*Pimelia (Helops) serrata*, GMEL. C. LINN. Syst. nat. t. 4 p. 2009. 64.

*Serropalpus caraboides*, ILLIG. Kaef. preus. p. 126. 1. — OLIV. Entom. t. 3. 57 bis. p. 5. 1. pl. 1. fig. 1. — TICNY, Hist. Nat. t. 7. p. 196. pl. fig. 3. — DUMÉRIL, Dict. des sc. nat. t. 49. (1827) p. 13. cahier des pl. 15. (Ornécophiles) pl. 11. fig. 1.

*Dircaca serrata*, FABR. Syst. eleuth. t. 1. p. 163. 1. — PANZ. Krit. Revis. p. 35. — *Id.* Index p. 52. 1. — SCHÖNH. Syn. ins. t. 1. p. 164. 1. — GOLDFUSS, Handb. p. 531. — L. DUFOUR, Excurs. entom. p. 69. 415.

*Melandrya caraboides*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 341. 1. pl. 89. fig. 6. — *Id.* Gen.

- t. 2. p. 194. 1. — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. 20. (1818) p. 42. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 553. 1. — DUFTSCH. Faun. austr. t. 2. p. 260. 1. — LAMARCK, An. s. vert. t. 4. p. 277. 1. — S. FARG. et SERV. Encycl. méth. t. 10. p. 418. 3. — GUÉRIN, Dict. class. d'Hist. nat. t. 10. (1826) p. 517. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 34. 1. — *Id.* Man. p. 329. 2576. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 249. 1. — F. BLANCH. in Regn. anim. de CUVIER, ed. Croch. livr. 205. pl. 53. 1. a, à c, détails. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 606.
- Melandrya serrata*, STURM. Faun. Deutsch. t. 2. p. 272. 1. — GERMAR, Reise. n. Dalmat. p. 192. 65. — PANZ. Index. p. 32. 1.

Long. 0,0112 à 0,0157 (5 à 6 1/2 l.) Larg. 0,0028 à 0,0048 (1 1/4 à 2 1/3 l.)

*Corps* allongé : peu ou médiocrement convexe. *Tête* assez finement ponctuée : garnie ou hérissée de poils obscurs, courts et peu apparents ; marquée d'une fossette sur le milieu du front : noire ou d'un noir bleuâtre : labre et palpes d'un flave roussâtre. *Yeux* d'un noir brun. *Antennes* à peine prolongées au-delà des angles postérieurs du prothorax : pubescentes : noires ou d'un noir bleuâtre, avec la dernière moitié du onzième article, flave. *Prothorax* tronqué ou à peine arqué en avant : élargi en ligne courbe d'avant en arrière : à côtés repliés en dessous et tranchants seulement dans leur seconde moitié ; à peine arqué en arrière et bissubsinué à la base, avec la partie antéscutellaire de celle-ci ordinairement non échancrée : d'un tiers ou de moitié plus large à la base qu'il est long sur son milieu : sans rebord sur les côtés, paraissant légèrement rebordé à la base après les fossettes ; médiocrement convexe en avant, graduellement peu convexe en arrière ; marqué de points petits et très-légèrement râpeux, donnant chacun naissance à un poil noir, couché, assez court, peu apparent ; noir ou d'un noir bleuâtre : creusé, vers chaque quart externe de la base, d'une fossette triangulaire, assez profonde, avancée en s'affaiblissant, jusqu'au quart ou au tiers postérieur de sa longueur, déprimée au devant de l'écusson ou offrant sur ce point de la ligne médiane les traces plus ou moins faibles de l'extrémité d'un sillon peu profond et parfois peu apparent. *Ecusson* en triangle obtusément tronqué, aussi long qu'il est large ; ponctué ; noir ou d'un noir bleuâtre. *Elytres* à peine plus larges en avant que le prothorax à sa base ; quatre fois environ aussi longues que lui ; subarrondies aux épaules ; subsinuément élargies jusqu'aux trois cinquièmes, rétrécies ensuite en ligne un peu courbe ; peu ou médiocrement convexes ; marquées chacune vers le tiers ou les deux cinquièmes de leur longueur d'une dépression plus ou moins sensible, un peu oblique-



ment transversale, plus avancée vers la suture que vers le bord externe; creusées d'une fossette humérale formant la partie antérieure de la cinquième strie; d'un bleu d'acier ou d'un bleu foncé verdâtre et métallique; finement et squammuleusement ponctuées; garnies de poils obscurs, couchés, fins, médiocrement apparents; rayées chacune de dix stries. *Intervalles* sensiblement convexes, plus saillants et plus en arête postérieurement, prolongés presque jusqu'à l'extrémité: le troisième, postérieurement uni au neuvième, en enclosant les quatrième à huitième: le neuvième, naissant au-dessous de l'épaule, presque parallèle au bord externe, dont il est distant du cinquième environ de la largeur des étuis, vers les deux tiers de leur longueur. *Repli* étroit, réduit à une tranche à partir des hanches postérieures. *Dessous du corps* noir; ponctué; un peu râpeux sur les côtés de l'antépectus, pointillé sur le reste; garni de poils obscurs et fins: dernier arceau ventral obtusément tronqué à l'extrémité et échancré dans son milieu. *Pieds* allongés; pubescents; noirs, avec les tarses antérieurs ordinairement d'un roux flave sur leur totalité ou leur presque totalité: les autres, sur leurs deux derniers articles.

Cette espèce paraît commune dans la plus grande partie des provinces de la France. Elle n'est pas bien rare, au printemps, dans les environs de Lyon, sur les vieux troncs des charmes, des chênes et surtout des saules.

Obs. Elle diffère des autres espèces par la couleur de ses élytres; par les fossettes raccourcies de la base de son prothorax; par ce segment ordinairement sans échancrure antéscutellaire, sans sillon sur la ligne médiane, ou n'offrant qu'une fossette à l'extrémité de celle-ci; par la faiblesse et la disposition des nervures.

Elle présente diverses variations sous le rapport de la couleur. Quand la matière colorante a été moins abondante, diverses parties, principalement du dessous du corps, se montrent moins foncées. Les palpes passent au flave testacé. Les pieds se montrent d'un rouge brun ou d'un rouge testacé violâtre, au moins sur les tibias et les tarses. Le ventre affecte quelquefois en partie les mêmes teintes.

Sa larve vit dans les parties mortes ou malades de diverses sortes d'arbres. Je l'ai trouvée dans des saules; mon ami M. Cl. Rey, l'a prise dans le charme et le hêtre. Elle a été très-bien décrite par M. Perris<sup>(1)</sup>.

---

(1) PERRIS, Ann. des sc. nat., 2<sup>e</sup> série, t. 14. (1840) p. 86. pl. 3. A. fig 14, larve; 15, sa grandeur; 16, antenne grossie.



## AA. Elytres noires.

- B. Prothorax profondément sillonné sur la ligne médiane ; à fossettes basilaires avancées jusqu'aux deux cinquièmes antérieurs ; à base non ou à peine entaillée au devant de l'écusson.

**2. M. caniculata** ; FABRICIUS. Noire, avec l'extrémité des antennes et des tarses testacée. Prothorax creusé sur la ligne médiane d'un sillon longitudinal très-prononcé ; marqué de deux fossettes ou sillons naissant près de la base, larges et avancés au moins jusqu'aux deux cinquièmes antérieurs de sa longueur ; à peine subéchancré au devant de l'écusson. Celui-ci plus long que large, arrondi postérieurement. Elytres offrant les intervalles alternes relevés en nervures ou en côtes affaiblies en devant : neuvième intervalle généralement éloigné du bord marginal du tiers de la largeur des étuis vers les deux tiers de leur longueur.

*Tenebrio dubius*, SHCALI. Abhandl. d. hall. Gesellsch. t. 1. p. 326.

*Melops canaliculatus*, FABR. Mant. t. 1. p. 215. 6. — *Id.* Ent. sys. t. 1. p. 119. 10. — OLIV. Ency. méth. t. 7. p. 46. 11. — PANZ. Faun. germ. p. 9. 4. — *Id.* Ent. germ. p. 42. 4. — PAYE. Ins. succ. t. 1. p. 94. 2.

*Pinelia (Melops) canaliculata*, GMEL. C. LINN. Syst. nat. t. 1. p. 2010. 66.

*Serropalpus canaliculatus*, ILLIC. Kaef. prens. p. 127. 2.

*Melandrya canaliculata*, FABR. Syst. El. t. 1. p. 164. 2. — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 342. 2. pl. 83. fig. 8. — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 20. (1818) p. 42. — PANZ. Krit. Revis. p. 35. — *Id.* Index, p. 52. — STUAM. Deutsch. Faun. t. 2. p. 274. 2. — DUFESCH. Faun. austr. t. 2. p. 261. 2. — PANZ. Index, p. 32. — GYLLENH. Ins. succ. t. 2. p. 555. 2. — S. FARG. et A SERV. Ency. méth. t. 10. p. 418. 2. — CURTIS. Brit. entom. t. 4. 135. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 34. 2. — *Id.* Man t. 529. 2577. — SAULS. Ins. fenn. p. 454. 1. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 249. 2. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 606.

Long. 0,0155 à 0,0157 (6 à 7 l.) Larg. 0,0045 (2 l.) à la base des élytres, 0,0036 (2 1/2) dans leur partie la plus large.

Corps allongé ; peu ou très-médiocrement convexe. Tête assez finement ponctuée ; creusée sur le front d'une impression profonde, sublinéaire, tantôt réduite à une fossette brièvement longitudinale, tantôt prolongée jusqu'à la partie postérieure ; garnie de poils bruns ; noire, avec le labre brun ou parfois moins obscur. Palpes maxillaires bruns ou d'un brun testacé. Antennes à peine prolongées au delà des angles postérieurs du prothorax ; pubescentes ; noires, à dernier article testacé ou d'un brun testacé : le troisième ordinairement plus grand que le quatrième. Yeux bruns. Prothorax tronqué en devant ; à angles

antérieurs déclives et très-émoussés ; à côtés repliés en dessous et tranchants seulement dans leur seconde moitié ; élargi d'avant en arrière jusqu'aux deux tiers ou un peu plus, rétréci ensuite un peu en ligne soit presque droite, soit un peu courbe, à angles postérieurs un peu dirigés en arrière et peu vifs ; faiblement arqué, en arrière et bis-subsinué à la base, avec la partie antéscutellaire de celle-ci ordinairement à peine subéchancrée ; d'un tiers environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; sans rebords sur les côtés ; légèrement relevé en rebord à sa base ; peu convexe, surtout en arrière ; creusé sur la ligne médiane d'un sillon longitudinal très-prononcé ; marqué de deux fossettes plus larges et plus profondes, naissant chacune près de la base, vers le cinquième externe de celle-ci, avancée en s'affaiblissant, jusqu'aux deux cinquièmes antérieurs de sa longueur ; noir ; assez finement ponctué ; garni de poils livides, fins, couchés et assez courts. *Ecusson* ordinairement plus long qu'il est large à la base ; subarrondi à son extrémité ; noir ; pointillé ; pubescent. *Elytres* d'un sixième ou d'un cinquième plus larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; près de quatre fois aussi longues que lui ; subgraduellement et plus ou moins élargies après le milieu ou vers les deux tiers, rétrécies ensuite en ligne courbe, obtuses à l'extrémité ; peu convexes ; marquées chacune vers le tiers ou les deux cinquièmes de leur longueur d'une dépression un peu obliquement transversale ; creusées d'une fossette humérale ; noires ; finement et subsquammuleusement ponctué ; garnies de poils couchés, assez fins, nébuleux ou parfois paraissant d'un cendré grisâtre ; chargées chacune de quatre nervures ou faible côtes longitudinales, séparées par des intervalles presque plans ou moins saillants ; ces intervalles affaiblis ou peu sensibles au devant de l'impression transversale, excepté ordinairement les troisième, cinquième et septième : les troisième et neuvième généralement unis à leur partie postérieure, un peu avant l'extrémité des élytres, en embrassant les quatrième à huitième : ce dernier généralement à peine sensible ; le neuvième naissant au dessous de l'épaule, s'éloignant davantage (à partir des trois septièmes de leur longueur) du bord externe, dont il est distant du tiers de leur largeur, vers les deux tiers de leur longueur ; offrant en dehors de ce neuvième intervalle, une autre nervure prolongée depuis la moitié environ de la longueur jusque près de l'extrémité. *Repli* étroit, réduit à une tranche à partir des hanches postérieures. *Dessous du corps* noir ; ponctué sur la poitrine, pointillé sur le ventre ; garni de poils obscurs, fins et couchés. *Pieds* allongés ; noirs, avec les derniers articles des tarses d'un fauve

testacé; quelquefois avec les tibias graduellement d'un brun tirant sur le testacé, vers leur extrémité, et avec les tarses plus clairs.

Cette espèce paraît rare en France. On l'a trouvée dans les environs de Paris et dans quelques localités voisines des Alpes.

Obs. Elle se distingue de la *M. caraboides* par la couleur de ses élytres; par son prothorax marqué sur la ligne médiane d'un sillon très-prononcé; creusé de deux sillons ou fossettes basilaires larges et profondes, avancées jusqu'aux deux cinquièmes ou au tiers antérieur; par son écusson généralement plus long qu'il est large à la base; par la côte des élytres naissant au dessous de l'épaule, ordinairement distante du bord externe du tiers de la largeur des étuis vers le tiers de leur longueur etc.. Elle s'éloigne de la *M. flavicornis*, par son prothorax marqué sur la ligne médiane d'un sillon longitudinal beaucoup plus prononcé; par les fossettes basilaires plus larges; par la base du segment prothoracique à peine ou non échancré dans son milieu; par l'écusson presque parallèle et subarrondi à l'extrémité; par les côtes des étuis plus étroites, plus tranchantes, au moins les alternes; par la direction de la nervure naissant du dessous de l'épaule; par la couleur de ses antennes et ordinairement de ses pieds. Elle diffère enfin des deux autres espèces, par le troisième article de ses antennes ordinairement plus grand que le quatrième. La *M. canaliculata* offre diverses variations: l'écusson est arrondi ou en ogive à sa partie postérieure; les élytres n'ont habituellement que leurs intervalles alternes relevés en forme de côtes et alors les étuis ne sont chargés que de cinq nervures, y comprise la suturale, et d'une sixième nervure naissant en dehors de la cinquième, vers la moitié seulement de la longueur des élytres; d'autres fois les intervalles pairs, à partir de la suture sont plus ou moins sensiblement saillants et semblent former de faibles nervures entre les autres qui sont plus saillantes. La couleur des palpes, des pieds et même parfois des antennes varie un peu suivant le développement de la matière colorante.

M. Godart a reçu sous le nom de *M. canaliculata*, un individu qui semble constituer une espèce distincte (*M. diversa*) par le dessus de son corps d'un noir plus luisant; marqué de points visiblement plus gros; garni de poils noirs apparents; par ses antennes à troisième article moins grand que le quatrième; par son prothorax élargi en ligne presque droite jusqu'aux deux tiers, rétréci ensuite en ligne courbe; à angles postérieurs plus ouverts que l'angle droit; creusé sur la ligne médiane d'un sillon élargi en triangle et plus profond près de

la base ; par cette dernière paraissant munie d'un léger rebord ; par ses fossettes basilaires formées d'une impression triangulaire, courte, attenante à la base, continuée au devant de son angle antérieur où elle est étranglée, par un sillon un peu dirigé vers le bord externe, par ses élytres chargées chacune de neuf côtes ou nervures (outre la nervure externe raccourcie en devant) à peu près égales en largeur et en saillie : les troisième à sixième avancées jusqu'au niveau de l'extrémité postérieure de la fossette humérale : la neuvième presque parallèle sur toute sa longueur, au bord marginal dont elle reste distante seulement d'un cinquième de la largeur des étuis, vers les deux tiers de leur longueur. Cet exemplaire qui sous tous les autres rapports se rapproche plus de la *canaliculata* que des autres espèces, ne serait-il de celle-là qu'une variété anormale ? Ou est-il le représentant d'une espèce particulière ? Il faudrait en voir plusieurs individus semblables pour résoudre la question dans ce sens.

BB. Prothorax faiblement sillonné sur la ligne médiane ; à fossettes basilaires avancées jusqu'à la moitié de sa longueur : base entaillée d'une manière très-marquée au devant de l'écusson.

3. *M. flavicornis*; DUFTSCHMIDT. Noire, avec les parties de la bouche, les antennes et les pieds d'un roux ferrugineux ou orangé. Prothorax trissinué à la base ; creusé vers chaque cinquième externe d'un sillon longitudinal avancé jusqu'à la moitié de la longueur de ce segment, légèrement sillonné sur la ligne médiane. Ecusson en triangle obtusément tronqué. Elytres chargées chacune de cinq côtes obtusément arrondies, séparées par des stries sulciformes profondes : les unes et les autres raccourcies en devant.

*Melandrya barbata*, STURM, Deutsch. Faun. t. 2. (1807) p. 275. 3. pl. 52. A et a, Insecte ; b à o, détails. — PANZ. Faun. germ. 105. 5. — *Id.* Index, p. 32. 3.

*Melandrya flavicornis*, DUFTSCH. Faun. austr. t. 2. p. 262. 3. — L. REDTENB. Faun. aust. p. 606.

*Melandrya rufipes*, CHEVROLAT, in GUÉRIN, Iconogr. du Regn. anim. de Cuvier, p. 126. pl. 33. fig. 2.

Long. 0,0090 à 0,0100 (4 à 4 1/2 l.) Larg. 0,0036 (1 2/3 l.)

Corps allongé ; peu ou médiocrement convexe. Tête finement ponctué, garnie de poils obscurs, courts et peu apparents ; notée d'une fossette sur le milieu du front ; noire ou d'un noir bleuâtre ; épistome, parties de la bouche, moins l'extrémité des mandibules et palpes, d'un



roux orangé. Yeux noirs ou bruns. Antennes à peine prolongés au-delà des angles postérieurs du prothorax; pubescentes; d'un roux ferrugineux ou d'un roux orangé; à deuxième article court; le troisième ordinairement un peu moins grand que le quatrième. Prothorax tronqué en avant; élargi en ligne courbe d'avant en arrière; à côtés repliés en dessous et tranchants seulement dans leur moitié postérieure; faiblement arqué en arrière, bispinué à la base, et échancré au devant de l'écusson; à angles postérieurs vifs et un peu courbés en arrière; de deux tiers plus large à la base qu'il est long sur son milieu; médiocrement convexe en avant, graduellement peu convexe en arrière; finement et subaspèremment ponctué; noir ou d'un noir bleuâtre; garni de poils obscurs, couchés, peu épais; rayé vers chaque quart du cinquième externe de la base d'un sillon longitudinal affaibli d'arrière en avant, avancé jusqu'à la moitié de la longueur du segment; marqué sur sa ligne médiane d'un sillon léger affaibli ou obsolète à ses extrémités. Ecusson en triangle un peu plus large qu'il est long; obtusément tronqué à son extrémité; noir; ponctué. Elytres à peine plus larges en avant que le prothorax à sa base; quatre fois environ aussi longues que lui; émoussées ou subarrondies aux épaules; plus ou moins faiblement élargies jusqu'aux trois cinquièmes, rétrécies ensuite, obtusément arrondies (prises ensemble) à l'extrémité; médiocrement convexes; noires, ponctuées et garnies de poils comme le prothorax; rayées chacune de stries sinueuses profondes. Intervalles en forme de côtes beaucoup plus larges que les stries, obtuses ou obtusément arrondies, naissant vers le sixième ou le cinquième de la longueur des étuis, prolongées presque jusqu'à l'extrémité: les deuxième et troisième réunies postérieurement: la cinquième ou juxta-marginale, subparallèle au bord externe, dont elle est à peine distante du quart de la largeur, vers les deux tiers de sa longueur. Repli étroit, réduit à peu près à une tranche à partir des hanches postérieures. Dessous du corps noir; ponctué et garni de poils à peu près comme le dessus. Pieds pubescents, généralement d'un roux ferrugineux ou orangé.

Cette espèce, plus particulière à l'Autriche, a été prise par M. Rolland fils dans les environs de Tours, et trouvée par divers naturalistes dans quelques autres lieux de la France centrale.

Obs. Elle a été décrite pour la première fois par Sturm, qui la considérait comme étant la *Dicaea barbata* de Fabricius: Duftschmidt quelques années plus tard signala cette erreur et lui donna le nom qu'elle porte aujourd'hui. Elle se distingue des deux autres espèces, par la couleur de ses antennes et de ses pieds; par son prothorax en



taillé à la base, au devant de l'écusson ; de la *M. caraboides*, par la couleur de ses élytres, par la longueur de ses fossettes prothoraciques ; de la *M. canaliculata*, par son prothorax légèrement sillonné sur la ligne médiane, marqué de fossettes plus étroites, plus profondes, paraissant rayées d'une ligne enfoncée ; par la largeur, la convexité et la disposition des côtes des élytres.

La *Melandrya Goryi*, de CASTELNAU, décrite par ce naturaliste dans son Hist. nat. des ins. t. 2. p. 219, dont j'ai vu un exemplaire dans la belle collection de M. Chevrolat, n'est évidemment qu'une variété de la *M. flavicornis*, ayant les antennes et les pieds bruns, avec l'extrémité des premières et les derniers articles des tarses, testacés ou d'un fauve testacé. Elle offre d'ailleurs tous les autres caractères spécifiques de la *flavicornis*.

## CINQUIÈME FAMILLE.

### MYCÉTOMIENS.

CARACTÈRES. *Ongles* simples ou munis seulement d'une dent rudimentaire à la base de chacune de leurs branches. *Antennes* subfiliformes ; de onze articles. *Tête* penchée, en majeure partie visible en dessus. *Yeux* échancrés. *Prothorax* marqué de deux fossettes anté-basilaires. *Hanches* de devant séparées par un prosternum aussi saillant qu'elles.

Ces insectes se réduisent au genre suivant :

Genre *Mycetoma*, MYCETOME ; (Dejean).

(μύκητες-θύς, champignon).

CARACTÈRES. *Antennes* insérées vers la partie interne antérieure des yeux ; médiocres : de onze articles : le deuxième court : les troisième à dixième presque égaux : le onzième, appendicé ou rétréci à l'extrémité. *Tête* en majeure partie visible en dessus. *Palpes maxillaires* à dernier article presque en cône un peu tronqué. *Yeux* échancrés. *Prothorax* presque en ovale transverse ; rétréci postérieurement ; noté de deux fossettes anté-basilaires punctiformes.

1. *M. suturale* ; PANZER. Oblong ; peu convexe ; peu garni de poils courts et presque indistincts ; d'un roux testacé, souvent nébuleux sur la

tête et sur le prothorax, plus clair à la base des élytres et le long de leur suture jusqu'aux quatre cinquièmes : celles-ci, à neuf rangées striales de points peu régulières ou à légères stries assez grossièrement ponctuées, peu distinctes à l'extrémité ; ou brunes à partir de la deuxième strie jusque près du bord externe, depuis le huitième de leur longueur jusqu'à l'extrémité. Prothorax marqué de deux fossettes ponctiformes.

*Dryops suturalis*, PANZER, Faun. Germ. 45.

*Ssiropalpus suturalis*, PANZER, Krit. Revis. t. 1. p. 93.

*Dircaea suturalis*, PANZER, Index p. 145. 3.

*Mycetomu suturale*, (ZIEGLER) (DEJEAN) Catal. (1833) p. 201. — *Id.* (1837) p. 223. —

L. DUFOUR, Excurs. Entom. p. 67. 414.

Long. 0,0067 à 0,0072 (3 à 3 1/4) Larg. 0,0028 (1 1/4 l.)

Corps oblong ou suballongé; pen convexe. Tête très-penchée ou subperpendiculaire; finement ponctuée; ordinairement marquée d'une petite fossette sur le milieu du front; presque glabre ou peu garnie de poils à peine distincts; d'un roux testacé ou d'un flave roussâtre nébuleux. Yeux bruns; échancrés. Antennes prolongées environ jusqu'au quart des élytres; les premier et deuxième articles, d'un roux testacé: les autres, gris ou d'un gris roussâtre: le deuxième, court: les troisième à dixième, presque en forme de coupe: le onzième, oblong, rétréci dans sa seconde moitié. Prothorax un peu plus large en devant que la tête; tronqué à son bord antérieur; arqué sur ses côtés et brièvement subsinué au devant des angles postérieurs; en ligne presque droite, faiblement bisinuée ou trissinuée à la base; offrant à peine à celle-ci les traces d'un rebord; sans rebord sur les côtés; plus sensiblement tranchant sur le dernier tiers de ses bords latéraux; une fois environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu; médiocrement convexe en devant, avec les angles antérieurs déclives, graduellement à peu près plan à son bord postérieur; finement ponctué; à peine garni de poils courts et peu distincts, d'un flave roussâtre ou d'un roux testacé nébuleux; marqué de deux fossettes ponctiformes ou gros points enfoncés, situés, un peu au devant de la base, vers chaque cinquième ou presque au quart externe de celle-ci; noté ordinairement de deux fossettes moins prononcées, situées, un peu après le bord antérieur, dans la même direction longitudinale que les points basilaires. Ecusson presque en demi-cercle; pointillé; d'un roux testacé. Elytres d'un cinquième environ plus larges en devant que le prothorax à sa base; quatre à

cinq fois aussi longues que lui; émoussées aux épaules; subparallèles jusqu'aux deux tiers, rétrécies ensuite en ligne courbe, obtusément arrondies à l'extrémité; rebordées; médiocrement convexes, presque planes sur le dos; marquées d'une fossette humérale; à peine garnies de poils courts et peu distincts; à neuf stries légères, ou à neuf rangées striales et peu régulières de points, constituant plus visiblement des stries légères sur la moitié interne de chacune que sur l'externe: ces rangées non prolongées jusqu'à l'extrémité qui est irrégulièrement ponctuée; intervalles impondués; d'un flave roussâtre à la base et le long de la suture jusqu'aux quatre cinquièmes de celle-ci, jusqu'à la deuxième strie de chacune; parfois de même couleur sur le bord externe sur une largeur variable, nébuleuses, brunâtres, brunes ou d'un brun noir sur le reste. *Repli* prolongé, en se rétrécissant, jusqu'au quatrième arceau ventral, réduit à une tranche, postérieurement. *Dessous du corps* d'un flave roussâtre ou d'un roux flave; pointillé; garni de poils livides, très-courts, fins, peu apparents. *Hanches antérieures et intermédiaires* séparées par le sternum. *Postépisternums* rétrécis d'avant en arrière, terminés en pointe. *Pieds* d'un flave testacé ou d'un flave roussâtre. *Premier article des tarsi postérieurs* un peu plus long que les deux suivants réunis.

Cette espèce vit dans les bolets attachés aux troncs des sapins. Elle a été prise dans les forêts du Mont-d'Or par mon ami M. Cl. Rey.

## SIXIÈME FAMILLE.

### CONOPALPIENS.

**CARACTÈRES.** *Ongles* simples, ou munis seulement d'une dent rudimentaire à la base de chacune de leurs hanches. *Antennes* filiformes: de dix articles seulement. *Dernier article des palpes maxillaires* allongé, conique. *Yeux* fortement échancrés. *Elytres* un peu flexibles. *Corps* subparallèle.

Cette branche est réduite au genre suivant:

Genre *Conopalpus*, CONOPALPE; Gyllenhal (1).

(*Conus*, cone; *palpus*, palpe.)

**CARACTÈRES.** *Antennes* insérées dans l'échancrure des yeux; assez longues; assez grêles; de dix articles: le deuxième, court: le

---

(1) GYLLENH. Insect., avec t. 2, p. 317,

troisième, un peu plus long que le suivant : les quatrième à dixième, une fois environ plus longs que larges ; subdentés au côté interne. *Tête* petite ; inclinée ; en partie visible quand l'insecte est examiné en dessus. *Mandibules* courtes ; épaisses. *Palpes maxillaires* allongées ; à dernier article long, en cône comprimé. *Palpes labiaux* à dernier article sécuriforme ou en coute. *Prothorax* presque en ovale transversal, tronqué en devant ; à angles antérieurs déclives. *Elytres* subparallèles. *Pieds* médiocres. *Eperons* courts. *Tarses* à avant-dernier article avancé sous le suivant, presque bilobé.

**1. C. testaceus** ; OLIVIER. Suballongé ; médiocrement convexe ; finement ponctué ; pubescent ; d'un roux de nuance plus claire sur le prothorax que sur les élytres ; front et ventre bruns : bord postérieur des arceaux celui-ci, flaves. Extrémités des mandibules, yeux, et sept derniers articles des antennes, noirs.

*Melyris testaceus*, OLIV. Encycl méth. t. 7. p. 657. 15. — *Id.* Entom. t. 1, 2, 21. 11 15. pl. 3. fig. 15, a, b.

*Cenopalpus flavicollis*, GYLLENH. Ins. succ. t. 1. p. 547. 1. — SCHONH. Syn. ins. t. 3, p. 52 1. — SAINT-FARGEAU ET AND. SERV. Encycl. méth. t. 10. p. 418, 1. — GUZAIN Iconogr. du Règn. anim. de Cuv. p. 127. pl. 33. fig. 4. et 4, a, à 4, d, détails. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 603.

*Zonitis testacea*, CURTIS, Brit. entomol. t. 3. pl. 112.

*Cenopalpus testaceus*, STEPH. Illustr. t. 5 p. 60. 1. — *Id.* Man. p. 338. 2649.

*Cenopalpus ruficollis*, NEWM. Entomol. Magaz. 1. 185.

Long. 0,0061 à 0,0070 (2  $\frac{3}{4}$  à 3  $\frac{1}{3}$  l.) Larg. 0,0020 à 0,0028 (8/9 à 1 l.)

Corps suballongé ; médiocrement convexe ; marqué de points petits et légers sur la tête et surtout sur le prothorax, moins fins sur les élytres ; garni de poils couchés ou presque couchés, très-apparents, de la couleur des diverses parties du corps. *Tête* noire, brune ou brunâtre sur le front, passant graduellement au roux fauve, au roux et au roux testacé : extrémité des mandibules, noire. *Palpes* d'un roux flave. *Yeux* noirs ; très-échancrés, réniformes. *Antennes* prolongées au moins jusqu'à la moitié des élytres ; pubescentes ; noires, avec les trois premiers articles d'un flave ou d'un jaune orangé. *Prothorax* tronqué ou un peu arqué en devant ; incliné et arrondi aux angles antérieurs, jusqu'au tiers de leur longueur, subparallèle ensuite : paraissant, par l'effet de cette déclivité, presque en demi-cercle une fois plus large à la base que long sur son milieu ; à peine rebordé, mais relevé en rebord sur les côtés ; moins étroitement relevé



à la base; tronqué à celle-ci, avec une faible sinuosité vers chaque quart externe; graduellement moins convexe en arrière qu'en avant; légèrement et finement ponctué; marqué d'un point enfoncé ou d'une légère fossette au devant de chacune des faibles sinuosités basilaires, rendant celles-ci plus apparentes; d'un roux flave ou d'un roux jaunâtre. *Ecusson* de même couleur; en triangle presque équilatéral. *Elytres* faiblement et graduellement élargies jusqu'aux deux tiers, obtusement arrondies postérieurement; émoussées ou subarrondies chacune à l'angle sutural; médiocrement convexes; mi-flexibles; moins finement et moins superficiellement ponctuées que le prothorax, paraissant légèrement ruguleuses à certain jour, entièrement d'un roux testacé ou d'un roux fauve. *Dessous du corps* pointillé; plus brièvement pubescent; d'un roux jaune sur la poitrine, avec le postpectus nébuleux ou obscur de chaque côté de la ligne médiane, d'un brun généralement plus obscur d'avant en arrière sur le ventre, avec le bord des arceaux, flave. *Mésosternum* prolongé environ jusqu'à la moitié des hanches. *Pieds* d'un jaune roux.

Cette espèce paraît rare en France. Elle a été prise dans les environs de Paris par plusieurs entomologistes; dans ceux de Tours par M. Blaive; dans divers autres lieux par quelques autres naturalistes. Elle est crépusculaire ou nocturne.

**2. *C. Vigorsii* ; STEPHENS.** *Suballongé ; subpubescent ; finement et ruguleusement ponctué. Bouche, base des antennes, prothorax et pieds, d'un flave orangé. Elytres d'un bleu luisant. Dessous du corps noir.*

*Conopalpus collaris*, (DEJ.) Catal, (1821) p. 70. — *Id.* (1833) p. 202. — *Id.* (1837) p. 223,

*Hellenia Vigorsii*, (MAC-LEAY) Mss.

*Conopalpus Vigorsii*, STEPH. Illustr. t. 5. p. 60. 2. pl. 25. fig. 1. — *Id.* Man. p. 358-2650.

Long. 0,0043 à 0,0067 (2 à 3 l.) Larg. 0,0016 à 0,0025 (2/3 à 1 1/8 l.)

*Corps* suballongé; médiocrement convexe; finement ponctué et d'une manière légèrement ruguleuse, avec les intervalles presque squammi-formes; garni de poils fins, soyeux, couchés, peu ou médiocrement épais. *Tête* noire. *Partie de la bouche et palpes* d'un jaune pâle, d'un jaune ou d'un flave roussâtre ou tirant sur l'orangé; extrémité des mandibules noire. *Antennes* prolongées au moins jusqu'au tiers des élytres; pubescentes; noires ou d'un noir brun, avec les trois premiers articles



au moins d'un jaune ou flave roussâtre ou orangé. *Prothorax* d'un jaune ou flave roussâtre. *Ecusson* et *élytres* d'un bleu noir ou d'un noir bleu : celles-ci, munies d'un rebord graduellement nul ; médiocrement convexe ; marquées de points moins fins que ceux du *prothorax*. *Dessous du corps* noir : antépectus et pieds d'un jaune pâle, d'un jaune ou flave roussâtre ou tirant sur l'orangé. *Mésosternum* prolongé jusqu'aux deux tiers au moins des hanches postérieures.

Cette espèce est généralement rare en France. Elle a été prise dans les environs de Lyon par M. Guillebeau ; près le Mans par M. de Marseul.

**OBS.** La couleur jaune varie du jaune pâle au jaune ou flave roussâtre ou flave orangé ou au jaune testacé. Le *prothorax* est généralement plus ou moins pâle ou plus roux que les autres parties.

Les antennes, dans l'état normal, sont noires, avec les trois premiers articles d'un flave roussâtre ; mais quand la matière colorante a fait défaut, la couleur jaune prend plus de développement, et le troisième article et quelquefois même presque tous, moins les huitième et neuvième sont d'un flave plus ou moins brunâtre.

## SEPTIÈME FAMILLE.

### OSPHYENS.

**CARACTÈRES.** *Ongles* offrant chacune de leurs branches terminées par deux ou trois dents. *Antennes* grêles ; subfiliformes ; de onze articles. *Tête* en partie visible en dessus. *Yeux* assez profondément échancrés. *Prothorax* presque en ovale transversal ; sans fossettes basilaires. *Hanches de devant* contiguës. *Mésosternum* prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité des hanches ; parallèle dans sa moitié postérieure. *Avant-dernier article des tarsi* avancé sous le suivant, élargi d'arrière en avant, échancré à l'extrémité.

Cette branche ne comprend que le genre suivant :

Genre *Osphya*, OSPHYE ; Illiger (1).

(ὀσφύα, reins, parcequ'ils ont les yeux réniformes.)

**CARACTÈRES.** *Antennes* insérées dans l'échancrure des yeux ; subfiliformes ; grêles ; assez longues ; de onze articles : le deuxième, court :

---

(1) ILLIG. Magaz. t, 6. p. 370 note, dernière ligne.

le troisième le plus grand. *Tête* ordinairement inclinée ; non enfoncée dans le prothorax jusqu'aux yeux, à partie postérieure ou moins visible, quand l'insecte est examiné en dessus ; rétrécie et un peu avancée au devant des yeux. *Mandibules* bifides à l'extrémité. *Mâchoires* submembraneuses ; assez courtes : à deux lobes. *Palpes maxillaires* allongés ; à deuxième article grossissant un peu de la base à l'extrémité, trois fois aussi long que le suivant : le troisième court, de moitié moins large en devant que la base du quatrième : celui-ci, comprimé, cultriforme, une fois et quart plus long qu'il est large à la base. *Palpes labiaux* à dernier article cultriforme, comprimé, allongé, anguleusement prolongé en arrière. *Ecusson* apparent. *Elytres* flexibles. *Pieds* assez allongés.

Illiger, dans le t. 1 de son *Magazin* (1801), p. 380, remarqua que l'insecte de ce genre colloqué par Fabricius avec les *Cantharis*, de cet auteur, devait en être séparé. Dans le t. 6, dudit *magasin* (1807), p. 300, il proposa d'en faire une coupe particulière sous le nom de *Pelecina*, dénomination déjà employée en entomologie, et qu'il changea en celle d'*Osphya*, dans un errata placé à la fin du même ouvrage. Olivier qui ignorait probablement le travail du naturaliste prussien, créait, dans le t. 8 de la partie entomologique de l'encyclopédie méthodique, la même coupe sous le nom de *Nothus*, indiqué par Ziegler.

**1. *O. bipunctata* ; FABRICIUS.** Allongé ; peu convexe ; pubescent. *Prothorax* en ovale transversal, relevé en rebord ; rarement d'un rouge de brique pâle, ordinairement marqué de deux taches ponctiformes noires, ou noir orné d'une bordure périphérique et souvent d'une ligne médiane d'un rouge pâle. *Elytres* le plus souvent d'un noir gris, ou d'un rouge de brique, parfois avec l'extrémité noire. *Bouche*, trois premiers articles des antennes et base au moins des cuisses, d'un rouge de brique pâle.

ETAT NORMAL. ♂. *Prothorax* d'un noir gris, orné d'une bordure périphérique et d'une ligne longitudinale médiane de largeur variable, d'un rouge de brique. *Elytres* entièrement d'un noir gris. *Cuisses postérieures* plus ou moins renflées.

Obs. Quelquefois la ligne médiane, d'un rouge de brique, du prothorax est envahie par la partie noire, et ce segment est alors d'un noir gris, avec une bordure périphérique d'un rouge pâle.

Les élytres sont parfois d'un rouge de brique sur leur bord externe.

*Dryops? bipunctata*, SCHONH. Syn. Insect. t. 3. append. p. 9. 8.

Les cuisses postérieures, dont le renflement varie, sont quelquefois simples comme chez la ♀.

*Nothus anceps*, STEPH. Man. p. 539. 2648.

♀. *Prothorax* d'un rouge de brique, orné sur le disque, de chaque côté de la ligne médiane, d'une tache ponctiforme noire, de grandeur variable. *Elytres* d'un rouge de brique. *Cuisses postérieures* simples.

Les taches du prothorax parfois réduites chacune à une sorte de point, montrent souvent un plus grand développement, sans en acquérir jamais autant que chez le ♂, plus rarement, elles disparaissent.

Les élytres ordinairement d'un rouge de brique, ou avec l'extrémité noire, sont rarement d'un rouge pâle ou de brique avec le bord externe noirâtre. Les cuisses sont toujours simples.

*Cantharis bipunctata*, FABR. Syst. Entom. p. 206. 8. (♀) — *Id.* Spec. Ins. t. 1. p. 260.

14. (♀) — *Id.* Mant. Ins. t. 1. p. 168. 16. (♀) — *Id.* Entom. Syst. t. 1. 1. p.

218. 21. (♀) — *Id.* Eleuth. t. 1. p. 300. 53. (♀) — GMEL. C. LINN. Syst. nat. t.

1. p. 1894. 53. — (♀) — DE VILLERS, C. LINN. Entom. t. 1. p. 297. 26. pl. 1.

fig. 36. et t. 4. (♀) 321. 26. (♀) — PANZ. Entom. germ. p. 90. 12. (♀) — ILLIG.

Mag. t. 1. p. 380. 33. (♀) — SCHONH. Syn. ins. t. 2. p. 69. 48. (♀).

*Telephorus bipunctatus*, OLIV. Entomol. t. 2. n° 26. p. 15. 16. 'pl. 3. fig. 16, a, b, (♀).

*Pelecina bipunctata*, ILLIG. Mag. t. 6. p. 300. n° 300. 55. et p. 535.

*Osphyra bipunctata*, ILLIG. Mag. t. 6. p. 370, note.

*Nothus clavipes*, OLIV. Encycl. méth. t. 8. p. 385. 1. (♂) — LAMARCK, Anim. S. vert.

t. 4. p. 374. 1. (♂) — DE CASTEL. Hist. nat. t. 2. p. 255. 1. (♂).

*Nothus bipunctatus*, OLIV. Encycl. méth. t. 8. p. 385. 3. (♂) — CURTIS, Brit. Entom.

t. 12. n° 28. fig. (♂♀). — STEPH. Man. p. 538. 2647. (♂♀).

*Nothur praeustus*, OLIV. Encycl. méth. t. 8. p. 385. 2. (♀) — LAMARCK, Anim. S.

vert. t. 4. p. 374. 2. (♀) — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 255. 2. (♀). — BANKS

et MATZ, in Entomol. Zeitung. v. Stettin, t. 2. (1841), p. 162 (♂♀).

*Zonitis clavipes*, MEGERLE. Catal. Ins. Vienn.

*Dryops? clavipes*, SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 8. 5. (♂♀) et append. p. 7. 7.

*Dryops? bipunctata*, SCHONH. Syn. Ins. t. 3. p. 8. 4. et appendix, p. 8. 8. (♂ Var ?)

*Nothus bimaculatus*, STEPH. Illustr. t. 5. p. 59. 1. pl. 25. fig. 2 (♀). et 3. (♂).

*Osphyra praeusta*, L. REDTENB. Faun. austr. p. 621. (♂♀).

Long. 0,0036 à 0,0142 (2 1/2 à 5 l.) Larg. 0,0015 à 0,0026 (2/3 à 1 1/5 l.)

*Corps* allongé; peu convexe; garni en dessus de poils couchés, un peu soyeux, peu fins, médiocrement épais, de la couleur des diverses parties du fond. *Tête* penchée; pointillée; pubescente; ordinairement d'un noir cendré sur sa moitié postérieure, d'un rouge pâle ou de chair sur l'antérieure (♂), ou d'un rouge de brique, ornée sur sa seconde moitié d'une tache noire contiguë au côté interne des yeux, après l'échancrure, et postérieurement convergeante avec sa pareille. *Palpes maxillaires* d'un rouge testacé, souvent avec le dernier article ou partie de cet article d'un noir gris ou noir cendré, principalement chez le ♂. *Yeux* noirs; profondément échancrés. *Antennes* au moins aussi longuement prolongées que la moitié des élytres; filiformes; à premier article renflé: le deuxième, de moitié plus court; les suivants très-grêles: le troisième, trois à quatre fois aussi long que le deuxième, quatre ou cinq fois aussi long qu'il est large, un peu plus grand que le quatrième: les suivants, jusqu'au dixième, graduellement un peu moins longs; ordinairement d'un noir gris, avec les trois articles basilaires d'un rouge pâle; souvent bruns ou brunâtres, à l'exception des trois articles précédents; rarement à base obscure. *Prothorax* presque en ovale transversal; arqué en devant, avec les angles antérieurs arrondis; arqué sur les côtés, offrant vers le milieu de ceux-ci ou un peu après sa plus grande largeur; tronqué à la base, avec les angles postérieurs subarrondis; plus ou moins sensiblement relevé en gouttière sur les côtés; d'un tiers au moins plus large dans son diamètre transversal le plus grand, qu'il est long sur son milieu; médiocrement convexe; pointillé; pubescent; peint ou coloré comme il a été dit. *Ecusson* en triangle subéquilatéral; pubescent; pointillé; de la couleur des étuis. *Elytres* un peu plus larges en devant que le prothorax à sa base; un peu moins larges que lui dans son diamètre transversal le plus grand; quatre à cinq fois aussi longues que ce dernier; inclinées en dehors des épaules, avec le bord externe graduellement visible; subparallèles jusqu'aux six septièmes (♂) ou faiblement élargies vers la moitié de leur longueur (♀), arrondies chacune à l'extrémité, plus brièvement près de la suture que du côté externe; très-médiocrement convexes (♂) ou presque planes sur le dos (♀); ponctuées d'une manière graduellement plus fine depuis la base jusque vers l'extrémité; notées d'une légère fossette humérale; pubescentes; colorées comme il a été dit. *Repli* très-étroit; presque nul. *Dessous*



*du corps* finement ponctué; pubescent; ordinairement noir ou noir gris, avec les côtés de l'antépectus d'un pâle rouge de brique, et l'extrémité ou la majeure partie du dernier arceau du ventre d'un rouge testacé (♂), habituellement noir ou d'un noir gris, avec les côtés ou la totalité de l'antépectus et la majeure partie au moins du dernier arceau ventral, d'un pâle rouge de brique; quelquefois avec le ventre de cette dernière couleur, paré de chaque côté de la ligne médiane, sur les quatre premiers arceaux du ventre, d'une rangée de taches noires ou noirâtres et graduellement moins larges d'avant en arrière; d'autres fois avec le postpectus et une tache ponctiforme à la base des quatre premières branches, noirs, et tout le reste d'un pâle rouge de brique (♂). *Pieds* ordinairement d'un rouge de brique pâle ou couleur de chair, avec l'extrémité des quatre cuisses antérieures, moins brièvement celle des postérieures, rarement la presque totalité de celles-ci, l'arête au moins des jambes, presque en totalité sur les premières, un peu moins sur les intermédiaires et à moitié sur les postérieures, et tarses, noirâtres ou d'un noir gris (♂); ou d'un rouge pâle de brique avec les genoux des pieds intermédiaires, l'extrémité des cuisses postérieures et l'extrémité des jambes de derrière, noirs ou noirâtres: tibias postérieurs habituellement munis à l'extrémité d'une dent à leur côté interne (♂). *Avant-dernier article des tarsi* un peu élargi d'arrière en avant, presque carré, échancré à l'extrémité: premier article des tarsi postérieurs aussi long ou à peu près que tous les suivants réunis. *Ongles* offrant chacune de leurs branches épaisses; terminés ordinairement par trois dents, dont la médiaire plus longue: l'externe, parfois nulle.

Cette espèce paraît rare en France. Elle a été prise près de Villebois (Ain) par M. Guillebeau; en Alsace, par M. D'Aumont; dans quelques autres parties de la France orientale, par quelques autres entomologistes; dans le midi, par de Villers.

On doit à MM. Base et Matz d'avoir indiqué les principales variétés de cette osphyne, et d'avoir montré qu'elles se rattachent à une même espèce.



## TRIBU

DES

## LONGIPÈDES.

CARACTÈRES. *Tête* non prolongée en devant en forme de museau ; inclinée ou perpendiculaire ; accolée contre le prothorax, c'est-à-dire ni engagée dans ce segment, ni séparée de lui par un nodule ou sorte de cou visible. *Antennes* insérées à découvert ; courtes ou médiocres ; soit grossissant vers le sommet, soit filiformes, simples, dentées ou flabellées. *Palpes maxillaires* allongés. *Prothorax* ordinairement élargi d'avant en arrière ; généralement aussi large à sa base que les élytres à leur partie antérieure ; souvent bissinué ou bissubsinué à son bord postérieur. *Hanches antérieures* allongées ; non séparées par un prosternum aussi saillant qu'elles. *Hanches postérieures* dirigées en sens transverse. *Pieds* ordinairement allongés, surtout les postérieurs. *Târses antérieurs et intermédiaires* de cinq articles : les postérieurs de quatre. *Ongles* soit simples ou munis seulement à la base de chacune de leurs branches d'une dent rudimentaire ; soit dentés ou pectinés ; soit offrant chacune de leurs branches bifide ou longitudinalement divisée.

Outre le caractère facile à saisir d'avoir la tête accolée contre le prothorax, ces insectes ont le plus souvent les pieds postérieurs au moins allongés, de là le nom de *Longipèdes* appliqué aux Hétéromères de cette Tribu.

### ÉTUDE DES PARTIES EXTÉRIEURES DU CORPS.

La *tête*, toujours perpendiculaire ou inclinée, varie entre les formes subarrondie, ovoïde et allongée. En général elle a le front peu

convexe. Son sommet, souvent au niveau du bord antérieur du prothorax, s'élève d'autres fois au-dessus de ce dernier, comme les *Scrapties* et la plupart des *Rhipiphorides* en offrent l'exemple.

Le *labre*, toujours distinct, souvent parallélogrammique, se montre d'autres fois plus long que large, comme chez les *Rhipiphores*, ou bilobé, comme chez les *Myodites*.

Les *mandibules*, cornées, sont tantôt courtes et peu apparentes dans l'état de repos, tantôt allongées et saillantes, comme on le voit chez la plupart des espèces du second groupe. Souvent armées d'une dent à leur bord interne, elles sont d'autres fois munies à ce dernier d'une expansion presque membraneuse, comme on le voit chez les *Mordelles*.

Les *mâchoires* n'offrent pas des variations moins nombreuses ou moins singulières. Quelquefois elles sont réduites à un seul lobe, l'interne s'étant atrophié comme les *Myodites* en fournissent la preuve. Ordinairement elles en ont deux, soit libres entre eux comme chez les *Mordellides*, soit unis à leur base, comme chez les *Rhipiphorides*. Ces lobes, membraneux chez le plus grand nombre, se rapprochent d'autres fois de la nature de la corne; ils offrent des configurations diverses: l'externe, chez les *Rhipiphorides*, plus singulier ou plus anormal que dans les autres genres, se développe en une sorte de prolongement linéaire, membraneux et cilié à sa base et à peu près corné à son extrémité, dépassant les autres organes buccaux.

Les *palpes maxillaires* sont composés de quatre articles, généralement allongés et de formes variables: le dernier, ordinairement le plus caractéristique, a la figure d'une hache, d'un couteau ou d'un triangle, chez nos *Longipèdes* du premier groupe; chez ceux du deuxième, il s'éloigne toujours de cette configuration et souvent se montre presque filiforme.

Le *menton*, généralement peu apparent, en raison de l'inflexion de la tête, se rapproche le plus souvent du carré, variable dans les proportions de ses côtés.

La *languette*, membraneuse, est habituellement bilobée.

Les *palpes labiaux*, ordinairement courts, souvent cachés ou peu apparents, sont composés de trois articles.

Les *joues* ont en général un développement peu remarquable; souvent cependant elles entament les yeux d'une manière assez sensible.

L'*épistome*, parfois distinct du front, comme chez les *Anaspes*, s'unit souvent à lui d'une manière plus ou moins intime.

Les yeux, situés sur les côtés de la tête, sont tantôt ovales et entiers, tantôt échancrés ou même profondément réniformes. Chez les uns, ils sont séparés du bord postérieur de la tête par un espace plus ou moins notable ; chez les autres, comme la plupart des Mordellides en offrent l'exemple, ils sont accolés contre la partie antérieure du prothorax.

Les antennes, toujours insérées à découvert, varient dans leur position. Chez les Mordelles, elles naissent près du bord antéro-interne des yeux ; chez les Ptilophores, vers la partie antéro-interne de l'échancre des yeux ; chez les Anaspes et les Scapties, dans cette échancre même ; chez les Rhipiphores, vers le milieu du bord interne de ces mêmes organes ; chez les Myodites, vers le sommet de la tête. Le plus souvent de onze articles, avec le dernier quelquefois appendicé ou comme composé de deux articles soudés, elles varient d'autres fois dans le nombre de ces pièces, parfois jusque dans la même espèce. Dans peu de Tribus elles offrent autant de diversités, soit sous le rapport des proportions de leurs articles, soit sous celui de leur configuration. Presque filiformes chez les Scapties, elles vont généralement en grossissant vers leur extrémité chez les Anaspes. Simples ou à peu près chez quelques Mordellides, elles sont dentées en scie chez les autres. Chez la plupart des femelles des Rhipiphorides, elles affectent une structure analogue ; mais chez les mâles elles se transforment en peignes ou en éventails, ou même la plupart de leurs articles présentent deux prolongements, qui les font ressembler à des sortes de plumes ou de panaches.

Le prothorax, ordinairement plus large que long, se montre d'autres fois plus développé sur la ligne médiane qu'il est large à la base ; rarement presque parallèle, habituellement il va s'élargissant d'avant en arrière, soit plus ou moins en ligne courbe, d'autres fois d'une manière sinuée ; en général, il est postérieurement aussi large que les élytres ; chez les Ptilophores, il couvre un peu incomplètement leurs angles huméraux. Quelquefois à peine légèrement bisinué à son bord postérieur, comme les Anaspes et les Scapties en fournissent l'exemple ; d'autres fois simplement très-arqué en arrière, comme chez les Myodites, il montre chez la plupart des autres Longipèdes sa base fortement bisinuée, avec la partie médiane prolongée en arrière ; quelquefois cette partie a acquis un développement assez considérable pour voiler l'écusson. Ses angles postérieurs se courbent souvent sur la partie humérale des élytres. Sa surface, souvent sans signes distincts, est rarement rayée d'une ligne longitudinale médiane ou

creusée d'un sillon large et profond, comme chez les *Mortèques*. Ses bords latéraux, parfois tranchants comme chez les *Scrapties* et chez les *Mordelles*, sont souvent repliés en dessous et obtus, soit sur leur partie antérieure seulement, comme chez les *Anaspes*, soit sur leur majeure partie ou même sur toute leur longueur, comme chez les *Rhipiphorides* en général.

L'*écusson*, voilé parfois, comme nous l'avons dit, par le lobe médian de la base du prothorax chez les uns, est apparent chez les autres; en général, il a peu de développement et offre diverses transitions entre le carré large et le triangle.

Les *élytres* et les *ailes* existent généralement <sup>(1)</sup>. Les premières, presque parallèles chez les uns, vont, chez les autres, en se rétrécissant d'avant en arrière jusque près de l'extrémité: souvent contiguës à la suture, et voilant complètement les ailes, elles sont d'autres fois déhiscentes dans leur moitié postérieure au moins, rétrécies en alène, et permettent d'apparaître aux véritables organes du vol, qui les dépassent postérieurement; plus singulières encore chez les *Myodites*, elles sont d'une brièveté anormale, et simulent des espèces de petites écailles écartées l'une de l'autre et laissant à découvert le dessus de l'abdomen, et aux ailes étendues toute leur liberté; glabres chez plusieurs, elles sont pubescentes chez le plus grand nombre; souvent sans stries, elles offrent chez les *Mordelles* un rebord sutural qui les fait paraître uni-striées près de leur bord interne; d'autres fois, comme chez les *Ptilophores*, elles présentent des stries plus ou moins marquées. Leur *repli*, en général étroit, et réduit à une tranche sur la majeure partie de sa longueur, offre parfois dans ses deux bords, distincts sur une plus grande étendue, des caractères qui ne manquent pas d'une certaine importance.

Le *pygidium* est le plus souvent en partie au moins visible. Ordinairement il est en espèce de triangle plus large à la base qu'il est long sur son milieu; chez les *Rhipiphores*, il forme, avec l'arceau précédent, une partie verticale ou tronquée; chez les ♀ des *Myodites*, il se recourbe en dessous et s'allonge d'un oviducte tubuleux; chez les *Mordelles*, il se prolonge en une sorte de cône caudiforme.

(1) Les ♀ des *Rhipidius* qui, jusqu'à ce jour ne paraissent pas avoir été trouvées en France, sont aptères. Les insectes de ce même genre offrent, sous le rapport des yeux et de la bouche, diverses autres anomalies, qui ne rentrent pas dans notre sujet.



Le *dessous du corps* offre une configuration variable, suivant le développement ou le rétrécissement des pièces tégumentaires qui le constituent.

Le *prosternum*, par suite du développement des hanches de devant, se montre très-réduit et ne forme jamais une saillie aussi élevée qu'elles.

Le *mésosternum*, rarement raccourci, comme chez les Pilophores, se prolonge ordinairement jusqu'à l'extrémité des hanches intermédiaires ou près de celle-ci ; tantôt il est très-étroit, comme chez la plupart des Anaspes, d'autres fois il acquiert une étendue telle, chez les Myodites, par exemple, qu'il rejette presque sur les côtés les pieds intermédiaires ; quelquefois il est presque entièrement voilé par la tête inclinée, comme chez les Mordelles.

Les *postépisternums* ou *épisternums du postpectus*, tantôt allongés et presque parallèles, chez les Scrapties, vont en se rétrécissant graduellement en pointe, chez la plupart des Anaspes. Chez les Mordelliens, leur forme variée contribue à fournir pour la distinction des espèces des caractères non encore utilisés ; ainsi quelquefois ils sont arqués, d'autres fois en ligne droite à leur bord interne. Chez la plupart des Rhipiphorides, ils offrent une figure plus régulièrement obtriangulaire, sont plus larges à la base, vont en se rétrécissant également des deux côtés, en s'écartant progressivement davantage du bord externe, et laissent ainsi se développer visiblement l'épimère postérieure, qui souvent est peu apparente chez les insectes du premier groupe.

Le *ventre* offre un nombre d'arceaux variable, dont le chiffre est ordinairement de cinq ou six. Plusieurs de ceux-ci, principalement chez les ♂ des Anaspiens, offrent des appendices, des lanières ou d'autres signes particuliers qui aident à la séparation des espèces. Chez les Mordelliens, l'*hypopygium* acquiert un développement plus considérable pour servir de support au pygidium.

Les *pieds* sont généralement grêles et allongés.

Les *hanches antérieures*, tantôt presque contiguës, se montrent exceptionnellement très-écartées, chez les Myodites. Parfois elles sont presque parallèles, d'autres fois presque obtriangulaires, convexes en dessus, concaves ou presque planes en dessous. Plus ou moins apparentes chez les uns, elles sont couvertes et cachées par la tête, quand celle-ci est fortement inclinée sur la poitrine.

Les *hanches intermédiaires*, plus ou moins rapprochées, suivant le développement du *mésosternum*, sont ordinairement couchées longitudinalement et presque parallèles ; chez les singuliers Myodites,



elles ont, comme les hanches antérieures, une direction presque transversale.

Les *hanches postérieures*, dirigées dans ce dernier sens, montrent des proportions en harmonie avec le genre de vie ou les besoins des diverses espèces. Chez les Rhipiphores, la surface plus considérable de l'épinière leur empêche de se rapprocher, autant que chez les autres, du bord latéral. Chez les Mordelles, qui semblent, par leur facilité à bondir, représenter les Orchésies de la Tribu précédente, elles ont acquis un développement tel, qu'elles l'emportent à cet égard sur le postpectus. Quand on sait avec quelle puissance ces insectes peuvent projeter leur corps en avant, on comprend que les muscles volumineux, chargés de leur donner cette énergie, avaient besoin d'une surface aussi étendue pour s'y insérer.

Les *cuisses* suivent les mêmes lois d'harmonie que les hanches. Ainsi, chez les Mordelles précitées, les postérieures ont acquis des proportions plus considérables : elles sont comprimées et un peu arquées, pour répondre aux efforts que l'insecte est obligé de faire pour sauter.

Les *jambes*, chez les mêmes insectes, ont par la même raison acquis plus de brièveté, et dépassent ou même égalent souvent à peine la longueur du premier article des tarses, tandis que chez les espèces faites pour marcher, elles sont aussi grandes ou même visiblement plus longues que tous les articles des tarses réunis.

Les *épérons*, ordinairement au nombre de deux, manquent aux tibias antérieurs, chez les Mœtèques. Chez les Mordelles, ceux des jambes postérieures, sans avoir acquis des proportions aussi considérables que chez les Orchésies, se sont développés suffisamment pour concourir à la projection du corps.

Les *tarses* offrent cinq pièces aux quatre pieds de devant, et une de moins à ceux de derrière. La longueur proportionnelle de ces articles varie suivant les genres et parfois même suivant les espèces, et fournit par là des caractères faciles à utiliser. Ainsi, aux pieds postérieurs, qui concourent, en général, d'une manière plus évidente au genre de vie de l'insecte, les pièces tarsiennes vont en diminuant de longueur chez les Mordelles et les Anaspes ; chez la plupart des Rhipiphorides les articles intermédiaires ont des proportions plus restreintes. Chez les Myodites, le premier article des mêmes pieds présente un renflement particulier ; chez plusieurs, toutes les pièces tarsiennes sont simples ; chez d'autres, la pénultième ou l'antépénultième se dilate, s'avance sous l'article suivant, en forme de sole soit légèrement

échancrée, soit presque bilobée. Quand l'antépénultième article se montre ainsi dilaté, comme on le voit aux quatre pieds antérieurs des Anaspes, l'avant-dernier article semble alors enclassé dans le précédent et souvent peu distinct. Quelquefois les tarsi antérieurs, par la dilatation ou les proportions différentes de quelques-unes de leurs pièces, fournissent le moyen de reconnaître les deux sexes.

Enfin les *ongles*, simples ou munis, chez quelques-uns, d'une dent insignifiante à la base de chacune de leurs branches, présentent chez les autres des singularités plus ou moins remarquables. Ils sont dentés ou pectinés chez les Myodites et chez les Ptilophores; bifides, à l'extrémité, chez les Rhipiphores; longitudinalement fendus chacun chez les Mordelles, avec la partie supérieure de chaque branche ainsi divisée, plus ou moins distinctement denticulée.

#### VIE ÉVOLUTIVE.

La science n'est pas encore suffisamment éclairée sur les premiers états de tous nos Longipèdes, pour donner sur les larves de ces insectes des détails complets.

Les Mordellides seules, dont les savantes études de MM. Léon Dufour, Perris et quelques autres naturalistes ont éclairé l'histoire des premiers âges, ont le corps presque parallèle, presque plat en dessus chez les uns, convexe chez les autres; hexapode; composé, outre la tête, de douze segments. Elles ont la tête subarrondie, offrant souvent le front ordinairement distinct de l'épistome; le labre visible; les mandibules cornées, terminées en pointe et parfois munies d'une dent près de leur extrémité; les mâchoires à un seul lobe ou n'offrant que de légères traces d'un lobe interne; les palpes maxillaires coniques, de trois articles: les labiaux, de deux; les mâchoires et le menton souvent prolongés en arrière jusque près du bord antérieur de l'antépectus; les yeux nuls ou représentés par quelques points tuberculeux; les antennes composées de quatre articles, dont le premier court, tuberculiforme, dont le dernier, grêle, est souvent terminé par une ou deux soies; le segment prothoracique généralement plus grand et souvent d'une consistance moins faible ou plus solide que les suivants: le dernier, de forme variable, tantôt chargé d'aspérités et terminé en une pointe simple ou bifide, tantôt armé de deux crochets: ce dernier segment ordinairement muni en dessous d'une partie exsertile, chargée de concourir avec les pieds aux mouvements de progression de la larve. Les pieds sont courts, composés de trois ou quatre

pièces, dépourvus d'ongles, au moins chez plusieurs. Souvent des rides et des bourrelets situés sur divers anneaux, ont pour mission d'aider à l'action des pieds. Les stigmates sont au nombre de neuf paires : une, plus inférieure, entre l'antépectus et le médipectus : huit plus latérales, situées sur les huit premiers segments abdominaux.

Ces larves habitent les troncs des arbres morts ou malades, les tiges ou les racines des arbrisseaux ou des plantes vivaces, et se nourrissent de la substance de ces végétaux. En consommant les matières qu'elles ont pour mission de réduire en vermoulure, elles creusent dans le sein de ces corps divers des galeries irrégulières, en partie au moins remplies par les débris pulvérulents qu'elles rejettent. Les appendices dont elles sont pourvues ; les râpes ou les crochets dont elles sont munies, servent à faciliter leurs mouvements ou leurs travaux. Les dédales mystérieux dans lesquels elles se cachent, leur fournissent des retraites protectrices pour passer à leur second état.

La nymphe n'offre rien de bien particulier. Elle a la tête inclinée ; le prothorax déclive ; les antennes étendues parallèlement au bord latéral du premier segment thoracique : les quatre pieds antérieurs apparents ; les postérieurs en majeure partie voilés par les organes du vol déhiscents et inclinés vers la partie médiale du dessous du corps. Celui-ci est ordinairement pourvu de soies ou de poils destinés à lui permettre quelques mouvements et à faciliter son changement de peau. Quinze jours lui suffisent ordinairement pour avoir acquis la consistance nécessaire à ses organes, et pour se débarrasser de son linceul.

On sait que quelques larves de Rhipiphorides sont parasites de certains Hyménoptères ; mais elles n'ont pas été assez complètement étudiées encore, pour nous étendre plus longuement sur ce sujet.

#### GENRE DE VIE DES INSECTES PARFAITS.

Revêtus de leur dernière livrée, nos Longipèdes ont des destinées moins diverses que dans leur jeune âge. La plupart semblent conviés par la Nature à recueillir la matière sucrée qu'elle prépare pour eux dans la corolle des fleurs. Au moment où ils apparaissent sous leur dernière forme, la terre reprend sa verdure ou s'est même déjà parée de ses plus beaux atours. Les rameaux d'aubépines se cachent sous des pétales éblouissants de blancheur ; le soleil d'avril, en ranimant la végétation, a nuancé de mille couleurs le tapis des prés, ou même les

chaleurs plus vives de juin ont fait succéder d'autres plantes à celles chargées d'annoncer les premières la fin de l'hiver. Les panais étalent leurs gracieuses ombelles; les spirées allongent leurs grappes élégantes; une foule d'insectes s'empressent de venir leur rendre une visite intéressée. Nos Longipèdes figurent au nombre de ces courtisans assidus. La plupart ont reçu des dons extérieurs en harmonie avec leur heureuse destinée. Ainsi, chez plusieurs, les antennes se sont transformées en espèces d'aigrettes ou de panaches en éventail. Presque tous ont une robe plus ou moins faite pour plaire; ce sont ordinairement les douces nuances du rouge pâle, du blond ou du nankin qui en forment le fond, soit d'une manière presque exclusive, soit plus souvent avec le saisissant contraste du jais, qui sert à les faire ressortir; chez le plus grand nombre cette robe a toute la richesse de la soie; tantôt le fin duvet dont elle est garnie offre l'apparence du satin; tantôt il brille d'un reflet presque métallique; d'autres fois ces poils luisants composent sur leur corsage des dessins variés, qui reproduisent les capricieuses ondulations de la moire.

Au sein de la nourriture exquise dont ils s'abreuvent dans la coupe des fleurs, souvent ces insectes oublient le soin de leur conservation et se laissent saisir avec une certaine facilité par la main qui les convoite. Cependant, si le soleil embrase l'air de ses feux, leur activité reçoit de la chaleur une nouvelle énergie, et plusieurs, à l'approche du danger, entr'ouvrent leurs élytres avec vivacité et s'envolent d'une aile agile; quelques-uns semblent fendre les airs avec la rapidité du trait. D'autres, comme les Mordelles ont reçu des moyens particuliers de salut; souvent celles-ci déjouent l'adresse du chasseur qui croit les tenir en son pouvoir; leur corps soyeux et glissant va se rétrécissant en pointe; à l'aide de leurs pieds postérieurs, doués d'une force énergique, elles se poussent et s'insinuent dans les interstices des doigts qui cherchent à les retenir; elles finissent souvent par se frayer un passage suffisant pour recouvrer leur liberté, et par échapper en bondissant au sort qui les attendait.

Quelques espèces de Mordelles semblent dédaigner les fleurs qui plaisent à leurs congénères, ou ne visiter ces gracieux ornements de la Nature qu'avec une discrète réserve. Elles se tiennent de préférence sur les troncs desséchés qui offrirent à leur jeune âge des aliments et un abri; elles aiment à y exposer, aux feux du soleil, leur cuirasse luisante, à parcourir ces troncs privés de vie qui leur semblent dévolus, et dans lesquels elles devront bientôt déposer l'espérance de la perpétuité de leur race.



Les Mordellides sont répandus, en général, sur toute la surface de la France; le midi, toutefois, a le privilège de voir éclore des espèces particulières. Les Rhipiphorides, au contraire, sont presque tous inconnus à nos provinces du septentrion; il faut à leur existence ou à leur activité le ciel d'azur et l'air échauffé de nos départements rapprochés de la Méditerranée.

Les premiers sont tous lignivores dans leur jeune âge; le genre de vie de la plupart des autres, durant leur état vermiforme, est encore couvert d'un voile mystérieux; quelques-uns, du moins, comme les Mètèques, habitués à la température de toutes nos zones, sont parasites au sortir de l'œuf. La Providence les a chargés de décimer au berceau ces guêpes désagréables, dont la dent avide entame avec tant d'audace les fruits savoureux de nos jardins. L'observation nous apprendra sans doute bientôt si les Myodites et les espèces des genres voisins ont une destination analogue.

Tel est le charme de l'étude de l'histoire naturelle; chaque pas fait dans cette voie conduit à une découverte; chaque découverte à une jouissance; et chaque jouissance à un motif nouveau d'élever nos pensées de reconnaissance vers cet Être souverain dont aucune langue humaine ne peut redire les perfections, mais dont toutes les œuvres servent à nous faire connaître la sagesse et la bonté.

#### HISTORIQUE.

La classification de nos Longipèdes a été généralement soumise à moins de fluctuations que celle des insectes de beaucoup d'autres Tribus.

1761. Linné, soit dans la seconde édition de sa Faune de Suède (1761), soit dans la dixième édition du Systema Naturae (1758), comprit dans son genre *Mordella*, tous ceux de ces Coléoptères décrits dans ses ouvrages.

1762. Geoffroy, dans son Histoire abrégée des Insectes, détacha des Mordelles du Pline du Nord, sous le nom d'*Anaspis*, les espèces à écusson très-petit, dont l'abdomen n'offre point de prolongement conique, espèces qu'il croyait à tort n'offrir que quatre articles aux tarses antérieurs; mais cette coupe resta longtemps à être adoptée par les écrivains qui le suivirent.

1792. Le genre linnéen était encore le seul presque universellement admis, quand Fabricius, dans son Entomologia systematica,



en détacha sous le nom de *Rhipiphorus*, les espèces à palpes filiformes.

1796. Latreille, qui préludait, dans son Précis des caractères généraux des Insectes, aux travaux plus remarquables qu'il devait commencer à produire un peu plus tard, Latreille comprit les genres *Anaspe*, *Mordelle* et *Rhipiphore* dans la première division de sa neuvième famille des Coléoptères.

1800. M. C. Duméril fit d'abord entrer nos Longipèdes dans sa famille des LUCIFUGES, dans la distribution méthodique des insectes, qu'il donna en l'an VIII, à la suite du premier volume des Leçons d'anatomie comparée de G. Cuvier. Quelques années après (1806), dans sa Zoologie analytique, il admis ces Coléoptères hétéromères dans sa famille des ANGUSTIPENNES.

1804. Latreille, dans son Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes, les isola des autres Hétéromères constituant sa tribu des VERSICOLORS, pour en former sa famille des *Mordellones*.

1807. Peu d'années après, dans le second volume de son Genera, cet illustre Entomologiste, à l'aide d'un insecte rangé avec les Mélandryes, dans son ouvrage précédent, fondait le genre *Scaptia*, composant avec les Notoxes, les Calopes et les Pyrochres, sa vingt-troisième famille, celle des PYROCHROÏDES.

1809. Dans ses Considérations générales sur l'ordre naturel des Animaux, il retrancha les Calopes de cette famille, pour les faire entrer dans celle des TÉNÉBRIONITES, composée d'éléments nombreux et disparates.

1812. De Lamarck, dans l'Extrait de son cours de zoologie, professé au Muséum d'Histoire naturelle, forma avec nos Longipèdes, une première division de ses CANTHARIDIENS, distincts des autres Hétéromères par leurs antennes en scie ou pectinées (1).

1817. Dans le troisième volume de la première édition du Règne animal de Cuvier, Latreille modifiant ses idées précédentes, formait à l'aide de nos Longipèdes la seconde division de sa famille des TRACHÉLIDES. Malgré l'erreur qu'il propageait, en considérant comme simples les crochets des tarsi de tous ces insectes, il avait saisi les rapports qui les lient, et en avait constitué un groupe très-naturel.

---

(1) Fischer, dans le t. 2. des Mémoires de la Soc. imp. des Natur. de Moscou, p, 293. et plus antérieurement dans son Entomographia mosquensis, avait établi le genre *Pelecotoma* appartenant à notre Tribu, mais étranger à la France.

1818. L'année suivante, dans le vingt-unième volume du nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, et plus tard (1825), dans ses familles naturelles du Règne animal, il partagea ses Mordellones en deux divisions :

1<sup>o</sup> Antennes en éventail ou très-pectinées dans les ♂. Palpes presque filiformes.  
(*G. Ripiphore, Pelecotome, Myode.*)

2<sup>o</sup> Antennes des deux sexes tantôt simplement en scie, tantôt sans dentelures. Palpes maxillaires terminés par un article plus grand, triangulaire ou en forme de hache.

(*G. Mordelle, Anaspe, Scryptie.*)

Il avait reconnu les variétés de formes que présentent, suivant les genres, les crochets des tarses, et il établissait le genre *Myode* (1).

1819. Le même naturaliste, dans le t. 29 du Dictionnaire précité, partagea les Ripiphores en deux sections destinées plus tard à devenir les bases de deux coupes génériques particulières, en voici les caractères :

1<sup>o</sup> Antennes ne paraissant composées que de dix articles (le deuxième nul ou caché dans l'intérieur du premier), pectinés depuis le deuxième; le dernier long, linéaire, ainsi que les rameaux des précédents; sommet de la tête de niveau avec l'extrémité antérieure du corselet, déprimé, droit; face de la tête formant un angle avec le vertex; corselet ayant dans son milieu un sillon, et terminé postérieurement à l'écusson, par un lobe très-obtus ou arrondi. (*Ripiph. paradoxus*).

2<sup>o</sup> Antennes de onze articles distincts, pectinés depuis le troisième: le dernier s'élargissant de la base à l'extrémité, en forme de triangle renversé et oblong; sommet de la tête élevé au-dessus de l'extrémité antérieure du corselet, comprimé, arrondi; milieu du corselet sans enfoncement, terminé à l'écusson par un angle plus ou moins pointu. (*Ripiphor. flabellatus*, etc.)

1829. Dans la partie entomologique de la deuxième édition du Règne animal de Cuvier, l'Entomologiste de Brives fit passer le genre *Scryptia* de sa tribu des MORDELLONES, dans celle des ANTHICIDÆ.

Ce genre *Scryptia*, dont la place semble si naturellement indiquée avec les Mordellides, par le caractère que présente la tête accolée contre le prothorax, était destiné à être ballotté. Gyllenhal (2) (1810), avait

(1) De Lamarck ayant appliqué cette dénomination à un genre précédemment établi, Latreille, dans le même Dictionnaire t. 29. p. 302, changea ce nom en celui de *Myodite*.

(2) Insecta suec. t. 2. p. 523.

compris parmi ses Serropalpides la seule espèce connue de lui et l'avait admise au nombre de ses Dircées. Stephens, dans le tom. 5 de ses Illustrations (1832) colloqua les Scrapties avec ses MÉLANDRYDES. Sa famille des MORDELLIDES, caractérisée par une tête obcordée, non enfoncée dans le prothorax ; par ses tarses à pénultième article simple, par ses ongles simples (1), fut divisée de la manière suivante :

A. Ecusson plus ou moins apparent.

B. Articles des tarses tous simples.

*Mordella.*

BB. Tarses antérieurs à pénultième article bilobé.

*Anaspis.*

AA. Ecusson nul ou caché.

*Rhipiphorus.*

1833. Dejean, dans la seconde édition, en partie détruite par l'incendie, de son Catalogue des Coléoptères, appliqua le nom générique de *Moetecus*, à la première des sections établies par Latreille, dans le genre *Rhipiphorus*. Il séparait aussi du genre *Pelecotoma* de Fischer, l'espèce dédiée par le naturaliste de Brives à notre savant entomologiste M. Léon Dufour, en l'indiquant comme base d'un nouveau genre désigné par lui sous le nom de *Ptiliphorus*, dénomination que MM. Guérin et Percheron convertissaient un peu plus tard en celle d'*Evaniocera*.

1841. M. de Castelnau, dans le deuxième volume de son Histoire naturelle des Coléoptères, assignait le nom générique de *Rhipiphorus* à l'insecte composant le genre *Moetecus* de Dejean ; convertissait les *Rhipiphores* de ce dernier en *Emenadies*, et les *Ptiliphores* du même auteur en *Pelecotoïdes*.

1845. M. L. Redtenbacher, dans ses genres de la Faune des Coléoptères de l'Autriche, disposés d'après une méthode analytique, distribua les genres de sa famille des Mordelles de la manière suivante :

A. Elytres déhiacentes, terminées en alène, ou nulles.

B. Palpes maxillaires à deux articles. Antennes des ♂ en éventail :  
celles des ♀ filiformes. ♀ sans ailes ni élytres.

*Symbius.*

BB. Palpes maxillaires de quatre articles. Antennes des ♂ et des ♀  
en éventail ou en peigne. Prothorax creusé d'un sillon mé-  
diaire profond.

*Rhipiphorus.*

---

(1) Les ongles comme je l'ai dit, simples chez les Anaspes, sont divisés chez les Mordelles, et bifides à l'extrémité chez les Rhipiphores.

- AA. Elytres non déhiscentes, contiguës l'une à l'autre à la suture, en ligne droite.
- C. Ongles dentés en scie. Abdomen prolongé en pointe. *Mordella*.
- CC. Ongles simples ou à une seule dent. Abdomen non prolongé en pointe.
- D. Tête verticale. Sommet de la tête très-convexe. Antennes notablement prolongées au delà de la base du prothorax. *Anaspis*.
- DD. Tête penchée. Sommet de la tête convexe. Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax pris ensemble. *Scaptia*.

Il ne changea rien à cette disposition, dans la publication de sa Faune d'Autriche (1849).

1851. M. de Kiesenwetter, en donnant dans les Annales de la Société entomologique de France, l'Enumération des Coléoptères trouvés dans notre midi, établit le genre *Trotomma*.

1853. M. Achille Costa, dans sa Faune du royaume de Naples, divisait ses MORDELLIDÉES en trois tribus :

- A. Antennes en éventail, au moins chez le ♂.
- B. Elytres rudimentaires, squammiformes. Ailes à découvert. *MYODITES*.
- BB. Elytres de grandeur ordinaire, recouvrant les ailes en grande partie. *RIPIPHORITES*.
- AA. Antennes simples ou seulement en scie chez les ♂. *MORDELLIDES*.

Ces derniers furent partagés de la manière suivante, savoir :

1<sup>o</sup> Ceux de ces insectes à abdomen prolongé en pointe ou constituant le genre *Mordella* des auteurs : en trois coupes génériques :

- α. Dernier article des antennes obliquement échancré et terminé en pointe. *Tomoxia*.
- αα. Dernier article ovale oblong.
- β. Ecusson visible. *Mordella*.
- ββ. Ecusson invisible. *Natirrica*.

Le genre *Mordella* fut lui-même divisé en deux sous-genres :

- α. Prothorax plus large que long. . . . . *Mordella*.
- αα. Prothorax aussi long que large. . . . . *Mordellistena*.

2<sup>o</sup> Les Mordellides à abdomen non prolongé en pointe, furent eux-mêmes répartis en deux genres ; mais fondés sur des caractères pris seulement chez l'un des sexes.

α. Ventre du ♂ fendu sur le cinquième et même sur le quatrième arceau ; sans appendices ou pourvu seulement de deux appendices courts. *Anaspis.*

αα. Ventre du ♂ fendu sur les troisième, quatrième et cinquième arceaux ; pourvu de quatre appendices filiformes. *Plesianaspis.*

1855. Enfin, M. le docteur A. Gerstaecker, dans sa disposition systématique des RHIPIPHORIDES, dont il forme une famille distincte de celle des MORDELLIDES ; en raison de leurs mandibules dépourvues de membrane à leur bord interne ; de leurs palpes à dernier article non sécuriforme ; de leurs mâchoires à lobes unis ; de leur tête à vertex élevé ; de leurs antennes non flabellées, etc., divise ces insectes en quatre tribus, dont voici le tableau :

A. Elytres contiguës à la suture. Yeux échancrés. Ecusson visible.  
Ongles dentés ou pectinés. *PTILOPHORIENS.*

AA. Elytres nulles, raccourcies, ou déhiscentes à la suture.

B. Ongles simples. Elytres courtes ou nulles. *RHIPIDIENS.*

BB. Ongles pectinés ou bifides.

C. Elytres très-courtes. Ailes visibles. Ecusson apparent. *MYODITES.*

CC. Elytres déhiscentes, acuminées. Ailes visibles. *RHIPIPHORIENS.*

La première Tribu comprend, pour la Faune d'Europe, les genres *Pelecotoma* et *Ptilophorus* : le premier à tibias mutiques, à ongles obtusément bidentés : le deuxième, à tibias à deux éperons, à ongles pectinés.

La seconde Tribu est réduite au genre *Rhipidius* de Thunberg (*Symbius* de Sundevall).

La troisième Tribu est bornée également à un genre, celui de *Myodites*.

La quatrième comprend le genre *Metoecus*, et celui de *Rhipiphorus*, dont voici les principales différences caractéristiques :

a. Palpes maxillaires à quatrième article le plus long. Tibias antérieurs mutiques. Articles des tarsi postérieurs tous allongés, cylindriques. *Metoecus.*

aa. Palpes maxillaires à deuxième article le plus long. Tibias antérieurs à un éperon. Deuxième article des tarsi postérieurs petit, comprimé. *Rhipiphorus.*



Il nous reste à exposer la méthode que nous avons adoptée.

Nous diviserons nos Longipèdes en deux groupes :

Dernier article des palpes maxillaires	plus ou moins fortement sécuriforme. Antennes soit filiformes, simples ou dentées, soit grossissant vers l'extrémité.	Groupes.  MORDELLIDES.
	non sécuriforme. Antennes pectinées ou flabellées chez les ♂; dentées au moins chez les ♀.	RHIPHOPHORIDES.

## PREMIER GROUPE.

### MORDELLIDES.

**CARACTÈRES.** *Dernier article des palpes maxillaires* plus ou moins fortement sécuriforme. *Antennes* soit filiformes, simples ou dentées, soit grossissant vers l'extrémité.

Toutes les larves connues de ces insectes vivent aux dépens des matières végétales.

Ces Hétéromères se répartissent en trois petites familles :

Sommet de la tête	de niveau avec le bord antérieur du prothorax. Tibia postérieur beaucoup plus court que tous les articles réunis du tarse qui le suit. Avant-dernier article des tarses postérieurs, grêle, entier.	Hanches postérieures plus longues que le postpectus. Pygidium prolongé en pointe conique. Ongles offrant chacun de leurs crochets longitudinalement divisé en deux branches, et ordinairement denté à l'une d'elles. Eperons des tibias antérieurs nuls ou presque nuls.	Familles.  MORDELLIENS.
		Hanches postérieures moins longues que le postpectus. Pygidium non prolongé en pointe conique. Ongles simples. Eperons des tibias antérieurs très-visibles.	ANASPIENS.
	plus élevé que le bord antérieur du prothorax. Hanches postérieures moins longues que le premier arceau ventral. Tibia postérieur aussi long que tous les articles réunis du tarse qui le suit. Avant-dernier article de tous les tarses avancé en forme de sole sous l'article suivant.		SCRAPTIENS.

## PREMIÈRE FAMILLE.

## MORDELLIENS.

CARACTÈRES. *Sommet de la tête* de niveau avec le bord antérieur du prothorax. *Pygidium* prolongé en pointe conique. *Hanches postérieures* plus longues que le postpectus. *Eperons des tibias antérieurs* nuls ou presque nuls. *Tibia postérieur* beaucoup plus court que tous les articles réunis du tarse qui le suit. *Avant-dernier article des tarses postérieurs* grêle, entier. *Ongles* offrant chacun de leurs crochets longitudinalement divisé en deux branches, et plus ou moins sensiblement denté à l'une d'elles. *Corps* longitudinalement arqué. *Yeux* ovulaires; entiers; situés sur les côtés de la tête. *Antennes* insérées vers la base des mandibules, près du bord antéro-interne des yeux: courtes ou très-médiocres: subfiliformes, à troisième article ordinairement plus grêle; comprimées ou subcomprimées, et plus ou moins sensiblement dentées à partir du cinquième article.

A ces caractères généraux on peut ajouter :

*Tête* petite; subtriangulaire; inclinée. *Epistome* parfois peu distinct du front. *Lèvre* transverse. *Mandibules* courtes; cornées; bifides à l'extrémité. *Mâchoires* à deux lobes. *Palpes maxillaires* allongés: à dernier article sécuriforme ou en forme de coudre. *Palpes labiaux* très-courts; peu apparents; cachés. *Prothorax* bissinué à la base, avec la partie médiane de celle-ci prolongée en arrière; à bords latéraux tranchants; convexe en devant, graduellement moins convexe en arrière. *Elytres* rétrécies ordinairement à partir de leur base; laissant à découvert la majeure partie au moins du pygidium, qui se prolonge en pointe conique; peu convexes; munies d'un rebord sutural qui les fait paraître comme unistriées près de la suture. *Hanches antérieures* et ordinairement les *intermédiaires* cachées par la tête inclinée sur la poitrine. *Ventre* de cinq arceaux: le cinquième ou hypopygium allongé en ogive ou en triangle: partie du sixième arceau parfois apparente. *Pieds postérieurs* au moins allongés; plus robustes que les antérieurs.

MM. Vallot, Schilling, Erichson et surtout Léon Dufour ont contribué à faire connaître le premier état de ces Coléoptères.

Ces insectes se répartissent dans les genres suivants :

		GENRES.
Tibias postérieurs	sans hachures sur leur arête dorsale.	<i>Tomoxia</i> .
	Ecusson aussi large que le tiers de la base de chaque élytre. Dernier article des antennes échancré dans la seconde moitié de son côté interne. Tibias intermédiaires moins longs que les quatre premiers articles du tarse qui les suit.	
	Ecusson visiblement moins large que le tiers de la base d'une élytre. Dernier article des antennes arqué à son côté interne. Tibias intermédiaires aussi longs ou à peine moins longs que tous les articles réunis du tarse qui les suit.	<i>Mordella</i> .
Tibias postérieurs	munis sur leur arête dorsale d'une ou de plusieurs hachures, souvent prolongées sur leur face externe.	<i>Mordellistena</i> .
	Tibias postérieurs n'offrant point de dent sur leur arête dorsale; rayés de plusieurs hachures, ainsi que le premier article des tarses.	
	Tibias postérieurs à une seule hachure sur leur arête dorsale; offrant cette arête brusquement moins saillante sur sa partie postérieure, à partir de la hachure et paraissant par là, munie d'une sorte de dent. Premier article des tarses à une seule hachure.	<i>Stenalia</i> .

Genre *Tomoxia*, TOMOXIE; A. Costa <sup>(1)</sup>.

(τρυς, article; ῥῆγος, pointu).

CARACTÈRES. *Tibias* et *tarses postérieurs* sans hachures sur leur arête dorsale. *Ecusson* au moins aussi large que le tiers de la base de chaque élytre, en carré plus large que long, échancré à son bord postérieur. *Antennes* de onze articles; dentées au côté interne et à peu près de même largeur à partir du cinquième: le dernier, échancré dans la seconde moitié de son côté interne, ou comme augmenté d'un peti

(1) Faun. d. Regn. di Napol. (*Mordellidees*) p. 3.

article étroit, soudé avec lui. *Tibias intermédiaires* moins longs que les quatre premiers articles des tarsi des mêmes pieds.

1. **T. bucephala** ; A. COSTA. *Suballongée* ; d'un noir brun ; a *pubescence soyeuse*, *concolore* sur quelques parties, d'un cendré olivâtre sur d'autres : celle-ci, formant sur les élytres une bordure suturale et deux sortes de bandes transverses : la bordure, étendue à leur base jusqu'à la fossette humérale, subgraduellement réduite au tiers de la largeur, près de leur extrémité qu'elle n'atteint pas : la première bande les couvrant de la moitié aux cinq huitièmes de leur longueur, parfois raccourcie à ses deux extrémités : la seconde bande, subapicale, extérieurement raccourcie. Antennes d'un brun noir, souvent moins obscures vers la base.

♂. Antennes aussi longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; à articles plus allongés, dentés à angles plus vifs, à dernier article une fois plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Deux premiers articles des tarsi intermédiaires aussi longs que les jambes des mêmes pieds. Pygidium dépassant l'hypopygium d'une longueur égale au moins aux deux tiers de celle de ce dernier.

♀. Antennes un peu moins longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; articles plus courts, dentés à angles moins vifs, à dernier article de moitié plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Jambes intermédiaires aussi longues que les trois premiers articles des tarsi des mêmes pieds. Pygidium dépassant l'hypopygium d'une longueur égale à peu près à la moitié de celle de ce dernier.

ETAT NORMAL. *Elytres* noires ou d'un brun noir, garnies sur quelques parties de poils soyeux, couchés, fins, de même couleur, parées sur la majeure partie de leur surface d'une sorte de duvet d'un cendré olivâtre : ce duvet, constituant une bordure suturale et deux bandes transverses : la bordure suturale, couvrant leur base jusqu'à la fossette humérale ou jusqu'aux côtés du calus huméral, rétrécie d'avant en arrière, réduite à la moitié de la largeur, vers la moitié de leur longueur, et au tiers, près de l'extrémité qu'elle n'atteint pas : la première bande, couvrant de la moitié aux cinq huitièmes de leur longueur, ordinairement liée à la bordure suturale, presque étendue jusqu'au bord externe : la deuxième bande, couvrant des quatre cin-

quièmes aux huit neuvièmes de leur longueur, liée à la bordure suturale, un peu raccourcie et recourbée à son extrémité externe.

*Tomoxia bucephala*, A. COSTA, Faun. del Regn. di Napol. (*Mordellidées*) p. 8, 1. pl. 20. fig. 4.

*Variations des élytres (par défaut.)*

Var. A. Première bande transverse isolée de la suture, plus ou moins restreinte, tantôt constituant une sorte de tache subponctiforme, tantôt paraissant formée de deux ou trois courtes lignes longitudinales unies. Bande postérieure semblant aussi parfois, mais plus rarement, composée de quelques lignes courtes, unies et peu distinctes.

*Mordella fasciata*, PAYK. Faun. suec. t. 3. add. p. 435. 1-2. — GYLLENH. Ins. suec. 1-2. p. 606.

*Mordella biguttata*, (DEJ.) Catal. (1821) p. 73. — *Id.* (1833) p. 219. — *Id.* (1837) p. 241. — GYLLENH. Insect. suec. t. 4. p. 520. 3. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 265. 3.

*Mordella picta*, (BESSER) (DEJ.) Catal. (1833). p. 219. — *Id.* (1837) p. 241.

*Variations des élytres (par excès.)*

Var. B. Bandes des élytres, surtout la première, moins nettement limitées, plus confuses, plus ou moins avancées en avant et en arrière, mais laissant toutefois encore paraître entre elles des points de séparation.

Var. C. Bandes des élytres confondues de telle sorte, que les élytres sont complètement recouvertes d'une sorte de duvet ou de poils soyeux, couchés, cendrés ou d'un cendré verdâtre, excepté à l'extrémité, et sur les côtés, depuis le dessous de l'épaule, jusque vers la moitié de leur longueur.

*Mordella sericea*, (ZIEGLER) (DEJAN) Catal. (1837) p. 241 ?

Dans cette variété extrême, le côté externe des élytres dénudé ou plutôt garni de poils obscurs plus fins que les poils cendrés, et sur un espace élargi d'avant en arrière en triangle allongé, depuis le dessous des épaules jusqu'à la moitié de la longueur, sur le tiers externe de la largeur, servent seuls, avec l'extrémité, à rappeler le dessin normal.

Long. 0,0052 à 0,0073 (2 1/3 à 3 1/4 l.) Larg. 0,0017 à 0,0025 (4/5 à 1 1/8 l.)



*Corps* suballongé ; peu étroit ; à fond noir ou d'un noir brun, garni de poils fins, soyeux, couchés. *Tête* en angle très-ouvert dans le milieu de son bord postérieur ; revêtue d'un duvet cendré olivâtre, luisant, épais ; moitié antérieure du labre, testacée ou d'un testacé fauve. *Palpes maxillaires* noirs ou d'un noir brun : deuxième et troisième articles souvent en partie fauves. *Antennes* prolongées environ jusqu'aux angles postérieurs du prothorax ; pubescentes ; noires, avec les troisième et quatrième articles parfois moins obscurs, presque égaux, une fois plus longs chacun qu'ils sont larges dans leur milieu : les suivants, comprimés : les cinquième à dixième, anguleusement dilatés et dentés au côté interne : le dernier, oblong, échancré dans la seconde moitié de son côté interne, et terminé en pointe. *Prothorax* anguleusement avancé dans le milieu de son bord antérieur ; un peu moins large à ce bord que la tête ; arqué sur les côtés, et offrant vers la moitié de ceux-ci sa plus grande largeur ; bissinué à la base, avec la partie médiaire de celle-ci plus prolongée en arrière, tronquée au devant de l'écusson, étendue jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes de la largeur de chaque élytre, subarrondie à ses angles postéro-externes ; sinué ou échancré de chaque côté de cette partie tronquée, offrant vers les trois quarts de la largeur de chaque étui, à partir de la suture, le point le plus avancé de ses sinuosités basilaires, sensiblement courbé en arrière aux angles postérieurs ; d'un tiers au moins plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; convexe ; revêtu de poils ou d'un duvet d'un cendré olivâtre, laissant, comme dénudées, trois taches d'un noir brun, brunes ou d'un brun fauve, savoir : une bande longitudinale assez large sur la ligne médiane, d'une longueur variable, n'atteignant ni le bord antérieur, ni la base : deux autres, subarrondies, situées une de chaque côté, entre la bande précitée et le bord externe, vers la moitié de sa longueur. *Ecusson* presque en carré plus large que long, échancré à son bord postérieur ; revêtu d'un duvet cendré blanchâtre. *Elytres* à peine aussi larges que le prothorax à ses angles postérieurs ; plus étroites aux épaules que celui-ci dans son milieu ; près de quatre fois aussi longues que lui sur les côtés ; deux fois à deux fois et quart aussi longues que lui sur son milieu ; faiblement rétrécies jusqu'aux sept huitièmes, obtusément arrondies chacune à l'extrémité ; deux fois à deux fois et quart aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble ; peu convexes ; ornées d'une sorte de duvet cendré olivâtre, comme il a été dit. *Repli* de deux tiers aussi large que chacun des postépisternums vers la moitié de la longueur de ceux-ci. *Pygidium* en cône subsinué vers les trois quarts.

assez robuste, termine en pointe étroitement tronquée; garni à la base de poils cendrés légèrement dorés, noir à l'extrémité; égal aux deux cinquièmes environ de la longueur d'une élytre. *Dessous du corps* noir ou d'un noir brun; garni de poils soyeux, d'un cendré olivâtre, légèrement dorés, laissant de couleur brune ou d'un noir brun, des espèces de taches sur les côtés de chacun des arceaux du ventre. *Postépisternums* obtriangulaires, rétrécis d'avant en arrière, un peu arqués à leur côté interne; deux fois et demie aussi longs qu'ils sont larges à la base. *Pieds* noirs; garnis d'un duvet cendré olivâtre ou cendré légèrement doré; jambes intermédiaires moins longues que les quatre premiers articles des tarses qui les suivent: pénultième article des tarses antérieurs entier.

Cette espèce paraît habiter la plus grande étendue des provinces de la France. Elle n'est pas rare dans les environs de Lyon, sur les parties desséchées des troncs des saules, des chênes et de diverses autres essences d'arbres. On la trouve également sur les ombelles.

Obs. Elle varie soit sous le rapport de la couleur, soit sous celui du dessin. Ainsi, les antennes sont quelquefois d'un brun tirant sur le fauve. Le duvet cendré se montre soit tirant sur le blanchâtre, soit sur le vert pâle, soit sur le gris ou d'autres fois prend une teinte mi-dorée. Les parties du prothorax qui semblent presque dénudées et constituent trois taches de la couleur du fond, passent parfois au brun ou même au brun fauve. Les bandes des élytres paraissent souvent dentées en avant et en arrière ou comme formées de deux ou trois lignes, courtes, inégales, liées ensemble. Souvent la bande antérieure est unie à la bordure suturale; d'autres fois elle en est isolée et constitue une sorte de gros point qui a fait donner le nom de *biguttata* à cette variété. D'autres fois, au contraire, l'espace de couleur obscure compris soit entre la bande du milieu et les parties antérieures de la bordure suturale, soit entre cette bande et la postérieure, est moins nettement limité, plus restreint, plus ou moins envahi par le duvet cendré. Enfin chez les individus composant la variété *sericea* de Ziegler, les élytres sont uniformément et densément revêtues de duvet cendré, depuis le bord antérieur de la bande du milieu, jusque plus ou moins près de l'extrémité, sans compter que la moitié antérieure de la bordure suturale s'est aussi un peu dilatée. Malgré toutes ces variations, cette espèce est facile à distinguer à la forme de son écusson et à celle du dernier article de ses antennes.

Genre *Mordella*, MORDELLE ; Linné (1).

(Étymologie (2) obscure.)

CARACTÈRES. *Tibias* et *tarses postérieurs* sans hachures sur leur arête dorsale. *Écusson* visiblement moins large que le tiers de la base d'une élytre ; en triangle, parfois plus ou moins obtus. *Antennes* de onze articles ; généralement dentées au côté interne, à partir du cinquième : le dernier ovalaire, arqué à son côté interne. *Tibias intermédiaires* aussi longs ou à peine moins longs que tous les articles réunis du tarse qui les suit.

A Yeux non contigus au bord postérieur de la tête : ce bord prolongé derrière ces organes jusqu'au niveau des angles antérieurs du prothorax. Elytres noires, à taches de duvet blanc.

1. *M. duodecim-punctata* ; Rossi. Noire ; pubescente. Prothorax orné d'une bordure de duvet blanc cendré, d'un point au devant de chaque cinquième externe de la base et de divers autres signes, d'un duvet semblable. Elytres parées chacune de six ou sept taches subponctiformes d'un duvet pareil : deux, à la base, près de l'écusson, divergentes postérieurement ou parfois réunies en arc : la troisième, sur le milieu de l'élytre, vers le cinquième de leur longueur : la quatrième, vers le quart, rapprochée du bord externe : les cinquième et sixième, formant avec leurs pareilles une bande transversale arquée en devant, vers les deux cinquièmes : la septième, sur le milieu de l'étui, un peu avant les trois quarts de sa longueur. Antennes noires. Ongles à cinq dents.

ETAT NORMAL. Elytres noires, garnies d'un duvet soyeux, concolore ; ornées chacune de sept taches la plupart subponctiformes, formées d'un duvet blanc ou blanc cendré ; les première et deuxième, liées ou à peu près à la base, à côté de l'écusson, unies à leur naissance, divergeant postérieurement : la première ou interne, servant de bordure à l'écusson et ordinairement prolongée du double de celui-ci : la

(1) Syst. Nat. (1758) t. 1. p. 420. — Id. (1767) t. 1. p. 682.

(2) Aristote (livre 3 chap. 19) avait donné le nom d'ἑρσδάκνη (qui mord fortement) à un insecte provenant d'un vers qui se métamorphose, après s'être formé dans la racine du chou. Gaza a traduit le nom grec par la dénomination latine *Mordella*, qui a été appliquée aux Coléoptères de ce genre, quoiqu'ils soient vraisemblablement différents de ceux mentionnés par le célèbre précepteur d'Alexandre.

deuxième, plus courte, tantôt paraissant ne faire qu'un avec la première et constituer avec elle une sorte d'arc couvrant presque la moitié de la largeur de la base de chaque élytre, tantôt formant avec la première l'image d'un V renversé : la troisième, ponctiforme ou ovale, située sur le milieu de l'élytre, vers le cinquième ou un peu plus de la longueur de celle-ci : la quatrième, plus petite, rapprochée du bord externe, vers le quart de la longueur des étuis ; les cinquième et sixième, constituant avec leurs pareilles une rangée transversale en arc dirigé en devant : la cinquième, ordinairement la plus grosse, ovale, rapprochée de la suture, vers les trois septièmes de la longueur de celle-ci : la sixième, ovale ou ponctiforme, souvent plus petite, plus postérieure de la moitié environ de sa longueur, située entre la cinquième et le bord externe : la septième arrondie, placée sur le milieu de chaque étui, un peu avant les trois quarts de la longueur de ceux-ci.

*Mordella 12-punctata*, Rossi, Faun. etrusc. t. 1. p. 243. 601. pl. 4. fig. 4. — *Id.* éd. Helw. t. 1. p. 299. 601. pl. 4. fig. 4. — Oliv. Entom. t. 3. n° 64. p. 5. 3. pl. 1. fig. 3. a, b, c, d. — Latr. Hist. nat. t. 10. p. 416. 3. — Schönn. Syn. ins. t. 3. p. 84. 6. — L. Redtenb. Faun. aust. p. 615.

*Mordella multipunctata*, Thörs, Kl. Beytr. p. 27. 283.

*Variations (par défaut).*

Var. A. *Elytres marquées seulement de quatre taches subponctiformes. de duvet blanc (en ne comptant les deux de la base que pour une seule).*

Obs. Ordinairement ce sont les quatrième et sixième qui font défaut ; quelquefois les deux premières et la quatrième

*Mordella perlata*, Sultz. Geschich. d. Ins. p. 67. pl. 7. fig. 14. (la figure indique cinq taches sur l'une des élytres, au lieu de 4.) — Foessel, Verzeich. p. 21. 402. — Hensst, in Bonow's Naturg. t. 6. p. 131. 1. pl. 29. fig. 1. 1. ou Kurz. Enleit. t. 1. p. 181. 1. pl. 29. fig. 1. — Gmel. C. Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 2025. 26. — Roemer, Gen. p. 51. 86. pl. 7. fig. 15. — Goeze, Faun. Eur. t. 3. p. 350. 6. — Oliv. Encycl. méth. t. 7. p. 740. 26.

*Mordella 8-punctata*, Schrank, Reise, 80. — *Id.* Faun. boic. t. 1. p. 571. 523.

Var. B. *Elytres ornées chacune seulement de trois taches de duvet blanc, (en ne comptant les deux de la base que pour une seule).*

*Mordella sex-punctata*, Hensst, Arch. p. 148. 1. — *Id.* trad. fr. p. 168. 5. — Gmel. C. Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 2024. 22. — Rossi, Faun. etrusc. t. 1. p. 243. 600. —



*Id.* Ed. HELW. t. 1. p. 299. 600. — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 340. 22. —  
 СВОИЯ. Syn. ins. t. 3. p. 84. 6.

Long. 0,0067 à 0,0090 (5 à 4 l.) Larg. 0,0017 à 0,0030 (3/4 à 1 2/3 l.)

*Corps* suballongé ; à fond noir ; garni d'un duvet soyeux. *Tête* subéchancrée ou en angle très-ouvert, dans le milieu de son bord postérieur : celui-ci, prolongé derrière la partie postérieure des yeux, jusqu'au niveau des angles antérieurs du prothorax ; ornée, à sa partie postérieure, d'une bordure d'un duvet cendré ; garnie sur le reste de sa surface d'un duvet semblable, moins rare et moins court sur la partie antérieure que sur celle qui la suit. *Palpes* et *antennes*, noirs : ces dernières, prolongées environ jusqu'aux angles postérieurs : deuxième à quatrième articles plus grêles : le deuxième, plus court que le suivant : les troisième et quatrième presque égaux ; les quatrième à dixième pubescents, comprimés, dilatés et dentés au côté interne : le onzième, oblong, dilaté en arc au côté interne. *Prothorax* avancé dans le milieu de son bord antérieur ; faiblement et obtusément arqué sur les côtés, un peu plus large aux angles postérieurs (qui sont émoussés) qu'aux antérieurs ; bissinué à la base, avec la partie médiaire plus prolongée en arrière, obtusément tronquée au devant de l'écusson, près de deux fois plus large que celui-ci et étendue jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes internes de chaque élytre ; sinué ou échancré entre ce lobe médiaire et les angles postérieurs qui sont un peu courbés en arrière, offrant vers le milieu de chaque étui le point le plus avancé de chaque sinuosité ; de moitié environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; convexe ; noir, garni d'un duvet court et concolore ; orné dans sa périphérie d'une bordure d'un duvet blanc cendré ; paré de divers signes ou dessins d'un duvet semblable, savoir : 1<sup>o</sup> deux sortes de parenthèses, unies bout à bout, de chaque côté de la ligne médiane, prolongées depuis le bord antérieur jusqu'aux trois quarts de sa longueur ; 2<sup>o</sup> de chaque côté de la première parenthèse, une bande transversale, arquée en arrière, formant avec la bordure antérieure un ovale transverse : 3<sup>o</sup> une tache ponctiforme, liée à la bordure basilaire, vers chaque cinquième externe de la base : ces dessins, souvent obli-  
 térés ou indistincts par suite de la dépilation. *Ecusson* presque en demi-cercle ou en triangle très-obtus et à côtés curvilignes, de moitié moins long qu'il est large à la base ; noir, garni d'un duvet concolore. *Elytres* à peine aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs, trois fois et demie aussi longues que lui sur les côtés ; deux fois et



quart aussi longues que lui sur son milieu ; sensiblement rétrécies d'avant en arrière, subarrondies chacune à l'extrémité ; une fois à une fois et quart plus longues qu'elles sont larges à la base prises ensemble ; peu convexes ; noires, garnies d'un duvet concolore, ornées chacune de six ou sept taches subponctiformes, d'un duvet blanc cendré, disposées comme il a été dit. *Pygidium* conique, étroitement tronqué à l'extrémité ; égal au moins aux deux cinquièmes ou aux trois septièmes de la longueur de chaque élytre ; noir, orné de deux taches basilaires formées de duvet blanc cendré, contiguës à la base, divergentes postérieurement ; une fois environ plus long que l'hypopygium. *Dessous du corps* noir, garni d'un duvet concolore, avec les postépisternums et une tache à la base de chacun des côtés des arceaux du ventre, d'un duvet blanc cendré. *Postépisternums* obtriangulaires, rétrécis d'avant en arrière, terminés en pointe obtuse ou obtusément tronquée, deux fois à deux fois et quart aussi longs qu'ils sont larges à la base ; en ligne droite à leur bord interne avec la partie antérieure de celui-ci un peu courbée en dedans. *Pieds* noirs : tarses intermédiaires à peine plus longs que la jambe : troisième et quatrième articles des tarses antérieurs et intermédiaires un peu élargis et sensiblement bilobés au moins en dessous : branche supérieure des ongles à cinq dents apparentes.

Cette espèce est assez rare en France. On la trouve dans les Alpes du Midi et dans quelques autres lieux. Elle a été prise dans les environs de Bordeaux par M. Perroud.

**Obs.** Le dessin du prothorax est souvent plus ou moins incomplet, par suite du frottement. Les taches des élytres varient un peu de grosseur : les quatrième et sixième sont parfois réduites à un point très-petit ou même disparaissent quelquefois ; néanmoins l'espèce est toujours facile à reconnaître à la largeur du lobe médian de la base du prothorax, à ses ongles à cinq dents, à sa taille très-différente de la *M. Gacognii*, qui présente les deux derniers caractères indiqués. Elle se reconnaît même entre toutes les espèces suivantes, quand même elle est complètement épilée, au bord postérieur de sa tête prolongé derrière les yeux jusqu'au niveau des angles antérieurs du prothorax, et empêchant ainsi aux yeux d'être contigus au bord antérieur de ce dernier segment.

**AA.** Yeux en partie au moins contigus par leur bord postérieur au bord antérieur du prothorax.

**B.** Repli des élytres au moins aussi large que chacun des postépisternums vers la moitié de leur longueur. Elytres noires, à taches guttiformes de duvet blanc.

**2. *M. maculosa* ; NAEZ.** Noire ou d'un noir brun ; pubescente. *Prothorax* offrant vers les trois septièmes de la base de chaque élytre le point le plus avancé de la sinuosité ; ordinairement paré d'une bordure basilaire formée d'un duvet blanc cendré. Élytres ornées d'une trentaine de gouttelettes d'un duvet semblable ; repli au moins aussi large que les postépisternums vers la moitié de leur longueur. Pygidium à peine aussi long que le tiers des étuis : hypopygium d'un tiers plus court que ce dernier.

*Mordella maculosa*, NAEZ. Act. Holm. (1794) p. 273. pl. fig. 4. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 613.

*Mordella guttata*, PATK. Faun. suec. t. 2. (1798) p. 486. 4. — GYLL. Ins. suec. t. 2. p. 607. 4. — *Id.* t. 4. p. 520. — SAHLB. Ins. fenn. p. 486. 4.

*Mordella atomaria*, FAB. Syst. Eleuth. t. 2. p. 123. 12. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 85. 26. — ZETTERS. Faun. lapp. p. 268. 2. — *Id.* Ins. lapp. p. 165. 2. — STEPH. Man. p. 265. 4.

*Mordella irrorata*, TROST, Kl. Beytr. p. 27. 282.

Long. 0,0053 à 0,0015 (1 1/2 à 2 l.) Larg. 0,0009 à 0,0017 (2/5 à 4/5 l.)

*Corps* oblong ; à fond noir, garni d'un duvet soyeux. *Tête* faiblement échancrée en arc dans la moitié médiaire de son bord postérieur ; noire ou d'un noir brun, garnie d'un duvet court et obscur : bord antérieur de l'épistome et labre d'un fauve testacé. *Palpes maxillaires* fauves ou en partie d'un fauve testacé, avec le dernier article d'un fauve foncé. *Antennes* presque aussi longuement prolongées que les angles postérieurs du prothorax ; d'un noir brun, avec les quatre premiers articles parfois un peu moins obscurs : ces articles plus étroits que les suivants : les premier et deuxième, subcylindriques, plus épais : le deuxième, plus court que le troisième : celui-ci et le quatrième, obtriangulaires, presque égaux : les cinquième à dixième, comprimés, peu pubescents, dilatés et dentés au côté interne : le onzième, subarrondi au même côté. *Prothorax* un peu anguleusement avancé dans le milieu de son bord antérieur ; obtusément arqué sur les côtés ; plus large aux angles postérieurs qui sont émoussés, qu'aux antérieurs ; bissinué à la base, avec la partie médiaire plus prolongée, obtusément arquée en arrière jusqu'à la sinuosité, obtusément tronquée au devant de l'écusson qu'elle débordé de chaque côté de la moitié de la largeur de celui-ci à la base : cette partie médiaire étendue environ jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes de la largeur de chaque élytre ; offrant vers les trois septièmes ou vers la moitié de

la base desdits étuis le point le plus avancé de la sinuosité, faiblement arqué en avant en dehors de ce point, c'est-à-dire sur les côtés de sa base; de moitié environ plus large à celle-ci qu'il est long sur son milieu; convexe; d'un noir brun; garni d'un duvet brun, court et soyeux; ordinairement paré, à la base et un peu sur les côtés, d'une bordure étroite d'un duvet blanc cendré, et marqué de deux bandes longitudinales d'un duvet pareil, raccourcies en avant, situées chacune vers le tiers de la largeur et le faisant paraître en partie d'un cendré blanchâtre, marqué de trois taches d'un brun noir. *Ecusson* obtusément triangulaire; une fois plus large à la base qu'il est long sur son milieu; revêtu d'un duvet cendré. *Elytres* un peu moins larges en avant que le prothorax à sa base; quatre fois environ aussi longues que celui-ci sur les côtés; faiblement rétrécies d'avant en arrière; obtusément arrondies chacune à l'extrémité; de trois quarts aussi larges vers les sept huitièmes qu'à la base; moins de deux fois aussi longues qu'elles sont larges à la base prises ensemble; peu convexes; noires ou d'un noir brun; garnies d'un duvet brun, court et soyeux; parsemées chacune d'une trentaine au moins de petites gouttes formées d'un duvet blanc cendré: ces taches, un peu inégales, irrégulièrement disposées: quelques-unes rangées ordinairement d'une manière sériale sur la strie juxta-suturale: quatre autres, habituellement disposées en une rangée obliquement transversale, dirigée de la moitié de la suture vers les deux tiers du bord externe. *Repli* au moins aussi large que les postépisternums, vers la moitié de la longueur de ceux-ci. *Pygidium* brun; conique, robuste, très-étroitement tronqué à l'extrémité; à peine aussi longuement prolongé depuis le quatrième arceau ventral que le tiers de la longueur des étuis. *Hypopygium* égal aux deux tiers de la longueur du pygidium. *Dessous du corps* noir ou noir brun, garni d'un duvet court et brun cendré ou brun fauve. *Postépisternums* obtriangulaires, terminés en pointe; en ligne presque droite ou à peine arquée à leur côté interne; deux fois à deux fois et quart aussi longs qu'ils sont larges à la base. *Pieds* noirs, garnis d'un duvet brun très-court: avant-dernier article des tarsi antérieurs un peu plus étroit, à peine échancré en dessus. *Ongles* peu distinctement dentés à leur branche supérieure.

Cette espèce habite les parties froides de la France. On la trouve à la Grande-Chartreuse, sur les planches, près des scies à eau, sur les troncs des arbres morts et quelquefois sur les fleurs.

**Obs.** Le prothorax semble parfois presque entièrement noir ou d'un noir brun, ou peu distinctement paré d'une bordure basilaire cen-

drée ; souvent les deux petites bandes longitudinales sont indistinctes ; d'autres fois, au contraire, il est comme poudré de cendré par l'effet des poils duveteux de cette teinte. Les taches des élytres varient de teinte et même de nombre par la disparition de quelques-unes.

Malgré les variations que peut offrir cette espèce, elle peut se reconnaître, même chez les individus dénudés, à la forme du lobe médian de la base du prothorax, à la brièveté du pygidium, à la longueur proportionnelle de l'hypopygium, et surtout à la largeur du repli des élytres vers le milieu de la longueur des postépisternums.

A cette division appartient l'espèce suivante, que j'ai reçue de M. le docteur Hampe sous le nom de

**M. albo-signata.** Oblongue ; noire, pubescente. Prothorax bordé de cendré à la base. Elytres ornées d'une courte ligne suturale, et chacune d'une rangée de trois taches disposées en arc de cercle depuis l'épaule jusqu'au cinquième de la suture ; d'une autre tache près du cinquième du bord extérieur, et d'une bande (raccourcie à ses extrémités), située vers le milieu de leur longueur, formées de duvet cendré. Repli au moins aussi large que chacun des postépisternums vers leur moitié. Pygidium à peine plus long qu'il est large à la base.

*Mordella albosignata* (Dex.) Catal. (1821) p. 73. — *Id.* (1837) p. 241.

Long. 0,0036 (1 2/3 l.) Larg. 0,0013 (2/3 l.)

Corps oblong ; noir ; garni de poils soyeux, fins, couchés. Tête offrant son bord postérieur à peine prolongé derrière les yeux jusqu'à la moitié de la largeur de ceux-ci ; noire ; garnie d'un duvet brun marron ou brun grisâtre. Palpes obscurs. Antennes brunes ou d'un brun noir ; à deuxième article court : les troisième et quatrième, grêles, presque égaux : les cinquième à dixième, dilatés et dentés à leur côté interne. Prothorax subarrondi ou très-émoussé aux angles postérieurs ; une fois environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; bispinué à son bord postérieur, avec la partie médiane de celle-ci plus prolongée en arrière, en arc très-obtus ou obtusément tronqué au devant de l'écusson, qu'elle déborde de chaque côté de près de la moitié de sa largeur, étendue jusqu'au tiers interne des élytres, subarrondie à ses angles postérieurs ; offrant le point le plus marqué des sinuosités en angle très-ouvert, correspondant aux deux



cinquièmes internes de la largeur de chaque élytre, à peu près en ligne transversalement droite, en dehors de chaque sinuosité; déprimé au devant de chacune de celles-ci; convexe; noir, garni de poils soyeux, bruns ou d'un brun fauve; orné à la base et un peu sur les côtés d'une bordure étroite cendrée ou d'un cendré fauve. *Ecusson* en triangle obtus, près d'une fois plus large que long; garni de poils cendrés. *Elytres* faiblement rétrécies d'avant en arrière; obtusément arrondies chacune à l'extrémité; deux fois ou deux fois et un sixième plus longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble; peu convexes; noires; garnies de poils soyeux, couchés, concolores; ornées d'une courte ligne suturale, de quatre ou cinq taches, et d'une sorte de bande raccourcie, formées d'un duvet blanc cendré: la ligne suturale, étroite, prolongée environ jusqu'au cinquième de leur longueur: trois ou quatre lignes courtes, disposées en arc de cercle, depuis l'épaule jusque vers la suture, vers le cinquième ou le quart de leur longueur: la ligne ou tache humérale paraissant tantôt unique, tantôt divisée en deux; offrant en outre près du bord externe, vers le cinquième de leur longueur, une tache subponctiforme: la bande, située vers le milieu de leur longueur ou peu après, échancrée dans son milieu, raccourcie à ses deux extrémités, paraissant composée de deux taches ovalaires ou subarrondies unies ensemble. *Repli* au moins aussi large que chacun des postépisternums vers la moitié ou les quatre septièmes de la longueur de ceux-ci. *Pygidium* conique, robuste, en triangle presque équilatéral ou d'un sixième plus long qu'il est large à la base; terminé en pointe très-étroitement tronquée; noir, garni à la base de poils cendrés; dépassant d'un cinquième à peine de sa longueur l'hypopygium. *Dessous du corps* noir; garni d'un duvet brun fauve ou brun grisâtre. *Postépisternums* rétrécis d'avant en arrière; terminés en pointe; un peu arqués à leur côté externe; trois fois et demie environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. *Pieds* noirs; pubescents: hanches postérieures subparallèles au bord du premier arceau jusqu'aux deux tiers externes de l'espace compris entre la ligne médiane et le bord extérieur, de moitié environ plus longues près de celui-ci que l'espace compris entre leur partie postéro-externe et le bord postérieur du premier arceau ventral.

**PATRIE**: la Styrie.

BB. Repli des élytres à peine égal à la moitié de la largeur des postépisternums, vers la moitié de la longueur de ceux-ci.

C. Elytres noires, ornées de divers signes d'un duvet blanc, flave ou cendré.



3. *M. Gacognii*; Mulsant. Corps noir ou d'un noir bleuâtre ; pubescent. Tête et prothorax revêtus d'un duvet blanc cendré. Elytres ornées de divers signes d'un duvet semblable : 1° une tache ou bande basilaire, étendue depuis la suture jusqu'au calus, couvrant le tiers de la suture, bidentée à son bord postérieur, enclosant dans son milieu une pupille noire; 2° une lanière naissant de l'épaule, prolongée jusqu'aux deux cinquièmes ou à la moitié de leur longueur; 3° deux taches elliptiques, soit isolées, soit unies en forme de bande courte, vers les trois cinquièmes de leur longueur; 4° une bordure suturale n'atteignant pas l'extrémité. Antennes noires. Post-épisternums tronqués à l'extrémité. Ongles à cinq dents.

♂. Tibias antérieurs légèrement arqués. Pygidium au moins aussi long que la moitié des élytres.

♀. Tibias antérieurs droits. Pygidium un peu moins long que la moitié des élytres.

*Mordella Gacognii*, E. Mulsant, in Ann. de la Soc. Linn. de Lyon (1850-52) p. 49.  
— Mulsant, Opusculs entomol. 1<sup>er</sup> cahier p. 57.

Long. 0,0067 à 0,0100 (3 à 4 1/2 l.) Larg. 0,0022 à 0,0053 (1 à 1 1/2 l.)

Corps assez (♂) ou médiocrement (♀) étroit ; à fond noir, garni de poils soyeux et couchés. Tête échancrée dans le milieu de son bord postérieur : celui-ci, à peine prolongé jusqu'à la moitié du bord postérieur des yeux ; noire, garnie d'un duvet cendré, légèrement doré. Palpes maxillaires à deuxième et troisième articles fauves ou d'un brun fauve ; le dernier, noir. Antennes prolongées à peine jusqu'aux angles postérieurs du prothorax ; noires ; pubescentes ; à deuxième article subcylindrique, assez épais, plus court que le troisième : les troisième et quatrième, plus étroits que les suivants, peu élargis de la base à l'extrémité : les cinquième à dixième, comprimés, dilatés et dentés au côté interne : le dernier, rétréci vers l'extrémité. Prothorax anguleusement avancé dans le milieu de son bord antérieur ; à peu près de la largeur de la tête en devant ; arqué sur les côtés, offrant vers la moitié de ceux-ci sa plus grande largeur ; un peu plus large aux angles postérieurs, qui sont courbés en arrière, qu'aux antérieurs ; bispinué à la base, avec la partie médiane plus prolongée en arrière, obtusément tronquée au devant de l'écusson, qu'elle débordé de chaque côté, de une fois à une fois et demie la largeur de celui-ci à la base, étendue jusqu'au tiers de la largeur de chaque élytre ; offrant

vers les trois quarts de la largeur de celles-ci, à partir de la suture, le point le plus avancé de chaque sinuosité; de deux tiers ou de trois quarts plus large à la base qu'il est long sur son milieu; convexe; noir; garni de poils fins, soyeux, couchés, d'un cendré luisant ou légèrement doré, laissant comme dénudées ou de couleur foncière, trois taches noires: l'une, sur la ligne médiane, élargie d'avant en arrière, prolongée depuis la moitié ou le cinquième de sa longueur, plus rarement depuis la base, jusque près du bord postérieur: chacune des autres, subarrondie ou ovale, située, vers les trois cinquièmes de sa longueur, entre la précédente et le bord externe, parfois très-réduite ou peu marquée. *Ecusson* en triangle presque équilatéral; revêtu d'un duvet cendré, légèrement doré. *Elytres* à peine aussi larges en devant que le prothorax à sa base; quatre fois environ aussi longues que celui-ci sur les côtés; deux fois et demie aussi longues que ce dernier sur son milieu; graduellement rétrécies jusqu'aux sept huitièmes, subarrondies chacune à l'extrémité; deux fois (♂) ou un peu moins de deux fois (♀) aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble; presque planes ou peu convexes; marquées d'une fossette humérale; noires, garnies de poils soyeux, fins et couchés, de même couleur; parées chacune de divers signes formés de poils ou d'un duvet blanc cendré, savoir: 1<sup>e</sup> une tache ou sorte de bande basilaire, étendue depuis la suture jusqu'à la fossette humérale ou jusqu'au côté interne du calus huméral, couvrant sur la suture le tiers antérieur de celle-ci, à peine prolongée jusqu'au quart de leur longueur à son angle postéro-externe, ordinairement bidentée dans la moitié interne de son bord postérieur, enclosant dans son milieu une pupille noire, couvrant du quart environ à la moitié de la largeur des étuis, à peu près aussi rapprochée de la base que de la suture: 2<sup>e</sup> une sorte de lanière ou bande étroite, naissant de l'épaule, couvrant jusqu'au sixième ou au cinquième du bord externe, dont elle s'éloigne ensuite subgraduellement, prolongée jusqu'à la moitié de leur longueur, vers les trois cinquièmes de leur largeur à partir de la suture: 3<sup>e</sup> deux taches elliptiques, oblongues ou subponctiformes, parfois isolées, surtout chez le ♂, souvent réunies et constituant alors une sorte de bande transversale, raccourcie à ses deux extrémités, c'est-à-dire n'arrivant ni à la suture, ni au bord externe, située vers les trois cinquièmes de leur longueur, plus ou moins fortement échancrée ou entaillée dans le milieu de ses bords antérieur et postérieur: 4<sup>e</sup> une bordure suturale confondue d'abord avec la bande basilaire, réduite ensuite au rebord, jusqu'à

la bande transversale, un peu moins étroite après celle-ci, n'arrivant pas à l'extrémité. *Repli* égal environ à la moitié de la largeur des postépisternums, vers la moitié de la longueur de ceux-ci. *Pygidium* allongé en cône, à pointe tronquée ou obtusément tronquée à l'extrémité; de moitié au moins (♂) ou près de moitié (♀) aussi long que les élytres; noir, à base cendrée. *Dessous du corps* noir, luisant; garni de poils soyeux, noirs, sur la majeure partie de sa surface, d'un cendré légèrement doré à la base du médipectus, sur les postépisternums, sur la partie médiane des hanches postérieures, sur la moitié antérieure du bord externe des arceaux du ventre, et à la base de chaque arceau, entre la tache latérale et la ligne médiane. *Postépisternums* rétrécis d'avant en arrière, tronqués à l'extrémité; aussi larges à celle-ci que la moitié de leur base; en ligne droite à leur côté interne; près de quatre fois aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. *Pieds* noirs; garnis d'un duvet soyeux, cendré sur les cuisses, sur les jambes antérieures au moins et ordinairement à la base des tarses: jambes postérieures ponctuées sur leur arête dorsale: éperon, desdites jambes, noirs: branche supérieure des ongles armée de cinq ou six fortes dents.

Cette belle espèce, la plus grande de celle de notre pays, a été découverte en 1851, dans les environs de Lyon, par mon ami M. Gacogne à qui je l'ai dédiée. Elle a également été prise, dans le même été, près de Digne, par M. Perroud et par mon fils l'abbé Victor Mulsant. La belle collection de M. Reiche en possède un exemplaire provenant des Pyrénées; je l'ai vue aussi dans celle de M. de Marseul.

**Obs.** Elle se distingue de la *M. 12-punctata* par le bord postérieur de sa tête prolongé à peine jusqu'à la moitié interne du bord postérieur de ses yeux; par le dessin de ses élytres: par ses étuis proportionnellement plus rétrécis; par sa taille. Elle s'éloigne généralement de toutes les suivantes avec lesquelles elle a quelque analogie, par sa grandeur; par ses antennes entièrement noires; par ses postépisternums obtusément tronqués à l'extrémité, en ligne droite à leur côté interne, etc.

Voici la description de sa larve:

**LARVE** suballongée; hexapode; de douze anneaux, non comprise la tête; presque d'égale largeur depuis le premier jusqu'au dixième; médiocrement convexe. *Tête* d'un tiers au moins plus étroite que le premier segment; perpendiculaire ou inclinée; convexe sur sa partie postérieure; parsemée de poils indistincts à la vue: d'un blanc

inégalement roussâtre ; rayée d'une ligne longitudinalement médiane, naissant du bord postérieur, prolongée jusqu'à la partie antérieure du front. *Labre* apparent. *Mandibules* fortes ; larges : d'un rouge testacé à la base, noires et cornées à l'extrémité. *Mâchoires* et *menton* prolongés à leur partie basilaire à peu près jusqu'au bord antérieur du premier segment : les *mâchoires* à un lobe, coriace à l'extrémité, garni à son côté interne de poils en partie spinosules. *Palpes maxillaires* assez courts ; coniques ; composés de trois articles. *Palpes labiaux* coniques ; de deux articles. *Antennes* situées après la base des mandibules ; courtes, composées de quatre articles en partie rétractiles : le dernier, terminé par une ou deux soies. *Yeux* représentés par trois points noirs, disposés sur une ligne longitudinale commençant au bord externe postérieur de la base des antennes. *Corps* d'un blanc livide ; marqué d'une ligne longitudinale médiane : à premier anneau ou prothoracique, en ovale transverse ; deux fois et quart aussi large que long, à peu près aussi grand que les deux suivants réunis ; offrant de chaque côté de sa partie médiane, près du bord postérieur, deux espaces presque indistinctement ruguleux, souvent jaunâtres ; anneaux suivants offrant des sections assez marquées sur les côtés ; montrant chacun jusqu'au onzième, entre la ligne médiane et les côtés, un point paraissant pouvoir se relever en saillie à peine distinctement tuberculeuse, pour servir à la progression de l'animal : les quatrième à dixième segments offrant sur les côtés une sorte de bourrelet longitudinal : les onzième et douzième, graduellement rétrécis ; presque en forme de cône : le douzième terminé en pointe noire, cornée, faiblement courbée en haut et bifide à son extrémité, hérissé vers sa base de poils, qui se transforment graduellement vers l'extrémité en aspérités cornées ou subcornées, de couleur brune : ce dernier segment muni en dessous d'une partie exsertile, pour faciliter les mouvements de l'animal. *Dessous du corps* plus livide que le dessus ; offrant sur la plupart des anneaux abdominaux une partie transverse un peu saillante ou susceptible de le devenir plus ou moins pour favoriser la progression : partie prosternale obtriangulaire, garnie de poils assez fins. *Pieds* coniques ; courts ; composés de quatre pièces : la dernière dépourvue d'ongles et terminée par quelques poils. *Stigmates* au nombre de neuf paires : la première ou thoracique, moins petite, située à la partie antéro-externe de la base de la deuxième paire des pieds, sur les limites des premier et deuxième segments et sur le bord inférieur de la ligne longitudinale servant à séparer les arceaux supérieurs



des inférieurs : les autres sur les quatrième à dixième arceaux , au-dessus de la boursoufflure qui forme une sorte de bord latéral.

Cette larve a été prise en assez grand nombre, par M. Gacogne et par moi, dans les parties pourries d'un peuplier mort et couché sur le sol, dans les environs de Givors (Rhône). Vers le commencement de juin elle se change en nymphe, et, dix à quinze jours après, en insecte parfait.

4. *M. fasciata* ; FABRICIUS. Noire, pubescente. Elytres ornées d'une bordure suturale étroite, et chacune de deux bandes transverses formées d'un duvet cendré, parfois cendré mi-doré. La bande antérieure, basilaire, enclosent ordinairement une pupille noire, oblique ; soit entière à son bord postérieur, soit raccourcie au côté interne de ce bord, soit formée de lignes courtes et isolées. La postérieure, couvrant de la moitié aux deux tiers de leur longueur, soit transverse, soit raccourcie à ses extrémités. Bord de la tête prolongé derrière les yeux jusqu'à la moitié de la largeur de ceux-ci. Antennes en partie testacées à la base.

ETAT NORMAL. Elytres noires, garnies sur une partie de leur surface de poils de même couleur, fins, soyeux et couchés ; ornées chacune d'un duvet cendré, cendré flavescent ou cendré mi-doré, constituant une bordure suturale et deux bandes transversales sur chaque élytre : la bordure suturale prolongée à peu près jusqu'à l'extrémité ou presque jusqu'à elle, deux fois environ plus large, sur chaque élytre, que le rebord sutural entre la première et la deuxième bande, rétrécie plus ou moins après celle-ci et parfois raccourcie à son extrémité. La bande antérieure, couvrant la base, le tiers ou parfois les deux cinquièmes de la suture, le cinquième environ de la longueur du bord externe, plus longuement prolongée en arrière à son bord postérieur, vers les deux cinquièmes de la largeur de chaque élytre à partir de la suture, anguleuse dans ce point et souvent munie en outre d'une dent près de la suture ; enclosant une pupille noire, soit presque d'égale largeur, soit ovale ou plutôt piriforme, naissant près de la base, vers la moitié ou un peu plus de la largeur de chaque étui, mais anguleusement dilatée jusqu'aux trois cinquièmes ou aux deux tiers de la largeur de ceux-ci, vers le tiers de la longueur de son bord externe, obliquement dirigée de dehors en dedans, convergeant vers le neuvième ou le huitième de la suture, dont elle reste aussi distante que de la base. La bande postérieure, couvrant depuis la moitié jusqu'aux deux tiers ou un peu plus de leur longueur, ordinairement



un peu ou à peine isolée de la bordure suturale, transversalement ou presque transversalement étendue jusqu'aux sept huitièmes ou huit neuvièmes de la largeur, habituellement entaillée à son bord antérieur près de la bordure suturale, souvent brièvement denticulée vers chaque extrémité de son bord postérieur ou entaillée dans le milieu de celui-ci. Partie perpendiculairement déclive de leur bord externe, garnie d'un duvet cendré ou cendré mi-doré, constituant une sorte de languette, dirigée en arrière, liée en devant à la bande basilaire.

*Mordella aculeata*, var. LINN. Faun. suec. p. 228. 832. — *Id.* Syst. Nat. t. 1. p. 682. 2. var. — PODA, Ins. Mus. græc. p. 47. var. — SULTZ. Kennz. d. Ins. p. 77. pl. 7. fig. 46. a. — DE VILL. C. LINN. Entom. t. 1. p. 406. 2. var.

*La Mordelle striée à points*, GEOFF. Hist. abr. t. 1. p. 354. 2.

*Mordella fasciata*, FABR. Sys. entom. p. 265. 6. — *Id.* Spec. ins. t. 1. p. 335. 8. — *Id.* Maut. t. 1. p. 218. 12. — *Id.* Ent. syst. t. 1. 2. p. 113. 2. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 122. 5. — SCHAEFF. Icon. pl. 127. fig. 7. — HERBST, in FUERSSLY's Arch. p. 148. 2. — *Id.* trad. fr. p. 167. 1. — GUEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 2023. 16. — ROSSI, Faun. etr. t. 1. p. 243. 599. — *Id.* éd. HELW. t. 1. p. 298. 599. — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 738. 12. — *Id.* Entom. t. 5. n° 64. p. 4. 2. pl. 1. fig. 2. a, b. — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. (1818) t. 21. p. 364. — PANZ. Entom. germ. t. 1. p. 212. 2. — CUV. Tabl. élém. p. 543. — BRAHM, Ins. Kal. t. 1. p. 155. 493. — MARSH. Entom. brit. p. 438. 2. — SCHRANK, Faun. boïc. t. 1. p. 572. 724. — TROST, Kl. Beytr. p. 27. 280. — WALKER, Faun. par. t. 1. p. 174. 5. — TICNY, Hist. nat. t. 7. p. 252. — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 415. 2. pl. 91. fig. 1. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 83. 5. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 425. 2. — SAMOELLE, The entomol. usef. p. 60. 197. pl. 4. fig. 5. — DUMÉRIL, Dict. des sc. nat. t. 32. p. 515. 2. pl. 15. livr. ou cah. 43. fig. 5. — FISCHER, Entomogr. t. 1. p. 222. 5. — MULS. Lettr. t. 2. p. 294. 2. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 50. 10. — *Id.* Man. p. 334. 2621. — CURTIS, Brit. entom. t. 11. 465. — WESTWOOD, Introd. to the mod. class. p. 292. pl. 36. fig. 6. 7 détails. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 265. 2. — L. DEY. Excurs. p. 72. 452. — LUCAS, Explor. p. 385. 996. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 614. — GEBLER, Verz. (1848) p. 291. 5. — PONEM. Mém. de l'Acad. de Stock. (1849), p. 222. — KESTER, Kaef. Europ. 9. 79.

*Mordella iriformis*, FOURC. Entom. paris t. 1. p. 161. 2. — DE VILLELS, C. LINN. Entomol. t. 1. p. 408. 8.

Obs. La plupart des descriptions ci-dessus ne mentionnent pas la pupille noire de la bande antérieure des élytres.

Long. 0,0056 à 0,0090 (2 1/2 à 4 l.) Larg. 0,0015 à 0,0026 (2/3 à 1 1/5 l.)

*Corps* suballongé ; peu (♀) ou médiocrement (♂) étroit ; à fond noir ou d'un noir brun. *Tête* en angle très-ouvert à son bord posté-

rieur; garnie de poils fins, couchés, soyeux, cendrés ou mi-dorés à certain jour. *Palps maxillaires* habituellement d'un brun noir, parfois fauves ou d'un fauve testacé sur leurs articles intermédiaires, plus rarement fauves, avec l'extrémité brune. *Antennes* prolongées environ jusqu'aux angles postérieurs du prothorax; pubescentes; noires ou brunes, avec les trois ou quatre premiers articles et une partie basilaire des suivants jusqu'au septième, d'un fauve testacé ou testacés, quelquefois avec les deuxième à quatrième bruns ou obscurs à l'extrémité, et les suivants entièrement noirs ou d'un noir cendré: à deuxième article plus court que le suivant: les troisième et quatrième presque égaux, au moins aussi longs que le suivant: les cinquième à dixième plus larges, comprimés, dentés au côté interne: le onzième oblong. *Prothorax* anguleusement avancé dans le milieu de son bord antérieur; à peine arqué sur les côtés; bissinué à la base, avec la partie médiale plus prolongée en arrière, obtusément tronquée ou subarrondie, débordant l'écusson de chaque côté, de près de la moitié de la largeur de celui-ci; offrant vers les trois cinquièmes de la largeur de chaque élytre le point le plus avancé de ses sinuosités; à peine courbé en arrière ou presque en ligne transversale droite en dehors de chaque sinuosité; près d'une fois plus large à la base qu'il est long sur son milieu; convexe; noir, couvert d'un duvet cendré ou cendré mi-doré, plus serré sur les côtés et surtout à la base; offrant souvent les traces plus ou moins distinctes d'une bande longitudinale peu nettement limitée, et, de chaque côté de celle-ci, d'une tache subarrondie, obscures. *Écusson* rétréci d'avant en arrière, obtusément tronqué à l'extrémité; plus large à la base qu'il est long sur son milieu: noir, revêtu d'un duvet cendré mi-doré. *Elytres* près de quatre fois aussi longues que le prothorax sur ses côtés; rétrécies d'avant en arrière; à peine aussi larges vers les cinq sixièmes de leur longueur que les deux tiers de leur base; deux fois (♀) ou deux fois et quart (♂) aussi longues qu'elles sont larges à la base (prises ensemble); obtusément arrondies à l'extrémité; peu convexes; noires; garnies d'un duvet soyeux et concolore sur une partie de leur surface; ornées d'un duvet cendré mi-doré constituant une bordure suturale, et, sur chacune, de deux bandes, comme il a été dit. *Repli* aussi large que le tiers des postépisternums, vers le milieu de la longueur de ceux-ci. *Pygidium* conique, aussi long que la moitié environ (♂) ou les deux cinquièmes (♀) d'une élytre; noir, avec la base cendrée. *Dessous du corps* noir ou d'un noir brun, revêtu d'un duvet cendré mi-doré, avec l'extrémité de l'hypopygium et souvent quelques autres parties

obscur ou noir. *Postépisternum* rétréci d'avant en arrière, terminé en pointe parfois un peu obtuse ; un peu arqués à leur côté interne ; deux fois (♀) à deux fois et quart (♂) aussi longs qu'ils sont larges à la base. *Pieds* noirs ou d'un noir brun, garnis d'un duvet cendré mi-doré : jambes et tarses des pieds postérieurs sans hachures.

Cette espèce paraît commune dans toutes les parties de la France. On la trouve sur divers arbres morts ou desséchés tels que chênes, peupliers, saules, et sur diverses fleurs, principalement celles en ombelles.

Obs. Elle offre des variations nombreuses.

1° Sous le rapport de la couleur :

Les *antennes* ont ordinairement leurs trois premiers articles testacés, ou d'un fauve ou flave testacé ; quelquefois plusieurs des articles suivants ou même les sept premiers articles sont de la même couleur, avec les trois ou quatre derniers de ceux-ci bruns à l'extrémité ; d'autres fois, au contraire, les trois premiers articles ne présentent la couleur testacée que sur une partie de leur longueur, et les suivants sont bruns ou noirâtres.

Les *palpes maxillaires* se montrent quelquefois testacés ou d'un fauve testacé, avec l'extrémité ou la dernière moitié du dernier article, noire ou brune.

Les *tibias antérieurs* sont parfois entièrement testacés et quelquefois d'autres parties des mêmes pieds ou des suivants, paraissent se rapprocher plus ou moins de la même teinte.

Les *épérons* des *tibias* postérieurs, ordinairement testacés, se montrent parfois obscurs ou bruns.

2° Sous le rapport du dessin :

Le *prothorax* est souvent assez densément garni de poils couchés, soyeux, cendrés, ou d'un cendré tirant sur le fauve, le flavescent ou le mi-doré, et dont la teinte varie suivant la manière dont on regarde l'insecte. Ordinairement, ce segment prothoracique offre sur la surface trois régions ou sortes de taches obscures : l'une, sur la ligne médiane ; une autre, de chaque côté de celle-ci : d'autres fois les poils cendrés sont moins apparents, si ce n'est à la base et sur les côtés.

Les *élytres* offrent des variations plus remarquables :

*Variation des élytres (par défaut).*

Var. α. Bande antérieure des *élytres* très-incomplète, réduite à une tache scutellaire obtriangulaire, et à une ligne longitudinalement oblique,

naissant vers l'épaule et prolongée jusqu'à la seconde bande ou presque jusqu'à la seconde bande, qui elle-même est raccourcie.

*Mordella briantea*, (VILLA), COMOLLI, De Coleopt. nov. ac rarior. p. 28. 60. — VILLA, Catal. (1844) p. 49. .

Var.  $\beta$ . Bande antérieure des élytres incomplète, non prolongée jusqu'à la suture ou à la bordure suturale, dans le tiers ou plus de son bord postéro-interne, laissant ainsi la papille incomplètement close dans cette partie.

La seconde bande est le plus souvent aussi alors raccourcie.

*Mordella fasciolata*, Rossi, Mantiss. t. 2. 103. 68 ?

*Mordella fasciata*, Var.  $\beta$ . SCHÖNH. Syn. ins. t. 3. p. 84 ?

*Mordella interrupta*, A. COSTA, Faun. del Regn. di. Napol. (*Mordellidées*) p. 13. 3. pl. 20. fig. 3. (type).

Obs. La bande antérieure peut être ainsi incomplète par deux causes très-différentes : 1<sup>o</sup> par suite de dépilation, quand les poils ont été enlevés par le frottement : 2<sup>o</sup> par changement de couleur, quand les poils cendrés qui forment cette bande ont été en partie remplacés par des poils obscurs. Dans le premier cas, l'état incomplet est accidentel : dans le second, il constitue une variété.

On trouve si communément toutes les transitions entre cet état incomplet et l'état normal, qu'il est difficile de considérer la *M. interrupta* comme constituant une espèce particulière.

Le duvet est souvent d'un cendré rougeâtre ou presque doré.

Var.  $\gamma$ . Bande antérieure incomplète, au moins dans sa partie postérieure, et formée de trois courtes lignes longitudinales isolées les unes des autres ; la plus externe, naissant de l'épaule où elle se lie avec l'espèce de languette de duvet située sur la partie déclive des élytres : cette ligne humérale se prolonge jusqu'au cinquième ou au quart de la longueur des étuis, en obliquant en dedans : la médiaire naît au niveau de la moitié de la longueur de la précédente et se prolonge plus qu'elle en arrière, de la moitié de sa longueur : la plus interne, naissant à peu près sur la même ligne que la médiaire est un peu plus courte surtout en arrière et se lie ordinairement à la bordure suturale. La bande postérieure est plus ou moins isolée de la bordure suturale, et paraît souvent formée de quelques lignes longitudinales courtes, unies entre elles.

Quelquefois la ligne humérale s'étend à la base jusqu'à l'écusson ;

d'autres fois il ne reste de la bande basilaire qu'une tache scutellaire obtriangulaire et les trois lignes longitudinales ci-dessus indiquées.

Var.  $\delta$ . Semblable à la précédente, mais offrant de plus les élytres dépourvues de bordure suturale après la bande basilaire.

*Mordella coronata*, A. COSTA, Faun. del Regn. di Napol. (*Mordellidées*) p. 11. 1. pl. 20. fig. 2. (type).

Dans l'exemplaire typique obligeamment communiqué par M. Costa, la bande antérieure est réduite, comme chez divers exemplaires de la variété précédente, à une tache scutellaire obtriangulaire et aux trois sortes de lignes indiquées : ces lignes sont nettement limitées et parfaitement isolées les unes des autres. La bordure suturale manque après la tache scutellaire. La bande postérieure raccourcie à ses deux extrémités est formée de deux ou trois lignes longitudinales courtes, inégales, unies ensemble.

Dans la collection de notre ami M. Guillebeau, nous avons vu un exemplaire semblable, trouvé dans nos environs; un autre, chez lequel la bordure suturale existait, et qui se rapportait ainsi à la variété précédente. Chez quelques autres exemplaires, soit pris par moi, soit observés dans les cartons de divers entomologistes, les lignes constituant la partie postérieure de la bande antérieure, distinctes encore, se lient plus ou moins entre elles, et l'on arrive ainsi insensiblement à l'état normal de la *M. fasciata*, chez laquelle cette partie de la bande de devant indique seulement par le prolongement en arrière du milieu de son bord postérieur la position de la ligne médiane, qui s'est ici complètement unie à ses voisines.

La *M. coronata* a, en général, une taille avantageuse, mais qui ne dépasse pas celle des plus grands individus de la *M. fasciata*, avec laquelle elle a tant de ressemblance sous le rapport de tous les autres caractères spécifiques, même sous celui du prolongement de la tête derrière le bord postérieur des yeux, qu'il est difficile de l'en éloigner.

Si, comme je le suppose, elle n'est qu'une variation de l'état normal de la *M. fasciata*, elle en est une variété très-remarquable; si on voulait la considérer comme constituant une espèce distincte, il serait difficile d'établir des limites entre elle et la *fasciata*.

Mais la *T. bucephala* ne montre-t-elle pas aussi que le duvet cendré s'étend ou se restreint, de même que la couleur, de manière à modi-



fier d'une manière plus ou moins remarquable le dessin qu'il forme chez les divers individus d'une même espèce?

Var. ε. *Bande antérieure semblable à l'état normal ou rapprochée de lui. Bande postérieure isolée de la bordure suturale, plus ou moins raccourcie à ses extrémités.*

Obs. Peut-être faut-il rapporter à cette variété la :

*M. bipunctata*, (DEJAN) Catal. (1321) p. 73. — GERMAR, *Species insect.* p. 170, 280.  
— *Id.* FAGU. ins. Europ. 13. 12.

qu'on ne voit plus figurer dans les catalogues nouveaux ; cependant ses antennes noires paraissent l'éloigner de la *M. fasciata*.

*Variations des élytres (par excès).*

Var. ζ. *Bandes à l'état normal ou un peu développées en excès ; élytres offrant en outre une rangée sériale de trois à cinq points formés par un durct cendré ; cette série, longitudinalement oblique, prolongée depuis la partie postéro-externe de la bande antérieure, jusqu'au bord antérieur de la deuxième bande, vers les deux cinquièmes ou la moitié de la largeur des étuis (M. seriato-guttata).*

Var. η. *Bandes des élytres plus développées que dans l'état normal, moins nettement limitées ; l'antérieure, enclosant une pupille plus restreinte (parfois subarrondie ou presque carrée, chez quelques individus ; mais permettant, chez d'autres, de distinguer plus ou moins facilement la direction oblique que présente la pupille à l'état normal) ; sans traces de dents ou de prolongements anguleux à son bord postérieur : la seconde bande, également un peu plus développée dans le sens de sa longueur, peu nettement arrêtée dans ses contours, sans traces de dents ou d'échancrure à ses bords antérieur et postérieur, couvrant toute la largeur de chaque élytre. (M. subcæca).*

Le duvet de ces bandes est ordinairement cendré ou cendré blanchâtre, c'est-à-dire semble pâlir à mesure que le duvet s'étend, comme il devient souvent plus coloré, plus brillant, plus doré, chez diverses variétés de la *M. interrupta*.

Var. θ. *Semblable à la variété précédente ; mais offrant de plus la bande antérieure unie à la suivante sur les côtés des élytres.*

Var.  $\alpha$ . Bandes des élytres longitudinalement assez développées pour s'unir de manière à ne laisser entre elles qu'un espace vague ou presque nul, moins densément garni de duvet : la bande antérieure sans traces de pupille.

*Mordella aculeata*, Poda, Insect. Mus. graec. p. 47. 1. var  $\beta$  ?

*Mordella villosa*, Schrank, Enum. p. 228. 428 ?

*Mordella murina*, Herbst, Archiv, p. 148. 3 ? — *Id.* trad. fr. p. 167. 2 ? — Gmel.

C. Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 2024. 21 ?

*Mordella fasciata*, var.  $\gamma$ . Schonh. Syn. ins. t. 3. p. 84. 3 ?

Chez cette variété, le quart ou le cinquième postérieur des élytres n'est pas couvert de duvet cendré, caractère qui la distingue de la *M. sericea*.

Chez toutes les variétés précédentes, la partie postérieure de la tête s'avance derrière les yeux jusqu'à la moitié au moins de la largeur de ces organes, caractère qui est un des traits les plus saillants de la *M. fasciata*, et la bande postérieure des élytres commence vers le milieu de la longueur de celles-ci.

La *M. aurofasciata* (VILLA), Comolli, De Coleopt. nov. ac rarior, p. 29, 61. — (VILLA), Catal. (1844) p. 49), semble se rattacher à l'une des variétés de cette espèce, chez laquelle le pigmentum n'a pas eu le temps de se développer. Voici, au reste la description donnée par M. Comolli :

Fusco-picea, pubescens, elytris rufo-castaneis, macula magna humerali arcuata maculaque postica suturali flavo-sericeis; ore, antennis, tibiisque ferrugineis.

Caput nigrum, sericeum, ore pallido; antennae graciliores lividae; thorax fuscus holosericeus; elytra rufo-castanea. macula magna arcuato basin versus aliaque irregulari pone medium flavo-sericeantibus; corpus pedesque fusco-picea sericea tibiisque dilutionibus.

---

La ***Mordella basalis*** de M. Achille Costa, se rapproche de la *fasciata*. Elle peut être caractérisée ainsi :

Noire, à pubescence soyeuse ; cette pubescence concolore, sur la majeure partie du dessus, d'un brun ou marron purpurescent sur les côtés et à la base du prothorax, sur l'écusson et à la base des élytres : celles-ci ornées en outre d'une bordure suturale très-étroite, d'une tache humérale courbée vers la suture, et d'une bande transverse raccourcie vers la moitié de leur longueur, formées d'un duvet semblable. Dessous du corps orné sur la poitrine et sur la

*base du ventre d'un duvet cendré argenté. Pygidium conique, terminé en pointe obtuse, presque égal à la moitié d'une élytre.*

*Mordella basalis*, Ach. Costa, Faun. del Regn. di Napol. (*Mordellidées*) p. 13. 4. pl. 21. fig. 1. (suivant le type).

Long. 0,0039 (1 3/4 l.) Larg. 0,0015 (2/3 l.)

Obs. On retrouve ici dans la bordure basilaire des élytres et dans la tache humérale se dirigeant vers la suture qu'elle n'atteint pas, la disposition de l'espèce de bande basilaire qui chez la *fasciata* enclose une pupille noire et oblique. La bande transverse et raccourcie à ses deux extrémités, dont les étuis sont parés vers la moitié de leur longueur, montre encore toute l'analogie qu'a la *M. basalis* avec la *fasciata*. N'en serait-elle encore qu'une variété par défaut, différente par la couleur du duvet des taches ? Les antennes sont nébuleuses ou obscurément testacées à la base.

M. Léon Dufour a donné l'*Histoire des métamorphoses et l'anatomie des Mordelles* (1) en général, et de la *M. fasciata* en particulier. Voici la description de la larve et celle de la nymphe de cet insecte, d'après ce savant entomologiste.

*Larve* hexapode; molle ou souple; oblongue; blanchâtre; semi-cylindrique. *Tête* ovale arrondie, libre, mobile; de consistance coriacée; marquée de quelques raies longitudinales d'un roux pâle. *Yeux* nuls. *Chaperon* roussâtre, trapézoïdal. *Labre* semi-circulaire. *Antennes* excessivement courtes; conoïdes; de trois (ou plutôt de quatre) articles, dont le dernier plus petit que les autres, mais non subuliforme. *Mandibules* cornées, noirâtres, pointues, édentées. *Mâchoires* oblongues, coudées; à lobe interne fort court, presque nul, velu. *Palpes maxillaires* courts; conoïdes; presque terminaux; de trois articles, dont le dernier plus grêle. *Lèvre* ovale; à peine velue. *Palpes labiaux* tout-à-fait inférieurs; fort courts; de deux articles subégaux, ne dépassant pas le bord de la lèvre. *Corps* composé de douze segments: le prothoracique plus grand et un peu plus consistant que les deux autres pédigères. *Segments abdominaux* à peu près égaux entre eux, et paraissant parfois ridés en travers, ce qui rend leur distinction difficile et embarrassante: le dernier, d'une consistance semi-cornée;

---

(1) Annales des sciences naturelles 2<sup>e</sup> série, t. 14. (1840) (Zoologie) p. 225-240. pl. 11. fig. 1 à 49. Larve et détails.

gros : conoïde ; effilé en une pointe brunâtre, comme tronquée et étroitement bifide ; paraissant, à la loupe, chargé, surtout dans sa moitié postérieure, d'aspérités dentiformes et entremêlées de poils rares. *Patte*s courtes : conoïdes ; de trois articles seulement, dont le basilaire ne semble qu'un large mamelon du segment : les deux autres à peu près égaux. *Ongles* nuls.

Long. 0,0125 (5 1/2 l.) à son dernier degré de développement.

Cette larve ronge le bois mort du peuplier (*populus nigra* LINN.) et de divers autres arbres, pour en faire sa nourriture et son logement. Elle s'y pratique des galeries cylindriques tantôt perpendiculaires, tantôt plus ou moins obliques, qu'elle remplit en cheminant d'excréments et de vermoulure. Les mandibules ne sont pas les seuls instruments dont elle se sert pour creuser sa retraite tubuleuse ; la forme conoïde et acuminée de son dernier segment abdominal, ainsi que les aspérités dont il est garni, font l'office de tarière et de râpe, soit pour polir et agrandir sa demeure, soit pour se frayer, en cas de difficulté, une route rétrograde.

Cette larve subit sa métamorphose en juin. Pour opérer celle-ci, sa peau se déchire au dos de sa partie antérieure, et est insensiblement ramenée en arrière.

**NYMPHE.** Droite, un peu atténuée en arrière. *Tête* inclinée sur le sternum ; garnie à sa région dorsale, ainsi que le segment prothoracique, de quelques spinules pilifères. *Mandibules* ouvertes. *Antennes* droites ; grenues : rabattues obliquement sur les côtés inférieurs. *Patte*s et *élytres* emmaillottées sous le corps. *Cuisses postérieures* entièrement cachées : trois derniers articles des *tarses* de derrière débordant le bout des *élytres*. *Segments de l'abdomen*, à l'exception du premier, offrant de chaque côté, tant les dorsaux que les ventraux, une petite spinule plus prononcée à ces derniers : plaques du dos armées en outre, de chaque côté de la ligne médiane, de deux ou trois spinules : dernier segment terminé par deux pointes crochues et plus ou moins divergentes. *Stigmates* très-distincts sur la membrane qui unit les segments dorsaux aux ventraux.

À la moindre excitation, cette nymphe roule sur elle-même comme une broche. Les spinules des segments lui servent pour opérer ses divers mouvements, et pour changer de peau lorsqu'elle va passer à l'état d'insecte parfait.

5. *M. decora*; CHEVROLAT. Suballongée; à fond noir; pubescente. Prothorax ordinairement à trois taches noires; garni sur le reste d'un duvet cendré flavescent ou d'un jaune cendré, mi-doré. Elytres parées chacune de deux bandes d'un duvet semblable: la première, couvrant la base jusqu'au sixième ou cinquième de la longueur du bord externe, jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes de la suture, anguleusement prolongée en arrière dans son milieu, enclosant une pupille noire, longitudinale: la seconde, transversale, arquée en arrière, couvrant des trois aux quatre cinquièmes ou un peu moins de leur longueur, en émettant en avant une bordure suturale graduellement rétrécie. Antennes noires.

*Mordella decora*, CHEVROLAT, in REV. chevier. par la Soc. Zoolog. 1840. p. 16. n° 16, — LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie p. 385. 998. pl. 32. fig. 10. et 10a b. c. d, détails.

*Mordella perspicillata*, A. COSTA, Faun. del Regn. di Napol. (*Mordellidées*) p. 15. 7. pl. 20. fig. 5. (suivant le type)

Long. 0,0036 à 0,0056 (1 2/3 à 2 1/2 l.) Larg. 0,0015 à 0,0017 (3/5 à 3/4 l.)

Corps suballongé; médiocrement étroit; à fond noir, d'un brun noir, ou même d'un brun fauve quand la matière colorante n'a pas pris tout son développement; à pubescence soyeuse. Tête en angle très-ouvert dans le milieu de son bord postérieur; revêtue d'un duvet cendré flavescent, mi-doré à certain jour. Palpes et antennes noirs: celles-ci, plus larges, comprimées et subdentées à partir du cinquième article: le deuxième, un peu plus épais et plus court que le suivant: les troisième et quatrième, subcylindriques, presque égaux. Prothorax légèrement arqué sur les côtés, offrant vers la moitié de ceux-ci sa plus grande largeur; bissinué à la base, avec la partie médiane plus prolongée, en arc dirigé en arrière, à peine plus large que la base de l'écusson, échancrée ou faiblement entaillée dans son milieu: offrant environ vers les deux tiers de la largeur de chaque élytre le point le plus avancé de ses sinuosités; coupé en ligne transverse à peu près droite, en dehors de chaque sinuosité, de moitié plus large à la base qu'il est long sur ses côtés; convexe; noir ou noir brun, revêtu d'un duvet cendré flavescent, mi-doré à certain jour, laissant d'une manière plus ou moins distincte trois sortes de taches noires ou de la couleur du fond: une, plus longue sur la ligne médiane: une, subarrondie, située de chaque côté entre cette ligne et le bord externe. Ecusson en triangle obtus, un peu plus large à la base qu'il est long sur son milieu: noir, revêtu d'un duvet cendré mi-doré. Elytres, en devant, à peu près de la largeur du prothorax à la base; trois fois environ aussi larges



que lui sur ses côtés; deux fois et quart environ aussi longues qu'elles sont larges à la base, réunies; sensiblement rétrécies jusqu'aux sept huitièmes; obtusément arrondies à l'extrémité; peu convexes; noires, garnies sur une partie de leur surface d'un duvet concolore; ornées chacune de deux bandes formées par un duvet cendré flavescent ou jaune cendré, mi-doré: la première, couvrant la base, prolongée sur le côté externe jusqu'au sixième ou au cinquième de leur longueur, jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes de la suture, anguleusement prolongée dans le milieu de son bord postérieur, presque jusqu'au milieu de leur longueur, vers le milieu de leur largeur: la deuxième, transversale ou un peu arquée en arrière, couvrant depuis les trois cinquièmes jusqu'à un peu moins des quatre cinquièmes, prolongée en avant en forme de bordure suturale graduellement rétrécie, avancée ordinairement jusqu'à la première bande ou presque jusqu'à elle: partie perpendiculairement déclive du bord externe, et repli garni d'un duvet cendré flavescent, constituant une sorte de languette rétrécie d'avant en arrière, liée à la base avec la première bande, et moins longuement prolongée que la partie anguleuse de ladite bande. *Repli* aussi large que les deux tiers des postépisternums vers la moitié de la longueur de ceux-ci. *Pygidium* conique; assez robuste; à peine égal aux deux cinquièmes d'une élytre; tronqué et frangé à l'extrémité; noir brun, garni à la base de poils cendrés ou cendrés flavescents. *Dessous du corps* noir; revêtu d'un duvet cendré mi-doré ou cendré flavescent mi-doré, sur les parties pectorales, sur la base du premier arceau ventral et sur les côtés des suivants, où ce duvet forme une tache triangulaire. *Postépisternums* deux fois à deux fois et quart aussi longs qu'ils sont larges à la base; rétrécis d'avant en arrière, en ligne un peu arquée à leur côté interne, terminés en pointe obtuse. *Pieds* noirs, garnis d'un duvet cendré mi-doré ou cendré flavescent mi-doré; hanches postérieures un peu moins longues à leur côté externe que le premier arceau ventral, à son bord latéral: jambes et tarses des pieds postérieurs sans hachures: quatrième article des tarses de devant presque bilobé.

Cette espèce habite nos provinces méridionales. Je l'ai prise dans les environs de Digne, de Grasse, de Marseille et dans divers autres lieux de notre midi. Elle n'est pas rare en Corse. On la trouve aussi en Espagne, en Algérie, etc.

Obs. Elle se distingue facilement de la *M. fasciata* avec laquelle elle a quelque analogie pour le dessin des élytres; par sa taille plus petite; par ses antennes noires; par son prothorax offrant vers les deux

tiers plutôt que vers la moitié de la largeur de chaque élytre le point le plus avancé de chaque sinuosité de sa base ; par la partie prolongée de cette dernière débordant à peine la base de l'écusson, sensiblement ou plus sensiblement échancrée dans son milieu ; par la pupille enclose dans la première bande, obtriangulaire ou piriforme, disposée dans le sens de la longueur, au lieu de l'être d'une manière oblique ; par son écusson non obtusément tronqué à sa partie postérieure ; par la deuxième bande transversale des élytres commençant seulement aux trois cinquièmes environ de la longueur ; par la couleur plus jaune ou d'un jaune verdâtre du duvet clair du prothorax, des bandes des élytres et du dessous du corps.

Quelquefois les poils cendrés flavescents du prothorax et des bandes des élytres sont agglutinés ou rapprochés par l'effet de la pluie ou par toute autre cause, de manière à faire paraître ces parties striées.

CC. Elytres noires, sans taches.

6. *M. aculeata* ; LINN. Noire ; revêtue d'un duvet concolore, en dessus, cendré ou cendré subargenté, sur quelques parties du dessous. Prothorax de moitié environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; émoussé aux angles postérieurs ; obtusément tronqué au devant de l'écusson ; offrant vers la moitié de la base de chaque élytre le point le plus avancé de ses sinuosités basilaires. Elytres deux fois à deux fois et quart aussi longues qu'elles sont larges à la base (prises ensemble). Pygidium aussi long que les deux cinquièmes ou la moitié des élytres ; non échancré à l'extrémité ; de trois quarts au moins plus long que large ; une fois plus long que l'hyppopygium.

*Mordella aculeata*, LINN. Syst. Nat. (1758) t. 1, p. 420. 1. — *Id.* (12<sup>e</sup> édit.) t. 1, p. 682. 2. — *Id.* Faun. suec. p. 228. 832. — Poda, Ins. mus. græc. p. 47. 1. — Scopol. Entom. carn. p. 62. 192. — MULLER, Faun. ins. fried. p. 22. 218. — *Id.* Zool. Dan. Prodr. p. 84. 917. — SCHAEFF. Elem. pl. 84. — BECKMANN, CAR. LINNÉ, Syst. Nat. p. 146. 2. — FAER, Syst. entom. p. 263. 5. — *Id.* Spec. t. 1, p. 353. 7. — *Id.* Mant. t. 1, p. 218. 11. — *Id.* Ent. syst. t. 1, 2, p. 113. 1. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2, p. 121. 1. — DE GEER, Mem. t. 5, p. 28. 1. — MULLER, LINN. Naturs. t. 5, 1, p. 386. 2. pl. 2, fig. 5. — SCHRANK, Enum. p. 227. 427. — *Id.* Faun. boic. t. 1, p. 572. 725. — RETZ, Gen. et spec. p. 134. 825. — LEPKE, Naturg. 2<sup>e</sup> édit. p. 482. 1. — HERBST, in FUESSELY's, Arch. p. 148. 1. — FOURCER, Entom. paris. t. 1, p. 161. 1. — PETAGN. Spec. Insect. Calab. p. 27. 137. — SCHMIEDL. Einleit. 250. — GMEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1, p. 2023. 2. — DE VILLERS, C. LINN. Entom. t. 1, p. 406. 2. — ROSSI, Faun. etrusc. t. 1, p. 242. 598.

— *Id.* Edit. HEUW. t. 1. 298. 593. — BRAHM, Ins. kal. t. 1. p. 41. 132. — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 758. 11. — *Id.* Entomol. t. 5. n<sup>o</sup> 64. p. 4. 1. pl. fig. 1. a, b, c. — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. (1805) t. 15. p. 68. — *Id.* (1818) t. 21. p. 365. — PANZ. Ent. germ. f. 212. 1. — FLORENC. in MEYER'S Zool. Arch. p. 241. 245. — PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 185. 3. — CEDERH. Faun. ingr. prod. p. 72. 225. — GOEZE, Faun. Eur. t. 8. p. 846. 2. — MARSH. Entom. brit. p. 488. 1. — WALGREN, Faun. par. p. 174. 1. — TIGNY, Hist. nat. t. 5. p. 251. — BLUMENB. Handb. 7<sup>e</sup> éd. p. 536. 1. — *Id.* 8<sup>e</sup> éd. p. 541. 1. — *Id.* trad. fr. t. 1. p. 422. 1. — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 414. 1. n<sup>o</sup> 1. — *Id.* Gen. t. 2. p. 208. 1. — *Id.* Regn. anim. de CUVIER (1817) t. 5. p. 315. — *Id.* (1829) part. entomol. t. 2. p. 57. — BECHST. Naturg. t. 1. 2. p. 891. 1. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 604. 1. — SCHONH. Syn. insect. t. 5. p. 82. 2. — LAMARCK, Anim. z. vert. t. 4. p. 425. 1. — GRÉVIN, Dict. class. t. 11. p. 196. — GOLDFUSS, Handb. p. 529. — DUMÉNIL, Dict. des sc. nat. t. 52. p. 515. 1. — ZETTERST. Faun. lapp. p. 287. 1. — *Id.* Ins. lapp. p. 163. 1. — MELS. Lettr. t. 2. p. 295. 1. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 48. 2. — *Id.* Man. p. 355. 2612. — CURTIS, Brit. entomol. t. 11. 485. — SAHLB. Ins. fenn. p. 484. 1. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 265. 1. — L. DUF. Excurs. p. 71. 431. — L. REUTENB. p. 614. — KUST, Kaef. Eur 9. 58.

Long. 0,0045 à 0,0067 (2 à 3 l.) Larg. 0,0011 à 0,0023 (1/2 à 1 l.)

*Corps* suballongé ; peu (♀) ou médiocrement (♂) étroit ; noir, garni d'un duvet soyeux. *Tête* presque en ligne droite à son bord postérieur ; garnie d'un duvet cendré brunâtre, ordinairement gris cendré surtout à la partie postérieure ; noire, avec le bord antérieur de l'épistome et souvent celui du labre, moins obscurs. *Palpes maxillaires* ordinairement noirs ou d'un noir brun, parfois fauves ou d'un fauve testacé, avec l'extrémité du dernier article plus obscure. *Antennes* à peine prolongées jusqu'aux angles postérieurs du prothorax ; noires ou d'un noir brun, avec les deuxième à quatrième articles et plus rarement les cinq premiers d'un brun fauve, fauves ou même testacés, au moins en partie : le deuxième subcylindrique, plus court que le suivant : les troisième et quatrième grêles, presque égaux : les autres pubescents, comprimés : les cinquième à dixième dilatés au côté interne et subdentés : le onzième oblong. *Prothorax* un peu plus large en devant que la tête à son bord postérieur : presque en ligne droite à son bord antérieur ; un peu élargi d'avant en arrière, en ligne presque droite ou faiblement et très-obtusément arquée ; émoussé aux angles postérieurs ; bispinué à la base, avec la partie médiaire plus prolongée en arrière, obtusément tronquée, débordant l'écusson de chaque côté, étendue jusqu'au quart de la largeur de chaque étau, subarrondie à ses angles postérieurs ; échancré en

ligne courbe assez régulière entre ce lobe médiaire et les angles postérieurs, offrant vers le milieu de la base de chaque élytre le point le plus avancé de la sinuosité ; de deux tiers à une fois plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; convexe ; offrant à certain jour une légère dépression longitudinale correspondant au milieu de la base de chaque élytre ; noir, garni ou revêtu d'un duvet ordinairement brun ou brun marron. *Ecusson* en triangle obtus et à côtés curvilignes, ou presque en demi-cercle ; de moitié plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; revêtu d'un duvet cendré. *Elytres* un peu plus étroites en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; quatre fois aussi longues que les côtés de celui-ci ; deux fois et quart aussi longues que ce dernier sur son milieu ; un peu rétrécies d'avant en arrière ; obtusément arrondies chacune à leur extrémité ; moins d'une fois ou à peine une fois plus longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble ; peu convexes ; noires, garnies d'un duvet ordinairement brun ou brun marron ; dépassant ordinairement un peu le quatrième arceau ventral. *Pygidium* conique ; aussi long que les deux cinquièmes ou la moitié des élytres ; obtus ou très étroitement tronqué à son extrémité ; noir, garni d'un duvet concolore ; une fois environ plus long que l'hypopygium. *Dessous du corps* noir, garni d'un duvet cendré brillant ou luisant, sur la majeure partie des côtés de la poitrine, surtout sur les postépisternums, à la base du premier arceau ventral, sur les côtés du même arceau et des trois suivants, où ce duvet forme une tache triangulaire ; souvent garni d'un duvet semblable, sur le bord postérieur des arceaux ; brun sur les autres parties du ventre. *Postépisternums* obtriangulaires, rétrécis d'avant en arrière, un peu arqués à leur côté interne, terminés en pointe ; deux fois à deux fois et quart aussi longs qu'il sont larges à la base. *Pieds* noirs, garnis d'un duvet cendré : tarses intermédiaires aussi longs que la jambe qui les précède : avant-dernier article des tarses antérieurs entier ou à peu près. Ongles peu distinctement denticulés.

Cette espèce est commune dans les diverses parties de la France.

Sa larve a été décrite par Erichson, in WIEGM. Arch. (1842) 1. p. 372.

OBS. La *M. aculeata* diffère des espèces voisines qui se trouvent dans notre pays, par sa couleur ; par sa tête coupée presque en ligne droite, à sa partie postérieure ; par les angles postérieurs de son prothorax émoussés ; par la longueur de son pygidium et sa grandeur relative avec l'hypopygium, etc.



Près de cette espèce, vient se placer la suivante :

**M. brachyura** ; Noire ; revêtue d'un duvet d'un brun purpuréscent, en dessus, cendré ou cendré argenté sur quelques parties du dessous. Prothorax de moitié environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; subarrondi aux angles postérieurs ; obtusément tronqué au devant de l'écusson, offrant vers les trois cinquièmes de la base de chaque élytre le point le plus avancé de ses sinuosités basilaires. Ecusson cendré. Élytres moins d'une fois plus longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble. Pygidium égal au tiers de la longueur d'une élytre, de moitié plus long qu'il est large, échancré à l'extrémité ; dépassant l'hypopygium d'un tiers de sa longueur,

*Mordella brevicauda*, ACU. COSTA, Faun. del Regn. di Napol. (*Mordellidées*) p. 45. 6. pl. 24. fig. 3. (type).

Long. 0,0045 (2 l.) Larg. 0,0022 (1 l.)

Obs. Elle n'a pas encore, je crois, été prise en France.

J'ai été obligé de changer la dénomination imposée par M. Costa, M. Boheman ayant plus antérieurement donné le nom de *brevicauda* à un autre Mordellien.

Au genre *Mordella* se rattache les deux espèces suivantes que j'ai vues dans la belle collection de M. Reiche.

**M. sulcicauda** ; (REICHE). Suballongée ; noire ; à pubescence concolore. Base des antennes d'un brun rouge. Tête échancrée en arc assez prononcé sur le quart médiaire de son bord postérieur, échancrure dans laquelle se loge un lobe du bord antérieur du prothorax. Lobe médiaire de la base de celui-ci tronqué, couvrant les deux septièmes internes de la base de chaque étui. Pygidium subconique, étroitement tronqué à l'extrémité, un peu comprimé et canaliculé de chaque côté, dans sa seconde moitié ; une fois plus long que l'hypopygium. Postépisternums obtriangulaires, à peine arqués à leur côté interne.

Long. 0,0073 (3 1/3 l.) Larg. 0,0028 (1 1/4 l.)

PATRIE : l'Espagne.

Obs. La tête est garnie d'un duvet fauve ; son bord postérieur se



prolonge à peine sur le cinquième interne du bord postérieur des yeux, qui sont contigus sur le reste du même bord à la partie antérieure du prothorax. L'écusson est presque en demi-cercle. Les élytres sont peu rétrécies, arrondies à l'extrémité ; une fois à peine plus longues que larges à la base, réunies.

Elle se distingue de la *M. aculeata* par sa taille plus avantageuse ; par l'échancrure prononcée de la partie médiaire du bord postérieur de la tête, dans laquelle se loge un lobe correspondant du bord antérieur du prothorax ; par ses yeux plus contigus à ce bord sur une plus large étendue ; par les caractères fournis par le pygidium.

**M. viridipennis** ; (REICHE). *Suballongée ; d'un vert métallique bleuâtre ; garnie de poils obscurs. Ecusson d'un blanc cendré. Epistome, labre, palpes et majeure partie des antennes d'un roux testacé brun. Celles-ci comprimées, dilatées et pectinées du sixième au dixième article. Tête échancrée en arc sur le tiers médiaire de son bord postérieur. Lobe médiaire de la base du prothorax tronqué et débordant l'écusson. Pygidium égal au tiers des élytres, tronqué ; une fois plus long que l'hypopygium. Base des arceaux du ventre garnie de poils cendrés luisants.*

Long. 0,0048 (2 1/3 l.) Larg. 0,0022 (1 l.)

*Corps d'un vert métallique bleuâtre. Antennes à peine prolongées jusqu'aux angles postérieurs du prothorax ; comprimées et graduellement plus larges du sixième article à l'extrémité, presque pectinées ou profondément dentées, à dents arrondies : le dernier article le plus large et arrondi à son extrémité. Prothorax de moitié plus large que long ; offrant à son bord antérieur un avancement arqué remplissant l'échancrure de la tête. Pygidium assez court, à peu près égal au tiers d'une élytre ; tronqué à l'extrémité. Dessous du corps d'un vert bleuâtre métallique : base des arceaux du ventre garnie de poils d'un cendré argenté, luisants. Postépisternums obtriangulaires, un peu arqués à leur côté interne. Pieds d'un brun noirâtre, irisés de vert métallique.*

PATRIE : l'Espagne.

Obs. Ces deux espèces présentent un caractère tout particulier dans le lobe de la partie antérieure du prothorax, lobe destiné à remplir l'échancrure du bord postérieur de la tête.

Genre *Mordellistena*, MORDELLISTÈNE ; Ach. Costa (1).

(*Mordella*, Mordelle ; σάβης, étroit.)

CARACTÈRES. *Tibias* postérieurs et premier article au moins du *tarse* qui les suit, munis de plusieurs hachures sur leur arête dorsale : le *tibia*, sans dent sensible sur l'arête. *Antennes* de onze articles ; subfiliformes ou grossissant un peu vers l'extrémité à partir du troisième article ; ordinairement subdentées à partir du cinquième article, parfois très-faiblement chez les ♀ ; à dernier article ovulaire. *Yeux* postérieurement contigus au bord antérieur du *prothorax* ou séparés de lui par un rebord uniformément très-étroit. *Episternums* du *postpectus* rarement régulièrement arqués, ordinairement en ligne à peu près droite à leur côté interne. *Corps* comprimé, plus ou moins étroit.

Les Insectes de ce genre sont faciles à distinguer de ceux de la coupe précédente, par les hachures, espèces d'entailles ou de raies, généralement très-visibles sur l'arête dorsale de leurs *tibias* postérieurs et sur celle des deux premiers articles du *tarse* qui les suit, hachures qui se prolongent plus ou moins sur la face externe des mêmes parties. Il est étonnant que ces signes, qui offrent des caractères faciles à utiliser, aient échappé au regard de Gyllenhal et de tous les autres observateurs, même les plus perspicaces. Il est inutile d'ajouter que pour pouvoir les compter avec soin ou bien examiner leur direction ou leur prolongement, il faut, surtout pour les petites espèces, exposer les pieds de la manière la plus favorable à la vision et regarder l'insecte à une lumière assez vive.

M. Vallot (Académie des sc. arts et bell. lett. de Dijon, séance publ. du 25 août 1829, p. 97) et M. Schelling (Beitrag. z. Entom. p. 96.), ont décrit brièvement la larve de la *Mordella pusilla* de Gyllenhal et de Mégerle, qui sont peut-être deux espèces différentes. Le premier a trouvé cette larve dans les tiges du *Marrubium vulgare* : le second, dans celles de l'*Artemisia vulgaris*. M. Guérin a signalé aussi (Ann. de la Soc. Entomol. de Fr. deuxième série t. 3. 1845, p. LIX) une larve de Mordelle, trouvée par lui dans les tiges d'une *Euphorbia*, larve qu'il rapporte avec doute à la *M. aculeata*, mais qui doit être celle d'une *Mordellistène*.

---

(1) Faun. del Reg. di Napol. (*Mordellidées*) p. 16 et p. 34.

α. Ventre roux. Elytres noires sans taches.

β. Postépisternums arqués à leur côté interne.

**1. *M. abdominalis* ; FABRICIUS.** Allongée (♂) ou suballongée (♀) ; à pubescence soyeuse ; noire, avec la bouche, les deux premiers articles des antennes, au moins, la majeure partie du ventre et la base du pygidium, d'un roux testacé. Prothorax de même couleur chez la ♀. Tibias postérieurs à trois hachures peu obliques, sur la seconde moitié de leur arête dorsale : premier et deuxième articles des tarses également marqués de hachures.

♂ Prothorax noir, brun ou brun fauve, ou parfois avec le bord postérieur roussâtre. Ventre d'un rouge testacé, avec la partie médiale de sa moitié antérieure au moins, nébuleuse ou brune. Cuisses et jambes antérieures brunes ou d'un brun jaunâtre : les autres, noires. Tarses antérieurs d'un flave testacé : les autres en partie d'un roux flave ou d'un roux testacé.

Obs. Le prothorax varie parfois du noir au brun ou même au brun fauve : souvent même il est roussâtre à son bord postérieur et près des angles de devant.

♀ Prothorax et ventre d'un rouge jaune, garni d'un duvet de même couleur. Pieds antérieurs d'un roux jaune ou d'un flave rougeâtre : les suivants noirs, avec les tarses intermédiaires et la base des articles postérieurs, d'un testacé rougeâtre.

♀ *Mordella abdominalis*, FABR. Syst. entom. p. 264. 8. — *Id.* Species, t. 1. p. 333. 10. — *Id.* Mant. t. 1. p. 229. 15. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 125. 20. — GMEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 2024. 19. — DE VILL. C. LINN. Entom. t. 1. p. 408. 7. et t. 4. p. 365. — ROEMER, Gen. p. 51. 86. pl. 7. fig. 15. — ROSSI, Mant. t. 1. p. 94. 211. — *M.* Ed. HELW. t. 1. p. 411. 211. — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 735. 15. — *Id.* Entomol. t. 3. n° 64. p. 7. 5. pl. 1. fig. 1. 5. a, b. — PANZ. Entom. germ. p. 212. 4. — PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 186. 5. — MARSH. Entom. brit. t. 1. p. 489. 4. — LATR. Hist. Nat. t. 10. p. 416. 3. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 608. 5. — SHONH. Syn. insect. t. 3. p. 86. 24. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 47. 4. — *Id.* Man. p. 332. 2611. — CURTIS, Brit. entomol. t. 11. n° 483. 1. — SHALB. Ins. fenn. p. 486. 6. — DE CASTELN. Hist. Nat. t. 2. p. 263. 5. — L. DEF. Excurs. p. 73. 453. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 615. — KEST. Kaef. Eur. 10. 73.

*Mordella bicolor*, SULTZER, Gesch. d. Insect. p. 67. pl. 7. fig. 15. — FUESSLY, Verz. p. 21. 405. — SCHRANK, Faun. boic. t. 1. p. 572. 726.

♂ *Mordella ventralis*, FABR. Entom. syst. t. 1. 2. p. 114. 5. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2.

- p. 125. 19. — PANZ, Entom. germ. p. 212. 3. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 609. 6. — SCHONH. Syn. Ins. t. 3. p. 86. 23. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 48. 4. — Id. Mar. p. 333. 2616. — CURTIS, Brit. entomol. t. 11. n° 483. — SAULS. Ins. fenn. p. 487. 7. — DE CASTELN. Hist. Nat. t. 2. p. 263. 6. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 614. — KESTER, Koef. Eur. 10. 76.

*Mordella abdominalis* var.  $\beta$ . PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 187. 5.

*Mordella nigra*, MARSH. Entom. brit. t. 1. p. 490. 5.

Long. 0,0059 à 0,0051 (1  $\frac{3}{4}$  à 2  $\frac{1}{4}$  l.) Larg. 0,0011 à 0,0013 (1  $\frac{2}{3}$  à 2  $\frac{1}{3}$  l.)

*Corps* allongé ( $\sigma$ ) ou suballongé ( $\varphi$ ); garni de poils soyeux, couchés, à peu près de la couleur du fond, au moins en dessus; coloré comme il va être dit. *Tête* en ligne presque droite ou à peine bissubsinuée, à son bord postérieur, avec la partie médiaire à peine plus prolongée en arrière que les parties voisines; noire, avec le labre, la bouche et les *palpes*, d'un rouge testacé. *Antennes* prolongées environ jusqu'au cinquième des élytres: à premier et deuxième articles presque égaux: le troisième, à peine plus long que le deuxième, un peu plus grand que la moitié du suivant: les quatrième à dixième, obconiques, dentés ou subdentés au côté interne: le onzième, ovulaire: noires ou brunes, chez la  $\varphi$ , avec les deux premiers articles d'un flave testacé, souvent de cette même couleur aux dentelures des articles suivants et surtout au dernier; ordinairement plus pâles, nébuleuses ou brunâtres chez le  $\sigma$ . *Prothorax* obtusément avancé dans le milieu de son bord antérieur, subsinueusement moins avancé sur les parties latérales de ce bord; un peu élargi en ligne faiblement arquée sur les côtés; bissinué à la base, avec la partie médiaire prolongée en arrière, obtusément tronquée et débordant un peu l'écusson: les angles de cette partie médiaire correspondant au quart ou au tiers interne de la largeur de chaque étui; échancré d'une manière inégalement arquée entre cette partie basilaire et les angles postérieurs, qui sont un peu dirigés en arrière et à peine émoussés; d'un tiers ou d'un quart plus large à la base qu'il est long sur son milieu; convexe; noir ou parfois avec une teinte d'un noir roussâtre, d'un brun roussâtre ou d'un testacé roussâtre à la base et parfois vers les bords latéraux ( $\sigma$ ), entièrement d'un roux flave ou roux testacé ( $\varphi$ ); à duvet concolore. *Écusson* en triangle obtus, plus large à la base qu'il est long; noir. *Elytres* à peu près aussi larges en devant que le prothorax à la base; quatre fois au moins aussi longues que celui-ci sur les côtés; deux fois et trois quarts environ aussi longues que lui

sur son milieu; deux fois et quart (♀) ou deux fois et demie (♂) aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble; subparallèles, subarrondies chacune à l'extrémité; médiocrement convexes; noires, sans taches; garnies d'un duvet de même couleur. *Repli* égal environ à la moitié de la largeur des postépisternums, vers la moitié de ceux-ci. *Pygidium* en cône étroit et pointu; noir, avec la base d'un roux testacé. *Hypopygium* égal au tiers ou aux deux cinquièmes du pygidium; d'un roux testacé. *Dessous du corps* garni de poils luisants, fauves ou d'un fauve testacé sur les parties obscures, presque concolores sur les parties claires; pointillé; noir, avec l'antépéctus et le ventre d'un rouge jaune ou d'un roux testacé (♀), avec l'antépéctus noirâtre ou brunâtre et le ventre d'un roux testacé, parfois maculé de noirâtre (♂). *Postépisternums* assez régulièrement arqués à leur côté interne; deux fois et demie ou un peu plus aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. *Pieds antérieurs* souvent testacés ou d'un testacé roussâtre (♀), bruns ou d'un brun fauve (♂): les intermédiaires bruns ou d'un brun roussâtre ou testacé (♀), bruns ou d'un brun fauve (♂): les postérieurs, ordinairement noirs ou d'un noir brun, avec les éperons, la base des tarse, testacés ou d'un rouge testacé (♂♀). *Tibias postérieurs* à trois hachures sur la moitié postérieure de l'arête dorsale: ces hachures, presque verticales ou peu obliques et non avancées jusqu'aux deux cinquièmes de la largeur de la face latérale. *Premier article des tarse postérieurs* à trois hachures sur la moitié postérieure de l'arête: deuxième article à une ou rarement deux hachures. *Ongles* d'un rouge testacé, faiblement denticulés à la branche supérieure.

Cette espèce paraît se trouver dans les diverses provinces de la France, particulièrement dans les parties froides ou tempérées. Elle est peu commune dans nos environs. On la trouve en mai et en juin sur les ombelles et sur diverses autres fleurs. Je l'ai prise en juillet, à la Grande-Chartreuse.

Obs. Elle se distingue facilement de toutes les suivantes par la couleur de son abdomen, et par le bord interne de ses postépisternums, arqué, plus large dans son milieu qu'à ses extrémités, surtout qu'à la postérieure: celle-ci, rétrécie en ligne courbe, au lieu d'être obliquement tronquée, comme chez les *Mordellistènes* suivantes.

Les *M. ventralis* et *abdominalis* de Fabricius, considérées jusqu'à ce jour comme deux espèces différentes, ne sont que les deux sexes de la même; le hasard m'a offert plusieurs fois l'occasion de m'en assurer.



et les caractères fournis par les hachures viennent confirmer ces indications.

αα. Ventre ordinairement noir, quelquefois testacé ou d'un flave testacé, mais alors les élytres sont soit noires, en partie testacées ou d'un flave testacé, soit entièrement testacées ou d'une teinte rapprochée.

ββ. Postépisternums en ligne droite à leur côté interne.

γγ. Elytres en partie au moins d'un flave roussâtre ou testacé.

**2. M. humeralis**; LINNÉ. Allongée; à pubescence soyeuse; ordinairement noire, avec la bouche, l'épistome, la partie antérieure du front, la base des antennes, les côtés du prothorax, une tache humérale et les pieds, moins la majeure partie médiane des cuisses postérieures, d'un roux testacé; quelquefois entièrement de cette couleur, avec les yeux et les hachures noires. Tibias postérieurs à trois hachures; l'antérieure, prolongée depuis le tiers postérieur de l'arête dorsale jusqu'au tiers antérieur du côté externe, avancée jusqu'à la moitié de la largeur de celui-ci: la suivante réduite au tiers de la largeur. Premier article des tarses à trois hachures: le deuxième, à deux.

ETAT NORMAL. Prothorax noir ou d'un noir brun, sur sa portion longitudinalement médiane, d'un roux pâle ou d'un roux testacé sur les côtés: la partie noire, couvrant un peu plus de la moitié médiane, ou presque les trois cinquièmes médianes de la largeur du segment, graduellement un peu étranglée vers les deux septièmes antérieurs de sa longueur. Elytres noires ou d'un noir brun, ornées chacune d'une tache humérale d'un roux pâle ou d'un roux testacé, couvrant ordinairement les trois cinquièmes externes de la base, parallèlement prolongée jusqu'aux deux septièmes de la longueur, arquée ou obtusément anguleuse à son bord postérieur et en général peu nettement limitée.

Obs. Les antennes sont noires, avec leurs trois ou quatre premiers articles d'un roux testacé. La tête est noire, avec le labre, l'épistome et la moitié antérieure du front d'un roux testacé. Le pygidium et le dessous du corps sont noirs. Les pieds d'un roux testacé, avec les cuisses postérieures noires, moins la base et les genoux.

*Mordella humeralis*, LINNÉ, Syst. Nat. (1758) t. 1. p. 420. 2. — *Id.* (12<sup>e</sup> édit.) t. 4. p. 682. 3. — *Id.* Faun. suec. p. 229. 835. — MULLER, LINN. Naturs. t. 3. 1. p. 386. 3. — Gmel. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 406. 3. — PANZ. Ent. germ. p.

213. 4. — *Id.* Faun. germ. 62. 3. — PARK. Faun. succ. t. 2. p. 187. 6. — SCHRANK, Faun. boic. t. 1. p. 573. 727. — GOEZE, Eur. Faun. t. 8. p. 849. 3. — MANSU. Entom. brit. p. 489. 3. — GYLLENH. Ins. succ. t. 2. p. 610. 7. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 86. 23. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 49. 5. — *Id.* Man. p. 333. 2617. — CURTIS, Brit. entom. t. 11. 483. — SAHLB. Ins. fenn. p. 487. 8. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 265. 7. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 615. — KUSTER, Kaef. Eur. 9. 61.

Var.  $\alpha$ . Bande longitudinale noire du prothorax nulle, ou n'offrant plus que de faibles traces de son existence. Tache humérale des élytres soit très restreinte, soit étendue jusqu'à la suture ou presque jusqu'à elle, postérieurement à limites indécises et se confondant souvent insensiblement avec la couleur foncière du reste des élytres, qui a passé au brun ou au brun fauve.

OES. La partie noire des antennes, du dessous du corps et des cuisses postérieures, a également passé souvent au brun ou brun tirant sur le fauve.

*Mordella auxillaris*, GYLLENH. Ins. succ. t. 2. p. 611. 8. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 85. 9. — DEJ. Catal. (1837) 241. — STEPH. Illustr. t. 5. 6. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 615. — KUST. Kaef. Europ. 9. 62.

*Mordella collaris*, (DEJ.) Catal. 1821. p. 73 ?

Var.  $\beta$ . Tête, prothorax, poitrine et pieds, d'un roux testacé. Elytres brunes, offrant à peine des traces de la tache humérale. Pygidium brun. Ventre d'un roux testacé brunâtre.

*Mordella fusca*, SCHRANK, Enum. p. 229. 431. — DE VILLERS, C. LINN. Entom. t. 1. p. 408. 9. — *Id.* t. 4. p. 365 ?

*Mordella flavescens*, MARSH. Entom. brit. p. 490. 7. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 80. 8. — *Id.* Man. p. 333. 2619.

*Anaspis flavescens*, LATR. Hist. Nat. t. 10. p. 420. 9.

*Nativica* <sup>(1)</sup> *meridionalis*, ACU. COSTA, Faun. d. Regn. di Napol. (*Mordellides*) p. 19. et 21. (suivant le type).

Var.  $\gamma$ . Prothorax d'un roux pâle ou d'un roux testacé, sans taches. Elytres d'un roux brunâtre sur leur majeure partie postérieure, graduellement d'un roux testacé en devant.

(1) Le genre *Nativica* m'a paru n'être fondé que sur un caractère inconstant, sur le prothorax accidentellement rejeté en arrière et voilant la base des élytres et l'écusson.

Obs. La partie postérieure de la tête, les six ou sept derniers articles des antennes et le dessous du corps, sont encore ordinairement bruns ou brunâtres; mais les cuisses postérieures sont déjà devenues chez divers individus, d'un roux testacé, ainsi quelquefois que le premier arceau ventral. Le pygidium prend aussi parfois la même teinte vers son extrémité.

Var.  $\delta$ . *Corps d'un roux testacé, avec les yeux et les hachures des pieds postérieurs, noirs: six ou sept derniers articles des antennes, pygidium, quatre, trois, ou deux derniers arceaux du ventre, nébuleux.*

Var.  $\epsilon$ . *Corps entièrement d'un roux testacé, avec les yeux et les hachures des pieds postérieurs, noirs, et parfois le pygidium nébuleux.*

Obs. A ces deux dernières variétés, qui se lient insensiblement l'une à l'autre, se rapporte la synonymie suivante:

*Mordella brunnea*, Fabr. Syst. Eleuth. t. 2. p. 125. 18. — SCHÖNH. Syn. ins. t. 3. p. 86. 22. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 47. 9. — *Id.* Man. p. 333. 2620. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 615.

*Mordella Neuwaldeggiana*, PANZ. Faun. gerin 56. 8. (Voy. PANZ. Krit. Revis. p. 98).

*Mordella ferruginea*, MARSH. Entom. brit. p. 490. 6.

*Anaspis ferruginea*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 420. 8.

Long. 0,0055 à 0,0045 (1 1/2 à 2 l.) Larg. 0,0009 à 0,0011 (2/5 à 1/2 l.)

*Corps* allongé; étroit; garni de poils soyeux, couchés, à peu près de la couleur des diverses parties du fond; coloré comme il a été dit. *Tête* en ligne presque droite ou bissubsinuée à son bord postérieur, avec le milieu de ce bord un peu plus prolongé en arrière que les parties voisines: superficiellement pointillée; colorée comme il a été dit. *Yeux* un peu anguleux vers les angles antérieurs du prothorax. *Antennes* prolongées environ jusqu'au cinquième des élytres; à premier et deuxième articles presque égaux: le deuxième, près d'une fois plus court que le suivant: les quatrième à dixième, dentés ou subdentés au côté interne: le onzième, ovulaire; colorées comme il a été dit. *Prothorax* obtusément avancé dans le milieu de son bord antérieur, subsinueusement moins avancé sur les parties latérales de ce bord; presque parallèle ou à peine élargi en ligne droite sur les côtés; bissinué à la base, avec la partie médiaire prolongée en arrière, tronquée ou obtusément tronquée, parfois subéchancrée au devant de l'écusson: cette partie médiaire, débordant à peine

l'écusson, jusqu'au cinquième ou au quart de la largeur basilaire des élytres : chaque sinuosité, en angle très-ouvert et correspondant à peu près à la moitié de la largeur de chaque étui ; d'un cinquième environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; convexe ; coloré comme il a été dit. *Ecusson* en triangle obtus, plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; ordinairement de la couleur des étuis. *Elytres* à peu près aussi larges en devant que le prothorax à sa base ; quatre fois et demie environ aussi longues que lui sur les côtés, trois fois à trois fois et quart aussi longues que lui sur son milieu ; subgraduellement rétrécies, subarrondies chacune à l'extrémité ; deux fois et demie aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble ; colorées comme il a été dit. *Pygidium* en cône étroit et pointu : égal aux deux cinquièmes ou rarement presque à la moitié de la longueur des élytres ; noir dans l'état normal, d'un rouge testacé dans les variétés pâles. *Hypopygium* une fois au moins plus court que le pygidium. *Repli* plus étroit que la moitié des postépisternums, vers le milieu de ceux-ci. *Dessous du corps* pointillé ; pubescent ; coloré comme il a été dit. *Postépisternums* parallèles dans leur seconde moitié, obliquement tronqués à l'extrémité ; trois fois aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. *Pieds* ordinairement d'un roux testacé, avec les cuisses postérieures en majeure partie noires ou noirâtres, parfois entièrement d'un roux testacé. *Tibias postérieurs* à trois hachures : l'antérieure, naissant des deux tiers postérieurs de l'arête dorsale, avancée sur le côté externe jusque vers le tiers antérieur de la longueur et la moitié de la largeur de la face latérale : la suivante, entre celle-ci et le bord postérieur, dépassant à peine le tiers de la largeur : la dernière, voisine du bord postérieur, dorsale. *Premier article des tarses* marqué de trois hachures, à peine prolongées jusqu'à la moitié de la largeur du côté externe : la première, avancée jusqu'au quart ou tiers antérieur : deuxième article des tarses à deux hachures. *Branche supérieure des ongles* légèrement denticulée.

Cette espèce est assez rare à l'état normal. Je l'ai prise à la Grande-Chartreuse, dans les mois de juin et de juillet, dans les environs de Lyon en mai et juin, sur les ombelles, sur les fleurs d'aubépine, etc.

Obs. La *Mordella acillaris* de Gyllenhal doit-elle constituer une espèce particulière ? Elle n'est, je pense, qu'une variation de *Phumeralis*. Chez quelques individus, la matière noire en se retirant du prothorax, semble s'être portée sur les élytres et autres parties noires, qui conservent leur teinte foncée, et la tache humérale se trouve alors plus



ou moins restreinte. Chez d'autres, la matière noire a en partie fait défaut, les élytres et autres parties obscures ont passé au brun noir ou au brun, ou même quelquefois à des teintes moins sombres ; dans ce cas, la tache humérale plus ou moins étendue, a des limites moins précises, et se confond souvent presque insensiblement avec la couleur foncière.

J'ai indiqué les transitions insensibles par lesquelles on passe de la *M. axillaris* à la var. *brunnea*. Il est impossible de considérer cette dernière comme une espèce. Les yeux anguleux, les hachures des pieds postérieurs viennent confirmer, par leur similitude, l'identité spécifique de toute ces variétés.

Quelquefois la première hachure des tibias est un peu moins avancée vers la base, ou interrompue dans son milieu ; mais ces variations sont rares ; d'autres fois après la troisième hachure, s'en montre une autre plus voisine du bord postérieur.

La *M. humeralis* se distingue suffisamment, par la couleur des diverses parties de son corps, des espèces à élytres complètement noires ou brunes ; j'indiquerai ci-après les caractères qui l'éloignent de la *M. lateralis*.

**3. *M. lateralis* ; OLIVIER.** Allongée ; à pubescence soyeuse ; noire ou brune, avec la bouche, la partie antérieure du front, les pieds et une tache humérale sur les élytres, d'un flave roux. Prothorax de même couleur, avec une tache basilaire, noirâtre, subarrondie, et parfois une tache obscure près du bord antérieur. Antennes testacées ou nébuleuses à base plus pâle. Tibias postérieurs à trois hachures : l'antérieure, prolongée du tiers postérieur de l'arête dorsale à la moitié ou un peu plus de la longueur, avancée jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes de la largeur du côté externe : la suivante, plus courte. Premier article des tarses postérieurs à trois hachures : le suivant, à deux.

ETAT NORMAL. Prothorax d'un flave roussâtre ou d'un flave testacé, mais paraissant souvent d'un brun tirant sur le fauve par l'effet du duvet ; marqué d'une tache noire ou brune, couvrant les trois cinquièmes médiaires de la base, trilobée ou subarrondie en devant, avancée parfois jusqu'au tiers antérieur, sur la ligne médiane, mais souvent moins ; noté souvent sur la partie médiane du bord antérieur d'une tache nébuleuse, isolée de la postérieure. Elytres d'un noir brun ou brunes, mais paraissant d'un noir fauve ou d'un brun tirant sur le fauve, par l'effet du duvet ; ornées chacune d'une tache humérale



d'un roux flavescent ou d'un flave roux, couvrant les trois cinquièmes externes de la base, prolongée parallèlement à la suture jusqu'aux deux cinquièmes de la longueur, couvrant jusqu'au sixième seulement de la longueur du bord externe, dont elle s'éloigne ensuite subgraduellement, rétrécies par conséquent dans sa partie postérieure, peu nettement limitée et presque confondue avec la partie foncière obscure.

Obs. La bouche, les palpes, le labre, l'épistome, la moitié antérieure du front, les trois premiers articles des antennes, l'antépectus et les pieds d'un flave roussâtre ou d'un roux flave: les autres articles des antennes, nébuleux ou d'un flave nébuleux; la partie postérieure de la tête, le dessous du corps et le pygidium, noirs ou noirâtres; les hachures et le bord postérieur des tibias et tarses postérieurs, de l'une de ces dernières couleurs.

*Mordella lateralis*, OLIV. Entomol. t. 5. n° 64. p. 8. 8. pl. 1. fig. 8, a, b.

*Mordella variegata*, FABR. Suppl. Entom. Syst. p. 127. 5-4. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 122. 5. — SCHONH. Syn. ins. t. 5. p. 84. 8. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 611. 9. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 49. 7. — *Id.* Man. p. 333. 2618. var. — SAHLB. Ins. fenn. p. 487. 9. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 265. 8. — L. REDTENB. Faun. 615.

*Mordella bicolor*, MARSH. Entom. brit. p. 490. 8.

*Anaspis variegata*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 419. 4.

Variations (par excès).

Var. α. Tache antérieure brune du prothorax, liée à la tache basilaire.

Variations (par défaut).

Var. β. Tache noire de la base du prothorax ordinairement moins développée: l'antérieure, nulle. Tache humérale couvrant jusqu'à près des trois quarts de la largeur, plus allongée et à limites plus indécises encore.

Var. γ. Tache des élytres couvrant la majeure partie de celles-ci qui sont brunes ou noirâtres à l'extrémité.

On. La tache de la base du prothorax est alors souvent très-réduite soit en longueur, soit même en largeur. Les élytres sont plus flaves vers les épaules, mais postérieurement la couleur flavescente ou d'un flave fauve ou testacé se confond graduellement avec la couleur noirâtre.

*Mordella dorsalis*, PANZ. Faun. germ. 15. 15. — *Id.* Entom. germ. p. 214. 12.

*Mordella humeralis*, PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 188. 6. var.  $\gamma$ .

*Mordella variegata*, GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 611. 9. var. b. — PANZER, Krit. Revis. p. 98. — *Id.* Index, p. 150. 1. — SCHÖNH. l. c. var.  $\beta$ .

Var.  $\delta$ . *Prothorax* entièrement d'un roux pâle ou d'un flave testacé.

Obs. Les antennes sont tantôt d'un flave testacé à la base, nébuleuses ou obscures à l'extrémité, tantôt entièrement d'un flave testacé. La tache humérale des élytres varie d'étendue. Les cuisses postérieures sont parfois noirâtres dans leur milieu, d'autres fois entièrement d'un flave testacé, ainsi que le reste des pieds.

Var.  $\epsilon$ . Tache des élytres plus ou moins restreinte.

*Mordella collaris*, (DEJ.) Catal. (1821) p. 73.

*Mordella variegata*, STEPH. Man. p. 333. 2618 ?

Long. 0,0025 à 0,0033 (1 1/8 à 1 1/2.) Larg. 0,0007 à 0,0009 (1/5 à 2/51.)

Corps allongé : étroit ; garni de poils fins, soyeux, couchés, fauves ou d'un fauve livide ou testacé sur les parties noires ou brunes, concolores sur les parties claires. Tête ordinairement un peu échancrée dans le milieu de son bord postérieur ; superficiellement pointillée ; noire sur sa partie postérieure, avec la bouche, le labre, l'épistome et la partie antérieure du front, d'un roux flave, d'un roux orangé ou d'un flave roussâtre. Palpes de même couleur. Antennes prolongées environ jusqu'au cinquième ou au quart des élytres ; à premier et deuxième articles presque égaux : le troisième, ordinairement des deux tiers aussi long que le quatrième : les cinquième à dixième, presque égaux et à peine dentelés : le dernier, ovulaire ; presque glabres et d'un flave roussâtre sur les trois premiers articles au moins, pubescentes et nébuleuses ou d'un testacé brunâtre sur les autres. *Prothorax* obtusément avancé dans le milieu de son bord antérieur ; subsinuément moins avancé dans les parties latérales de ce bord ; presque parallèle ou à peine élargi en ligne faiblement arquée, sur les côtés ; bisinné à la base, avec la partie médiaire obtusément arquée à la base, ou obtusément tronquée avec les angles subarrondis : ces angles débordant l'écusson au moins de la moitié de sa largeur ; offrant les sinuosités en angle très-ouvert, correspondant à peine à la moitié de la largeur de chaque étui ; à angles

postérieurs vifs et un peu dirigés en arrière; d'un sixième à peine plus large à la base qu'il est long sur son milieu; convexe; coloré comme il a été dit. *Ecusson* en triangle obtus ou presque en demi-cercle; brun ou testacé. *Elytres* à peu près aussi larges en devant que le prothorax à sa base; quatre fois à quatre fois et demie aussi longues qu'elles sont larges sur les côtés, trois fois aussi longues que lui sur son milieu; deux fois et demie aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble; subparallèles; obtusément arrondies chacune à l'extrémité; colorées comme il a été dit. *Pygidium* en cône étroit et pointu; égal environ aux deux cinquièmes de la largeur des étuis. *Hypopygium* une fois au moins plus court. *Repli* ordinairement plus étroit que la moitié des postépisternums, vers leur milieu, ou à peine égal à cette moitié. *Dessous du corps* pointillé; brièvement et peu densément pubescent; ordinairement flave testacé sur les côtés de l'antépectus, d'un brun noir, brun ou brunâtre sur le reste, avec le bord postérieur des arceaux du ventre moins obscur. *Postépisternums* subparallèles dans leur seconde moitié, obliquement tronqués à l'extrémité; trois fois et demie environ aussi longs qu'ils sont larges à celle-ci. *Pieds* d'un roux flave, avec le bord postérieur, les hachures des tibias et articles des tarses postérieurs noirs ou noirâtres. *Tibias postérieurs* à trois hachures: l'antérieure, naissant vers le tiers postérieur de l'arête dorsale, avancée sur le côté externe jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes de la largeur de ce côté, et à peine jusqu'à la moitié de sa longueur: la deuxième, un peu plus courte: la troisième, dorsale. *Premier article des tarses postérieurs* à trois hachures dorsales et peu avancées sur le côté externe: la première, à peine avancée ordinairement au-delà de la moitié ou des trois cinquièmes postérieurs: deuxième article à deux hachures dorsales. *Ongles* flaves; peu distinctement denticulés.

Cette espèce paraît commune dans toutes les parties de la France.

Obs. Elle a été décrite et figurée pour la première fois par Olivier, sous le nom qu'il était juste de lui conserver.

Quelquefois la première hachure des tibias s'allonge un peu plus sur le côté, et s'avance davantage vers la base de cette pièce, mais jamais autant que chez la *M. humeralis*.

Elle se distingue d'ailleurs de cette dernière par ses antennes seulement nébuleuses ou brunâtres sur les cinquième à dixième articles; par le troisième de ceux-ci plus long comparativement; par sa tête ordinairement un peu échancrée dans le milieu de son bord postérieur;

par son prothorax n'offrant ordinairement qu'une tache basilaire noire, plus ou moins avancée, et parfois qu'une autre tache brune plus étroite, attenante au bord antérieur, mais très-rarement à la postérieure, et dans ce cas, l'on reconnaît facilement le dessin primitif; la partie basilaire noire ou d'un noir fauve, au lieu d'être réduite au tiers médiaire de la base, en couvre les cinq sixièmes, est subarrondie à son bord antérieur, et se lie souvent à peine à la tache antérieure beaucoup plus étroite qu'elle; par la tache flave des élytres, plus pâle, plus allongée et plus promptement détachée du bord latéral, dans l'état normal; par la première hachure des tibias moins oblique, moins avancée près de la base sur l'arête dorsale, moins étendue sur le côté latéral.

Le prothorax, le dessous du corps et le pygidium paraissent d'ailleurs passer très-rarement, chez cette espèce, au flave ou au roux testacé.

γγ. Elytres entièrement noires.

δ. Première hachure du tibia postérieur obliquement prolongée presque sur toute la largeur de la face externe du dit tibia.

**4. M. inaequalis.** Allongée; noire, à pubescence d'un fauve livide, donnant au fond une teinte grise. Quatre premiers articles des antennes, ordinairement bouche, et souvent partie des pieds antérieurs, testacés. Lobe médiaire de la base du prothorax obtusément tronqué ou arqué en arrière. Pygidium en cône pointu, une fois plus long que l'hypopygium. Tibias postérieurs à trois hachures: l'antérieure prolongée à peu près sur toute leur face externe, depuis les trois cinquièmes de l'arête dorsale, jusqu'au quart ou au tiers de l'inférieure: la suivante, près d'une fois plus courte. Eperon externe des dits tibias moins long que la moitié de l'interne.

ETAT NORMAL. Corps noir ou d'un noir brun; à pubescence d'un fauve livide, ou grisâtre, donnant au corps une teinte grise. Trois ou quatre premiers articles des antennes et labre, testacés.

Obs. À partir de cet état, dans lequel la matière noire montre son plus grand développement, l'espèce subit d'assez nombreuses variations.

Var. α. Cuisses antérieures et parfois tibias des mêmes pieds, d'un flave testacé ou d'un testacé livide.



Obs. L'épistome et parfois la partie antérieure du front, sont quelquefois testacés ou d'un roux testacé.

*Mordella pusilla*, (MEGERLE) L. REDTENS. Faun. austr. 614 ?

Var.  $\beta$ . *Pieds antérieurs entièrement testacés ou avec les tarses nublés. Cuisses et souvent tibias intermédiaires testacés ou d'un roux testacé.*

Obs. Les articles basilaires des antennes, le labre, l'épistome et souvent une partie notable du front, sont également testacés ou d'un roux testacé. Les palpes mêmes sont parfois de cette couleur, avec l'extrémité noirâtre.

*Mordella ruficeps* ? STEPH. Man. 553. 2613 ?

Var.  $\gamma$ . *Quatre pieds antérieurs, tibias et tarses des pieds postérieurs d'un roux testacé : cuisses postérieures d'un brun roussâtre.*

Obs. La couleur d'un roux testacé est parfois réduite, sur la tête, au labre, ou d'autres fois s'étend davantage. Les cinquième à onzième articles des antennes sont parfois bruns au lieu d'être noirs : la couleur rousse est moins vive sur les tibias et tarses postérieurs que sur les quatre pieds de devant.

*Mordellistena picipes*, Ach. COSTA, Faun. del Regn. di Napol. (*Mordellidees*) p. 18. 3. pl. 21. fig. 6. (type)

Var.  $\delta$ . *Dessus du corps d'un brun de poix testacé ; moitié antérieure de la tête, quatre ou cinq premiers articles des antennes, palpes et pieds, d'un flave testacé. Dessous du corps d'un brunâtre testacé.*

*Mordella helvola*, (GODET) CHLYROLAT, in collect. — Patrie : le Caucase.

La matière colorante noire qui ne s'est pas développée en quantité suffisante, donne à l'individu un aspect particulier.

Long. 0,0022 à 0,0035 (1 à 1'2 l.). Larg. 0,0004 à 0,0009 (1/3 à 2/5 l.)

*Corps* allongé ; étroit ; noir ; garni de poils soyeux, couchés, d'un fauve livide, donnant à la couleur foncière une teinte grisâtre. *Tête* légèrement échancrée dans le tiers ou les deux cinquièmes médiaux de son bord postérieur ; ordinairement testacée ou d'un fauve testacé sur le labre et parfois sur une plus grande région de sa partie antérieure. *Palpes maxillaires* colorés comme il a été dit. *Antennes* prolongées environ jusqu'aux angles postérieurs du prothorax ; noires, avec



les trois ou quatre premiers articles testacés ou d'un roux testacé : le deuxième, cylindrique, plus épais et un peu moins court que le troisième : les cinquième à dixième, subcomprimés, un peu dilatés au côté interne, subtiliformes ou à peine dentés. *Prothorax* à peine avancé en angle très-obtus dans le milieu de son bord antérieur ; très-obtusément arqué sur ses côtés ; à angles postérieurs assez vifs et à peu près rectangulairement ouverts : bissinué à la base, avec la partie médiaire plus prolongée en arrière, obtusément arquée ou obtusément tronquée, parfois même subéchancrée au devant de l'écusson, qu'elle débordé un peu de chaque côté : ces sinuosités en angle très-ouvert, correspondant environ aux deux cinquièmes ou un peu plus de la largeur de chaque élytre, à partir de la suture ; à angles postérieurs peu courbés en arrière ; au moins aussi long sur son milieu qu'il est large à la base ; convexe ; noir, pubescent. *Écusson* en triangle, parfois un peu obtus, ordinairement un peu plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; noir, pubescent. *Elytres* faiblement rétrécies ou subparallèles jusqu'aux trois quarts de leur longueur, subarrondies chacune à l'extrémité ; quatre fois au moins aussi longues que le prothorax sur ses côtés ; deux fois et demie à trois fois aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble ; peu convexes ; noires ; pubescentes. *Repli* égal au moins ou environ à la moitié de la largeur du postépisternum, vers la moitié de la longueur de celui-ci, souvent presque aussi large que lui à sa partie postérieure. *Pygidium* conique ; terminé en pointe ; aussi long que les deux cinquièmes ou les trois septièmes au moins de la longueur d'une élytre ; noir ; dépassant l'hypopygium d'une longueur presque égale à celle de ce dernier. *Dessous du corps* noir ; pubescent. *Postépisternums* étroits ; faiblement rétrécis d'avant en arrière, en ligne droite ou à peine arquée à leur côté interne ; obtus à leur extrémité ; quatre fois environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. *Pieds* pubescents ; colorés comme il a été dit. *Tibias postérieurs* marqués de trois hachures : les deux premières, très-obliques, très-apparentes : l'antérieure, prolongée sur toute la largeur ou presque sur toute la largeur de leur face latérale, depuis la moitié ou un peu plus de l'arête dorsale jusqu'au quart ou aux deux septièmes de l'inférieure : la suivante, de moitié environ plus courte, parallèle à la précédente : la postérieure, dorsale. *Eperons des tibias* très-inégaux : l'externe égal parfois seulement au cinquième, d'autres fois environ au tiers de la longueur de l'interne. *Premier article des tarsi postérieurs* à deux hachures : le suivant, à une.

Cette espèce paraît habiter la plupart des parties de la France. Suivant M. Perris, sa larve vit dans les tiges de l'*Artemisia vulgaris* et dans celles de l'*Eupatorium cannabinum*.

Obs. Les individus chez lesquels la couleur rousse a pris une plus grande extension, paraissent exclusivement ou du moins principalement propres aux contrées méridionales.

Ces derniers forment à la vue un contraste assez frappant avec les exemplaires chez lesquels le labre et la partie basilaire des antennes sont seuls testacés; mais on trouve toutes les transitions entre ces exemplaires à pieds entièrement noirs, et ceux chez lesquels ces organes de la marche sont d'un roux testacé. Tous ces individus portent d'ailleurs les caractères distinctifs de cette espèce, c'est-à-dire ceux tirés des hachures et de la brièveté de l'éperon externe des tibias postérieurs. Quelquefois cet éperon est si court, qu'à peine peut-on le découvrir.

Un individu de la var.  $\alpha$ , portait dans la collection de M. Chevrolat le nom de *M. pusilla* (MÉGERLE). Cet insecte se rapporte-t-il bien à l'espèce indiquée par le naturaliste allemand? Suivant M. L. Redtenbacher, la *M. pusilla* a le lobe prothoracique arrondi, le premier article des antennes d'un brun jaune, les pieds antérieurs souvent bruns ou d'un brun flave. Ici, le lobe prothoracique est obtusément tronqué, les trois ou quatre premiers articles des antennes sont toujours testacés ou d'un flave testacé : ces différences, qui tiennent parfois au jour, ou à la manière dont on examine l'insecte, ne seraient pas assez importantes pour empêcher de regarder la *pusilla* décrite dans la Faune d'Autriche comme identique avec notre *M. inaequalis*; mais la forme des hachures et les proportions des éperons, dont l'auteur allemand ne parle pas, pourraient seuls permettre de résoudre la question.

**5. *M. episternalis*.** *Étroite ; entièrement noire, à pubescence obscure. Lobe médial de la base du prothorax subéchancré. Repli des élytres d'un tiers à peine aussi large que le postépisternum : celui-ci légèrement arqué et de largeur uniforme. Pygidium en cône pointu, cinq fois aussi long qu'il est large à la base, une fois plus long que l'hypopygium. Éperons des tibias postérieurs peu inégaux : ces tibias à trois hachures : l'antérieure, prolongée, sur tout leur côté externe, depuis la moitié de l'arête dorsale jusqu'au quart de l'inférieure : la suivante de moitié plus courte. Trois premiers articles des tarses, à hachures.*

Long. 0,0033 à 0,0043 (1 1/2 à 2 l.) Larg. 0,0009 à 0,0010 (2/5 à 9/20 l.)

*Corps* allongé; étroit; entièrement noir; garni de poils soyeux, fins, couchés, bruns, d'un fauve obscur sur la tête et sur le prothorax. *Tête* légèrement échancrée dans le tiers ou les deux cinquièmes médiaux de son bord postérieur; pubescente; entièrement noire, ou avec le labre d'un brun fauve. *Palpes maxillaires* noirs. *Antennes* prolongées au moins jusqu'aux angles postérieurs du prothorax; noires; à deuxième article cylindrique, plus épais et un peu moins court que le troisième: les quatrième à dixième, subcomprimés, un peu dilatés au côté interne, subfiliformes ou à peine dentés. *Prothorax* à peine avancé en angle très-obtus dans le milieu de son bord antérieur; très-obtusément arqué sur les côtés; à angles postérieurs assez vifs et à peu près rectangulairement ouverts; bispinué à la base, avec la partie postérieure prolongée en arrière, subéchancrée au devant de l'écusson, qu'elle débordé un peu de chaque côté jusqu'à ses angles postérieurs qui sont assez émoussés: chaque sinuosité, en angle très-ouvert, correspondant environ aux deux cinquièmes ou un peu plus de la largeur de chaque élytre, à partir de la suture; à angles postérieurs peu courbés en arrière; à peu près aussi long sur son milieu qu'il est large à la base; convexe; noir; pubescent. *Ecusson* en triangle un peu obtus, ordinairement un peu plus large à la base qu'il est long sur son milieu; noir. *Elytres* faiblement rétrécies ou subparallèles jusqu'aux trois quarts de leur longueur, subarrondies chacune à l'extrémité; quatre fois au moins aussi longues que le prothorax sur ses côtés: deux fois et demie à trois fois aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble; peu convexes; noires; pubescentes. *Repli* d'un tiers à peine aussi large que le postépisternum, vers la moitié de la longueur de celui-ci. *Pygidium* allongé; conique, sublinéaire dans sa seconde moitié, terminé en pointe; aussi long que la moitié de la longueur des élytres; cinq fois aussi long qu'il est large à la base; noir: dépassant l'hypopygium, d'une longueur plus grande que celle de ce dernier. *Dessous du corps* noir; garni de poils soyeux, couchés, peu épais, presque concolores ou d'un fauve obscur. *Postépisternums* d'une largeur uniforme ou à peine rétrécis d'avant en arrière, légèrement arqués à leurs bords interne et externe: quatre fois environ aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu; obliquement tronqués à leur extrémité. *Pieds* noirs; pubescents. *Tibias postérieurs* marqués de trois hachures obliques: les deux premières, très-apparences: l'antérieure, prolongée sur toute la

largeur de leur côté externe, depuis la moitié de la longueur de l'arête dorsale, jusqu'au quart antérieur de l'arête inférieure : la suivante, subparallèle à la précédente, une fois environ plus courte : la dernière, moins visible, sur l'arête dorsale, près de l'extrémité. *Eperon externe des tibia postérieurs* d'un quart ou d'un tiers seulement plus court que l'interne. *Trois premiers articles des tarsi* marqués sur presque toute la largeur de leur côté externe, de hachures très-obliques : ordinairement trois, sur le premier : deux, sur le deuxième : une sur le troisième. *Premier article des tarsi postérieurs* à peine aussi long que le tibia. *Ongles* indistinctement denticulés.

Cette espèce paraît principalement méridionale. Je l'ai prise dans le mois d'août, dans les environs de Digne (Basses-Alpes ; elle m'a été aussi envoyée par M. Alex. Wachanru, de Marseille. M. Perroud l'a reçue de Hongrie sous le nom de *pumila*, GYLLENH.

Obs. Elle s'éloigne de la *M. inaequalis* par la forme de ses épisternums du postpectus ; par le repli des élytres comparativement moins large ; par son pygidium sublinéaire dans sa moitié postérieure ; par ses trois premiers articles des tarsi postérieurs marqués de hachures ; par ses pieds postérieurs moins longs ; par son corps entièrement noir ; surtout par l'éperon externe de ses tibia postérieurs, à peine d'un tiers plus court que l'interne.

Chez les individus qui ont servi à la description ci-dessus, les cinquième à dixième articles des antennes sont à peine des deux cinquièmes plus longs que larges ; le dernier article des palpes maxillaires est moins d'une fois plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand ; l'éperon externe des tibia postérieurs est égal aux deux tiers au moins de l'interne : l'épisternum est presque d'égale largeur et un peu arqué en dedans, soit à son côté interne, soit à l'externe. J'ai trouvé, dans le midi de la France, d'autres Mordellistènes analogues, pour les hachures et le lobe médial de la base du prothorax, à l'*episternalis* ; mais ayant la taille un peu plus petite ; les cinquième à dixième articles des antennes une fois plus longs qu'ils sont larges ; le dernier article des palpes maxillaires une fois plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand ; l'éperon externe à peine plus grand que la moitié de l'interne ; le postépisternum en ligne droite à son côté interne. De tels individus sembleraient devoir constituer une espèce distincte (*M. longicornis*) ; mais ils ont d'ailleurs tant de ressemblance avec l'*episternalis*, particulièrement sous le rapport de la longueur et des proportions du pygidium, et par leurs trois premiers articles des



tarses postérieurs marqués de hachures, qu'il faut attendre de nouvelles observations pour savoir si ces différences sont spécifiques, si elles sont sexuelles ou ne sont que des anomalies.

**6. M. Illiputiana** Etroite ; entièrement noire ; à pubescence d'un fauve livide. Lobe médial de la base du prothorax obtusément tronqué. Repli des élytres aussi large que le postépisternum à son extrémité : celui-ci rétréci d'avant en arrière, en ligne droite à son côté interne. Pygidium en cône pointu : hypopygium égal aux deux tiers de ce dernier. Eperons des tibias postérieurs, peu inégaux : ces tibias à trois hachures : l'antérieure prolongée sur tout leur côté externe, depuis la moitié de l'arête dorsale, jusqu'au quart de l'inférieure : la suivante de moitié plus courte. Premier article des tarses à une ou deux hachures.

Long. 0,0013 (2/3 l.) Larg. 0,0006 (1/4 l.)

Corps allongé ; étroit ; entièrement noir, garni de poils soyeux, couchés, fauves ou d'un fauve livide, qui lui donnent une teinte grisâtre. Tête en ligne presque droite à son bord postérieur. Antennes prolongées au moins jusqu'au cinquième de la longueur des élytres ; subfiliformes, peu ou point dentées au côté interne ; à troisième article plus grêle et plus court que le deuxième : les cinquième à dixième plus longs que larges ; souvent d'un testacé obscur à la base. Prothorax en ligne presque droite ou légèrement arquée en devant ; peu élargi d'avant en arrière en ligne faiblement arquée ; bissinué à la base, avec la partie médiale obtusément tronquée, débordant de chaque côté l'écusson de la moitié de la largeur de la base de celui-ci, subarrondie à ses angles, en ligne courbe depuis ceux-ci jusqu'à chaque sinuosité : celles-ci, en angle très-ouvert, correspondant aux deux cinquièmes de la largeur de chaque élytre à partir de la suture ; en ligne arquée en devant depuis chaque sinuosité jusqu'à ses angles postérieurs, qui sont vifs et un peu courbés en arrière ; à peu près aussi long sur son milieu qu'il est large à la base ; convexe ; noir ; pubescent. Ecusson petit ; triangulaire ; noir ; pubescent. Elytres subparallèles jusqu'aux deux tiers, en ogive chacune à l'extrémité ; quatre fois et quart aussi longues que le prothorax sur ses côtés ; deux fois et demie aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble ; médiocrement convexes ; noires ; pubescentes. Repli étroit, à peu près aussi large que le postépisternum à son extrémité. Pygidium assez robuste ; en cône pointu ; aussi long que les deux cinquièmes d'un



élytre : une fois et demie plus long qu'il est large à la base ; noir ; pubescent ; dépassant l'hypopygium d'un tiers à peine de sa longueur. *Dessous du corps* noir ; pubescent. *Postépisternums* étroits ; graduellement rétrécis d'avant en arrière ; en ligne droite à leur côté interne ; cinq fois aussi longs qu'ils sont larges à l'extrémité. *Pieds* noirs ; pubescents. *Tibias postérieurs* marqués de trois hachures obliques : l'antérieure, prolongée sur tout leur côté externe, depuis la moitié de l'arête dorsale, jusqu'au quart antérieur de l'inférieure : la deuxième subparallèle, de moitié environ plus courte : la troisième peu apparente, dorsale. *Eperons* de ces tibias peu inégaux. Premier article des tarses à une ou deux hachures. *Ongles* indistinctement denticulés.

Cette espèce se trouve rarement dans les environs de Lyon. Elle paraît peu commune en France.

Obs. Elle se distingue de la *M. episternalis* par la petitesse de sa taille ; par ses postépisternums en ligne droite à leur côté interne, étroits, à peine plus larges à leur partie postérieure que le repli ; par son pygidium plus court, plus robuste ; par son hypopygium égal aux deux tiers du pygidium.

Elle m'a été envoyée par M. le Dr Hampe comme étant la *M. pumila* de M. L. Redtenbacher ; si elle est véritablement l'insecte décrit par ce naturaliste, il est douteux que ce soit l'espèce du même nom de Gyllenhal.

Peu le comte Mannerheim, de célèbre mémoire, a décrit dans les *Bulletins de la Société des Naturalistes de Moscou* ( 1844 ) p. 198, une *Mordella troglodytes*, ainsi caractérisée :

Elongata, nigra, immaculata, creberrime punctulata, dense fusco-sericea, thoracis latitudine parum breviori, basi profunde bissinuato, lobo medio truncato, aculeo ani elongato, conico, antennis simplicibus.

A en juger par un exemplaire observé dans la collection de M. Reiche, cet insecte, dont la description peut convenir à beaucoup d'autres Mordellistènes, se rapporterait à notre *M. liliputiana*.

♂♂. Hachures du tibia postérieur non prolongées sur toute la largeur de leur face externe.

1. Cinquième à dixième articles des antennes moins d'une fois plus longs qu'ils sont larges.

ζ. Moitié postérieure au moins de l'arête des tibias postérieurs marquée de hachures.

7. *M. grisea*. Allongée; noire, revêtue d'un duvet fauve livide, mi-doré à certain jour, donnant au noir une teinte brun fauve. Lobe médiane de la base du prothorax obtusément tronqué, souvent échancré. Ecusson ordinairement cendré. Repli des élytres à peine égal à la moitié de la largeur du postépisternum; celui-ci subparallèle dans sa seconde moitié. Pygidium en cône presque en pointe, à son extrémité; une fois plus long que l'hypopygium. Tibias postérieurs marqués sur les quatre septièmes postérieurs de leur arête dorsale, de quatre ou cinq hachures peu obliques, peu avancées sur leur face externe. Premier article des tarses à trois ou quatre hachures; le deuxième, à deux.

*Mordella grisea*, (FÖRBLICH) (DEJEAN), Catal. (1821) p. 73. — *Id.* (1833) p. 249. — *Id.* (1857) p. 241.

Long. 0,0053 à 0,0045 (1 1/2 à 2 l.) Larg. 0,0009 à 0,0010 (2/5 à 9/20 l.)

Corps allongé; entièrement noir, garni de poils soyeux, d'un fauve livide, mi-dorés à certain jour, et donnant au dessus du corps une teinte d'un brun fauve. Tête faiblement en angle très-ouvert dans le milieu de son bord postérieur. Palpes maxillaires à dernier article moins d'une fois plus long à son côté externe qu'il est large dans son milieu. Antennes prolongées environ jusqu'au cinquième ou au quart des élytres; pubescentes; noires; à premier et deuxième articles courts, presque égaux: le troisième plus grêle et un peu plus court que le deuxième: les cinquième à dixième comprimés, subdentés au côté interne, plus longs que larges: le onzième, ovalaire. Prothorax avancé en angle obtus et très-ouvert à son bord antérieur, déprimé ou subsinué de chaque côté de la ligne médiane; faiblement arqué sur les côtés, offrant vers la moitié de sa longueur sa plus grande largeur; bissinué à la base, avec la partie médiane prolongée en arrière, obtusément arquée ou obtusément tronquée, souvent subéchancrée au devant de l'écusson; débordant la base de celui-ci, de la moitié au moins de la largeur de cette base; offrant, vers la moitié de la largeur de chaque étui, le point le plus avancé de chaque sinuosité basilaire, et les angles vifs et un peu dirigés en arrière; un peu plus large à la base qu'il est long sur son milieu; convexe; à peine déprimé à la base, vers chaque sinuosité; à teinte brun fauve. Ecusson assez petit; en triangle obtus; souvent revêtu d'un duvet cendré. Elytres aussi larges en devant que le prothorax; quatre fois aussi longues que lui sur les côtés, trois fois environ aussi longues que ce dernier sur sa ligne médiane, deux fois et demie à trois fois aussi longues

qu'elles sont larges à la base, prises ensemble; presque parallèles, en ogive ou subarrondies chacune à l'extrémité; médiocrement convexes; à teinte brun fauve. *Repli* à peine aussi large que le tiers ou que la moitié des postépisternums, vers la moitié de la longueur de ceux-ci. *Pygidium* en cône très-étroitement tronqué ou presque en pointe à son extrémité; égal aux deux cinquièmes ou plus de la longueur des élytres; noir, garni d'un duvet semblable au reste du dessus du corps. *Hypopygium* une fois environ plus court que le pygidium. *Dessous du corps* noir; pointillé; pubescent, mi-doré à certain jour. *Postépisternums* en ligne presque droite au côté interne; subparallèles dans leur seconde moitié; obliquement tronqués à l'extrémité; d'un tiers moins large à celle-ci qu'en devant. *Pieds* noirs; pubescents. *Tibias postérieurs* au moins aussi longs que le premier article des tarses; marqués sur les quatre septièmes ou deux tiers postérieurs de leur arête dorsale ordinairement de quatre ou cinq, plus rarement de trois hachures, peu obliques, à peine plus avancées sur le côté externe, que le quart ou le tiers de la largeur de celui-ci. *Premier article des tarses postérieurs* marqué de trois ou quatre hachures: le deuxième, de deux ou trois.

Cette espèce paraît habiter la plupart des parties de la France, surtout les parties méridionales. J'ai trouvé sa larve dans les racines de l'*Euphorbia gerardiana*; l'insecte parfait m'est éelos du 20 au 25 juin. Suivant M. Perris, cette larve vivrait aussi dans les tiges du *Calamagrostis arenaria*.

Obs. Elle se distingue des trois espèces précédentes, par ses tibias postérieurs, n'offrant aucune hachure prolongée sur toute leur face latérale.

8. *M. subtruncata*. Allongée; noire; à pubescence concolore, en dessus. Lobe médiale de la base du prothorax tronqué. Sinuosités prothoraciques correspondant aux trois cinquièmes au moins de la base de chaque élytre. *Repli* de celles-ci une fois au moins plus étroit que le postépisternum vers son milieu: celui-ci subparallèle dans sa seconde moitié. *Pygidium* en cône étroitement tronqué à l'extrémité, près d'une fois plus long que l'hypopygium. *Tibias postérieurs* marqués sur les quatre septièmes ou deux tiers postérieurs de leur arête dorsale de cinq ou six hachures à peine prolongées jusqu'au tiers de la largeur de leur face externe. *Premier article des tarses* à trois ou quatre hachures: le deuxième, à deux ou trois.

Long. 0,0035 à 0,0045 (4 2/3 à 1 2/8 l.) Larg. 0,0009 à 0,0012 (2/5 à 1/2 l.)

*Corps* allongé : étroit : entièrement noir ; à duvet soyeux, brun ou concolore, en dessus. *Tête* un peu échancrée en arc faible ou en angle très-ouvert à son bord postérieur. *Antennes* prolongées jusqu'au quart environ des élytres ; à troisième article grêle, un peu plus court que le deuxième : le quatrième un peu plus grand que ce dernier : les cinquième à dixième subdentés, presque carrés, à peine plus longs que larges. *Prothorax* un peu anguleusement avancé dans le milieu de son bord antérieur ; à lobe médiaire de sa base tronqué, débordant un peu l'écusson, émoussé aux angles ; échancré en arc irrégulier dirigé en avant, à partir de ceux-ci, jusqu'à ses angles postérieurs ; à sinuosités basilaires correspondant environ à la moitié de la base de chaque élytre : au moins aussi long sur son milieu qu'il est large à la base. *Elytres* deux fois et demie aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble ; subarrondies chacune ou obtusément et un peu obliquement tronquées à leur partie postérieure. *Pygidium* en cône étroitement tronqué à son extrémité ; égal environ aux deux cinquièmes de la longueur d'une élytre ; un peu moins d'une fois plus long que l'hypopygium. *Dessous du corps* et *pieds* noirs ; garnis de poils d'un fauve livide, mi-dorés à certain jour. *Postépisternums* en ligne droite à leur côté interne, subparallèles dans leur seconde moitié ; obliquement tronqués à leur extrémité ; une fois au moins plus larges que le repli à cette dernière. *Tibias postérieurs* marqués sur les deux tiers ou trois cinquièmes postérieurs de leur arête dorsale de cinq ou six hachures obliques, médiocrement allongées sur leur face externe. *Premier article des tarsi* à quatre hachures : le deuxième à deux ou trois.

Cette espèce se trouve dans les environs de Lyon ; elle est surtout commune dans le midi.

**Obs.** Elle se distingue de la *M. grisea* par le dessus de son corps garni d'un duvet noir ; par le lobe médiaire de la base de son prothorax non échancré ; par son écusson jamais de couleur cendrée ; par ses tibias postérieurs marqués généralement, ainsi que le premier article des tarsi, d'un plus grand nombre de hachures ; par son pygidium visiblement tronqué à l'extrémité.

Les caractères tirés des hachures rendent très-faciles à distinguer les *M. inaequalis*, *episternalis* et *liliputiana*, chez lesquelles la première de ces lignes s'étend obliquement sur toute la largeur de la face latérale du tibia postérieur. La *M. grisea* présente dans la teinte d'un brun fauve ou d'un brun marron de son duvet un cachet particulier, qui ne permet pas de la confondre avec les suivantes. La



*M. subtruncata* se reconnaît encore assez bien, au lobe médiaire de la base de son prothorax assez largement tronqué, aux sinuosités basilaires du même segment correspondant aux trois cinquièmes ou même un peu plus de la largeur de chaque élytre, à partir de la suture; à son pygidium étroitement tronqué. Les espèces suivantes présentent la plupart plus de difficultés, parce que les hachures semblent offrir, chez les mêmes espèces, quelques variations dans leur nombre, dans leur largeur et dans leur rapprochement.

Toutes ces espèces ont les antennes subfiliformes, souvent à peine dentées, surtout chez les ♀; les postépisternums en ligne droite à leur côté interne, au moins une fois plus large à l'extrémité que le repli des élytres; les hachures prolongées jusqu'au quart, au tiers ou à peine à la moitié de la largeur du côté externe des tibias; le premier article des tarses postérieurs aussi long que le tibia.

9. *M. pumila*; GYLLENHAL. *Étroite; noire, à pubescence concolore, en dessus. Lobe médiaire de la base du prothorax tronqué et subéchancré dans son milieu. Sinuosités prothoraciques correspondant à la moitié environ de la base de chaque élytre. Pygidium en cône pointu; une fois plus long que l'hypopygium. Tibias postérieurs marqués, sur les quatre derniers septièmes de leur arête dorsale, de trois à cinq hachures peu avancées sur leur face latérale. Premier article des tarses à trois ou quatre hachures: le second, à deux ou trois.*

*Mordella* (espèce voisine de l'*aculeata*) LATR. *Gener.* t. 2. p. 209?

*Mordella pumila*, GYLLENH. *Ins. suec.* t. 2. p. 605. 2?

*Mordella elongata*, (DEJ.) *Catal.* (1821) p. 75? — *Id.* (1833) p. 219? — *Id.* (1837) p. 241?

Long. 0,0030 à 0,0036 (1 2/3 à 1 2/3 l.) Long. 0,0007 à 0,0009 (1/3 à 2/3 l.)

*Corps* étroit; allongé; entièrement noir; aspèremment pointillé, garni en dessus d'une pubescence soyeuse, couchée, concolore, au moins sur les élytres et sur la majeure partie du prothorax, avec les parties antéro-latérales de celui-ci garnies de poils d'un fauve livide, mi-doré. *Antennes* à deuxième et troisième articles ordinairement presque égaux: le troisième, plus grêle que le deuxième: les cinquième à dixième, comprimés, à peine dentés au côté interne: les cinquième et sixième les plus larges et les plus longs. *Prothorax* au moins aussi long sur son milieu qu'il est large à la base; à lobe médiaire tronqué et ordinairement échancré ou subéchancré au devant de l'écusson, débordant un peu celui-ci, subarrondi à ses



angles : sinuosités basilaires correspondant chacune environ à la moitié de la largeur des étuis. *Elytres* deux fois et demie environ aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble. *Pygidium* égal aux deux cinquièmes (♀) ou à la moitié (♂) de la longueur d'une élytre. *Dessous du corps* garni de poils d'un fauve livide, mi-dorés à certain jour : ces poils ordinairement plus obscurs sur les quatre derniers arceaux du ventre. *Postépisternums* en ligne droite à leur côté externe ; obliquement tronqués à l'extrémité ; une fois au moins plus larges à celle-ci que le repli. *Tibias postérieurs* marqués sur les quatre derniers septièmes de leur arête dorsale de trois à cinq hachures un peu obliques, peu avancées sur leur face latérale. *Premier article des tarses postérieurs* au moins aussi long que la jambe ; à trois, quatre ou cinq hachures : le deuxième, à deux ou trois.

Cette espèce paraît se trouver dans la plupart des parties de la France.

Obs. Latreille, le premier, avait remarqué parmi les Mordelles à corps noir, des individus au corps plus étroit, devant constituer une espèce particulière, à laquelle il n'attacha aucun nom. Gyllenhal donna la dénomination spécifique de *pumila*, à des exemplaires qui paraissent se rapporter à la nôtre, car dans le t. 4 de ses Insectes de Suède, cet illustre écrivain ajoute que le lobe médiaire de la base du prothorax est échancré : mais il ne serait pas impossible que le savant auteur eût confondu plusieurs espèces sous le même nom.

Le pygidium varie de longueur. Parfois il est à peine deux fois et quart aussi long qu'il est large à la base ; d'autres fois sa longueur égale au moins trois fois sa largeur basilaire. Chez les ♀, il est, en général, plus court que chez les ♂. Sous le rapport du nombre des hachures, on trouve les variations suivantes :

Var. α. Cinq hachures aux tibias (*M. pentas*). (Premier article des tarses à quatre ou à cinq hachures).

Var. β. Quatre hachures aux tibias (*M. pumila*). (Premier article des tarses postérieurs 1<sup>o</sup> à quatre ou cinq hachures. 2<sup>o</sup> à trois hachures).

Var. γ. Tibias postérieurs à trois hachures (*M. deficiens*) (Premier article des tarses à trois ou quatre hachures).

La var. β. est la plus commune.

10. *M. stricta*; Ach. Costa. Etroite ; noire ; à pubescence presque concolore, en dessus. Lobe médiaire de la base du prothorax arqué en arrière. Sinuosités prothoraciques correspondant à la moitié de la base de

chaque élytre. Pygidium en cône allongé et pointu, près d'une fois plus long que l'hypopygium. Tibias postérieurs marqués sur les quatre septièmes postérieurs de leur arête dorsale de cinq hachures, peu prolongées sur leur face externe. Premier article des tarses postérieurs à trois ou quatre hachures : le deuxième, à deux.

*Mordella stricta*, ACN. COSTA, Faun. d. Regn. di Napol. (*Mordellidées*) p. 16. 1. pl. 21. fig. 4. (type).

Long. 0,0043 (2 l.) Larg. 0,0014 (2/3 l.)

Obs. Elle se rapproche de la *M. subtruncata*, par le nombre des hachures et par l'étendue qu'elles occupent sur l'arête des tibias postérieurs ; mais elle s'en éloigne par le lobe médiaire de la base de son prothorax arqué en arrière au lieu d'être tronqué ; par son pygidium terminé en pointe ; par son corps plus étroit.

Elle a plus d'analogie avec la *M. pumila* sous le rapport, de la forme de son pygidium ; mais elle en diffère par le lobe prothoracique arqué en arrière.

Dans la collection de M. Cl. Rey, j'ai vu une *Mordellistena* qui semble devoir constituer une espèce particulière :

**M. tarsata.** *Étroite ; noire ; à pubescence obscure , au moins sur les élytres, en dessus. Lobe médiaire de la base du prothorax arqué ou obtusément arqué en arrière. Pygidium en cône allongé et pointu, une fois au moins plus long que l'hypopygium. Tibias postérieurs marqués sur les quatre septièmes postérieurs de leur arête dorsale de quatre ou cinq hachures non avancées jusqu'au tiers de la largeur de la face latérale : premier article des tarses à quatre ou cinq hachures : le deuxième, à trois : le troisième, à deux.*

Long. 0,0043 (2 l.) Larg. 0,0010 (1/2 l.)

Elle a été prise dans les environs de Lyon.

Obs. Elle se rapproche de la *stricta* par la forme du lobe de la base du prothorax ; mais elle s'en éloigne ainsi que de toutes les espèces voisines par le troisième article des tarses marqué de hachures. Est-ce un caractère constant ou une anomalie ? je n'en ai vu qu'un exemplaire.

11. **M. stenidea.** *Étroite ; noire ; à pubescence concolore, en dessus. Lobe médiaire de la base du prothorax tronqué. Sinuosités protho-*

raciques correspondant à la moitié environ de la base de chaque élytre. Pygidium en cône pointu ; une fois environ plus long que l'hypopygium. Tibias postérieurs marqués, sur la moitié postérieure de leur arête dorsale, de trois ou quatre hachures peu avancées sur leur face latérale. Premier article des tarses, à trois ou quatre hachures : le suivant, à deux.

Long. 0,0022 à 0,0026 (1 à 1 1/3 l.)

On la trouve dans les diverses parties de la France. Elle n'est pas rare dans les environs de Lyon.

Obs. Elle a beaucoup d'analogie avec la *M. pumila* ; elle est comme celle-ci aspéremment pointillée en dessus ; mais elle en paraît néanmoins différer spécifiquement. Elle a le lobe médiaire de la base du prothorax non échancré ; les tibias postérieurs, marqués seulement sur la dernière moitié de leur arête dorsale, de quatre hachures dont la dernière parfois peu distincte.

Elle offre aussi des variations sous le rapport de la longueur et des proportions du pygidium et sous celui du nombre des hachures.

Var.  $\alpha$ . Tibias à quatre hachures. (Premier article des tarses ordinairement à quatre, quelquefois à trois).

Var.  $\beta$ . Tibias à trois hachures.

Dans la collection de M. Perroud, j'ai vu une Mordellistène qui peut être ainsi caractérisée :

**M. Perroudi.** *Étroite ; noire ; à pubescence d'un fauve livide, mi-doré à certain jour, donnant au fond une teinte grisâtre. Lobe médiaire de la base du prothorax arqué en arrière. Sinuosités basilaires du prothorax correspondant aux trois cinquièmes de la base de chaque élytre. Pygidium en cône allongé et pointu, une fois environ plus long que l'hypopygium. Tibias postérieurs marqués sur la moitié seulement de leur arête dorsale de quatre ou cinq hachures peu prolongées sur la face latérale. Premier article des tarses à quatre hachures : le deuxième, à deux.*

Long. 0,0015 (2 l.) Larg. 0,0014 (2/3 l.)

Elle a été prise par M. Perroud dans les environs de Lyon.

Obs. Elle s'éloigne des *M. pumila* et *stenidea* par son prothorax arqué en arrière ; de la *stricta* par son duvet fauve ; de toutes trois

par le lobe médiaire de la base de son prothorax plus largement tronqué, et par les sinuosités prothoraciques plus rapprochées du bord externe. Est-elle une variété anormale de la *subtruncata*? je ne la mentionne provisoirement que pour mémoire, n'en ayant vu qu'un exemplaire.

A cette section se rattache l'espèce suivante :

**M. confinis**; Ach. Costa. Allongée; noire; à pubescence d'un fauve livide, donnant au fond une teinte grisâtre; quatre premiers articles des antennes, bouche, palpes, quatre cuisses antérieures, testacés: tibias et tarses des quatre premiers pieds graduellement obscurs vers l'extrémité. Deuxième article des antennes de moitié moins court que le suivant: les troisième et quatrième égaux. Lobe médiaire de la base du prothorax arqué en arrière. Pygidium prolongé en cône pointu, une fois plus long que l'hypopygium. Tibias postérieurs marqués sur la seconde moitié de leur arête dorsale de trois hachures, égales, à peine prolongées sur sa face externe.

*Mordellistena confinis*, Ach. Costa, Faun. del Regn. di Napoli. (*Mordellidées*) p. 18. 4.

Long. 0,0019 (5/6 l.) — pygidium 0,0007 (1/3 l.) Larg. 0,0037 (1 2/3 l.)

Obs. La couleur de sa bouche, de la base de ses antennes et de ses quatre pieds antérieurs, suffit pour la faire reconnaître parmi les espèces à élytres noires, ayant la seconde moitié de leurs tibias postérieurs marquée de trois ou quatre hachures presque uniquement dorsales.

Elle n'a pas, à ma connaissance, été trouvée en France.

Œ. Deux cinquièmes postérieurs de l'arête dorsale des tibias postérieurs seuls marqués de hachures, peu avancées sur leur face latérale.

**12. M. minima**; A. Costa. Etroite; noire; à pubescence fauve livide. Lobe médiaire de la base du prothorax arqué en arrière: sinuosités prothoraciques correspondant à la moitié de la base de chaque élytre. Pygidium en cône allongé et pointu une fois au moins plus long que l'hypopygium. Tibias postérieurs marqués, sur les deux cinquièmes de leur arête dorsale, de trois hachures non prolongées jusqu'au tiers de la largeur de leur face laté-

rale. Premier article des tarsi à trois hachures : le deuxième, à une ou deux.

*Mordelliesna minima*, Ach. COSTA, Faun. du Regn. di Napol (*Mordellidées*) p. 13. 5. pl. 21. fig. 1. (type).

Long. 0,0026 à 0,0053 (1 1/5 à 1 1/2 l.) Larg 0,0007 (1/3 l.)

Cette espèce est principalement méridionale.

Obs. Les antennes sont à peu près filiformes à partir du troisième article : les cinquième à dixième articles, comprimés, presque carrés, à peine plus longs qu'ils sont larges. Le dernier article des palpes est à peine une fois plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Le pygidium est au moins deux fois et demie aussi long qu'il est large à la base.

J'ai reçu de M. Edouard Perris, de Mont-de-Marsan, une *Mordellistène* presque semblable à la *minima* par sa taille, par son duvet, par la plupart de ses caractères ; mais ayant le lobe médiaire de la base du prothorax très-obtusément arqué ou faiblement échancré dans son milieu, et les palpes maxillaires aussi longs que toute la partie de la tête comprise depuis la moitié du front, jusqu'à l'extrémité des mandibules, à dernier article trois fois aussi long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Peut-être cet individu est-il le type d'une espèce particulière (*M. Perrisi*) : il faut de nouvelles observations pour émettre à cet égard une opinion plus positive.

Dans nos provinces méridionales on trouve des *Mordellistènes* ayant la plus grande analogie par la taille et par les autres caractères avec la *M. minima* ; mais en différant par le dessus de leur corps garni d'un duvet noir et par leurs tarsi postérieurs à quatre hachures au lieu de trois. Peut-être de tels individus qui semblent constituer une espèce particulière (*M. trilineata*) ne sont-ils que des variétés de la précédente.

Enfin, l'on trouve dans le midi de la France des *Mordellistènes* d'une taille exiguë (0,0023 l.), qui ont beaucoup d'analogie avec la *M. trilineata* ; mais ils n'ont plus que deux hachures sur les deux cinquièmes postérieurs de l'arête dorsale des tibia postérieurs : deux ou trois sur le premier article des tarsi : une ou deux sur le deuxième. Le dernier article des palpes maxillaires est à peine deux fois aussi long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand. Sont-ils des exemplaires plus petits de la *M. trilineata* qui, en perdant



de leur taille, ont aussi perdu une hachure sur les tibias ? ou constituent-ils une espèce particulière (*M. infima*) ?

Près de ces Mordellistènes à élytres noires, il faut sans doute placer les suivantes, si toutefois elles ne se rattachent pas à quelques-unes des nôtres :

**M. parvula** ; GYLLENHAL. Nigra, immaculata, sericeo-pubescens, thorace latitudine fere brevior, aculeo ani brevi, conico, antennis simplicibus.

Variat antennarum basi femoribusque anticis, picco-testaceis.

*Mordella parvula*, GYLLENH. INS. SUEC. t. 4. p. 519.

L'illustre auteur aurait-il confondu plusieurs espèces sous la même dénomination ? ou sa *parvula* se rattacherait-elle à notre *inaequalis* ?

**M. breviceauda** ; BOHEMAN. Nigra immaculata, sericeo-pubescens ; prothorace subquadrato, basi profundius bisinuato ; antennis filiformibus serratis, aculeo ani brevi, conico.

Long. 0,0040 (1 3/4 l.) Larg. 0,0012 (1/2 l.)

*Mordella breviceauda*, GU. BOHEMAN. MEM. de l'Acad. des sc. de Stockholm, 1849, p. 223.

« Cinquième à dixième articles des antennes une fois plus longs qu'ils sont larges.

**13. M. artemisiae** ; (REY). Allongée ; noire sur la tête et sur le prothorax, brun ou d'un brun fauve sur le reste ; garnie d'un duvet flavescent, mi-doré à certain jour. Antennes prolongées au moins jusqu'à la moitié des élytres ; à cinquième à dixième articles une fois plus longs que larges, à peine subdentés. Prothorax à lobe médiaire de la base arqué en arrière ; à angles postérieurs subarrondis. Tibias postérieurs et premier article des tarsi, marqués sur leur arête dorsale de hachures dépassant à peine cette arête et peu apparentes.

Long. 0,0053 (1 1/2 l.) Larg. 0,0011 (1/2 l.)

Corps allongé ; garni d'un duvet soyeux et couché ; coloré comme il sera dit. Tête en angle très-ouvert à son bord postérieur ; garnie d'un duvet fauve ou fauve livide ; noire : labre d'un fauve rougeâtre. Palpes bruns. Yeux munis postérieurement d'un rebord très-étroit. Antennes prolongées au moins jusqu'à la moitié des élytres ; d'un

fauve testacé; à premier article un peu moins court et plus gros que le deuxième : celui-ci à peu près égal au quatrième, et un peu moins court que le troisième qui est plus grêle : les cinquième à dixième une fois au moins plus longs que larges, à peine subdentés au côté interne : le dernier, ovulaire ou oblong. *Prothorax* avancé en angle obtus et très-ouvert dans le milieu de son bord antérieur : déprimé et subsinué à ce bord de chaque côté de la ligne médiane : subparallèle sur les côtés : bissinué à la base, avec la partie médiane prolongée en arrière, obtusément arquée, débordant la base de l'écusson de la moitié environ de la largeur de celle-ci; offrant vers la moitié de la largeur de chaque étau le point le plus avancé de chaque sinuosité basilaire; à angles postérieurs subarrondis; d'un quart environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu; convexe; noir, garni d'un duvet fauve livide. *Ecusson* médiocre; en triangle obtus; noir, garni d'un duvet flavescent. *Élytres* à peine aussi larges en avant que le prothorax à sa base; quatre fois environ aussi longues que celui-ci sur les côtés; deux fois et demie à deux fois et trois quarts aussi longues que celui-ci sur son milieu; deux fois et quart environ aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble; subparallèles, subarrondies chacune à l'extrémité; médiocrement convexes; brunes ou d'un brun fauve, garnies d'un duvet flavescent ou flave cendré, mi-doré à certain jour. *Repli* moins large que la moitié des postépisternums. *Pygidium* en cône tronqué ou parfois presque bifide à son extrémité; à peine plus long que le tiers des élytres; noir, à duvet concolore. *Hypopygium* d'un tiers plus court que le pygidium. *Dessous du corps* brun, garni d'un duvet court, flavescent, mi-doré à certain jour. *Postépisternums* en ligne droite à leur côté interne, faiblement rétrécis dans leur seconde moitié; obliquement tronqués à l'extrémité; d'un tiers moins larges à celle-ci qu'en avant. *Pieds* fauves ou d'un brun fauve, avec les cuisses postérieures plus obscures. *Tibias* postérieurs un peu plus longs que le premier article des tarses; marqués sur la seconde moitié de leur arête supérieure, de quatre ou cinq hachures peu apparentes, dépassant à peine l'arête du côté de la face latérale externe. *Premier article des tarses* à trois ou quatre hachures, exclusivement dorsales, peu apparentes : deuxième article presque sans hachure bien marquée.

Cette espèce vit dans l'Armoise vulgaire, suivant M. Rey. La collection de mon savant ami et celle de M. Reiche, m'ont fourni les types de cette description.

Obs. Cette espèce s'éloigne de toutes les autres par la longueur de

ses antennes, par la grandeur des articles cinq à dix de ces organes ; par les angles postérieurs de son prothorax qui sont subarrondis ; par la brièveté de ses hachures qui ne dépassent pas l'arête des tibias. Elle mériterait de former un genre particulier (*G. Tolida*).

Genre *Stenalia*, STÉNALIE.

CARACTÈRES. *Tibias postérieurs* à une seule hachure vers les trois cinquièmes de leur arête dorsale : offrant cette arête brusquement moins saillante après la hachure, et paraissant, par là, munie d'une sorte de dent. *Bord postérieur de la tête* prolongé derrière les yeux presque jusqu'à la moitié du côté extérieur de ces organes. *Antennes* plus grêles à la base, comprimées et plus ou moins sensiblement subdentées à leur côté interne, du cinquième au dixième article : le onzième, ovulaire. *Pygidium* subparallèle dans sa moitié antérieure ou un peu plus, subsinuément en cône tronqué dans ses deux cinquièmes postérieurs. *Épisternums du postpectus* presque en forme de virgule, rétrécis d'avant en arrière, en ligne courbe à leur côté interne. *Corps* très-étroit.

Obs. L'insecte sur lequel repose cette coupe se distingue de ceux de la précédente, non-seulement par une hachure unique, mais par la saillie ou dent du tibia postérieur, et par la forme des postépisternums et par le bord de la tête prolongé derrière les yeux.

1. *S. testacea*; FABRICIUS. *Allongée ; étroite ; à pubescence d'un fauve livide, mi-dorée ; noire ; base des antennes et élytres d'un flave testacé : celles-ci, obscures à la base, nébuleuses à l'extrémité, à rebord sutural et souvent partie du bord externe, noirâtres.*

♂. Antennes subdentées à partir du cinquième article ; noires, avec les deux ou quatre premiers articles ordinairement fauves ou d'un brun fauve.

♀. Antennes peu sensiblement dentées ; noires, avec les quatre premiers articles habituellement d'un testacé flavescent.

*Mordella testacea*, FABR. Mantiss. t. 1. p. 218. 14. — *Id.* Entom. Syst. t. 1. 2. p. 114. 4. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 125. 9. (suivant le type). — GUEL. CAR. LINN. Syst. Natur. t. 1. p. 2023. 18. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 85. 15. — GYLLENH. Ins. succ. t. 2. p. 613. 10.

*Mordella humeralis*, var. β. PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 186. 6.

*Mordella angustata*, (DEJ.) Catal. (1821) p. 75. — *Id.* (1855) p. 219. — *Id.* (1857) p. 241.

*Mordella chirargra*, L. Dufour, Excurs. p. 72. 431.

Long. 0,0038 à 0,0056 (1 2/3 à 2 1/2 l.) Larg. 0 0010 à 0,0014 (2/5 à 2/3 l.)

*Corps* allongé; étroit; revêtu d'un duvet fin, soyeux, couché; mi-doré à certain jour. *Tête* en angle très-ouvert à son bord postérieur; noire ou d'un brun noir, avec le bord antérieur de l'épistome et le labre ordinairement d'un fauve testacé. *Palpes maxillaires* habituellement bruns ou d'un brun noir, rarement d'un testacé obscur. *Antennes* non prolongées jusqu'aux angles postérieurs du prothorax; d'un roux testacé sur les deux à quatre premiers articles, et parfois même sur quelques-uns des suivants; d'un noir brun sur les autres; soyeuses; comprimées, peu dentées, surtout chez la ♀, à partir du cinquième article: le dernier ovalaire, *Prothorax* anguleusement avancé dans le milieu du bord antérieur; légèrement arqué sur ses côtés; bissinué à la base, c'est-à-dire coupé en ligne presque droite sur chaque quart externe, avec la partie médiane prolongée en arrière, obtusément tronquée, une fois plus large que la base de l'écusson, couvrant jusqu'au quart de la largeur de chaque élytre; à angles postérieurs subarrondis: chaque sinuosité, en angle très-ouvert, correspondant à la moitié de la largeur de chaque étui; moins large à la base qu'il est long sur son milieu; convexe; noir ou noir brun; revêtu d'un duvet gris cendré, mi-doré. *Ecusson* petit; en triangle obtus; noir brun; pubescent. *Elytres* aussi larges à la base que le prothorax à ses angles postérieurs; près de cinq fois aussi longues que lui sur les côtés; deux fois et quart aussi longues que lui sur son milieu; deux fois et demie aussi longues qu'elles sont larges à la base, prises ensemble: d'un flave testacé, avec la base noirâtre, et l'extrémité nébuleuse ou obscure: la partie basilaire noirâtre, à limites indécises, presque nulle à l'épaule, dépassant un peu l'écusson, à la suture; ornées d'une bordure suturale noire ou noirâtre, réduite au rebord; également noirâtres ou obscures sur les deux tiers postérieurs du bord externe. *Repli* presque nul, même en devant. *Pygidium* subparallèle d'avant en arrière, presque sur ses trois cinquièmes antérieurs, sub-sinuément rétréci en arrière postérieurement en cône tronqué: cette partie conique à peine plus longue qu'elle est large à la base. *Hypopygium* une fois plus court que le pygidium. *Dessous du corps* noir; luisant; pointillé; garni d'un duvet soyeux, fin, peu épais, cendré, mi-doré. *Postépisternums* rétrécis d'avant en arrière, arqués à leur côté interne, obtus à l'extrémité; deux fois aussi longs qu'ils sont larges à la base. *Pieds* garnis d'un duvet grisâtre, mi-doré; noirs ou d'un noir brun, avec les cuisses antérieures parfois d'un brun testacé ou d'un



testacé obscur. *Tibias postérieurs* marqués d'une hachure vers les deux tiers de leur arête dorsale, avec la partie postérieure de cette arête brusquement moins élevée, offrant ainsi une sorte de dent vers les trois cinquièmes précités : éperon externe en général une fois au moins plus court que l'interne. *Ongles* à peine denticulés.

Cette espèce est méridionale.

Obs. Ordinairement les antennes sont testacées à la base sur les deux à quatre premiers articles, quelquefois même nébuleuses sur le cinquième; d'autres fois elles sont obscures ou entièrement d'un brun noir. Les palpes, ordinairement de cette couleur, sont parfois d'un testacé plus ou moins nébuleux. Les cuisses antérieures et même les jambes de devant se montrent quelquefois d'une teinte semblable. La partie basilaire des étuis est noirâtre, plus ou moins foncée. La bordure suturale est tantôt noire et bien marquée, tantôt presque décolorée. Les individus chez lesquels elle est bien caractérisée ont ordinairement les deux tiers du bord latéral noir; chez les autres, la bordure externe est indistincte.

J'ai vu dans la collection de mon ami M. Perroud, deux exemplaires envoyés de Hongrie, d'une taille un peu moins petite, noirs ou d'un noir brun, avec les élytres brunes ou d'un brun testacé. Chez l'un de ces individus la partie conique du pygidium était très-courte. La couleur du corps et celle des élytres était-elle due à quelque cause accidentelle? ces exemplaires n'offriraient-ils qu'une variation singulière, ou seraient-ils les représentants d'une espèce particulière (*S. brunipennis*)?

## DEUXIÈME FAMILLE.

### ANASPIENS.

CARACTÈRES. *Sommet de la tête* de niveau avec le bord antérieur du prothorax. *Pygidium* en triangle obtus, notablement plus large à la base qu'il est long sur son milieu, par conséquent non prolongé en pointe conique. *Hanches postérieures* visiblement moins longues que le postpectus. *Tibias antérieurs* munis d'éperons très-apparents. *Tibia postérieur* beaucoup plus court que tous les articles réunis du tarse qui le suit. *Avant-dernier article des tarsi postérieurs* entier. *Ongles* simples, ou munis seulement à la base de chacun de leurs crochets, d'une dent rudimentaire. *Corps* un peu arqué longitudinalement. *Antennes* insérées vers le bord antéro-interne des yeux ou



entre ce point et le milieu du bord interne; de médiocre longueur; subfiliformes ou grossissant plus ou moins sensiblement vers l'extrémité; à troisième article ordinairement plus grêle.

Ajoutez à ces caractères plus importants :

*Tête* petite; subarrondie; inclinée. *Épistome* généralement distinct du front. *Labre* transverse. *Mandibules* courtes; cornées; bifides à l'extrémité. *Mâchoires* à deux lobes : l'un des deux au moins frangé. *Palpes maxillaires* allongés, à dernier article sécuriforme ou en forme de coudre. *Yeux* entiers, chez les uns; échancrés, chez quelques autres; aboutissant ou à peu près au bord postérieur de la tête. *Prothorax* un peu plus large en devant que la tête; plus large à la base qu'il est long sur son milieu; à angles antérieurs déclives et presque confondus avec le repli; à bords latéraux sans rebord, tranchants seulement sur leur seconde moitié: convexe en devant, graduellement moins convexe en arrière; à angles postérieurs peu ou point émoussés, rectangulairement ouverts et ordinairement un peu courbés en arrière. *Écusson* petit. *Elytres* allongées; laissant généralement à découvert une partie du pygidium; peu ou point sensiblement rebordées à la suture. *Ventre* de cinq arceaux, avec le sixième parfois en partie apparent. *Hanches antérieures* élargies, contiguës. *Hanches intermédiaires* allongées, couchées, séparées par le mésosternum généralement étroit. *Pieds* postérieurs au moins allongés.

Les Larves paraissent toutes vivre aux dépens des végétaux, comme celles des Mordelliens.

On doit à M. Perris les premiers renseignements sur la vie évolutive de ces insectes.

Les ♂ de diverses espèces d'Anaspiens sont munis, sur quelques-uns des derniers arceaux du ventre, de sortes de lanières dont le nombre, la forme, la longueur et la direction varient. M. le docteur Suffrian a le premier fait connaître (1) le parti qu'il est possible d'en tirer pour la distinction des espèces. Il est à regretter que la plupart des écrivains (2) qui se sont occupés de ces insectes, aient négligé ces caractères, qui offrent des moyens faciles de rattacher à chaque espèce les variations qui s'en éloignent le plus.

La déplorable coutume de coiler les Coléoptères, empêche souvent

(1) Entomol. Zeitung t. 5. (1844) p. 25.

(2) M. Costa, le seul des écrivains modernes qui les ait utilisés, a fondé sur ces caractères son genre *Plesianaspis* que je n'ai pu adopter, car les bases sur lesquelles il repose n'existent que chez le ♂.

d'étudier ces signes distinctifs, surtout quand on n'a pas le soin de présenter l'espèce en dessus et en dessous.

Ces insectes peuvent être partagés en trois genres :

Hanches postérieures

arquées en arrière à leur bord postérieur, plus longues que le premier arceau ventral. Tibia postérieur plus court que les deux premiers articles des tarses postérieurs réunis. Quatrième article des tarses antérieurs peu distinct; comme enchâssé dans le troisième, qui est bilobé.

Repli des élytres graduellement et faiblement rétréci, offrant ses deux bords distincts jusque vers l'extrémité du troisième arceau ventral.

GENRES.

*Anaspis*.

Repli des élytres graduellement et assez fortement rétréci, réduit à une tranche à partir du bord postérieur des hanches de derrière.

*Silaria*.

en ligne presque droite, au moins sur les deux tiers internes de leur bord postérieur; plus courtes que le premier arceau ventral. Tibia postérieur au moins aussi long que les deux premiers articles des tarses postérieurs réunis. Quatrième article des tarses de devant distinct du troisième, à peine moins court que lui, bilobé.

*Pentaria*.

Genre *Anaspis*, ANASPE; Geoffroy (1).

(α, privatif; ἀσπίς, écusson) (2).

CARACTÈRES. *Hanches postérieures* arquées en arrière à leur bord postérieur: plus longues que le premier arceau ventral, du moins dans le point intermédiaire entre la ligne médiane de cet arceau et son bord latéral. *Tibia postérieur* visiblement plus court que les deux premiers articles des tarses postérieurs réunis. *Quatrième article des tarses antérieurs* peu apparent; comme enchâssé dans le troisième, qui est bilobé (3). *Yeux* généralement échancrés. *Repli des élytres* graduellement et faiblement rétréci, offrant ses deux bords distincts jusque vers l'extrémité du troisième arceau ventral.

(1) Hist. abr. des ins. t. 1. p. 315.

(2) Cette définition ne doit pas être prise à la lettre. Toutes les Anaspes ont un écusson apparent; mais il est généralement petit.

(3) La difficulté d'apercevoir le quatrième article avait trompé Geoffroy; il croyait ces insectes tétramères.

α. Elytres noires sans taches.

β. Prothorax noir.

γ. Sixième à dixième articles des antennes subglobuleux (♂) ou submoniliformes (♀), à peu près d'égale grosseur, à peine aussi longs qu'ils sont larges dans leur diamètre transversal le plus grand.

**1. A. monilicornis.** *Allongée ; pubescente ; noire ; trois ou quatre premiers articles des antennes et partie au moins des palpes d'un flave ou d'un roux testacé ; épistome, labre et partie au moins des pieds antérieurs, soit de même couleur, soit bruns. Sixième à dixième articles des antennes moniliformes (♂) ou submoniliformes (♀), à peine aussi longs que larges : le dernier près d'une fois plus grand que le dixième. Mésosternum prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches.*

♂. Quatrième arceau ventral à peu près uniformément développé dans le sens de la longueur, faiblement moins grand que le troisième ; tantôt subéchancré, tantôt à peine prolongé en forme de dent sur sa ligne médiane ; sans appendices, ainsi que le troisième. Cinquième arceau longitudinalement fendu sur le milieu, avec chaque partie divisée par cette fente, terminée en pointe obtuse : cette fente offrant l'image d'un sillon longitudinal parfois un peu élargi dans son milieu ou près de son extrémité postérieure. Sixième à dixième ou septième à dixième articles des antennes subglobuleux ou moniliformes. Trois premiers articles des tarses antérieurs, en général, médiocrement dilatés : les deux premiers, parfois à peine dilatés : le premier, un peu moins grand ou quelquefois presque aussi grand que le deuxième.

♀. Troisième et quatrième arceaux du ventre presque égaux ; sans appendices : le cinquième, en ogive, sans sillon. Sixième à dixième ou septième à dixième articles des antennes submoniliformes, obtusément tronqués à leur extrémité. Tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu le troisième article : le premier, une fois plus long que le deuxième.

ETAT NORMAL. Noire : trois premiers articles des antennes d'un flave orangé ou d'un flave testacé : le quatrième, d'un flave nébuleux. Palpes d'un flave testacé ou d'un flave orangé. Épistome et labre bruns. Pieds bruns, avec les genoux, les tibias et les tarses moins obscurs ou d'un brun testacé.

OBS. Les antennes, parfois flaves seulement sur leurs trois premiers articles, offrent rarement chez d'autres exemplaires le cinquième en

partie flavescent. L'épistome, souvent brun, passe d'autres fois au testacé, au flave ou même au flave orangé. Les palpes maxillaires, en général uniformément de l'une de ces nuances, sont parfois flaves, avec le dernier article nébuleux, brunâtre, ou même brun. Les pieds surtout offrent des variations nombreuses ; souvent ils sont comme dans l'état considéré comme normal ; mais parfois les tibias et tarses antérieurs sont testacés ou d'un fauve testacé ; d'autres fois les tibias et tarses de tous les pieds sont de la même teinte ; chez d'autres exemplaires les pieds antérieurs en entier sont testacés ou d'un flave testacé ; chez d'autres enfin, les cuisses de devant sont seules de cette teinte, et les tibias et tarses sont nébuleux ou brunâtres.

A l'une de ces variétés ayant l'épistome et les pieds bruns, se rapporte l'espèce suivante :

*Anaspis melanostoma*, Ach. Costa, Faun. d. Regn. di Napoi. (*Mordellidées*), p. 23. 4. pl. 22. fig. 6. (♀) (suivant le type).

Long. 0,0033 à 0,0045 Larg. 0,0011 à 0,0015 (1/2 à 2/3 l.)

*Corps* allongé ; arqué ; médiocrement convexe ; coloré comme il sera dit ; garni d'une pubescence soyeuse, donnant aux parties noires une teinte d'un noir cendré ou grisâtre. *Tête* noire, avec le labre et l'épistome parfois testacés. *Palpes maxillaires* d'un flave testacé, au moins sur leurs trois premiers articles. *Antennes* prolongées jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes (♂) ou jusqu'au quart ou un peu plus (♀) des élytres ; grossissant graduellement vers l'extrémité, à partir du cinquième ou du sixième article : les premier et deuxième, assez courts, crassiuscules, presque égaux : les troisième et quatrième, presque égaux, les plus longs des dix premiers : le troisième, au moins aussi grand ou plus grand que le quatrième, une fois plus long qu'il est large : les sixième à dixième ou les septième à dixième subglobuleux ou moniliformes (♂), très-obtusément arrondis, ou arqués à leur extrémité : avec les angles émoussés ou subarrondis, à peine aussi longs qu'ils sont larges dans leur diamètre transversal le plus grand : le dernier, ovalaire, allongé, près d'une fois plus grand que le dixième ; noires, avec les trois premiers articles flaves, et le quatrième ordinairement d'un flave nébuleux. *Prothorax* élargi en ligne courbe jusqu'aux trois cinquièmes au moins de sa longueur et à peine rétréci ensuite (♂) ou élargi jusqu'à la base (♀) ; bissubsinué à celle-ci, avec



la partie médiaire ordinairement faiblement arquée en arrière, ou obtuse; d'un tiers ou de moitié plus large à la base qu'il est long sur son milieu; noir: pubescent. *Ecusson* en triangle obtus; noir. *Elytres* aussi larges en avant que le prothorax; près de quatre fois aussi longues que ce dernier sur son milieu; faiblement élargies vers la moitié de leur longueur; en ogive émoussée à leur extrémité; médiocrement convexes; noires; pubescentes. *Repli* à peu près aussi large en avant que la moitié des postépisternums, moins large que ceux-ci vers leur extrémité, graduellement rétréci jusque vers le bord postérieur du troisième arceau ventral. *Dessous du corps* noir; très-brièvement pubescent. *Mésosternum* prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* graduellement rétrécis, obtusément en pointe ou presque obliquement tronqués à l'extrémité. *Quatrième arceau du ventre* de longueur uniforme, presque aussi grand que le précédent (♂ ♀). *Pieds* colorés comme il a été dit: hanches postérieures ordinairement sans traces de ligne transversale près de l'attache des cuisses.

Cette espèce se trouve dans les environs de Lyon, et paraît habiter la plupart des provinces de la France. Elle se montre dans nos campagnes, en mai et juin.

Obs. L'*A. monilicornis* a probablement été confondue par divers auteurs avec l'*A. frontalis* et surtout avec l'*A. rufilabris*. Elle s'éloigne de cette dernière par une taille généralement moins petite, et par la longueur proportionnellement plus grande du dernier article des antennes. Les ♂ sont très-distincts entre eux. Celui de l'*A. monilicornis* manque d'appendices au troisième arceau ventral; offre le quatrième presque aussi long que le précédent: le cinquième, fendu; il a le premier article des tarses presque aussi long que le deuxième, et souvent peu dilaté. Celui de l'*A. rufilabris* est muni de deux appendices linéaires, naissant près de la ligne médiane du troisième arceau ventral; il offre le quatrième moins grand: le cinquième, bilobé; les tarses antérieurs sensiblement dilatés, avec le premier article près d'une fois plus court que le deuxième. Quant aux ♀, il est très-difficile souvent de les distinguer. Les teintes des parties de la bouche et des pieds sont si variables, qu'on ne peut à cet égard établir aucune règle fixe. Celles de l'*A. monilicornis*, outre la taille moins petite, et la longueur plus grande du dernier article des antennes, ont le mésosternum prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches; n'ont généralement point de traces de courte ligne transversale près de l'insertion des cuisses postérieures, (séparée de la ligne



transversale plus extérieure et plus longue); la raie transversale, située de chaque côté, vers l'extrémité postérieure du postpectus, n'est pas ordinairement sinuée ou arquée en avant dans sa moitié interne; mais ces derniers caractères n'ont pas une constance rigoureuse.

Quant à l'*A. frontalis*, la forme et la longueur des articles sixième à dixième des antennes, la moitié antérieure du front d'un roux testacé, etc., ne permettent pas de la confondre avec l'*A. monilicornis*.

Obs. Dans la belle collection de mon ami M. Cl. Rey, j'ai vu une ♀ de l'*A. monilicornis*, offrant le front graduellement d'un brun tirant sur le testacé, vers sa partie antérieure: les cinq premiers articles des antennes et la base du sixième, d'un flave testacé; les pattes antérieures, les tibias et tarses intermédiaires et les tibias postérieurs, d'un flave fauve ou roussâtre; le prothorax brun, avec une bordure antérieure assez étroite, sans bornes précises, et une bordure basilaire à limites également indécises, couvrant au moins le tiers postérieur des côtés, interrompue ou presque interrompue dans son milieu, d'un roux testacé, ou paraissant de cette teinte, avec une bande transversale brune, prolongée presque jusqu'à la base, sur la ligne médiane.

2. *A. rufilabris*; (STURM) GYLLENHAL. Allongée; pubescente; noire; épistome, bouche, palpes et ordinairement partie au moins des tibias et des tarses, d'un testacé brun ou brunâtre: trois ou quatre premiers articles des antennes, testacés. Celles-ci, à articles sixième à dixième, moniliformes (♂) ou submoniliformes (♀), à peine aussi longs que larges: le dernier, de moitié plus grand que le dixième. Mésosternum prolongé presque jusqu'à l'extrémité des hanches.

♂. Quatrième arceau ventral uniformément développé dans le sens de la longueur de l'insecte: égal environ aux trois quarts de la longueur du troisième: celui-ci donnant naissance près de la ligne médiane à deux appendices linéaires, ou à deux sortes de lanières, velues ou ciliées, prolongées jusqu'à la moitié du cinquième arceau, droites jusqu'à leur extrémité, paraissant séparées entre elles par un sillon, quand elles sont couchées, c'est-à-dire dans leur état normal. Cinquième arceau non creusé d'une fossette; bilobé à son extrémité. Sixième à dixième ou septième à dixième articles des antennes subglobuleux ou moniliformes. Trois premiers articles des tarses antérieurs

presque uniformément dilatés, et veloutés en dessous : le deuxième, de moitié au moins, ou près d'une fois plus grand que le premier.

♀. Quatrième arceau ventral semblable, pour son développement, à celui du ♂; sans appendices. Cinquième arceau de forme ordinaire, c'est-à-dire en ogive et non bilobé à l'extrémité. Sixième à dixième articles des antennes submoniliformes, obtusément tronqués à leur extrémité. Tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu le troisième article : le premier, une fois environ plus long que le deuxième.

ETAT NORMAL. Noire : trois premiers articles des antennes testacés : le quatrième, souvent d'un testacé nébuleux. Epistome, labre, bouche et palpes maxillaires, d'un testacé brun ou brunâtre ou d'un brun testacé. Cuisses antérieures souvent d'un testacé brunâtre : les autres, noires : genoux, tibias et tarses d'un testacé brunâtre.

Obs. Les antennes ont parfois le quatrième article testacé, soit à la base et graduellement obscur à l'extrémité, soit plus rarement entièrement testacé. Le labre et l'épistome varient du testacé au brun : les palpes du testacé au brun testacé. Les cuisses, parfois toutes brunes, ou même d'un brun noirâtre sur les quatre postérieures, avec les genoux d'un brun testacé, sont ordinairement d'un brun testacé ou d'un testacé brun sur les antérieures et quelquefois sur toutes les autres, avec les genoux testacés, parfois même toutes sont testacées : les tibias et les tarses, souvent testacés ou d'un testacé livide, sont parfois bruns, comme les cuisses, même chez les ♂. Les pieds, surtout, offrent, sous le rapport de la coloration, des variations nombreuses.

*L'Anaspe noire*, GEOFFROY, Hist. abr. t. 1. p. 316. 1. pl. 5. fig. 7.

*Anaspis nigra*, FOURCR. Entom. par. t. 1. p. 141. 1.

*Mordella clavicornis*, FORST. Centur. p. 66 ? — GMEL. C. LINN. Entom. Syst. t. 1. p. 2025. 28 ? — GOEZE, Entom. Beytr. t. 1. p. 711. 4 ? — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 741 ? — MARSH. Ent. brit. t. 1. p. 494. 22.

*Mordella atra*, FAER. Ent. Syst. t. 1. 2. p. 115. 10. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 126. 23. — PANZ. Entom. germ. p. 213. 8. — FALL. Observ. Entom. 1<sup>re</sup> part. p. 11.

*Mordella nigra*, ROSSI, Mantiss. t. 1. p. 95. 215. — *Id.* Edit. HELW. t. 1. p. 441. 213.

*Mordella frontalis*, var. b. GYLLENH. Ins. succ. t. 2. p. 614. 11. — SCHONH. Syn. Ins. t. 3. p. 88. var. β.

*Anaspis frontalis*, var. LATR. Hist. nat. t. 10. p. 210. 1. var.

*Mordella rufilabris*, (STURM) GYLLENHAL, Ins. suec. t. 4, p. 521. 11-12. — SAHLBEAG, Ins. fenn. p. 488. 12.

*Anaspis atra*, DUBÉNIL, Dict. des sc. nat. t. 2, p. 105. 5.

*Anaspis rufilabris*, ZETTERST. Ins. lapp. p. 166. 2. — L. REDTENB. Faun. aust. p. 616.

Long. 0,0028 à 0,0033 (1 1/4 à 1 2/5 l.) Larg. 0,0009 à 0,0015 (2/5 à 2/5 l.)

*Corps* allongé ou suballongé ; arqué ; médiocrement convexe ; coloré comme il sera dit ; revêtu d'une pubescence soyeuse, donnant aux parties noires une teinte d'un noir cendré ou grisâtre. *Tête* noire, avec l'épistome, le labre, la bouche et les palpes, d'un brun testacé ou d'un testacé brun : extrémité des mandibules noirâtre. *Antennes* prolongées environ jusqu'au quart (♂) ou un peu moins (♀) des élytres ; grossissant graduellement à partir du cinquième ou du sixième article : les premier et deuxième, courts, crassiuscules : le deuxième, à peine plus grand que la moitié du suivant : les troisième et quatrième, les plus longs des six premiers, presque égaux : le troisième, au moins aussi grand que le quatrième, une fois plus long qu'il est large : les sixième à dixième ou du moins les septième à dixième, moniliformes (♂), ou élargis en ligne courbe d'arrière en avant, obtusément tronqués à leur extrémité, avec les angles émoussés, à peine aussi longs qu'ils sont larges dans leur diamètre transversal le plus grand (♀) : le dernier, suballongé, rétréci dans sa seconde moitié, de moitié environ plus grand que le dixième ; noires, avec les trois ou quatre premiers articles testacés ou d'un fauve livide. *Prothorax* élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié et faiblement ensuite jusqu'à la base ; bissubsinué à celle-ci, avec la partie médiaire tronquée ; d'un tiers ou de moitié plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; noir ; pubescent. *Ecusson* assez petit ; en triangle émoussé postérieurement ; noir ; pubescent. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax ; trois fois et demie à quatre fois aussi longues que ce dernier sur son milieu ; faiblement élargies vers la moitié de leur longueur, en ogive émoussée à l'extrémité ; médiocrement convexes ; noires ; pubescentes. *Repli* à peu près aussi large en devant que la moitié des postépisternums, moins large que ceux-ci vers leur extrémité, graduellement rétréci et à deux bords distincts jusqu'à l'extrémité du troisième arceau ventral. *Dessous du corps* noir ; très-brièvement pubescent. *Mésosternum* prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* obtusément et obliquement tronqués à l'extrémité ; trois fois et demie environ aussi longs qu'ils sont larges à la base.

*Quatrième arceau du ventre uniformément égal (♂ ♀) aux trois quarts environ du précédent. Pieds colorés comme il a été dit; hanches postérieures offrant ordinairement les traces d'une courte ligne transversale près de l'insertion des cuisses.*

Cette espèce paraît habiter la plupart des provinces de la France. On la trouve dans les environs de Lyon, dans les mois de mai et de juin, principalement sur les montagnes.

γγ. Sixième à dixième articles des antennes, grossissant ordinairement graduellement, non moniliformes ou submoniliformes.

δ. Cinquième article des antennes visiblement plus grand que le deuxième.  
ε. Front en partie d'un roux testacé.

δ. **A. frontalis**; LINNÉ. *Allongée; pubescente; noire: moitié antérieure du front, parties de la bouche, trois ou quatre premiers articles des antennes, cuisses et partie au moins des tibia antérieurs, d'un roux testacé ou d'un flave testacé. Sixième à dixième articles des antennes élargis en ligne droite de la base à l'extrémité: les septième à neuvième plus longs (♂) ou à peine aussi longs (♀) qu'ils sont larges à l'extrémité. Mésosternum non prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches.*

♂. Quatrième arceau ventral uniformément développé dans le sens de la longueur de l'insecte; égal aux trois quarts environ du troisième: celui-ci, donnant naissance, près de la ligne médiane, à deux appendices ou sortes de lanières velues ou ciliées, prolongées jusque vers la moitié du cinquième arceau, courbées chacune en dedans à leur extrémité: quatrième arceau parfois légèrement sillonné, de chaque côté de la ligne médiane, qui se montre parfois alors légèrement carénée: ces légers sillons, destinés à loger les lanières. Cinquième arceau creusé sur la ligne médiane d'une fossette profonde et ovalaire; bilobé à son extrémité. Sixième à huitième articles des antennes plus longs qu'ils sont larges à leur extrémité: les neuvième et dixième, à peine aussi larges à celle-ci qu'ils sont longs. Trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés, surtout le deuxième; veloutés en dessous: le deuxième, un plus long que le premier. Trois premiers articles des tarses postérieurs prolongés en forme de dent à l'extrémité de leur arête dorsale.

♀. Quatrième arceau du ventre comme chez le ♂. Le troisième, sans appendices: le cinquième, sans fossette distincte. Septième à dixième articles des antennes, surtout les huitième à dixième, un peu



plus courts ou à peine aussi longs qu'ils sont larges à l'extrémité. Tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu le troisième article : le premier, de moitié environ plus long que le deuxième. Deux premiers articles des tarses postérieurs prolongés en forme de dent à l'extrémité de leur arête dorsale.

ETAT NORMAL. Noire : quatre premiers articles des antennes (♂) ou les trois premiers articles seulement (♀), d'un flave roussâtre : le quatrième, chez celle-ci, d'un flave roussâtre à la base, graduellement obscur vers l'extrémité. Cuisses et tibias antérieurs d'un flave roussâtre ou testacé : cuisses intermédiaires souvent d'un fauve testacé (♂) : autres parties des pieds, noires.

Obs. Le cinquième article des antennes est parfois de la couleur des précédents, au moins chez le ♂. Quelquefois l'arête dorsale des tibias antérieurs, et plus rarement celle des cuisses de devant, est noirâtre. Chez divers individus, chez les ♂ surtout, les cuisses intermédiaires sont d'un fauve flavescents ou livide, et les tarses antérieurs se rapprochent de la même teinte. Enfin chez d'autres exemplaires, chez lesquels la matière noire a été moins abondante, les cuisses postérieures, et moins visiblement les tibias intermédiaires, se rapprochent plus ou moins du testacé ou du testacé livide.

Chez quelques autres exemplaires, la couleur testacée des parties claires a pris une teinte plus rapprochée du roux orangé ou de l'orangé ; elle s'est étendue davantage, a envahi parfois le sixième article des antennes, les côtés de la partie postérieure du front, vers le côté interne des yeux, les côtés du prothorax sur une largeur variable ou indéterminée, quelquefois même le bord antérieur de ce segment. Mais la forme des appendices du ♂ et les autres caractères montrent que ces individus, d'une coloration singulière, considérés jusqu'à ce jour comme constituant une espèce, ne sont qu'une variation du corsage de l'*A. frontalis*. Gyllenhal l'avait déjà soupçonné. A cette variété se rapporte la synonymie suivante :

- Mordella lateralis*, FABR. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 114. 8. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 125. 25. — PANZ. Entom. germ. p. 216. 6. — GYLLENH. Ins. succ. t. 2. p. 616. 12. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 43. 2. — *Id.* Man. p. 331. 2594. — SAHLB. Tas. fenn. p. 490. 13.
- Anaspis lateralis*, DUFÉOY, Dict. des sc. nat. t. 2. p. 42. 7. — SENONN. Syn. ins. t. 5. p. 88. 2. — FISCHER, Entomogr. t. 2. p. 223. 6. — ZETTERST. Faun. lapp. p. 290. 3. — *Id.* Ins. lapp. p. 166. 4. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 260. 3. — L. DUF. Excurs. p. 72. 437. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 616.



## Synonymie de l'état ordinaire :

- Mordella frontalis*, LINN. Syst. Nat. 10<sup>e</sup> édit. 1758. t. 1. p. 420. 5. — *Id.* 12<sup>e</sup> édit. t. 1. p. 682. 4. — *Id.* Faun. suec. p. 229. 834. — FAER. Syst. Entom. p. 264. 10. — *Id.* Spec. Ins. t. 1. p. 335. 12. — *Id.* Mant. ins. t. 1. p. 219. 17. — *Id.* Ent. Syst. t. 1. 2. p. 114. 9. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 25. 24. — MULLER, Zool. Dan. prodr. p. 84. 915. — GOEZE, Entom. Beyt. t. 1. p. 709. 4. — *Id.* Faun. Eur. t. 8. p. 847. 5. — SCHRANK, Enum. p. 228. 429. — *Id.* Faun. boic. t. 1. p. 573. 728. — GMEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 2024. 4. — DE VILLERS, C. LINN. Entomol. t. 1. p. 407. 4. — ROSSI, Mant. t. 1. p. 95. 212. — *Id.* app. 153. — *Id.* édit. HELW. t. 1. p. 441. 212. — OLIV. Encycl. méthod. t. 7. p. 759. 17. — *Id.* Entomol. t. 5. n<sup>o</sup> 64. p. 7. 6. pl. 1. fig. 6, a, b, c. — PANZ. Faun. germ. 13. 13. — *Id.* Entom. germ. p. 213. 7. — *Id.* Index, p. 150. 4. — CEDERH. Faun. ing. prodr. p. 73. 224. — PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 183. 1. — MARSH. Entom. brit. 1. p. 491. 10. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 614. 11. et t. 4. p. 521. 11. — SAHLB. Ins. fenn. p. 489. 11.
- Anaspis frontalis*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 418. 2. — *Id.* Gener. t. 2. p. 210. 1. — DUMÉRIL, Dict. des sc. nat. t. 2. p. 103. 6. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 426. 1. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 87. 1. — GOLDFUSS, Handb. p. 528. — FISCHER, Entomogr. de la Russie t. 2. p. 222. 5. — ZETTERST. Faun. lapp. p. 288. 1. — *Id.* Ins. lapp. p. 165. 1. — MULS. Lettr. t. 2. p. 295. 3. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 42. 1. — *Id.* Mau. p. 351. 2595. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 266. 1. — L. DEFOUR, Excurs. p. 72. 456. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 616. — ACH. COSTA, Faun. d. Regn. di Nap. (*Mordellidées*) p. 21. 1. pl. 22. fig. 5.
- Mordella flavifrons*, ESCHSH. Mem. del'Acad. des sc. de St-Pétersb. (Voy. GERMAR's Magaz. t. 4. p. 401. 21.)

Long. 0,0033 à 0,0045 (1 1/2 à 2 l.) Larg. 0,0008 à 0,0020 (2/3 à 9/10 l.)

*Corps* allongé ou suballongé; arqué; médiocrement convexe; coloré comme il sera dit; revêtu d'une pubescence courte et soyeuse, donnant aux parties noires une teinte d'un noir cendré ou grisâtre. *Tête* noire sur sa partie postérieure, avec la partie antérieure, depuis la moitié environ du front, d'un fauve flave ou d'un testacé roussâtre. *Bouche* et *palpes* de l'une de ces teintes. *Antennes* prolongées jusqu'au sixième (♀) ou au cinquième (♂) des élytres; graduellement plus grosses vers l'extrémité, surtout chez la ♀; à troisième et quatrième articles, les plus longs, deux fois et demie à trois fois aussi longs qu'ils sont larges, presque égaux: le troisième, ordinairement un peu plus grand que le quatrième: les sixième à dixième, élargis de la base à l'extrémité; noires, avec les trois premiers articles et ordinairement la base (♀) ou la majeure partie (♂) du quatrième article, flaves ou

d'un flaye livide. *Prothorax* élargi en ligne un peu courbe ou un peu arquée d'avant en arrière; bissubsinué à la base, avec la partie médiale un peu arquée en arrière et un peu plus prolongée que les angles; d'un tiers au moins plus large à la base qu'il est long sur son milieu; noir; pubescent: luisant. *Ecusson* assez petit; en triangle subéquilateral; noir; pointillé. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax; quatre à cinq fois aussi longues que ce dernier dans son milieu; graduellement et faiblement élargies vers la moitié de leur longueur; en ogive chacune à l'extrémité; médiocrement convexes; noires; pubescentes, luisantes. *Repli* moins large ou à peine aussi large en devant que la moitié du postépisternum, aussi large que celui-ci vers le bord antérieur des hanches postérieures, offrant généralement ses deux bords distincts au moins jusque vers l'extrémité du troisième arceau. *Dessous du corps* noir; finement pubescent. *Mésosternum* non prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* graduellement rétrécis en pointe un peu obtuse; trois fois et demie aussi longs qu'ils sont larges en devant. *Quatrième arceau du ventre* uniformément aussi grand (♂ ♀) que les deux tiers au moins du précédent. *Pieds* colorés comme il a été dit. *Tibias* et deux ou trois premiers articles des tarses postérieurs bordés d'une frange pectinée et obliquement coupés à leur extrémité d'avant en arrière, de dessous en dessus, offrant leur arête dorsale prolongée en espèce de dent.

Cette espèce paraît habiter presque toutes les parties de la France. On la trouve communément dans les environs de Lyon, au printemps et en été, sur les ombelles, les aubépines, etc., et en fauchant les prés.

Obs. Elle a généralement à peu près la taille de l'*A. monilicornis*; elle est moins petite que l'*A. rufilabris*. Elle se distingue de ces deux espèces par son mésosternum non prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches; par les sixième à dixième articles des antennes élargis en ligne droite et tronqués à l'extrémité, au lieu d'être moniliformes (♂) ou submoniliformes (♀); par la couleur de la moitié antérieure de son front. Le ♂ de l'*A. frontalis* se distingue facilement de celui des deux autres espèces. Son troisième arceau ventral est pourvu de deux appendices courbés en dedans à leur extrémité. Chez l'*A. rufilabris*, ces appendices sont droits; chez l'*A. monilicornis*, ces sortes de lanières manquent: le cinquième arceau de l'*A. frontalis* est creusé d'une fossette ovalaire profonde: celle-ci, manque chez l'*A. rufilabris*: le cinquième arceau de l'*A. monilicornis* est fendu ou sillonné. Le premier article des tarses antérieurs du ♂ de l'*A. frontalis* se distingue, par sa brièveté, de celui de l'*A. monilicornis*.

## 15. Front noir.

4. **A. forcipata.** Allongée ; pubescente ; noire : trois à cinq premiers articles des antennes flaves ou testacés : labre, palpes, épistome et pieds parfois entièrement de même couleur : pieds postérieurs ordinairement noirs ou bruns : les intermédiaires et l'épistome souvent d'un roux brun ou bruns. Antennes grossissant à partir du septième article : le deuxième, de moitié au moins aussi grand que le suivant : les troisième et quatrième les plus longs, presque égaux : les sixième à dixième, plus longs que larges.

♂. Quatrième arceau ventral graduellement un peu plus court vers la ligne médiane, à peine plus grand vers cette ligne que le quart du troisième arceau : ce dernier, sensiblement avancé sur le quatrième, sur le tiers médiaire environ de sa largeur, aussi long sur ce point que les deux arceaux suivants réunis : le troisième, déprimé et tronqué ou faiblement échancré en arc sur les deux septièmes médiaires de son bord postérieur, donnant naissance, vers chacune des extrémités de cette échancrure, à un appendice cilié, linéaire, prolongés chacun presque jusqu'à l'extrémité du cinquième arceau ou le dépassant un peu : le quatrième, pareillement échancré et donnant naissance, à chaque extrémité de cette échancrure, à un appendice très-court, peu apparent : le cinquième arceau déprimé ou concave, relevé sur les côtés en une tranche graduellement plus sensiblement saillante d'avant en arrière, bilobé et cilié à son extrémité. Tarses antérieurs à peine dilatés, si ce n'est un peu le troisième ; à premier article une fois environ plus long que le deuxième.

♀. Quatrième arceau ventral uniformément développé, égal au moins aux deux tiers du troisième : ces arceaux sans appendices : le cinquième, en ogive à son extrémité. Tarses antérieurs non dilatés ; à premier article à peu près aussi long que les trois suivants réunis.

ETAT NORMAL. Noire : trois ou quatre premiers articles des antennes, épistome, labre, palpes et quatre pieds antérieurs flaves ou d'un flave orangé : pieds postérieurs d'un brun noir, maculés de roux testacé ou parfois entièrement d'un flave testacé.

Obs. En considérant comme normal cet état chez lequel la matière colorante flave a pris le plus d'extension, on peut observer, chez quelques individus, diverses variations. Ainsi le cinquième article des

antennes est parfois également flave; d'autres fois l'épistome est parfois brun ou brun obscurément roussâtre.

A un exemplaire ♀ présentant ces deux dernières modifications se rapporte l'espèce suivante :

*Anaspis pulicaria*, ACN. COSTA, Faun. d. Regn. di Napol. (*Mordellidées*) p. 22. 3. pl. 22. fig. 5. (suivant le type).

Obs. Quand la matière colorante a été insuffisante, le noir de quelques parties, de la poitrine, par exemple, passe au brun ou même au brun testacé.

Dans les collections de M. Rey et dans celle de M. Marsenl, j'ai vu une variété offrant les appendices du troisième arceau plus pâles ou testacés et courbés chacun en dessous, pendants au lieu d'être couchés sur le corps; ils sembleraient de prime à bord signaler une espèce nouvelle (*A. pendula*); mais la coloration moins complète de ces appendices accuse un manque de matière noire, et la direction anormale de ces pièces est sans doute accidentelle ou le résultat de leur faiblesse, par suite de leur incomplète coloration.

Var. β. *Trois à cinq premiers articles des antennes, labre, partie de l'épistome et pieds antérieurs seuls, testacés.*

Obs. Les pieds intermédiaires varient alors du roux brun au brun testacé ou même au brun: les postérieurs sont d'un brun noir ou d'un noir brun. Les antennes ont quelquefois le quatrième article nébuleux, surtout chez les ♀; d'autres fois, au contraire, le cinquième, principalement chez les ♂, est de la couleur des précédents; mais toutes ces parties claires, à part parfois les antennes, n'ont plus la teinte flave, c'est-à-dire la couleur plus gaie de l'état normal.

Var. γ. *Trois ou quatre premiers articles des antennes testacés ou d'un flave testacé: labre d'un roux brunâtre ou d'un brun testacé. Pieds antérieurs d'un testacé brunâtre ou d'un roux brun ou brunâtre.*

*Anaspis lateralis*, STEPHENS, Illust. t. 5. p. 43. 2. — *Id.* Man. p. 331. 2594. (suivant un exemplaire ♀ communiqué par l'auteur).

Obs. Ces dernières modifications offrent tant de différence avec l'état regardé comme normal, qu'on serait tenté de considérer les



individus qui se rattachent à la variété  $\gamma$  et même ceux de la var.  $\beta$ , comme constituant une espèce particulière (*L. brachialis*); mais les appendices du ventre des  $\sigma$  et les caractères fournis par les antennes qui ne commencent ordinairement à grossir qu'à partir du septième article; les troisième et quatrième articles des mêmes organes, articles qui sont les plus longs et à peu près égaux, la forme des postépisternums et surtout leur largeur à la base, viennent confirmer l'identité de l'espèce.

Long. 0,0028 à 0,0036 (1 1/4 à 1 2/3 l.) Larg. 0,0009 à 0,0011 (2/5 à 1/2 l.)

*Corps* allongé; médiocrement convexe; garni d'une pubescence fine, soyeuse et couchée; coloré comme il va être dit. *Tête* noire: labre, épistome et palpes, colorés comme il a été dit. *Antennes* assez grêles, surtout chez le  $\sigma$ ; prolongées environ jusqu'aux deux cinquièmes des élytres; grossissant graduellement et assez faiblement à partir du septième article: les premier et deuxième, crassiuscules, presque égaux: le deuxième, variablement égal à la moitié ou un peu plus du suivant: les troisième et quatrième, les plus longs, souvent presque égaux: le troisième, variablement un peu plus court ou plus long que le quatrième, au moins une fois et demie plus long que large: le cinquième, un peu moins long que le quatrième: les septième à dixième, élargis assez sensiblement en ligne droite de la base à l'extrémité, tronqués à celle-ci, plus longs qu'ils sont larges à cette dernière: le dernier, ovulaire, d'un tiers ( $\sigma$ ) ou de moitié (?) environ plus grand que le dixième; flaves ou d'un flave roussâtre sur les trois à cinq premiers articles, noires sur les autres. *Prothorax* élargi en ligne un peu arquée; bissubsinué à la base, avec la partie médiaire un peu arquée et un peu plus prolongée en arrière; d'un quart ou d'un tiers plus large à la base qu'il est long sur son milieu; d'un noir brun ou brun, à teinte d'un noir ou d'un brun grisâtre par l'effet du duvet. *Ecusson* petit; triangulaire; pubescent; noir ou brun. *Elytres* aussi larges en avant que le prothorax; trois fois et demie à quatre fois aussi longues que lui; faiblement élargies dans leur milieu, en ogive chacune à l'extrémité; médiocrement convexes; pubescentes; noires ou brunes, à teinte grisâtre, par l'effet du duvet. *Repli* prolongé jusqu'à l'extrémité du troisième arceau. *Dessous du corps* noir; pubescent. *Mésosternum* non prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* allongés, terminés en pointe; plus étroits vers celle-ci que le repli. *Pieds* colorés comme il a été dit.



Cette espèce paraît se trouver dans la plupart des provinces de la France.

Obs. Elle s'éloigne de l'*A. frontalis* par sa taille plus petite ; par son front noir, etc. : des *A. monilicornis* et *rufilabris*, par la forme des articles de ses antennes. Le ♂ est très-distinct d'ailleurs de ceux des espèces précédentes.

♂♂. Troisième article des antennes à peu près égal au deuxième.

5. ***A. labiata*** ; Ach. Costa. Oblongue ; pubescente ; noire ; labre, épistome, partie antérieure du front, six ou sept premiers articles des antennes, côtés de l'antépectus et pieds antérieurs, testacés. Antennes grossissant à partir du cinquième ou sixième article : les premier et deuxième subglobuleux, plus gros que chacun des trois suivants : le deuxième, aussi long que le suivant : les troisième et quatrième, peu distinctement séparés : les quatrième à dixième serrés, plus larges que longs : les trois derniers moins courts que les précédents. Repli aussi large que le quart environ du postépisternum vers l'extrémité de celui-ci.

♂. Quatrième arceau ventral uniformément développé : à peine plus court que le troisième : tous les arceaux sans appendices : le cinquième, tronqué ou à peine entaillé à l'extrémité, offrant sur la ligne médiane une dépression ou surface plane en triangle dont l'extrémité de l'arceau forme la base. Tarses antérieurs non dilatés.

♀. Cinquième arceau en ogive ; non déprimé.

*Anaspis labiata*, Ach. Costa, Faun. del Regn. di Napol. (*Mordellidées*) p. 22.2. pl. 22. fig. 4. (suivant un exemplaire typique)

Obs. La couleur flave ou d'un flave testacé de la base des antennes est parfois réduite aux six et presque aux cinq premiers articles, souvent elle s'étend jusqu'au septième et rarement jusqu'au huitième article. Le prothorax montre parfois sur ses parties antéro-latérales quelque tendance à passer du noir au testacé. Les pieds antérieurs varient de teinte ; ils sont ordinairement plus clairs chez le ♂ : les intermédiaires se montrent parfois, au moins en partie, d'un testacé tirant sur le roux ou le marron : les postérieurs sont quelquefois moins noirs, bruns ou même d'un rouge brun à la base des cuisses et sur une partie des tibias.

Long. 0,0015 (2/3 l.) Larg. 0,0005 (1/5 l.)

*Corps* oblong; médiocrement convexe; garni d'une pubescence très-courte, peu épaisse, soyeuse, peu apparente; offrant des rides ou stries transversales, formant des sortes de bandes transversales squammuliformes; coloré comme il va être dit. *Tête* noire: labre, épistome et partie antérieure du front d'un flave roussâtre livide ou d'un roux testacé. *Antennes* prolongées jusqu'au septième des élytres; grossissant graduellement à partir du cinquième ou sixième article: les premier et deuxième, plus gros que chacun des deux ou trois suivants: le troisième, grêle, à peine aussi long ou à peine plus long que le deuxième, peu distinctement séparé du suivant: les quatrième à dixième, serrés, plus larges que longs: les trois derniers, graduellement plus gros et moins courts que les précédents: le onzième, souvent à peine plus long que large chez le ♂, un peu plus long chez la ♀; d'un flave testacé sur les six ou huit premiers articles, noirs sur les trois ou cinq derniers. *Prothorax* élargi en ligne faiblement arquée sur les côtés; bissubsinué à la base, avec la partie médiaire faiblement arquée en arrière; d'un tiers environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu; noir; pubescent. *Ecusson* petit; triangulaire; noir; pubescent. *Elytres* aussi larges en avant que le prothorax, trois fois et demie environ aussi longues que lui; faiblement élargies dans leur milieu, en ogive chacune à l'extrémité; médiocrement convexes; noires; pubescentes. *Repli* étroit, à peine plus large en avant que le tiers de la base du postépisternum, prolongé jusqu'à l'extrémité du deuxième arceau ventral et parfois un peu moins. *Dessous du corps* brièvement pubescent; noir, avec les côtés de l'antépectus testacés. *Mésosternum* prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* obtusément et obliquement tronqués à l'extrémité; quatre fois environ aussi larges vers celle-ci que le repli. *Pieds* antérieurs, au moins, d'un testacé flavescent ou livide: les suivants, bruns ou d'un testacé marron: les derniers, d'un brun noir: premier article des tarses antérieurs à peu près égal aux trois suivants réunis.

Cette espèce paraît méridionale. Elle m'a été envoyée des environs de Marseille par M. Wachauru; de Mont-de-Marsant par M. Perris; elle a également été prise dans divers lieux de la Provence par M. Rey.

Obs. Elle se distingue de toutes par les articles des antennes serrés, plus courts qu'ils sont larges; par le repli des élytres plus étroit, à peine plus large que le quart du postépisternum, vers l'extrémité de celui-ci, souvent à peine prolongé jusqu'au deuxième arceau ventral; par sa taille plus petite.

αα. Elytres ordinairement noires, avec une ou deux taches flaves ou testacées, rarement testacées avec la base, une bande subtransverse et souvent une partie de la suture, noires.

6. **A. Geoffroyi**; MULLER. Allongée; pubescente; noire, avec les pieds parfois moins obscurs ou même en partie d'un fauve testacé: trois à cinq premiers articles des antennes, épistome, labre, bouche et palpes, d'un flave testacé: dernier article de ceux-ci ordinairement nébuleux. Elytres habituellement ornées chacune d'une tache humérale flave, parfois en outre d'une tache postérieure: rarement flaves, avec la base et une tache liée à la moitié du bord externe, noires. Prothorax alors flave ou d'un rouge testacé au moins à ses bords antérieur et postérieur.

♂. Quatrième arceau ventral à peu près aussi long sur les côtés que le troisième, anguleusement prolongé en arrière sur le cinquième, sur la ligne médiane: ce dernier fendu longitudinalement sur la ligne médiane presque jusqu'à la base, bilobé à son extrémité ou arrondi de chaque côté de la fente. Point de lanières ou appendices sur aucun des arceaux. Sixième à dixième articles des antennes à peine élargis de la base à l'extrémité; près de moitié plus longs qu'ils sont larges à celle-ci. Trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés: le premier, près de moitié plus court que le deuxième.

♀. Quatrième arceau ventral à peu près uniformément égal au troisième; sans prolongement sur sa ligne médiane: le cinquième, simple, non fendu, en ogive postérieurement. Cinquième à septième articles des antennes ordinairement près d'un quart plus longs que larges: les huitième à dixième (ou du moins ce dernier), à peine plus longs qu'ils sont larges à l'extrémité. Troisième article des tarses antérieurs seul un peu dilaté: le premier, au moins aussi long ou ordinairement un peu plus long que le deuxième.

ETAT NORMAL. Elytres noires, ornées chacune d'une tache d'un flave roussâtre, d'un jaune pâle ou d'un flave livide, subhumérale, c'est-à-dire avancée presque jusqu'à la base, couvrant le bord externe presque jusqu'aux deux cinquièmes de sa longueur: presque en parallélogramme plus long que large: généralement moins rapprochée de la base vers sa partie antéro-interne qu'à l'externe: ordinairement étendue jusqu'au quart interne de la largeur des étuis, à son angle postéro-interne, graduellement un peu moins rapprochée de la suture d'arrière en avant: échancrée ou entaillée à son

bord postérieur vers le quart externe ou un peu plus de la largeur, arquée et un peu plus prolongée en arrière, entre cette échancrure et la suture.

Obs. Les antennes ont le plus souvent les trois (♂) ou les quatre premiers (♀) articles des antennes d'un flave testacé, quelquefois même le cinquième est de la même couleur; d'autres fois, au contraire, les trois premiers, les seuls moins obscurs, sont nébuleux ou brunâtres. La tache des élytres est parfois avancée jusqu'à la base, à l'angle huméral, le plus souvent elle ne s'avance pas jusqu'à elle. Quelquefois elle est étendue jusqu'au cinquième de la largeur voisin de la suture; d'autres fois elle s'étend à peine jusqu'au tiers interne: son bord interne ordinairement graduellement moins rapproché de la suture d'arrière en avant, est parfois presque parallèle à celle-ci. Le repli est noir. Les pieds, généralement noirs ou d'un brun noir, chez le ♂, offrent souvent les tibias et les tarses moins obscurs ou même d'un fauve testacé, surtout chez la ♀.

*L'Anaspæ à taches jaunes*, GEOFFR. Hist. abr. t. 1. p. 316. 2.

*Mordella humeralis*, FAER. Syst. Entom. p. 264. 9. — *Id.* Spec. Ins. t. 1. p. 333. 11.

— *Id.* Mant. ins. t. 1. p. 219. 16. — *Id.* Entom. Syst. t. 1. 2. p. 114. 7. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 123. 21. — GOEZE, Entom. Beytr. t. 1. p. 709. 3. — OLIV. Entom. t. 5. n<sup>o</sup> 64. p. 8. 7. pl. 1. fig. 7. a, b. — WALKEN. Faun. par. t. 1. p. 174. 4.

*Anaspis bicolor*, FOURC. Entom. par. t. 1. p. 142. 2.

*Mordella biguttata*, ROSS, Mantiss. Insect. t. 2. app. p. 103. 69. — MARSH. Entom. brit. t. 1. p. 492. 12.

*Anaspis Geoffroyi*, PN W. J. MULLER, Neug. Insekt. in GERMAR'S, Mag. d. Entomol. t. 4. p. 214. 16.

*Anaspis humeralis*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 418. 3. — DUNÉRI, Dict. des sc. nat. t. 2. p. 102. 1. — SCHONH. Syn. Insect. t. 5. p. 90. 7. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 426. 2. — MELS. Lettr. t. 2. p. 293. 1. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 615. — ACH. COSTA, Faun. d. R. di Napol. (*Mordellidées*) p. 24. 5. a. pl. 23. fig. 1.

*Anaspis biguttata*, STEPH. Illustr. t. 3. p. 46. 17. (suivant le type). — *Id.* Man. p. 332. 2609.

Var. A. *Elytres noires ou d'un noir brun, ornées chacune de deux taches flaves, savoir: l'humérale, précitée: la seconde, après la moitié de leur longueur, analogue à la précédente.*

Obs. Chez quelques individus, la tache postérieure, plus ou moins restreinte, est à peine apparente ou seulement indiquée par une sorte de translucidité à limites indécises; chez d'autres, au contraire, elle



est comme la première, flave ou d'une teinte rapprochée. Cette seconde tache varie d'étendue; ordinairement elle commence aux trois cinquièmes ou un peu moins de leur longueur, couvre le bord externe jusqu'aux sept huitièmes ou même plus de la longueur des étuis, et s'étend jusqu'au tiers, aux deux septièmes ou même au quart interne de la largeur de ceux-ci.

Les pieds offrent toutes les variations de couleur du type et souvent sont moins obscurs, d'un fauve testacé ou même d'un testacé livide, sur une partie au moins des tibias et des tarses.

α. Prothorax noir.

*Anaspis Geoffroyi*, PH. W. J. MULLER, Neue Insek. in GERMAR's, Magaz. d. Entom. t. 4. p. 214. 16. var. β.

*Anaspis nigricollis*, CURTIS, Brit. entomol. (suivant un exemplaire communiqué par l'auteur).

*Anaspis fasciata*, STEPH. Illustr. t. 5. p. 46 15. (suivant le type) — *Id.* Man. p. 352. 2607.

*Anaspis 4-maculata*, (DEJEAN) Catal. (1821) p. 73 — (1855) p. 220. — *Id.* (1837) p. 242.

*Anaspis humeralis*, var. b. (*quadrimaculata*), ACH. COSTA, l. c. p. 23. pl. 23. fig. 2. (suivant le type).

Obs. Quelquefois la tache postérieure s'est étendue plus encore, s'est rapprochée de l'extrémité, s'est avancée davantage vers son angle antéro-interne, de manière à rétrécir, surtout vers la suture, l'espèce de bande transversale noire qui la sépare de l'antérieure. La partie noire des élytres a passé au noir brun ou au brun.

*Mordella nigricollis*, MARSH. Ent. Brit. t. 1. p. 492. 12.

*Anaspis nigricollis*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 420. 7. — STEPH. Catal. 249. 2476

β. Prothorax en partie d'un rouge testacé plus ou moins obscur.

Obs. Quelquefois chez la var. A., la matière noire a en partie fait défaut ailleurs que sur les élytres, le prothorax a passé au rouge brun ou au rouge testacé sur plusieurs points de sa surface, parfois même sur la majeure partie de celle-ci; le labre et l'épistome sont testacés ou d'un flave testacé; les cinq ou six premiers articles des antennes, les tibias et tarses antérieurs et intermédiaires, les tarses postérieurs ou seulement la base de leurs articles, quelquefois même la base des tibias postérieurs, sont testacés ou d'un flave testacé.

*Anaspis vulcanica*, ACH. COSTA, Faun. d. Regn. di. Napol. (*Mordellidées*) p. 27. 7. pl. 24. fig. 1. (♀) (suivant le type).



Var. B. *Elytres flaves, d'un flave testacé ou d'un flave orangé, ornées d'une bande basilaire commune, ordinairement en triangle dirigé en arrière, d'une bande transversale vers le milieu de leur longueur, et d'une bordure suturale, noires: cette dernière, réduite environ au cinquième de leur largeur. Repli ordinairement flave ou en partie flave, sur les côtés de la première tache.*

Obs. Dans cette variété la tache antérieure est souvent devenue triangulaire, c'est-à-dire plus fortement épointée à sa partie antéro-interne. La tache postérieure a atteint ou à peu près l'extrémité, s'est aussi rapprochée davantage de la suture. Le prothorax offre souvent des taches ou une bordure d'un flave testacé à ses bords antérieur et postérieur. Les antennes sont souvent flaves sur leurs six premiers articles. Les pieds sont souvent d'un flave testacé ou flavescents, avec les cuisses nébuleuses au moins dans leur milieu.

*Mordella fasciata*, FORSTER, Nov. Spec. insect. p. 65. 65.

*Anaspis Geoffroyi*, PH. W. J. MÜLLER, l. c. var.  $\gamma$ .

*Anaspis humeralis*, var. c. (*cruciata*) A. COSTA, l. c. p. 25. (suivant le type).

Var. C. *Elytres d'un flave orangé ou d'un flave pâle, ornées d'une bande basilaire transversale commune, obtriangulaire sur la suture, et chacune d'une tache irrégulière noire, joignant le bord latéral vers la moitié de sa longueur, non étendue jusqu'à la suture: celle-ci parfois nébuleuse vers l'extrémité. Prothorax flave, d'un flave pâle, d'un flave testacé ou d'un flave orangé, orné d'une bande transversale noire, plus renflée dans son milieu, parfois réduite à une sorte de tache ponctiforme sur le disque.*

Obs. Ici la bordure suturale a disparu ou il n'en reste plus que de faibles traces vers l'extrémité. La bande transversale s'est réduite à une tache. Les bordures flaves du prothorax, qui commençaient à se montrer dans la variété précédente, ont pris un développement tel que le flave occupe la plus grande partie de la surface, en ne laissant, de la couleur noire primitive, qu'une sorte de bande transversale plus renflée sur le disque. Parfois même il ne reste de cette bande qu'une tache subponctiforme sur le disque, noire ou noirâtre. Le repli est flave en totalité ou en majeure partie. Les pieds sont presque entièrement de la même couleur, ou avec les cuisses intermédiaires et postérieures nébuleuses dans leur milieu.

*Mordella 4-pustulata*, (MARSHALL),

*Anaspis 4-pustulata*, STEPH. Illustr. t. 5. p. 46. 14. — *Id.* Man. p. 332. 2606. (type).

*Anaspis 4-notata*, STEPH. Catal. 249. 2477. — *Id.* Illustr. t. 5. p. 46. 16. — *Id.* Man. p. 332. 2608.

*Anaspis humeralis*, var. c (*discicollis*) ACH. COSTA, l. c. p. 23. pl. 23. fig. 4.

Long. 0,0022 à 0,0053 (1 à 1 1/2 l.) Larg. 0,0009 à 0,0011 (2/5 à 1/2 l.)

*Corps* allongé ou suballongé ; médiocrement convexe ; garni d'une pubescence courte, fine, soyeuse, couchée, cendrée sur le prothorax, brune ou de la couleur du fond ou à peu près sur les élytres ; coloré comme il a été dit. *Tête* noire, avec l'épistome, le labre et la bouche d'un flave testacé ou d'un fauve flave. *Palpes maxillaires* de même teinte, avec le dernier article ordinairement nébuleux. *Antennes* prolongées au moins jusqu'aux deux cinquièmes (♂) ou à peine au tiers (♀) des élytres ; grossissant graduellement vers l'extrémité, à partir du cinquième article : les quatre premiers, un peu plus grêles : les premier et deuxième les plus courts, crassiuscules : le deuxième, ordinairement plus court que le premier : le quatrième, le plus long des dix premiers : le troisième, un peu plus court, souvent presque égal au cinquième : les septième à dixième, à peine plus longs (♂) ou à peine aussi longs (♀) qu'ils sont larges à l'extrémité : le onzième, suballongé, rétréci dans sa seconde moitié ; noires avec les trois ou quatre premiers articles, rarement avec les cinq premiers, d'un flave pâle ou roussâtre : le premier, souvent nébuleux. *Prothorax* élargi en ligne arquée d'avant en arrière ; faiblement bissinué à la base, avec la partie médiaire un peu arquée en arrière et plus prolongée que les angles ; de moitié environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; noir ; pubescent. *Ecusson* en triangle subéquilatéral ; noir ; pubescent. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax ; quatre fois environ aussi longues que lui ; à peine plus larges vers la moitié de leur longueur, rétrécies depuis les quatre cinquièmes de celle-ci jusque près de l'angle sutural qui est émousé ; médiocrement convexes ; noires, ornées chacune d'une tache flave ou d'un jaune pâle, comme il a été dit. *Repli* à peu près égal en devant à la moitié des postépisternums, égal à la moitié de la largeur de ceux-ci vers les quatre cinquièmes ou cinq sixièmes de leur longueur, graduellement rétréci et offrant à peine ses deux bords distincts au-delà de l'extrémité du deuxième arceau ventral. *Dessous du corps* noir ; finement et brièvement pubescent. *Mésosternum* prolongé presque jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* graduellement et faiblement rétrécis jus-

qu'aux quatre cinquièmes, en pointe obtuse, ou obliquement coupés à l'extrémité; trois fois environ aussi longs qu'ils sont larges à la base. Pieds noirs ou d'un noir brun, avec les tibias et les tarses bruns, d'un brun fauve ou même d'un fauve testacé ou livide.

Cette espèce paraît habiter la plupart des parties de la France. On la trouve assez communément au printemps et en été sur les ombelles, les spirées, etc.

OBS. De toutes les espèces de ce genre aucune ne subit des variations aussi nombreuses. Ces modifications qui se lient par des transitions insensibles, ont été bien signalées par M. Achille Costa, dans son bel ouvrage sur la Faune du royaume de Naples. Les caractères tirés des derniers arceaux du ventre du ♂, viennent confirmer l'identité de l'espèce.

Cette espèce a été décrite pour la première fois par Geoffroy. Fourcroy, abrégiateur de ce dernier, lui donna le nom de *bicolor*, appliqué à d'autres espèces par divers auteurs. Fabricius la décrivit comme étant la *Mordella humeralis* de Linné. Pour dissiper toute confusion, et éviter la répétition de ce terme spécifique dans la même famille, j'ai adopté le nom imposé par Müller.

ββ Prothorax d'un roux fauve ou testacé.

ζ. Tête noire.

7. **A. ruficollis**; FABRICIUS. *Suballongée ; pubescente ; noire, avec l'épistome, le labre, les palpes, les troisième à cinquième premiers articles des antennes et les pieds, flaves : prothorax d'un rouge flave : seconde moitié du dernier article des palpes maxillaires, obscure. Sixième à dixième articles des antennes au moins aussi longs que larges.*

♂ Quatrième arceau ventral presque une fois plus court que le troisième, sur les côtés du ventre, deux fois plus court que lui sur la ligne médiane : le troisième donnant naissance, près de cette ligne, à deux lanières, velues ou ciliées, étroites, en forceps, ordinairement couchées et offrant la figure d'une ellipse ou d'un ovale allongé : cinquième arceau ventral creusé d'une fossette ovale circonscrite par les lanières. Cinquième à dixième articles des antennes faiblement élargis de la base à l'extrémité; la moitié environ plus longs qu'ils sont larges à celle-ci. Tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu l'article bilobé. Premier et deuxième articles des tarses postérieurs échancrés à leur extrémité, sur leurs parties latérales.

♀ Quatrième arceau ventral à peu près égal aux deux tiers de la longueur du troisième, soit sur les côtés, soit sur la ligne médiane. Ventre simple, sans fossettes, et sans appendices. Sixième à dixième articles des antennes plus sensiblement obconiques, à peu près aussi longs qu'ils sont larges à l'extrémité. Tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu l'article bilobé. Premier et deuxième articles des tarses postérieurs en ligne à peu près droite à leur extrémité, sur leurs parties latérales.

Obs. l'*A. ruficollis* est une des espèces qui offrent le moins de variations. La couleur flave de la base des antennes parfois réduite aux trois premiers articles, s'étend ordinairement aux quatre ou quelquefois aux cinq premiers. Quand la matière colorante noire a été moins abondante, les élytres passent du noir au brun : mais la couleur noire est toujours nettement limitée sur la tête, au bord antérieur du front.

*L'Anaspe à corselet jaune*, GEOFFR. Hist. abrég. t. 1. p. 317. 3.

*Mordella thoracica*, HERBST, in FUESSLY'S Archiv. cab. 5. p. 149. 5.

*Anaspis thoracica*, FOURCQ. Entom. paris. t. 1. p. 142. 3.

*Mordella ruficollis*, FAB. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 118. 12 — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p.

126. 27. — PANZ. Entom. germ. p. 213. 10. — OLIV. Entomol. t. 3. n° 64. p. 9.

9. pl. 6. fig. 9, a, b. — MARSU. Entom. brit. t. 1. p. 491. 11.

*Anaspis ruficollis*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 419. 5. — DUMÉRIL, Dict. des sc. nat. t. 2. p. 103. 2. — SCHÖNH. Syn. ins. t. 5. p. 89. 5. — MULS. Lettr. t. 2. p. 293. 2. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 43. 3. — *Id.* Man. p. 331. 2595. — SABLE. Ins. fenn. p. 491. 15. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 260. 2. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 616.

Long. 0,0028 à 0,0033 (1 1/4 à 1 1/2 l.) Larg. 0,0009 à 0,0015 (2/5 à 3/5 l.)

*Corps* suballongé ou allongé ; médiocrement convexe ; garni d'une pubescence fine, soyeuse, très-courte, cendrée ; coloré comme il sera dit. *Tête* pubescente ; noire, avec l'épistome et le labre flaves, ou d'un flave roussâtre : extrémité des mandibules, noirâtre. *Palpes maxillaires* flaves, avec le dernier article nébuleux ou obscur dans sa seconde moitié. *Antennes* prolongées jusqu'à la moitié des élytres (♂) ou un peu moins (♀) ; grossissant graduellement vers l'extrémité, à partir du quatrième ou du cinquième article : les trois ou quatre premiers, à peu près de même grosseur : les premier et deuxième, presque égaux, les plus courts : les troisième et quatrième, les plus longs : le quatrième, au moins aussi grand que le troisième : le cinquième, un peu moins long : les sixième à dixième, faiblement élargis de la base à l'extré-



mité (♂) ou graduellement obconiques (♀), plus longs (♂) ou aussi longs (♀) qu'ils sont larges à leur extrémité : le onzième, ovulaire ; noires, avec les trois à cinq premiers articles, flaves. *Prothorax* élargi d'avant en arrière en ligne plus sensiblement arquée dans sa première moitié que dans la seconde ; bissubsinué à la base, avec la partie médiaire un peu arquée en arrière et faiblement plus prolongée que les angles ; de moitié plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; pubescent ; d'un rouge testacé livide ou flavescent, souvent plus pâle sur les côtés. *Ecusson* en triangle subéquilatéral ; noir ; pubescent. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; quatre fois environ aussi longues que lui ; à peine élargies dans leur milieu, rétrécies ou presque obliquement coupées depuis les cinq sixièmes de leur longueur jusqu'à l'angle sutural ; médiocrement convexes ; noires ; pubescentes. *Repli* offrant ses deux bords visibles, jusque vers l'extrémité du troisième arceau ventral ; noir. *Dessous du corps* brièvement pubescent ; noir. *Mésosternum* prolongé à peu près jusqu'à la moitié des trochanters des hanches intermédiaires. *Postépisternums* graduellement rétrécis en pointe. *Pieds* flaves ou d'un jaune flave, avec le bord postérieur des jambes de derrière et des articles des tarses postérieurs nébuleux ou obscur.

Cette espèce est commune dans toute la France.

℥. Tête d'un flave roux ou testacé.

8. **A. thoracica** ; LINNÉ. *Suballongée ; pubescente ; noire, avec la tête, les palpes, les trois à cinq premiers articles des antennes, le prothorax et les pieds d'un roux flave ou d'un flave roussâtre : cuisses postérieures souvent nébuleuses ou noirâtres. Septième à dixième articles des antennes à peine aussi longs (♀) ou un peu plus longs (♂) qu'ils sont larges à l'extrémité.*

♂. Quatrième arceau ventral égal environ sur les côtés aux trois cinquièmes de la longueur du troisième, un peu voilé vers la ligne médiane par un prolongement du troisième arceau : celui-ci, donnant naissance, vers ce point, à deux appendices ou lanières étroites, velues ou ciliées, presque droites ou légèrement en forceps, prolongées un peu au-delà du cinquième arceau : le quatrième, donnant naissance à deux appendices assez courts : le cinquième, creusé, sur la ligne médiane, d'une fossette obtriangulaire, et entaillé à son extrémité. Septième à dixième articles des antennes plus faiblement



élargis ou moins sensiblement obconiques, plus longs qu'ils sont larges à l'extrémité. Tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu l'article bilobé.

♀. Quatrième arceau ventral à peu près uniformément égal aux trois cinquièmes du précédent. Ventre simple, sans fossettes, ni appendices. Septième à dixième articles des antennes plus sensiblement obconiques, à peine aussi longs ou un peu moins longs qu'ils sont larges à l'extrémité. Tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu l'article bilobé. Premier et deuxième articles des tarses postérieurs coupés à peu près en ligne droite à leur extrémité, sur leurs parties latérales.

ETAT NORMAL. Noire : tête, palpes, trois à cinq premiers articles des antennes, prothorax et pieds roussâtres, d'un testacé roussâtre, d'un roux flave ou d'un flave roussâtre : cuisses postérieures ordinairement nébuleuses ou noirâtres.

*Mordella thoracica*, LINN. Syst. Nat. 10<sup>e</sup> édit. 1758. t. 1. p. 420. 4. — *Id* 12<sup>e</sup> édit. t. 1. p. 682. 5. — *Id*. Faun. suec. p. 229. 855. — FABR. Syst. Entom. p. 264. 11. — *Id*. Spec. ins. t. 1. p. 353. 15. — *Id*. Mant. ins. t. 1. p. 219. 18. — *Id*. Ent. Syst. t. 4. 2. p. 115. 11. — *Id*. Syst. Eleuth. t. 2. p. 126. 26. — MULLER, C. LINN. Natursyst. t. 5. p. 536. — MULLER, Zool. Dan. Prodr. p. 84. 916. } — GOEZE, Ent. Beytr. t. 1. p. 710. 5. — SCHRANK, Enum. p. 450. 228. — GMEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 2024. 5. — DE VILLERS, C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 407. 5. — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 759. 18. — *Id*. Entom. t. 3. n<sup>o</sup> 64. p. 9. 10. pl. 1. fig. 10, a, b. — PANZ. Ent. german. p. 215. 9. — PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 184. 2. — WALCKEN. Faun. paris. t. 1. p. 174. 1. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 616. 15. — SÄHLB. Ins. fern. p. 490. 14.

*Anaspis thoracica*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 421. 10. — DUMÉRIL, Dict. des sc. nat. t. 2. p. 105. 4. — SCHÖNN. Syn. Ins. t. 5. p. 88. 3. — FISCHER, Entomogr. de la Russ. t. 1. p. 223. 7. — ZETTERST. Faun. lapp. p. 289. 2. — *Id*. Ins. lapp. p. 166. 5. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 44. 5. — *Id*. Man. p. 331. 2597. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 260. 4. — L. REDTENS. Faun. austr. p. 616.

*Plesianaspis thoracica*, ACH. COSTA, Faun. d. R. d. Napol. t. 1. (*Mordellidees*) p. 28. t. pl. 24. fig. 2 et 3.

Var. A. Tête, base des antennes, palpes, prothorax et totalité des pieds, d'un roux testacé. Elytres brunes.

*Anaspis fuscescens*, STEPH. Illustr. t. 5. p. 43. 4. — *Id*. Man. p. 331. 2926. (suivant le type).

Var. B. *Elytres d'un brun fauve ou fauves ; tête et prothorax testacés : derniers articles des antennes et ventre, noirs.*

Obs. Quand la matière noire a manqué en partie plus ou moins grande, les élytres passent au brun fauve ou même au fauve : la tête et le prothorax ont une teinte moins claire ; les antennes sont testacées sur un plus grand nombre d'articles ; la poitrine est ordinairement plus pâle que le ventre.

Var. C. *Entièrement fauve ou testacée, avec les derniers articles des antennes, parfois le bord postérieur des arceaux du ventre et les hanches postérieures, noirâtres.*

Obs. Ici, la matière noire a presque complètement fait défaut ; mais la tête et le prothorax sont devenus d'une teinte moins claire, soit testacée ou d'un fauve testacé, comme les élytres et tout le reste du corps.

Long. 0,0028 à 0,0033 (1 1/4 à 1 3/5) Larg. 0,0008 à 0,0010 (2/51.)

*Corps* suballongé ou allongé : médiocrement convexe ; garni d'une pubescence courte, soyeuse, fine, couchée, de la couleur du fond sur les parties claires, brune sur les parties noires ; coloré comme il sera dit. *Tête* entièrement d'un flave roussâtre, avec l'extrémité des mandibules, noire. *Palpes* d'un flave roussâtre. *Antennes* prolongées environ jusqu'aux deux cinquièmes des élytres (♂) ou à peine au tiers (♀) ; grossissant graduellement vers l'extrémité, à partir du cinquième ou du sixième article : les trois ou quatre premiers plus grêles, à peu près de la même grosseur : les premier et deuxième, crassiuscules, presque égaux : le troisième et le quatrième les plus longs, presque égaux : le troisième, ordinairement à peine aussi grand que le quatrième : le cinquième sensiblement moins long que ce dernier : les septième à dixième, plus faiblement élargis de la base à l'extrémité, plus longs qu'ils sont larges à celle-ci (♂) ou sensiblement obconiques, à peine aussi longs ou moins longs qu'ils sont larges à l'extrémité (♀) ; le onzième ovalaire ; noires, avec les trois ou cinq premiers articles et plus ordinairement les quatre premiers, flaves ou d'un flave pâle. *Prothorax* élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié, subparallèle ensuite ; à peine bissubsinué à la base, avec la partie médiale faiblement arquée en arrière ; parfois presque tronqué ; de moitié environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; pubescent ; d'un roux flave

ou d'un rouge testacé pâle. *Ecusson* en triangle subéquilatéral ; noir ; pubescent. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax à sa base ; trois fois et demie à quatre fois aussi longues que lui ; à peine élargies dans la moitié de leur longueur, rétrécies en ligne courbe depuis les cinq sixièmes de leur longueur jusqu'à l'angle sutural ; médiocrement convexes : noires ; à pubescence brune. *Repli* offrant ses deux bords visibles jusque vers l'extrémité du troisième arceau ventral. *Dessous du corps* brièvement pubescent : d'un roux flave sur l'antépéctus, noir sur le reste. *Mésosternum* prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité des hanches intermédiaires. *Postépisternums* graduellement rétrécis en pointe obtuse. *Pieds* d'un roux flave ou livide, ou d'un flave roussâtre : cuisses postérieures nébuleuses, ou enfumées, ou noirâtres : tibias et tarses des mêmes pieds et cuisses intermédiaires parfois plus légèrement nébuleuses.

Cette espèce n'est pas rare dans les environs de Lyon, principalement sur les côteaux ou les montagnes qui entourent la ville. Elle paraît habiter aussi la plupart des parties de la France.

Obs. Les variétés décolorées semblent se lier insensiblement aux espèces à élytres d'un flave testacé.

xx. Elytres blanches, d'un roux flave ou d'une teinte rapprochée, parfois avec quelques taches nébuleuses ou noirâtres.

z. Antennes presque uniformément plus grosses sur leurs six derniers articles : les sixième à dixième moniliformes ou submoniliformes et noirs.

9. **A. flava** ; LINNÉ. *Allongée ; pubescente ; d'un roux flave ou testacé, en dessus : yeux, six derniers articles des antennes, pygidium, postpectus et ventre, noirs : élytres obscures ou noirâtres à l'extrémité. Antennes presque uniformément plus grosses sur leurs six derniers articles : les sixième à dixième moniliformes (♂) ou submoniliformes (♀).*

♂. Ventre dépourvu de lanières. Cinquième arceau moins d'une fois plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; fendu sur la ligne médiane, ou rayé d'un sillon ordinairement un peu élargi depuis la moitié jusque près de l'extrémité : cet arceau débordé par le sixième. Trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés et veloutés en dessous : le deuxième, le plus grand, près d'une fois plus long que le premier.

♀. Cinquième arceau ventral une fois au moins plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; non rayé sur la ligne médiane :

terminé en ogive : sixième arceau ordinairement indistinct. Tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est le troisième article : le premier, aussi grand que les trois suivants réunis.

*Mordella flava*, LINN. Syst. Nat. 10<sup>e</sup> édit. (1758) t. 1. p. 420. 5. — *Id.* 12<sup>e</sup> édit. t. 1. p. 682. 6. — *Id.* Faun. succ. p. 229. 835. — FABR. Syst. Entom. p. 264. 12. — *Id.* Spec. ins. t. 1. p. 334. 14. — *Id.* Mant. ins. t. 1. p. 219. 19. — *Id.* Ent. Syst. t. 1. 2. p. 115. 13. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 126. 28. — MULLER, Faun. fridr. p. 22. 219. — *Id.* Zool. Dan. prodr. p. 84. 918. — GOEZE, Entom. Beytr. t. 1. p. 710. 6. — *Id.* Faun. Eur. t. 8. p. 848. 1. — SCHRANK, Enum. p. 229. 432. — *Id.* Faun. boic. t. 1. p. 575. 729. — HERBST, in FUERSSLY'S, Arch. p. 149. — GMEL. CAR. LINN. Syst. nat. t. 1. p. 2024. 6. — DE VILLERS, C. LINN. Entomol. t. 1. p. 407. 6. — ROSSI, Faun. efr. t. 1. p. 245. 604. — *Id.* éd. HELW. t. 1. p. 301. 604. — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 740. 19. — PANZ. Faun. germ. 13. 14. — *Id.* Ent. germ. p. 245. 11. — *Id.* Index. p. 150. 5. — CEDERH. Faun. ingr. prodr. p. 75. 225. — MARSH. Entom. brit. t. 1. p. 495. 24. — TICNY, Hist. nat. t. 5. p. 234. — GYLLENH. Ins. succ. t. 2. p. 617. 14. — SAHLB. Ins. fenn. p. 492. 17.

*Mordella thoracica*, PAYE, Faun. succ. t. 2. p. 185. 2. — MULLER, Faun. fridr. p. 22. 219. — MULLER, C. LINN. Natur. 5. 1. p. 386. 6. — DE VILLERS, C. LINN. Entom. t. 1. p. 407. 6.

*Anaspis thoracica*, var ? LATR. Hist. nat. t. 10. p. 421.

*Anaspis flava*, DUMÉRIL, Dict. des sc. nat. t. 2. p. 103. 5. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 89. 4. — FISCHER, Entom. de la Russ. t. 1. p. 223. 8. — ZETTERST. Faun. lapp. p. 291. 6. — *Id.* Ins. lapp. p. 167. 7. — STEPH. Illustr. t. 3. p. 45. 9. — *Id.* Man. p. 532. 2601. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 616.

*Plesianaspis flava*, ACH. COSTA, Faun. d. Regn. di Nap. (*Mordellidées*) t. 1. p. 29. 2. (en partie seulement) pl. 24. fig. 4. (♀).

Long. 0,0056 à 0,0045 (1 2/3 à 2 l.) Long. 0,0011 à 0,0014 (1/2 à 2/3 l.)

*Corps* allongé ; très-médiocrement convexe ; garni d'une pubescence soyeuse, fine, couchée et presque concolore. *Tête* et *pulpes* d'un roux flave ou d'un roux testacé. *Yeux* noirs. *Antennes* prolongées environ jusqu'au sixième ou au cinquième des élytres : presque uniformément moins grêles ou plus grosses à partir du sixième article : les premier et deuxième, presque égaux, crassiuscules, d'un quart ou de moitié plus longs que larges : le deuxième, égal environ aux deux tiers du suivant : le troisième, un peu plus grand que le quatrième : le cinquième, obconique, plus court : les sixième à dixième, subglobuleux ou moniliformes (♂), ou élargis en ligne courbe de la base à l'extrémité et obtusément tronqués à cette dernière (♀) : le dernier,



ovulaire (♂) ou oblong (♀), près de moitié (♂) ou plus de moitié (♀) plus long que le dixième; flaves sur les quatre premiers articles, noires sur les autres. *Prothorax* élargi en ligne faiblement arquée; bissubsinué à la base, avec la partie médiaire tronquée; d'un tiers environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu, d'un flave roussâtre, d'un roux flave ou d'un roux testacé; pubescent. *Ecusson* triangulaire: flave roux; pubescent. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax; quatre fois environ (♀) ou au moins (♂) aussi longues que lui; à peine élargies vers la moitié de leur longueur, en ogive chacune à l'extrémité: très-médiocrement convexes; d'un roux flave ou d'un roux testacé, avec l'extrémité graduellement noirâtre ou obscure: dernier arceau du dos de l'abdomen, noir ou noirâtre. *Repli* prolongé jusque vers l'extrémité du troisième arceau ventral. *Dessous du corps* d'un roux flave sur les anté et médipectus, noir ou d'un noir brun, sur le postpectus et sur le ventre. *Mésosternum* prolongé presque jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* allongés; terminés en pointe obtuse ou presque obliquement tronquée. *Quatrième arceau ventral* d'un développement uniforme; d'un sixième environ plus court que le troisième. *Pieds* d'un flave roussâtre, avec les tarses postérieurs en partie nébuleux.

Cette espèce paraît commune dans presque toutes les parties de la France. On la trouve, en mai, sur les aubépines, les ombelles, etc.

Obs. Elle est facile à reconnaître à ses élytres obscures à l'extrémité, à son pygidium noir, à ses antennes moniliformes ou submoniliformes. Le ♂ se distingue de ceux des espèces suivantes, par son ventre sans lanières.

Entre les *A. flava* et *subtestacea* vient se placer l'espèce suivante dont les antennes vont en grossissant graduellement.

**A. arctica**; ZETTERSTEDT. *Allongée; pubescente, d'un roux flave ou testacé, en dessus: yeux, six premiers articles des antennes, et ordinairement partie du quatrième, pygidium, postpectus et ventre, noirs ou d'un noir brun. Elytres nébuleuses à partir du tiers, avec l'extrémité plus obscure. Antennes graduellement plus grosses à partir du cinquième article: les sixième à dixième élargis en ligne droite et plus longs que larges.*

*Anaspis arctica*, ZETTERST. Faun. lapp. p. 290. 5. — *Id.* Insecta lapp. p. 166. 6.

*Mordella arctica*, SAHLB. Ins. fenn. p. 491. 16.

Long. 0,0035 (1 1/2 l.)



PATRIE : le nord de l'Europe.

Obs. Elle s'éloigne de la précédente par la forme de ses antennes et par ses élytres ordinairement nébuleuses à partir du tiers ou des deux cinquièmes de leur longueur.

Le ♂ se distingue facilement de celui de l'espèce précédente, par les caractères suivants :

♂. Quatrième arceau ventral une fois environ plus court que le troisième, surtout près de la ligne médiane : les troisième, quatrième et cinquième, offrant sur cette ligne une échancrure égale au cinquième ou au quart de la largeur de l'arceau : le troisième, muni, de chaque côté de cette échancrure, d'une lanière légèrement renflée à son extrémité, prolongée presque jusqu'à l'extrémité du cinquième arceau : le quatrième, offrant aussi de chaque côté de l'échancrure un appendice ovalaire, très-court, à peine plus long que le tiers du cinquième arceau : ce dernier, profondément concave et relevé sur les côtés en espèces de tranches ; bilobé à son extrémité. Trois premiers articles des tarses peu ou point dilatés : le premier, de moitié environ plus grand que le deuxième.

zz. Antennes grossissant graduellement à partir du septième article ; noires seulement sur les quatre ou cinq derniers.

θ. Poitrine bloade.

10. **A. subtestacea** ; STEPHENS. *Allongée ; pubescente ; blonde ou d'un flave testacé ; yeux, quatre ou cinq derniers articles des antennes, et souvent ventre en partie ou en totalité, noirs ou bruns. Antennes grossissant graduellement et médiocrement à partir du septième article : les troisième et quatrième, les plus longs, presque égaux : les septième à neuvième, plus longs que larges.*

♂. Deuxième arceau du ventre muni à son bord postérieur, près de la ligne médiane, de deux lanières ou appendices velus ou ciliés, ordinairement couchés sur les arceaux suivants et prolongés jusqu'à la moitié du cinquième arceau : le troisième, donnant naissance, à l'extrémité de sa ligne médiane, à une sorte de lame verticale, comprimée, graduellement plus développée dans le sens de sa hauteur, et munie d'une dent vers la moitié de sa longueur, divisée ensuite en deux lanières prolongées jusqu'à l'extrémité du cinquième arceau : le quatrième, à peine aussi long sur les côtés que le troisième, graduellement un peu plus court, en se rapprochant de la ligne médiane,

muni, vers celle-ci, de deux appendices presque glabres, déprimés, couchés, peu apparents, prolongés jusqu'à la moitié du cinquième arceau : celui-ci, longitudinalement fendu sur son milieu, bilobé à son extrémité. Sixième arceau peu ou point apparent. Trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés, surtout le deuxième, veloutés en dessous : le deuxième, une fois au moins plus long que le premier.

♀. Deuxième, troisième et quatrième arceaux du ventre sans appendices : le quatrième, uniformément un peu plus court que le troisième : le cinquième, en ogive à son extrémité, non fendu longitudinalement. Trois premiers articles des tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu le troisième : le premier, de moitié au moins plus long que le deuxième.

ETAT NORMAL. Blonde ou d'un flave testacé : yeux, quatre ou cinq derniers articles des antennes et ventre, noirs.

*Anaspis flava*, var? LATR. Hist. nat. t. 10, p. 421.

*Anaspis lurida*. (KIRBY) STEPH. Illustr. t. 5, p. 44. 8. (suivant un exemplaire ♂ communiqué par l'auteur). — *Id.* Man. p. 532. 2600.

OBS. Les élytres ne sont pas franchement obscures vers l'extrémité, comme le dit l'auteur anglais ; si quelquefois elles le paraissent, cela est dû à la couleur noire des arceaux du dos de l'abdomen.

Var. α. *Ventre seulement en partie noir ou noirâtre.*

OBS. La base du premier arceau et l'extrémité du dernier sont ordinairement les plus promptes à perdre la couleur noire ; les intermédiaires la retiennent généralement davantage ; parfois même ceux-ci sont seulement noirâtres.

*Plesianaspis flava*, A. COSTA, Faun. del Reg. di Napol. (*Mordellidées*) p. 29. 2. et p. 70. (var. *analis*) pl. 5. et 6. (♂). (suivant un exemplaire communiqué par l'auteur).

Var. β. *Ventre entièrement blond ou d'un flave testacé.*

OBS. Les ♀ sont les plus sujettes à présenter cette modification.

*Mordella testacea*, MARSH. Entom. brit. t. 1. p. 495. 16.

*Anaspis brunnea*, DEJ. Catal. (1821) p. 75. — *Id.* (1853) p. 220. — *Id.* (1857) p. 241. (suivant M. Chevrolat).

*Anaspis subtestacea*, STEPH. Illustr. t. 5. p. 45. 10. (suivant un exemplaire communiqué par l'auteur). — *Id.* Mant. p. 352. 2602.

*Mordella fusca*, MARSH. Ent. brit. t. 1. p. 493. 17.

*Anaspis fusca*, STEPHENS, Illustr. t. 5. p. 45. 11. — *Id.* Mant. p. 352. 3603. (suivant un exemplaire ♀ communiqué par l'auteur).

*Plesianaspis flava*, A. COSTA, l. c. p. 30. (var. *unicolor*).

Long. 0,0023 à 0,0035 (1 à 1 1/2 l.) Larg. 0,0011 à 0,0016 (1/2 à 2/5 l.)

*Corps* allongé; médiocrement convexe; garni d'une pubescence fine, soyeuse et couchée, concolore. *Tête* et *palpes* d'un flave roussâtre. *Antennes* prolongées jusqu'aux deux cinquièmes ou un peu moins des élytres; grossissant graduellement à partir du septième article: les premier et deuxième, crassiuscules: le deuxième, un peu moins court que le premier, égal à la moitié (♂) ou au moins aux trois cinquièmes (♀) du suivant: les troisième et quatrième, les plus longs, à peu près égaux: les cinquième et sixième, presque égaux, filiformes, de moitié (♀) ou une fois (♂) plus longs qu'ils sont larges: les septième à dixième, grossissant médiocrement et en ligne droite de la base à l'extrémité, tronqués à cette dernière: les septième à neuvième, au moins plus longs qu'ils sont larges à l'extrémité (♂ ♀): le dernier, ovalaire, de moitié environ plus long que le dixième; flaves, graduellement brunes ou noirâtres, à partir du septième ou parfois du sixième article. *Prothorax* élargi en ligne courbe jusqu'à plus de la moitié et plus faiblement ensuite; bissubsinné à la base, avec la partie médiaire de celle-ci obtusément tronquée ou obtusément arquée en arrière; de moitié environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu; d'un flave roussâtre ou d'un flave testacé; pubescent. *Ecusson* de même couleur; petit; en triangle obtus. *Elytres* aussi larges en avant que le prothorax; quatre fois aussi longues que lui; faiblement élargies dans leur milieu, en ogive chacune à l'extrémité; médiocrement convexes; pubescentes; d'un flave roussâtre ou d'un flave testacé. *Pygidium* testacé ou d'un testacé brunâtre: arceaux précédents du dos de l'abdomen, ordinairement obscurs. *Repli* prolongé environ jusqu'à l'extrémité du troisième arceau ventral. *Dessous du corps* pubescent; d'un flave testacé ou d'un flave roussâtre sur les parties pectorales. *Ventre* coloré comme il a été dit. *Mésosternum* ordinairement prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* allongés, terminés en

pointe obtuse, à peine plus larges vers leur extrémité que le repli dans sa partie voisine de celle-ci. *Pieds* d'un flave roussâtre ou d'un flave testacé.

Cette espèce paraît habiter la plupart des provinces de la France. Elle est médiocrement commune dans les environs de Lyon.

Obs. *L.A. subtestacca* est vraisemblablement celle dont Latreille a voulu parler, quand il a dit <sup>(1)</sup>, à la suite de la description de l'*A. flava* : « On trouve en France une espèce voisine de cette variété, si « toutefois ce n'est pas la même. Elle est d'un jaune pâle, avec la « tête un peu fauve et les yeux noirs, l'extrémité des antennes « obscure; l'extrémité des élytres n'est pas noirâtre; l'abdomen l'est « dans quelques individus. »

Une de ces variétés a été décrite brièvement par Marsham sous le nom de *testacca*, déjà antérieurement donné. Une autre a été indiquée par Kirby, et décrite d'une manière peu reconnaissable par Stephens, qui trop souvent a eu le tort d'embrouiller la science, en se basant sur des modifications fugitives ou presque insaisissables des nuances du corps, pour donner comme espèces de simples variétés.

*L.A. subtestacca* se distingue de l'*A. flava* par sa couleur plus blonde ou moins rousse, par son pygidium testacé; par ses antennes grossissant assez faiblement et graduellement à partir du septième article, noires seulement sur les quatre ou cinq derniers; elle s'éloigne de l'*A. maculata*, par ses élytres sans taches; de toutes les deux, par ses parties pectorales blondes ou d'un flave testacé. Le ♂ offre des caractères particuliers, qu'on ne retrouve chez aucune autre espèce de ce genre.

60. Poitrine noire, au moins sur le postpectus.

**11. *A. maculata* ;** (GEOFFROY) FOURCROY. *Allongée ; pubescente ; flave* : yeux, trois ou quatre derniers articles des antennes, médi et postpectus et ventre, noirs ou d'un brun noir. *Elytres* ordinairement ornées de trois taches nébuleuses ou obscures : la première, basilaire, obtriangulaire, commune : la deuxième, la plus apparente, en forme de bande transverse raccourcie vers les deux cinquièmes internes : la troisième, suturale, subapicale. *Antennes* grossissant à partir du septième article : les neuvième et dixième submoniliformes.

(<sup>1</sup>) Hist. nat. t. 10. p. 421.

♂. Quatrième arceau ventral à peu près uniformément développé, d'un tiers environ plus court que le troisième : celui-ci, donnant naissance, près de sa ligne médiane, à deux appendices, ou sortes de lanières ciliées ou velues, habituellement couchées sur les arceaux suivants et prolongées jusqu'à l'extrémité du cinquième : celui-ci, creusé sur la moitié basilaire de sa ligne médiane, d'une petite fossette ; déprimé et faiblement échanuré à son extrémité. Sixième arceau peu ou point apparent. Trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés et veloutés en dessous ; le premier, à peine plus grand que la moitié du deuxième.

♀. Quatrième arceau ventral d'un quart ou presque d'un tiers plus court que le troisième : celui-ci, sans appendices : le cinquième, sans fossettes. Tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu le troisième article : les premier et deuxième, presque égaux.

ETAT NORMAL DES ÉLYTRES. Elytres d'un flave testacé plus ou moins pâle, ou plus ou moins roussâtre ; ornées de trois taches nébuleuses ou obscures : la première, obtriangulaire, couvrant la base, presque d'une épaule à l'autre, anguleusement prolongée jusqu'au sixième environ de la suture : la deuxième, ordinairement la plus apparente, vers les deux cinquièmes de la longueur des étuis, en forme de bande transverse, raccourcie à ses deux extrémités, surtout à l'interne : la troisième, généralement nébuleuse ou moins apparente, commune aux deux élytres, elliptique, couvrant la suture depuis les trois cinquièmes ou les deux tiers, jusque près de l'extrémité.

*L'Anaspis fauve*, GEOFFROY, Hist. abr. t. 1. p. 317. 4.

*Anaspis maculata*, FOURC. Entom. paris. t. 1. p. 142. 4. — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 420. 6

*Mordella melanopa*, FORSTER, Nov. Spec. Ins. centur. p. 64. 64. — GOEZE, Entom. Beyr. t. 1. p. 710. 2. — GUEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 2024. 24. — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 740. 24.

*Mordella obscura*, MANSU. Entom. brit. t. 1. p. 492. 14. — GYLLENH. Ins. succ. t. 2. p. 618. 15 et t. 4. p. 522. 15.

*Anaspis obscura*, SCHÖNH. Syn. Ins. t. 3. p. 89. 6. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 616.

*Anaspis melanopa*, STERN. Illustr. t. 5. p. 46. 6. (suivant le type) — Id. Man. p. 331. 2598.

Var. A. Tache basilaire des élytres, ou la suturale subapicale, peu ou point apparente.



α. Tache basilaire indistincte.

*Mordella bipunctata*, var. BONELLI, Specim. Faun. subalp. in Memor. d. Soc. di Agricolt. di Tor. t. 9. (1812) p. 175. 19. pl. 3. fig. 19,

β. Tache suturale subapicale indistincte.

Var. B. *Taches basilaire et suturale subapicale des élytres, peu ou point apparentes : celle du milieu, seule distincte.*

*Mordella bimaculata*, Rossi, Faun. étrusc. t. 1. p. 245. 605? — *Id.* édit. HELW. t. 1. p. 301. 605?

*Mordella bipunctata*, BONELLI, Specim. Faun. subalp. in Memor. d. Soc. di Agricolt. d. Tor. t. 9. (1812) p. 175. 19. pl. 3. fig. 19. var.

*Mordella nigricollis*, MARSH. Entom. brit. t. 1. p. 492. 15. (1).

Var. C. *Toutes les taches des élytres indistinctes.*

*Mordella pallida*, MARSH. Entom. brit. t. 1. p. 492. 15.

*Anaspis pallida*, STREPH. Illustr. t. 5. p. 44. 7. (suivant le type). — *Id.* Man. p. 351. 2599.

Long. 0,0028 à 0,0055 (1 1/4 à 1 1/2 l.) Larg. 0,0009 à 0,0011 (2/3 à 1/2 l.)

Corps allongé; médiocrement convexe; garni d'une pubescence fine, soyeuse et couchée, concolore. Tête et palpes d'un flave pâle. Yeux noirs. Antennes prolongées environ jusqu'au quart (♂), au tiers ou un peu plus (♀) des élytres; grossissant à partir du septième article: les premier et deuxième, crassiuscules: le deuxième, ordinairement moins court que le premier, égal environ aux deux tiers du suivant: les troisième et quatrième, presque égaux, les plus longs: le troisième, souvent à peine aussi long (♂) ou à peine plus long (♀) que le quatrième: les cinquième et sixième, plus courts: le septième, obconique, un peu plus long (♂) ou à peine aussi long (♀) qu'il est large à son extrémité: les neuvième et dixième, submoniliformes, surtout chez le ♂, élargis en ligne courbe de la base à l'extrémité, tronqués (♀) ou un peu arqués (♂) à cette dernière: le dernier, ovoïde, faiblement (♂) ou de moitié (♀) plus long que le dixième; flaves ou d'un flave pâle sur les six premiers articles et

---

(1) L'exemplaire d'après lequel a été faite la description de Marsham était probablement accidentellement obscurcie; mais suivant M. Spence, cet insecte est réellement une variété de l'*A. maculata*.

ordinairement sur la base du septième, d'un brun noir ou d'un noir brun sur le reste *Prothorax* élargi en ligne un peu arquée; bissub-sinué à la base, avec la partie médiaire un peu arquée en arrière; paraissant très-légèrement rebordé à la base; de deux tiers environ plus large à cette dernière qu'il est long sur son milieu; d'un flave roussâtre ou d'un flave testacé; pubescent. *Ecusson* petit; triangulaire; d'un flave testacé; pubescent. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax; quatre fois au moins aussi longues que lui; faiblement élargies dans leur milieu, en ogive chacune à l'extrémité; médiocrement convexes; pubescentes; colorées comme il a été dit. *Repli*, latéral; aussi large que le postépisternum, vers l'extrémité de celui-ci; prolongé à peu près jusqu'au troisième arceau ventral. *Dessous du corps* pubescent; d'un flave pâle sur l'antépectus, noir ou d'un brun noir sur le reste, avec le médipectus moins obscur. *Mésosternum* prolongé à peu près jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* allongés, terminés en pointe obtuse. *Dernier arceau ventral* plus d'une fois ou près de deux fois aussi large à la base qu'il est long sur la ligne médiane. *Pieds* flaves ou d'un flave pâle.

Cette espèce paraît commune dans les diverses parties de la France.

OBS. Elle est facile à distinguer, même dans les variétés à élytres uniformément blondes, de l'*A. testacea*, par son postpectus noir; de l'*A. flava*, par son pygidium blond et par les caractères fournis par les antennes.

Les premiers états de cet insecte ont été décrits par M. Perris <sup>(1)</sup>, avec ce soin consciencieux et ce talent remarquable d'observation, qui caractérise toutes les productions de ce savant entomologiste. La description de la larve a été reproduite par Erichson, dans les *Archives pour l'hist. nat.* 1849 t. 2, p. 107. Bericht p. 83.

#### Genre *Silaria*, SILARIE.

CARACTÈRES. *Hanches postérieures* arquées en arrière à leur bord postérieur; plus longues que le premier arceau ventral, du moins dans le point intermédiaire entre la ligne médiane de cet arceau et son bord latéral. *Tibia postérieur* visiblement plus court que les deux premiers articles des tarses postérieurs réunis. Quatrième article des tarses an-

---

(1) Annal. de la Soc. Entomol. de Fr. 2<sup>e</sup> série t. 5. 1847 p. 29 à 32. pl. 1. n° 11 fig. 1. larve 3 à 5 détails.

térieurs peu apparent, comme enclâssé dans le troisième qui est bilobé. Yeux très-sensiblement échancrés. Repli des élytres graduellement et assez fortement rétréci, réduit à une tranche à partir du bord postérieur des hanches de derrière.

α. Deuxième article des antennes égal environ aux deux tiers du troisième. Elytres noires, sans taches.

1. **S. brunnipes** ; (REY) Suballongée ; pubescente ; noire : labre ordinairement d'un brun roux ou d'un flave roux. Cinq premiers articles des antennes et palpes d'un flave livide : pieds d'un brun noir, avec les tibias et tarses antérieurs moins obscurs. Antennes grêles, grossissant faiblement à partir du cinquième ou du sixième article : le deuxième égal aux deux tiers du troisième, ordinairement aussi grand que le quatrième : les sixième à dixième, faiblement élargis en ligne droite de la base à l'extrémité ; les sixième à dixième au moins un peu plus longs que larges. Elytres au moins une fois et quart aussi longues que larges réunis.

♂. Quatrième arceau ventral uniformément développé, à peu près aussi long que le troisième ; le cinquième sensiblement caréné sur la ligne médiane ; le cinquième, bilobé à l'extrémité, entaillé au moins jusqu'au tiers de sa longueur. Premier et deuxième articles des tarses antérieurs peu ou point dilatés sur leur tranche dorsale : le premier médiocrement dilaté sur son côté interne : le troisième dilaté.

♀. Quatrième arceau ventral comme chez le ♂ : les quatrième et cinquième sans carène : le cinquième en ogive et non bilobé à son extrémité. Trois premiers articles des tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu le troisième.

ETAT NORMAL. Les troisième à cinquième articles des antennes ordinairement flaves chez le ♂, sont ordinairement nébuleux ou obscurs chez la ♀. Les pieds varient du brun noir au brun, et même quelquefois avec tendance à passer au brun testacé ; les tibias et les tarses antérieurs sont généralement plus pâles et varient entre le brun testacé et le testacé brunâtre.

Long. 0,0027 à 0,0029 (1 1/4 à 1 1/5 l.) Larg. 0,0009 (2/5 l.)

Corps suballongé ; très-médiocrement convexe ; noir ; garni d'une pubescence brune, courte, fine, couchée, soyeuse. Tête noire : labre d'un roux testacé, ou parfois d'un brun roussâtre. Palpes d'un flave

roussâtre; à troisième article à peine plus grand que le troisième article des antennes; à dernier article plus long que les deuxième et troisième réunis, une fois et quart environ plus long qu'il est large dans son diamètre transversal le plus grand; obtus à son extrémité. *Antennes* prolongées environ jusqu'au cinquième des élytres; grêles, grossissant faiblement et graduellement à partir du sixième article: les deuxième et troisième, crassiuscules: le deuxième un peu moins court que le premier, aussi grand environ que les deux tiers du troisième, ordinairement aussi grand que le quatrième: les sixième à dixième faiblement élargis en ligne droite de la base à l'extrémité, à peine arqués ou obtusément tronqués à cette dernière: les sixième à huitième un peu plus longs que larges: les neuvième et dixième un peu moins longs que larges: le onzième article ovale, de moitié environ plus long que le dixième; noires, avec les cinq premiers articles flaves ou d'un flave pâle. *Prothorax* élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié environ, subparallèle ou à peine rétréci en ligne peu courbe postérieurement; bissubsinué à la base, avec la partie médiaire tronquée ou obtuse; d'un tiers ou de moitié plus long qu'il est large sur son milieu; noir; pubescent. *Ecusson* en triangle obtus, plus large que long; noir; pubescent. *Elytres* aussi larges en avant que le prothorax; trois fois à trois fois et quart environ aussi longues que ce dernier sur son milieu; subparallèles, rétrécies en ligne courbe depuis les deux tiers (♂) ou les trois quarts (♀) jusqu'à l'angle sutural; très-médiocrement convexes; noires; pubescentes. *Dessous du corps* noir; pubescent. *Mésosternum* prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* obliquement tronqués à l'extrémité; une fois plus larges que le repli des élytres au niveau du bord postérieur du postpectus; de moitié ou des trois cinquièmes aussi larges dans ce point que leur bord antérieur. *Pieds* d'un brun noir ou d'un noir brun: tibias et tarses antérieurs moins obscurs: premier article des tarses antérieurs à peu près aussi long que les trois suivants réunis.

Cette espèce se trouve dans les environs de Lyon.

Obs. Quelques autres individus trouvés par M. Rey dans les environs de La Seyne, près Toulon, s'en éloignent par le labre brun; par le dernier article des palpes nébuleux, proportionnellement plus allongé et offrant son angle postéro-interne très-ouvert et rapproché de la moitié de la longueur totale de l'article, au lieu d'être voisin de la base; par les antennes paraissant commencer à grossir à partir du cinquième article; par les neuvième et dixième articles un peu moins longs qu'ils sont larges, au lieu d'être aussi longs que larges.



Le ♂ offre une légère carène sur le quatrième arceau ventral aussi bien que sur le cinquième : ses trois premiers articles des tarses sont moins grêles ou un peu dilatés. De tels individus sembleraient devoir constituer une espèce particulière (*S. fuscipes* Rey); mais ces différences légères ne sont peut-être que des variations d'une même espèce.

**2. *S. latiuscula* ; (Rey)** *Oblongue ; pubescente ; noire ; labre, souvent épistome et même partie du front, palpes et trois à cinq premiers articles des antennes, d'un flave roux. Pieds antérieurs ordinairement flaves (♂) ou brunâtres (♀) : les postérieurs bruns ou d'un noir brun. Deuxième article des antennes égal aux deux tiers du troisième, aussi grand que le quatrième : les sixième à dixième élargis en ligne droite, tronqués à l'extrémité : les sixième à huitième au moins aussi longs que larges. Elytres une fois à peine plus longues qu'elles sont larges, réunies. Postépisternums aussi larges en arrière que les trois cinquièmes de leur base.*

♂. Quatrième arceau ventral uniformément développé : aussi long que le troisième : le cinquième, légèrement caréné sur sa ligne médiane, bilobé à l'extrémité, débordé par le sixième. Trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés, surtout les premier et troisième.

♀. Quatrième arceau ventral comme chez le ♂ : le cinquième, non caréné ; en ogive obtuse à l'extrémité. Trois premiers articles des tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu le troisième.

**ETAT NORMAL.** Corps noir, avec le labre et l'épistome d'un flave roussâtre (♂) ou le labre d'un roux flave et l'épistome d'un brun roussâtre (♀). Trois à cinq premiers articles des tarses flaves, graduellement nébuleux ou moins clairs sur les quatrième et cinquième : les suivants passant au brun ou au brun noirâtre. Pieds antérieurs flaves : les intermédiaires d'un flave testacé brunâtre : les postérieurs bruns ou d'un brun tirant sur le testacé (♂) ; pieds antérieurs et intermédiaires d'un brun testacé, avec les tarses antérieurs au moins, moins obscurs : les postérieurs d'un brun noir, souvent avec les genoux plus clairs (♀).

♂. Quelquefois la couleur d'un flave roussâtre envahit la partie antérieure du front ou passe graduellement sur celle-ci au brun roussâtre. La teinte des trois premiers articles des antennes varie du flave au roux livide graduellement nébuleux ou plus obscur sur les



quatrième à sixième articles. Les pieds montrent aussi quelques variations dans leur teinte.

♀. La couleur d'un roux flave ou d'un roux livide s'étend parfois sur une partie au moins de l'épistome, mais ne paraît pas envahir le front. La couleur flave des antennes est réduite parfois aux trois premiers articles. Les pieds antérieurs et intermédiaires montrent aussi dans leurs teintes quelques variations, mais qui s'éloignent en général faiblement de l'état normal.

Le prothorax ni les élytres ne paraissent pas ordinairement se modifier dans leur teinte noire.

Long. 0,0033 (1 1/2 l.) Larg. 0,0013 (3/3 l.)

*Corps* oblong; très-médiocrement convexe; noir; garni d'une pubescence courte, soyeuse, fine et couchée, qui donne une teinte d'un noir brun aux parties noires. *Tête* noire, avec le labre et l'épistome (♂) ou souvent seulement avec le labre (♀) d'un roux testacé. *Palpes maxillaires* de même couleur ou d'un flave livide; à dernier article souvent nébuleux vers son extrémité, à peine aussi long que les deux précédents réunis, terminé en pointe aiguë. *Antennes* prolongées environ jusqu'au cinquième des élytres; grossissant graduellement à partir du cinquième article: le premier, court, subglobuleux: le deuxième, égal aux deux tiers du troisième, aussi grand que le quatrième: les sixième à dixième, graduellement élargis en ligne droite de la base à l'extrémité, tronqués à cette dernière, avec les angles un peu émoussés: les sixième à huitième, aussi longs (♀) ou un peu plus longs (♂) que larges: les neuvième et dixième, proportionnellement un peu plus courts: le onzième, de moitié au moins plus long que le dixième; flaves, d'un flave testacé ou d'un roux livide, sur les trois à cinq premiers articles, passant graduellement au brun sur les derniers. *Prothorax* élargi en ligne courbe jusqu'aux trois quarts (♂) ou jusqu'à l'extrémité (♀); bissubsinue à la base, avec la partie médiaire obtuse ou tronquée et les angles à peine émoussés; de trois quarts environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu; noir; pubescent. *Ecusson* en triangle plus long que large; noir; pubescent. *Elytres* aussi larges en avant que le prothorax; quatre fois environ aussi longues que lui; une fois et quart environ plus longues qu'elles sont larges prises ensemble; subparallèles jusqu'à la moitié (♀) ou aux trois cinquièmes (♂), rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural, d'une manière presque

régulière chez la ♀, plus sensiblement subarrondies à l'extrémité, chez le ♂; faiblement convexes; noires; pubescentes. *Dessous du corps* noir; pubescent. *Mésosternum* étroit, prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* obtusément et obliquement tronqués à l'extrémité; près d'une fois plus larges vers le bord postérieur du postpectus que le repli, aussi larges dans ce point que les trois cinquièmes environ de leur bord antérieur. *Pieds* colorés comme il a été dit. Premier article des tarses antérieurs à peu près aussi long (♂ ♀) que les trois suivants réunis.

Cette espèce a été prise par MM. Rey et Guillebeau dans les montagnes de la France voisines de la Savoie, sur le Caille-lait à fleurs blanches.

Obs. Elle a de l'analogie avec la *S. brunnipes*; mais elle s'en éloigne par la largeur de ses élytres et par quelques autres caractères indiqués.

3. **S. varians.** *Oblongue; pubescente; ordinairement noire, avec le labre et l'épistome, les palpes, les cinq premiers articles des antennes, les quatre premiers pieds, et nébuleusement les postérieurs, d'un roux flave ou d'un flave roussâtre: partie antérieure du front, partie ou totalité du prothorax, parfois d'un flave roussâtre ou rougeâtre. Troisième article des antennes souvent faiblement plus grand que le quatrième, d'un tiers ou de moitié plus long le deuxième: les septième à dixième, élargis en ligne courbe jusqu'à la moitié, tronqués à l'extrémité: les septième à neuvième plus longs (♂) ou presque aussi longs (♀) que larges.*

♂. Quatrième arceau ventral graduellement un peu plus court sur son milieu que sur les côtés, d'un tiers au moins plus court sur la ligne médiane que le troisième. Cinquième arceau échancré à son extrémité, débordé par le sixième. Trois premiers articles des tarses antérieurs dilatés, surtout les troisième et premier: celui-ci, plus large sur son côté interne.

♀. Quatrième arceau ventral d'un développement uniforme, à peu près aussi long que le troisième: le cinquième, en ogive obtuse à son extrémité. Tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu le troisième article.

*Anaspis pulicaria*, (FROELICH) (DEJEAN), Catal. (1837) p. 241 ?

*Anaspis nigra*, (MEGERLE) (DEJEAN), Catal. (1837) p. 241 ?

*Anaspis depressa*, (SCHUFFEL) (DEJ.) Catal. (1837) p. 241 ?

ÉTAT NORMAL. *Tête* noire, avec le labre et l'épistome d'un flave roussâtre. *Palpes maxillaires* de même couleur, parfois avec la moitié postérieure du dernier article, nébuleuse. *Prothorax* noir, avec le repli inférieur d'un fauve roussâtre ou d'un roux testacé. *Elytres* noires. *Pieds* antérieurs et intermédiaires d'un flave roussâtre ou d'un roux livide : les postérieurs d'un flave testacé nébuleux.

En considérant cet état comme normal, l'espèce subit de nombreuses modifications.

Quand la matière noire a été moins abondante, la couleur d'un flave roux du labre et de l'épistome s'étend en teinte graduellement affaiblie sur une partie du front. Le prothorax, noir sur la majeure partie de sa surface, passe au brun roussâtre, au roux brunâtre ou au roux testacé vers ses parties antérieures ou antéro-latérales ; chez d'autres individus, la couleur rouge testacé ou d'un roux testacé envahit graduellement une partie de sa surface : chez quelques autres, il se montre d'un rouge de brique, avec sa partie antéro-scutellaire obscure ou noirâtre sur un espace variable ; enfin chez d'autres la matière noire a complètement disparu, et il est alors presque uniformément d'un rouge de brique ou d'un rouge de brique blanchâtre. Les élytres restent noires ; mais les pieds postérieurs s'éclaircissent souvent plus ou moins.

Quand le défaut de matière colorante a été poussé plus loin, et qu'elle s'est mêlée ou infiltrée dans les parties claires, il en résulte une coloration anormale. Le prothorax passe au rouge roux brunâtre en même temps que les élytres prennent une couleur moins sombre ; quelquefois les élytres et le prothorax sont d'un brun fauve ou d'un fauve brun, plus clair, plus fauve ou plus testacé sur les côtés du prothorax et souvent aussi sur diverses parties des élytres, surtout à l'angle huméral.

Quand, au contraire, la matière noire s'est développée avec trop d'abondance, elle envahit des parties qui ne lui étaient pas destinées. L'épistome et même le labre se montrent obscurs, bruns, ou d'un brun noir. Les articles basilaires des antennes deviennent nébuleux, les quatrième et cinquième, quelquefois obscurs. Le prothorax et les élytres sont complètement noirs. Les pieds antérieurs, chez les uns, sont encore d'un flave testacé nébuleux, tandis que les intermédiaires et surtout les postérieurs s'assombrissent, et l'on trouve enfin des individus chez lesquels les pieds sont complètement noirs.

On peut réduire pour le prothorax et les élytres ces diverses modifications aux variétés suivantes.

Var. A. *Prothorax* et élytres noirs.

Var. B. *Prothorax* noir, avec une partie de ses bords antérieur et latéraux, d'un rouge brunâtre, d'un rouge ou d'un roux testacé. Elytres noires.

Var. C. *Prothorax* en majeure partie d'un rouge de brique ou d'une teinte rapprochée, avec la partie anté-scutellaire noire, noirâtre ou obscure.

Var. D. *Prothorax* entièrement d'un rouge testacé, ou d'un rouge testacé pâle ou blanchâtre. Elytres noires.

*Anaspis collaris*, Dej. Catal. (1837) p. 242. (suivant M. Reiche).

Var. E. *Prothorax* d'un rouge brunâtre, au moins en partie. Elytres brunes ou d'un brun tirant sur le testacé, avec des espaces ou des taches plus pâles, souvent avec une tache humérale et même quelques autres.

Obs. Outre les variations de couleurs ou de teintes, cette espèce en offre quelques autres dans les proportions des deuxième à quatrième articles des antennes. Le plus souvent les troisième et quatrième sont presque égaux et d'un tiers environ plus grands chacun que le deuxième; d'autres fois le troisième est plus grand que le quatrième.

Long. 0,0026 à 0,0028 (1 1/3 à 1 1/4 l.) Larg. 0,0009 (2/3 l.)

*Corps* oblong; très-médiocrement convexe; coloré comme il sera dit; garni d'une pubescence soyeuse, fine et couchée, qui donne une teinte brune aux parties noires. *Tête* noire, avec le labre, l'épistome, souvent la partie antérieure du front, la bouche et les palpes, d'un flave roux. *Antennes* à peine prolongées jusqu'au septième des élytres; grossissant graduellement à partir du cinquième ou plutôt du sixième article: les premier et deuxième presque égaux, crassiuscules: le troisième souvent faiblement plus long que le quatrième, d'un tiers ou de moitié au moins plus long que le deuxième: le cinquième plus court que le quatrième: les septième à dixième, élargis en ligne courbe dans leur moitié basilaire, subparallèles ou à peine élargis en ligne droite dans la seconde, tronqués à l'extrémité, paraissant, par suite de leur rétrécissement basilaire, assez détachés les uns des autres: les septième à



neuvième plus grands (♂) ou à peine aussi grands (♀) qu'ils sont larges à l'extrémité : le onzième, de moitié au moins (♂) ou de deux tiers au moins (♀) plus long que le dixième ; noires, avec les cinq articles basilaires d'un flave roussâtre. *Prothorax* élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié, subparallèle ou à peine élargi ensuite ; bissubsinue à la base ; avec la partie médiane obtuse ou tronquée ; de deux tiers environ plus large qu'il est long sur son milieu ; pubescent, côtelé comme il a été dit. *Ecusson* en triangle plus large que long, obtus ou émoussé à sa partie postérieure ; noir ; pubescent. *Elytres* aussi larges en avant que le prothorax ; trois fois à trois fois et demie aussi longues que celui-ci sur son milieu ; graduellement un peu élargies jusqu'aux trois cinquièmes ou un peu plus, rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural ; médiocrement convexes ; pubescentes : ordinairement noires. *Dessous du corps* brièvement pubescent ; généralement noir, avec les côtés de l'antépectus ordinairement d'un fauve roussâtre. *Mésosternum* prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches. *Postépisternums* obliquement tronqués à leur extrémité, aussi larges au niveau du bord postérieur du postpectus que les deux tiers de leur base. *Pieds* ordinairement d'un flave testacé ou d'un roux testacé livide, avec les postérieurs plus ou moins nébuleux. Premier article des tarses antérieurs à peu près aussi long que les trois suivants réunis.

Cette espèce paraît habiter la plupart des parties de la France.

Obs. Elle se distingue de toutes les autres par les troisième et quatrième articles des antennes ordinairement moins inégaux : le troisième d'un tiers ou de moitié plus grand que le deuxième. Elle s'éloigne de la *S. latiuscula* par ses élytres proportionnellement moins larges, etc. Le ♂ se reconnaît entre tous ceux des espèces précédentes par son quatrième arceau ventral graduellement plus court vers la ligne médiane ; par le cinquième non caréné.

A cette division se rattache l'espèce suivante.

**S. Chevrolati.** Oblongue ; pubescente ; flave ou d'un flave testacé, en dessus, avec le sommet de la tête noirâtre. Six premiers articles des antennes, palpes et quatre pieds antérieurs, flaves : derniers articles des antennes, nébuleux ou noirâtres : pieds postérieurs d'un brun flavescant. *Dessous du corps* noir, avec l'antépectus, flave.

Long. 0,0022 (1 l.) Larg 0,0009 (2/3 l.)



*Corps* oblong ; faiblement convexe ; à pubescence assez serrée, concolore avec le fond. *Tête* d'un flave roussâtre , avec le sommet graduellement obscur ou noirâtre. *Palpes* d'un flave roussâtre. *Antennes* prolongées au moins jusqu'au quart des élytres ; grossissant graduellement un peu à partir du sixième ou du septième article : le troisième, de moitié plus long que le premier, égal au suivant : celui-ci une fois plus long que large, de la grosseur à peu près du deuxième : les sixième à dixième, faiblement plus longs que larges ; d'un flave testacé sur les six premiers articles, nébuleuses ou noirâtres sur les suivants. *Yeux* noirs ; très-faiblement échancrés. *Prothorax* élargi en ligne un peu arquée sur les côtés ; bissinué à la base, avec la moitié médiaire de celle-ci faiblement arquée en arrière ; de moitié au moins plus large que long ; d'un flave rougeâtre ou d'un flave testacé ; pubescent. *Écusson* en triangle plus large que long ; noirâtre. *Elytres* aussi larges en devant que le prothorax ; trois fois et demie environ aussi longues que lui ; à peine élargies dans leur milieu, en ogive à côtés inégaux chacune à l'extrémité ; peu convexes ; d'un flave testacé ; pubescentes. *Pygidium* obscur ou noirâtre. *Repli* flave testacé. *Dessous du corps* noir, ou noir brun, avec l'antépectus d'un flave testacé ; garni d'un duvet très-court, peu serré, fin, presque concolore ou d'un fauve livide. *Pestépisternums* rétrécis d'avant en arrière, obtusément tronqués à l'extrémité. *Pieds* antérieurs et intermédiaires d'un flave testacé : les postérieurs, d'un brun flavescent. *Premier article des tarses postérieurs* presque égal au tibia ; d'un tiers plus long que l'article suivant.

PATRIE : l'Espagne.

Obs. L'insecte était collé ; je n'ai pu examiner les derniers arceaux du ventre ; mais la couleur du dessus du corps fait suffisamment reconnaître la *S. Chevrolati* parmi les autres espèces peu nombreuses de cette petite coupe, si distincte par la forme du repli des élytres.

Je l'ai dédiée à M. Chevrolat. Puisse ce faible souvenir lui redire ma reconnaissance, pour la bienveillance avec laquelle il a toujours mis à ma disposition les richesses de sa collection.

αα. Deuxième article des antennes à peine moins long ou souvent au moins aussi long que le troisième. Elytres ordinairement marquées de taches flavescentes.

4. *S. quadripustulata* ; MULLER. Oblongue ; pubescente ; noire ou d'un brun noir : épistome, labre, palpes, cinq premiers articles des antennes et quatre pieds antérieurs, d'un roux flave ou d'un flave testacé. Prothorax ordinairement passant au roux flave sur ses parties antéro-

latérales. Elytres ornées ordinairement chacune de deux taches flaves : la première couvrant le bord latéral presque depuis la base jusque vers les deux cinquièmes, non étendue jusqu'à la suture, épointée à sa partie antéro-interne : la deuxième, subtransversale des quatre aux cinq cinquièmes de leur longueur : ces taches parfois plus petites ou peu apparentes. Troisième article des antennes à peine plus long que le deuxième : les quatrième et cinquième plus courts que le troisième : les sixième à dixième, serrés, plus larges que longs.

♂. Quatrième arceau ventral d'un développement uniforme ; presque égal au troisième : le cinquième légèrement déprimé vers l'extrémité de sa ligne médiane, obtusément tronqué ou à peine échancré à l'extrémité. Tarses antérieurs non dilatés, si ce n'est un peu le troisième article.

♀. Quatrième arceau ventral comme chez le ♂. Le cinquième, en ogive à son extrémité. Tarses antérieurs non dilatés.

*Anaspis quadripustulata*, FR. W. J. MÜLLER, Neue Insekten, in GERMAR's Magaz. d'Ent. 1. 4. (1821) p. 212. 15.

ÉTAT NORMAL. Tête noire ou d'un noir brun, avec le labre et l'épistome d'un flave roussâtre ou d'un roux testacé. Prothorax brun ou brun noir, passant au fauve, au fauve testacé ou même au testacé roussâtre vers les parties antérieures des côtés ; à pubescence d'un fauve testacé. Elytres brunes ou d'un brun noir ; ornées chacune de deux taches flaves, d'un flave roussâtre, ou d'un roux livide : l'antérieure, couvrant le bord externe presque depuis la base jusque vers les deux cinquièmes de sa longueur, à bord postérieur en ligne transversale droite ou un peu plus prolongée en arrière à son angle postéro-interne, étendue jusqu'au cinquième interne de la largeur des étuis, parallèle à la suture depuis son angle postéro-interne jusqu'au quart de la longueur des étuis, obliquement coupée de ce point à son angle antéro-externe : la deuxième, subtransversale, presque liée au bord externe, un peu moins rapprochée de la suture, couvrant à son côté externe depuis un peu après les trois cinquièmes jusque un peu après les quatre cinquièmes de la longueur des élytres, un peu moins développée longitudinalement à son côté interne. Pieds antérieurs et intermédiaires d'un flave fauve ou d'un flave testacé : les postérieurs bruns ou brun noir, avec les trochanters et un peu la base des cuisses d'un flave testacé.

Oss. Quand la matière noire a été moins abondante, diverses parties

deviennent plus claires. La couleur d'un flave testacé s'étend sur la partie antérieure du front; les parties antérieures et latéro-antérieures du prothorax passent plus franchement au flave roux, au roux testacé et parfois au rouge roux testacé. Quelquefois le prothorax est d'un flave orangé ou roussâtre avec une bordure basilaire noire; les taches des élytres ont acquis parfois un peu d'extension; la couleur foncière des étuis passe rarement au brun fauve; les pieds postérieurs se montrent moins obscurs ou rarement d'un brun testacé.

Quand au contraire la matière noire s'est développée en excès, les articles basilaires des antennes deviennent nébuleux; la tête, chez quelques individus, se montre entièrement noire, même sur l'épistome et sur le labre; le prothorax acquiert uniformément la même couleur; les taches des élytres se rappetissent: l'antérieure s'étend parfois à peine jusqu'au tiers interne; la postérieure se réduit quelquefois à une sorte de gros point irrégulier; ces taches deviennent nébuleuses ou faiblement apparentes; elles finissent même par disparaître, et les élytres semblent à la vue uniformément noires; mais en les soulevant et les regardant au jour, on voit encore les traces plus ou moins distinctes des deux taches ou du moins de l'antérieure. Le repli est alors tantôt uniformément noir, tantôt en partie testacé. Les pieds intermédiaires passent souvent au brun, en même temps que les postérieurs se foncent davantage; d'autres fois les quatre pieds antérieurs ont une teinte d'un roux flave plus prononcée, comme si la matière noire s'était concentrée sur les diverses autres parties, pour leur laisser une coloration plus vive. Le doryte subit aussi des modifications dans sa couleur; ordinairement d'un fauve testacé sur les parties claires, il devient plus obscur quand ces parties se rembrunissent.

On peut réduire les diverses modifications que présentent le prothorax et les élytres, aux variétés suivantes.

*Var. A. Prothorax et élytres noirs ou d'un noir brun: celles-ci ornées chacune de deux taches d'un flave testacé.*

*Var. B. Prothorax en partie ou presque en totalité d'un roux testacé ou d'une teinte rapprochée. Élytres comme chez la précédente.*

*Anaspis quadrimaculata*, SCHÖNHER, Syn. ins. t. 3. append. p. 37. 57. (décrite par Gyllenhal).

*Var. C. Prothorax noir. Taches des élytres plus ou moins petites*

Var. D. *Prothorax* noir. *Elytres* ne paraissant offrir plus qu'une tache (ordinairement l'anérieure), et souvent restreinte.

*Mordella bipustulata*, BONELLI, Specim. Faun. subalp. in Memor. della Soc. di Agricolt. di Torino, t. 9. (1812) p. 172. 18. pl. 5. fig. 18?

Var. E. *Prothorax* et *élytres*, noirs : taches de celles-ci peu ou point apparentes.

Long. 0,0025 à 0,0026 (1 à 1 1/5 l.) Larg. 0,0009 (2/3 l.)

Corps oblong ; arqué ; faiblement ou très-médiocrement convexe ; coloré comme il sera dit ; garni d'une pubescence courte, soyeuse, fine et couchée, donnant aux parties noires une teinte moins obscure ou grisâtre. Tête noire : épistome, labre, bouche et palpes maxillaires d'un roux testacé : extrémité des mandibules, brunâtre : dernier article des palpes, nébuleux. Antennes prolongées un peu au delà de la base du prothorax : grossissant graduellement à partir du cinquième article : les premier et deuxième crassiuscules, presque égaux : le troisième souvent à peine plus long ou même moins long que le deuxième : le quatrième plus court, égal à peu près au cinquième : les sixième à dixième serrés, faiblement élargis presque en ligne droite de la base à l'extrémité, tronqués à cette dernière, plus larges à celle-ci qu'ils sont longs : les huitième à dixième graduellement un peu moins courts que les précédents : le onzième ovulaire, d'un quart (?) ou de moitié (?) plus long que le dixième ; noires ou brunes, avec les cinq ou six premiers articles d'un flave testacé. *Prothorax* élargi en ligne courbe jusqu'aux trois cinquièmes, et faiblement ensuite ; bissubsinué à la base, avec la partie médiaire obtuse ou tronquée ; de moitié environ plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; pubescent ; coloré comme il a été dit. *Écusson* en triangle notablement plus large que long ; émoussé postérieurement ; brun ; pubescent. *Elytres* aussi larges en avant que le prothorax ; trois fois environ aussi longues que lui ; faiblement élargies en ligne presque droite jusqu'aux trois cinquièmes ou aux deux tiers, rétrécies ensuite en ligne un peu courbe à partir de ce point jusqu'à l'angle sutural ; en ogive à leur extrémité, prises ensemble : très-médiocrement convexes ; pubescentes ; colorées comme il a été dit. *Repli* ordinairement d'un flave testacé dans la partie correspondant aux taches des *élytres*, brun sur le reste. *Dessous du corps* habituellement d'un roux testacé sur les côtés de l'antépectus ; noir ou d'un noir brun et brièvement pubescent sur



le reste. *Mésosternum* prolongé jusqu'à l'extrémité des hanches. *Post-épisternums* obliquement tronqués à l'extrémité ; aussi larges vers le bord postérieur du postpectus que les deux tiers de leur partie antérieure. *Pieds* colorés comme il a été dit. Premier article des tarses antérieurs non dilaté, et aussi long que les trois suivants réunis (♂♀).

Cette espèce paraît habiter la plupart des parties de la France. Elle est assez commune dans les environs de Lyon sur les spirées, sur les fleurs en ombelles, sur celles de l'aubépine, etc.

Obs. Cette espèce, même dans ses variétés les plus anormales, se distingue de toutes les précédentes par le troisième article de ses antennes à peine plus grand et parfois même à peine aussi grand que le deuxième, notablement plus long que le quatrième ; par les cinquième à dixième, faiblement élargis en ligne à peu près droite de la base à l'extrémité, paraissant par là plus serrés ou moins détachés les uns des autres ; par ses élytres rétrécies en ligne un peu courbe depuis les deux tiers jusqu'à l'angle sutural et comme obliquement tronquée à leur extrémité ; le ♂ n'a d'ailleurs ni le quatrième arceau rétréci vers son milieu, ni le cinquième fortement entaillé à son extrémité, ni les tarses antérieurs dilatés.

#### Genre *Pentaria*, PENTARIE.

CARACTÈRES. *Hanches postérieures* en ligne presque droite à leur bord postérieur, ou du moins sur les deux tiers internes de celui-ci ; plus courtes que le premier arceau ventral. *Tibia postérieur* au moins aussi long que les deux premiers articles des tarses postérieurs réunis. *Quatrième article* des tarses antérieurs distinct du troisième, à peine moins court que lui, bilobé. *Repli* graduellement et faiblement rétréci, offrant ses deux bords distincts jusque vers l'extrémité du troisième arceau ventral.

A ces caractères on peut ajouter : *Yeux* à grosses facettes, à peine échancrés. *Elytres* parallèles. *Pieds* grêles. *Ventre* paraissant avoir toujours six anneaux distincts.

L'insecte sur lequel est fondée cette petite coupe semble faire le passage des Anaspiens aux Seraptiens, par ses hanches postérieures plus courtes ; par ses tibias postérieurs plus allongés ; par le quatrième article des tarses antérieurs plus distinct, visiblement détaché du troisième, bilobé ; et même par la couleur de son corps.

1. *P. sericaria*. Allongée ; parallèle ; pubescente ; fauve ou d'un



fauve testacé, en dessus. Dessous du corps d'un fauve brunâtre. Pieds d'un fauve testacé. Antennes de même couleur sur leurs quatre premiers articles, noires sur les autres : les deuxième à quatrième presque égaux : les sixième à dixième plus larges que longs. Repli à peu près aussi large en devant que le postépisternum.

♂ Inconnu.

♀ Ventre de six arceaux ; le premier le plus grand : les autres sans appendices : le sixième en ogive. Tarses antérieurs non dilatés.

*Anaspis sericans*, D. HAUFF, in litter.

Long. 0,0026 (1 1/3 l.) Larg. 0,0009 (2/3 l.)

Corps allongé ; très-médiocrement convexe ; fauve ou d'un fauve testacé, en dessus et garni d'une pubescence courte, soyeuse, couchée et d'un fauve cendré. Yeux noirs ; à grosses facettes ; faiblement échanerés. Palpes fauves. Antennes prolongées environ jusqu'au cinquième des élytres ; grossissant graduellement à partir du cinquième ou sixième article : les premier et deuxième un peu plus gros que les trois suivants, crassiuscules : les deuxième, troisième et quatrième à peu près égaux : les troisième et quatrième un peu plus longs que larges : les sixième à dixième, assez serrés, subcomprimés ; faiblement élargis de la base à l'extrémité, visiblement moins longs qu'ils sont larges à cette dernière : le dernier oblong, de moitié plus long que le dixième : fauves ou d'un fauve testacé sur les quatre premiers articles, noires sur les autres. Prothorax élargi en ligne courbe jusqu'à la base ; à peine bissubsinués à cette dernière. Écusson petit, triangulaire. Élytres aussi larges à la base que le prothorax ; trois fois et demie environ aussi longues que lui ; subparallèles jusqu'aux quatre cinquièmes, obtusément arrondies, prises ensemble, à l'extrémité ; très-médiocrement convexes. Repli latéral ; aussi large en devant que les postépisternums ; prolongé en se rétrécissant jusque vers l'extrémité du troisième arceau ventral. Dessous du corps testacé ou d'un testacé tirant sur le fauve sur l'antépectus, d'un brun fauve ou d'un fauve brun sur le reste. Mésosternum aussi saillant que les hanches, prolongé jusqu'à leur extrémité. Postépisternums allongés ; obtusément et obliquement tronqués à l'extrémité ; faiblement plus larges près de celle-ci que le repli. Pieds d'un fauve testacé ou d'un testacé fauve. Tibias postérieurs aussi longs que les deux premiers articles des tarses.

Cette espèce a été envoyée par le docteur Hampe, de Vienne en Autriche, sous le nom de *sericans*, dont j'ai été obligé de modifier la terminaison, M. Melsheimer ayant appliqué la même épithète à une autre espèce de Mordelliens. La *P. sericaria* a été prise par M. Rey dans les environs de Hyères.

Obs. Outre les caractères génériques qui l'éloignent des autres Anaspiens, elle se distingue de toutes les précédentes espèces par la largeur de son repli.

### TROISIÈME FAMILLE.

#### SCRAPTIENS.

**CARACTÈRES.** *Sommet de la tête* plus élevé que le bord antérieur du prothorax, convexement déclive à sa partie postérieure. *Pygidium* non prolongé en pointe. *Hanches postérieures* moins longues que le premier arceau ventral. *Eperons destibias antérieurs* très-visibles. *Tibia postérieur* aussi long que tous les articles réunis du tarse qui le suit. *Avant-dernier article de tous les tarses* avancé en forme de sole sous l'article suivant. *Ongles* simples et munis à la base de chacun de leurs crochets d'une dent rudimentaire. *Corps* à peine arqué.

Ajoutez à ces caractères pour les espèces suivantes :

*Tête* petite; plus étroite que le prothorax; inclinée; arrondie à ses angles postérieurs. *Yeux* profondément échancrés; très-écartés; divergeant postérieurement à leur côté interne, à partir de la partie postéro-interne de leur échancrure. *Antennes* médiocres; filiformes; de onze articles. *Palpes maxillaires* à dernier article en forme de hache ou de couteau. *Prothorax* transversal. *Ecusson* distinct. *Elytres* à peu près aussi larges en devant que le prothorax à sa base. *Hanches de devant* allongées, contiguës ou non séparées par un prosternum aussi saillant qu'elles. *Hanches intermédiaires* allongées, subparallèles. *Hanches postérieures* un peu obliquement transverses; un peu rétrécies de dedans en dehors. *Ventre* de cinq arceaux.

Les Scaptiliens ballottés dans d'autres tribus par les auteurs, appartiennent à celle-ci par leur tête accolée contre le prothorax; ils semblent, dans ce premier groupe, les représentants des Ptilophores dans le second.

Ces insectes se répartissent dans les deux genres suivants :

## GENRES.

Elytres

subparallèles ; flexibles ; n'embrassant pas les côtés du ventre. Cinquième à dixième articles des antennes plus longs que larges. Ailes développées. Premier arceau ventral voilé en devant par les hanches postérieures plus élevées que lui ; à pointe antéro-médiale de cet arceau caché sous les hanches ; moins long, près de la ligne médiane, que le deuxième arceau.

*Scaptia*.

ovales ou ovales, oblongues, assez dures ; embrassant les côtés du ventre. Cinquième à dixième articles des antennes submoniliformes, à peine aussi longs que larges. Ailes ordinairement nulles ou peu développées. Premier arceau ventral non voilé en devant par les hanches postérieures ; à pointe antéro-médiale visiblement avancée entre les dites hanches ; plus long près de la ligne médiane que le deuxième arceau.

*Troctomma*.Genre *Scaptia*, SCAPTIE ; Latreille.

CARACTÈRES. *Elytres* subparallèles ; flexibles ; n'embrassant pas les côtés du ventre. *Antennes* filiformes ; cinquième à dixième articles plus longs que larges. *Mandibules* bifides à l'extrémité. *Mâchoires* à deux lobes : l'externe plus grand, cilié ou velu. *Palpes maxillaires* à dernier article en forme de contre ; une fois environ plus long qu'il n'est large à la base : plus large à celle-ci que le troisième. *Langue* membraneuse. *Ailes* développées. *Premier arceau ventral* voilé en devant par les hanches postérieures qui sont plus élevées que lui ; à pointe antéro-médiale cachée sous lesdites hanches ; plus court, depuis celles-ci, près de la ligne médiane, que le deuxième arceau.

A ces caractères on peut ajouter pour les espèces suivantes :

*Prothorax* à angles de devant déclives, peu marqués ; à peine bis-sinué à la base, avec la partie médiale à peine prolongée en arrière ; marqué d'une fossette plus ou moins apparente, près de chaque subsinuosité ; sans rebord. *Elytres* munies antérieurement sur les côtés d'un rebord très-étroit, qui s'efface postérieurement ; à bord externe incliné en dehors de l'épaule, et invisible en dessus jusque vers le quart de la moitié de sa longueur.

(<sup>1</sup>) *Genera*, t. 2. p. 199.

**1. *S. fusca* ; LATREILLE.** *Subparallèle ; très-médiocrement convexe ; à pubescence soyeuse ; pointillée, avec les intervalles squammuliformes ; brune sur la tête et sur le prothorax, d'un brun fauve ou testacé sur les élytres. Prothorax une fois plus large que long ; à deux fossettes basilaires assez faibles. Dessous du corps et pieds bruns ou d'un brun fauve : le premier moins obscur sur le ventre : les seconds sur les jambes et les tarses. Deuxième article des antennes égal aux deux tiers du précédent : celui-ci plus grand que le quatrième. Yeux notablement séparés du bord postérieur de la tête.*

♂ Dernier arceau du ventre échancré ou entaillé dans le milieu de son bord postérieur, ordinairement déprimé ou sillonné longitudinalement sur la seconde moitié de sa ligne médiane.

♀ Dernier arceau du ventre entier ; non sillonné longitudinalement.

*Melyris dubius*, OLIV. Entom. t. 2. n° 21. p. 12. 17. pl. 3. fig. 17, a, b. (suivant le type existant dans la collection de M. Chevrolat)

*Melandrya fusca*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 342. 4.

*Scaptia fusca*, LATR. GÖEB. t. 2. p. 200. 1. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 421. 1. — GOLDFUSS, Handl. p. 350. — S. FARG. et A. SERV. Encycl. méth. t. 10. p. 409. — DUMÉRIL, Dict. d'hist. nat. t. 48. p. 212. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 39. 1. — Id. Man. p. 330. 2585. — Edit. Croch. Regn. anim. de CUVIER, pl. 54. fig. 1. — GUÉRIN, Dict. class. d'Hist. nat. t. 13. (1839) p. 294. — KUSTER, Kaeft. Europ. p. 27. 91.

*Dicaea fuscula*, GYLLENH. Ins. suec. t. 2, p. 525. S. voyez t. 4. p. 569. 8.

*Dicaea sericea*, SCHÖNH. Syn. Insect. t. 3. p. 49. 11 et append. p. 19. 26. (décrit par Gyllenhal).

*Scaptia fuscula*, DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 259. 1. — L. REDTENBACHER, Faun. austr. p. 611.

*Scaptia dubia*, GUÉRIN, Iconogr. du Regn. Anim. p. 131. pl. 34. fig. 8, a, détails.

Long. 0,0039 à 0,0048 (1 3/4 à 2 1/3 l.) Larg. 0,0015 à 0,0018 (5/3 à 2/3 l.)

*Corps* subparallèle ; très-médiocrement convexe ; garni de poils fins, soyeux, fauves ou d'un fauve livide ; brun sur la tête et sur le prothorax, d'un brun fauve ou testacé sur les élytres. *Tête* subarrondie ; visiblement plus étroite que le bord antérieur du prothorax ; médiocrement convexe ; presque en ligne droite à son bord postérieur ; finement ponctuée ; à pubescence hérissée ; brune : labre et *palpes* ordinairement d'un brun pâle ou d'un brun livide. *Antennes* prolongées

environ jusqu'au quart des élytres; filiformes; pubescentes; brunes; à deuxième article égal à peu près aux deux tiers du troisième. *Yeux* d'un brun noir; profondément échancrés; séparés du bord postérieur de la tête par un espace égal à la partie de leur bord interne comprise depuis l'échancrure. *Prothorax* un peu arqué à son bord antérieur; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié de ses côtés, subparallèle ensuite; à bords latéraux tranchants sur presque toute leur longueur; à angles postérieurs émoussés; presque en ligne droite ou à peine arqué en arrière et peu sensiblement bissubsinué à la base; une fois plus large à celle-ci qu'il n'est long sur son milieu; marqué, vers chaque quart externe de sa base, d'une fossette, tantôt réduite à une sorte de point enfoncé, tantôt en forme de petit sillon longitudinal médiocrement avancé, rendant alors plus distinctes les faibles subsinuosités basilaires; finement ponctué, avec les intervalles squammuliformes; à pubescence couchée; brun, ou brun fauve, avec les bords parfois moins foncés. *Ecusson* assez grand; en triangle subéquilatéral, à côtés faiblement curvilignes; brun fauve; pointillé; pubescent. *Elytres* aussi larges en avant que le prothorax à ses angles postérieurs; quatre fois environ aussi longues que lui; subparallèles ou plutôt faiblement élargies jusques à un peu plus de la moitié de leur longueur, obtusément arrondies à l'extrémité (prises ensemble), avec l'angle sutural émoussé et l'extérieur arrondi; peu ou très-médiocrement convexes; sans stries et sans fossette humérale; d'un brun fauve ou d'un fauve brunâtre; à pubescence couchée; pointillées d'une manière plus fine que le prothorax à leur base, et plus finement encore à leur extrémité, avec les intervalles squammuliformes. *Repli latéral*, et un peu moins large en avant que les postépisternums; postérieurement réduit à une tranche. *Dessous du corps* brun ou brun fauve, ordinairement moins obscur sur le ventre que sur la poitrine; pointillé, avec les intervalles squammuliformes; garni, comme le dessus, de poils fauves, assez fins, soyeux et couchés. *Postépisternums* subparallèles, légèrement arqués à leur côté interne et un peu rétrécis postérieurement; quatre fois environ aussi longs qu'ils sont larges. *Pieds* grêles; pointillés; pubescents; ordinairement bruns sur les cuisses, d'un brun fauve graduellement plus clair ou d'un fauve testacé sur les parties suivantes: premier article des postérieurs d'un cinquième au moins plus grand que tous les suivants réunis.

Cette espèce paraît habiter la plupart des parties de la France; on la trouve, surtout pendant l'été, en fauchant les herbes, principalement sur les côteaux secs.



Obs. Divers auteurs, Latreille entre autres, ont rapporté à cette espèce le *Serropalpus fuscus* d'Illiger; mais comme l'a fait très-bien remarquer Gyllenhal, le Coléoptère décrit par le naturaliste prussien a le prothorax plus long que large, ce qui ne convient pas à notre *Scrapl. fusca*; le *Serr. fuscus* de l'entomologiste précité, par son corps rétréci à ses deux extrémités, s'éloigne encore des insectes de cette coupe.

Olivier a décrit le premier cet insecte sous le nom de *Melyris dubius*; mais Latreille est le premier qui l'ait réellement fait connaître et le nom qu'il lui a donné doit être conservé.

**2. *S. ophthalmica* ; (REY).** Subparallèle; très-médiocrement convexe; à pubescence soyeuse; entièrement d'un jaune flave ou d'un jaune testacé, avec les yeux noirs. Prothorax un peu plus d'une fois plus large qu'il est long; ordinairement entaillé au devant de l'écusson; à deux fossettes basilaires profondes, avancées jusqu'à la moitié. Deuxième article des antennes le plus court, égal aux deux tiers du suivant: le troisième, égal aux deux tiers du quatrième: ce dernier à peine aussi grand que le cinquième. Yeux séparés du bord postérieur, vers le milieu de leur échancrure, par un espace à peine égal à leur diamètre, dans ce point.

*Scraplia ophthalmica*, REY. in collect.

Long. 0,0022 à 0,0025 (1 à 1 1/8 l.) Larg. 0,0009 à 0,0010 (2/5 à 1/2 l.)

Corps subparallèle; très-médiocrement convexe; entièrement d'un jaune testacé, d'un jaune flave ou d'un flave orangé (moins les yeux qui sont noirs); garni de poils fins, soyeux, de la couleur du corps. Tête subarrondie; presque aussi large que le bord antérieur du prothorax; convexe; presque en ligne droite à son bord postérieur; assez finement ponctuée; à pubescence mi-hérissée; d'un jaune testacé, avec l'extrémité des mandibules obscure. Palpes d'un flave orangé. Antennes prolongées au moins jusqu'aux deux cinquièmes des élytres; d'un jaune flave ou d'un jaune testacé; filiformes; pubescentes; à deuxième article, le plus court, égal aux deux tiers du troisième: celui-ci égal aux deux tiers du quatrième: ce dernier à peine aussi grand que le suivant: les cinquième à dixième presque égaux ou graduellement et faiblement plus longs: le onzième un peu plus long que le dixième. Yeux noirs; à facettes assez grosses; séparés du bord postérieur de la tête, vers le milieu de l'échancrure, par un espace à peine aussi large ou moins large que leur diamètre dans ce point.

*Prothorax* tronqué à son bord antérieur; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié de ses côtés, parallèle ensuite; à bords latéraux tranchants sur la majeure partie de leur longueur, avec leur partie antérieure obtuse et subarrondie; à angles postérieurs vifs et rectangulairement ouverts; bissubsinué à la base, avec la moitié médiane à peine ou faiblement plus prolongée en arrière et ordinairement entaillée au-devant de l'écusson; un peu plus d'une fois plus large à la base qu'il n'est long sur son milieu; médiocrement convexe en avant et graduellement moins en arrière; marqué, vers chaque quart externe de sa base, d'une fossette ordinairement triangulaire et très-marquée, avancée jusqu'à la moitié de sa longueur; offrant le plus souvent les traces d'un léger sillon, vers l'extrémité de la ligne médiane; finement ponctué, avec les intervalles squammuliformes; d'un jaune flave; garni de poils couchés et concolores. *Écusson* en triangle équilatéral; pubescent; pointillé; de la couleur du prothorax. *Elytres* aussi larges en avant que le prothorax; quatre à cinq fois aussi longues que lui; subparallèles jusqu'aux deux tiers ou à peine élargies un peu après la moitié, arrondies chacune à l'extrémité, laissant souvent à découvert une partie du dernier segment de l'abdomen; peu ou très-médiocrement convexes; sans stries; d'un jaune flave ou d'un jaune testacé, comme le prothorax; à pubescence concolore et couchée; finement ponctuées, surtout en se rapprochant de l'extrémité. *Repli latéral*, à peine plus large en avant que les postépisternums, réduit graduellement à une tranche. *Dessous du corps et pieds* d'un jaune testacé; finement ponctué; pubescent. *Postépisternums* graduellement rétrécis; trois à quatre fois aussi longs qu'ils sont larges à la base. *Premier article des tarses postérieurs* plus grand que tous les suivants réunis.

Cette belle espèce a été trouvée, en juin, par mon ami M. Cl. Rey, à Sauvebonne (Var), en secouant des Saponaires desséchées et gisant sur le gravier voisin de la rivière passant audit lieu.

OBS. Elle se distingue sans peine des autres espèces par sa couleur; par les proportions des articles deuxième et quatrième de ses antennes; par ses yeux plus rapprochés du bord postérieur que chez la *fusca*, et non prolongés jusqu'à ce bord, comme chez la *minuta*, etc.

3. *S. minuta*. Subparallèle; très-médiocrement convexe; à pubescence soyeuse; pointillée, avec les intervalles squammuliformes; brune ou noire sur la tête, brunâtre, fauve ou testacée sur le prothorax. Celui-ci, une fois et quart plus large que long; à deux fossettes basilaires. *Dessous*

du corps ordinairement brun fauve. Pieds d'un testacé livide. Deuxième et troisième articles des antennes presque égaux : le quatrième, le plus grand, aussi long que les deux précédents réunis. Yeux contigus au bord postérieur de la tête.

♂. Dernier arceau du ventre échancré ou entaillé dans le milieu de son bord postérieur.

♀. Dernier arceau du ventre entier.

*Scaptia minuta*, DEJ. Catal (1821) p. 73 ? — *Id.* (1833) p. 217 ? — *Id.* (1837) p. 239 ?

*Scaptia fuscula*, CH. PH. MÜLLER, N. Insekt. in GERMAN'S Magaz. t. 4. p. 202. 11 ?

Long. 0,0026 à 0,0028 (1 1/5 à 1 1/4 l.) Larg. 0,0009 à 0,0011 (2/5 à 1/2 l.)

Corps oblong ; subparallèle ; peu ou très-médiocrement convexe ; garni de poils fins, soyeux, fauves ou d'un fauve livide ou testacé. Tête subarrondie ; plus étroite que le bord antérieur du prothorax ; assez convexe ; presque en ligne droite ou à peine arquée en arrière à son bord postérieur ; assez grossièrement ponctuée ; à pubescence hérissée ; noire ou brune, avec partie au moins de l'épistome et du labre d'un testacé livide ou d'un livide flavescent. Palpes maxillaires de l'une de ces teintes. Antennes prolongées environ jusqu'au cinquième des élytres ; filiformes : les deuxième et troisième articles un peu plus grêles : le deuxième, court, variablement égal, un peu plus ou moins court que le troisième : le quatrième à peu près aussi long que les deux précédents réunis, ordinairement un peu plus long que les cinquième à dixième : ceux-ci, à peu près égaux, de moitié environ plus longs qu'ils sont larges : le onzième, ovulaire ; ordinairement d'un brun fauve, souvent avec les trois articles basilaires pâles. Yeux d'un brun noir ; à grosses facettes ; profondément échancrés ; contigus au bord postérieur de la tête. Prothorax à peine arqué à son bord antérieur ; élargi en ligne courbe jusqu'à la moitié ou les trois cinquièmes de ses côtés, subparallèle ensuite ; à bords latéraux tranchants sur la majeure partie de leur longueur, émoussés près des angles de devant ; à angles postérieurs non émoussés et rectangulairement ouverts ; presque en ligne droite ou à peine arqué en arrière et peu sensiblement bissubsinné à la base ; quelquefois légèrement entaillé dans le milieu de son bord postérieur, ou paraissant tel par la disposition des poils ; un peu plus d'une fois plus large à la base qu'il est long sur son milieu ; médiocrement convexe en devant et graduellement moins en

arrière ; marqué , vers chaque quart externe de sa base , d'une fossette ou d'un léger et court sillon longitudinal , quelquefois déprimé ou sillonné depuis ce point jusqu'au tiers du bord externe , avec la partie en dehors de ce sillon plus ou moins relevée : ces fossettes ou ce sillon rendant plus distincte chaque subsinuosité basilaire ; finement ponctué , avec les intervalles squammuliformes ; garni d'un duvet couché ; ordinairement fauve ou d'un fauve testacé , quelquefois d'un fauve brunâtre. *Ecusson* assez grand ; en triangle subéquilatéral ; fauve ; pointillé ; pubescent. *Elytres* au moins aussi larges en avant que le prothorax ; cinq à six fois aussi longues que lui ; subparallèles jusqu'aux quatre cinquièmes ou à peine élargies dans leur milieu , obtusément arrondies à l'extrémité (prises ensemble) , avec l'angle sutural peu ou point émoussé , et l'extérieur arrondi ; très-médiocrement convexes ; sans stries et sans fossette humérale ; testacées ou d'un brun ou fauve testacé ; à pubescence couchée ; pointillées d'une manière à peu près uniforme , aussi fine que le prothorax , avec les intervalles squammuliformes. *Repli* latéral et près de moitié plus étroit en avant que les postépisternums , graduellement réduit à une tranche postérieurement. *Dessous du corps* ordinairement d'un fauve brun ou brunâtre ; quelquefois seulement testacé , quand la matière colorante a été peu abondante ; plus parcimonieusement pubescent que le dessus ; à peine pointillé sur les côtés de l'antépectus , finement granuleux sur les postépisternums , pointillé sur le ventre , avec les intervalles de ce dernier squammuliformes. *Postépisternums* graduellement rétrécis : quatre fois environ aussi longs qu'ils sont larges. *Pieds* médiocres ou assez allongés ; grêles ; d'un testacé livide ; pointillés ; pubescents. *Premier article des tarsi postérieurs* de moitié à peine plus grand que tous les suivants réunis.

Cette espèce se trouve principalement en fauchant les herbes sous les futaies de chênes ou dans les bois de pins.

OBS. Elle se distingue facilement de la *Sc. fusca* par la brièveté de son troisième article des antennes , et par ses yeux contigus au bord postérieur de la tête : par son premier article des tarsi postérieurs moins long. Elle varie suivant le développement de la matière colorante. Dans l'état qu'on peut considérer comme normal , la tête est d'un brun noir , le prothorax et les élytres sont d'un fauve testacé ; souvent le premier est-il plus brunâtre. Mais quand la matière colorante a été moins abondante , la tête passe au brun , et le prothorax et les élytres sont d'un testacé livide ou plus rarement d'un livide flavescent. Quelquefois alors le prothorax , plus flexible , offre



le sillon basilaire avancée obliquement jusqu'au tiers antérieur des bords latéraux, avec la partie en dehors de ce sillon plus ou moins sensiblement relevée. Le dessous du corps subit des modifications harmoniques à celles du dessus; ordinairement d'un brun fauve, d'un fauve brun ou brunâtre, il se montre parfois chez les individus décolorés, d'un testacé livide ou d'un flave testacé.

La synonymie de cette espèce est obscure et douteuse. Gyllenhal, dans le t. 4 de son ouvrage, rapporte sa *Direaca fuscula* à la *Scraptia fusca* de Latreille; et Dejean, qui peut-être avait reçu des exemplaires de cet insecte du savant naturaliste suédois, regarde la *D. fuscula* de celui-ci comme étant identique avec sa *S. minuta*, considérée comme étant celle que je décris.

La *S. minuta* est peut-être la même que la *S. fuscula* de Muller, à en juger par la taille: mais cet auteur n'ayant pas indiqué les deux seuls caractères qui la distinguent de la *fusca*, celui tiré de la grandeur proportionnelle des premiers articles des antennes et celui fourni par les yeux atteignant le bord postérieur de la tête, j'ai adopté le nom de Dejean, pour éviter toute équivoque.

#### Genre *Trotomma*, TROTOMME; De Kiesenwetter (1).

CARACTÈRES. *Elytres* ovales-oblongues; assez dures: embrassant les côtés du ventre. *Antennes* subfiliformes, grossissant légèrement vers le sommet: cinquième à dixième articles, submoniliformes, à peine aussi longs qu'ils sont larges. *Mandibules* courtes; cornées. *Mâchoires* à deux lobes: l'externe court ou rudimentaire. *Ailes* ordinairement peu développées. *Premier arceau ventral* non voilé en devant par les hanches postérieures, avec lesquelles il est de niveau: à pointe antéro-médiaire visiblement avancée entre lesdites hanches; plus long près de la ligne médiane que le deuxième arceau.

Ajoutez à ces caractères:

*Prothorax* à angles de devant déclives et peu marqués; bissinué à la base, avec la partie médiane un peu arquée en arrière; marqué d'une fossette ou d'une dépression vers chaque sinuosité. *Elytres* munies antérieurement sur les côtés d'un rebord qui s'efface postérieurement: à bord externe invisible en dessus presque jusqu'à l'extrémité.

#### 1. *T. pubescens*; DE KIESENWETTER. *Ovale oblong; yeux noirs*:

(1) Énumération, etc. in *Annales de la Société Entomologique de France*, 2<sup>e</sup> série, t. 9, 1851. p. 625.



*tout le reste du corps blond ou d'un roux testacé ; garni de poils concolores, fins et presque couchés : ponctué, grossièrement à la base des élytres, et plus finement à leur extrémité.*

*Trotomna pubescens*, DE KIESENWETTER, in ANN. de la Soc. Entom. de Fr. 2<sup>e</sup> série, t. 9, p. 621.

Long. 0,0015 (2/31) Larg. 0,0007 (1/31.)

Corps oblong; ovalaire: médiocrement convexe: ponctué; entièrement blond, avec les yeux et les mandibules, noirs; garni de poils d'un blond livide, couchés, médiocrement épais. *Tête* subarrondie; plus étroite que le bord antérieur du prothorax; convexe; arquée en arrière à son bord postérieur; pointillée; à pubescence courte et mi-hérissée; blonde, avec les mandibules noires. *Palpes* blonds. *Antennes* prolongées environ jusqu'au cinquième de la longueur des élytres; pubescentes; blondes; filiformes; à deuxième article égal au moins aux deux tiers du troisième: celui-ci, une fois plus long que large, plus grand que le quatrième: les cinquième à dixième, à peine aussi longs que larges: le onzième ovoïde. *Yeux* noirs; profondément échancrés; séparés du bord postérieur de la tête par un espace assez notable. *Prothorax* plus large en avant que la tête: tronqué ou à peine arqué en avant; élargi en ligne courbe jusque vers la moitié ou un peu plus de sa longueur, subparallèle ensuite: à bords latéraux tranchants sur la majeure partie de leur longueur, mais moins vivement dans leur moitié antérieure, et émoussés près des angles de devant; à angles postérieurs peu ou point émoussés et à peine plus ouverts que l'angle droit; à peine arqué en arrière à la base; une fois au moins plus large à son bord postérieur, qu'il est long sur son milieu; convexe ou assez convexe; offrant parfois de légères traces d'un sillon ou d'une dépression vers chaque quart externe de la base; ponctué d'une manière moins grossière que la base des élytres, avec les intervalles presque squammiformes: blond; pubescent. *Ecusson* transverse; presque aussi large dans la moitié de son bord antérieur que la moitié de la base de chaque élytre; arqué en arrière à son bord postérieur; près de quatre fois aussi large à la base qu'il est long sur son milieu; blond; pubescent; pointillé. *Elytres* au moins aussi larges en avant que le prothorax à sa base; trois fois et quart à trois fois et demie aussi longues que lui; un peu ovalaires; tronquées ou très-obtusément arrondies chacune à l'extrémité, et laissant souvent apparaître une partie du dernier arceau de l'abdomen; assez convexes; arquées longitudinalement: grossièrement ponctuées près de la base,

et d'une manière graduellement plus fine vers l'extrémité ; blondes ; pubescentes. *Repli* très-étroit en devant ; postérieurement réduit à une tranche. *Dessous du corps* et *pieds* blonds ; pubescents. *Postépisternums* presque parallèles ; trois fois environ aussi longs qu'ils sont larges. *Ventre* moins finement ponctué que la poitrine, avec les intervalles squammuliformes. *Premier article des tarses postérieurs* au moins aussi long que tous les suivants réunis.

Cette espèce est méridionale. Je l'ai reçue, dans le temps, de feu Doublier, de regrettable mémoire. Elle a été trouvée par M. de Kiesenwetter dans les environs de Montpellier et dans ceux de Perpignan ; par M. Rey dans les environs d'Hyères.

## DEUXIÈME GROUPE.

### RHIPIPHORIDES.

**CARACTÈRES.** *Dernier article des palpes maxillaires* non sécuriforme. *Antennes* pectinées ou flabellées chez les ♂, dentées au moins chez les ♀.

Ce groupe et le précédent semblent former deux séries presque parallèles ; ici, comme chez les Mordellides, les élytres sont rétrécies chez les uns et subparallèles chez les autres ; chez les premiers Rhipiphorides, la tête est aussi au niveau du bord antérieur du prothorax ; chez les autres, elle est plus élevée.

Ces insectes se répartissent dans les familles suivantes :

Elytres	non contiguës à la suture jusqu'à l'angle sutural ; laissant les ailes au moins en partie à découvert. Yeux entiers.	Elytres allongées, déhiscentes, acuminées. Antennes insérées vers la moitié du côté interne des yeux. Ecusson caché. Hanches antérieures et intermédiaires rapprochées, longitudinales.	RHIPIPHORIENS.
		Elytres squammuliformes, écartées, à peine aussi longues que le quart de l'abdomen. Antennes insérées vers la partie supéro-interne des yeux. Ecusson apparent. Hanches antérieures et intermédiaires très-écartées.	MYODIENS.
	contiguës à la suture jusqu'à l'angle sutural, couvrant le dos de l'abdomen, à l'exception du pygidium ; cachant les ailes. Ecusson apparent. Hanches rapprochées. Yeux profondément échancrés.		PTILOPHORIENS.

## PREMIÈRE FAMILLE.

## RHIPIPHORIENS.

CARACTÈRES. *Elytres* allongées; acuminées; déhiscentes à la suture, à partir de la moitié de la longueur de celle-ci ou d'un point plus rapproché de la base. *Ailes* prolongées au-delà des élytres. *Yeux* ovales; entiers. *Antennes* insérées au côté interne des yeux, vers la moitié de la longueur de celui-ci: pectinées ou en éventail à partir du troisième article. *Ecusson* caché ou à peu près par le lobe médiaire de la base du prothorax. *Postépisternums* ou épisternums du postpectus obtriangulaires, laissant apparaître entre eux et le bord latéral du postpectus, les épimères de ce segment, qui sont subtriangulaires, presque aussi larges à leur base que le postépisternum l'est à la sienne. *Hanches intermédiaires* longitudinales; à peu près aussi rapprochées que les autres; séparées toutefois entre elles par le mésosternum. *Cuisses antérieures* échancrées vers l'extrémité de leur arête inférieure. *Tibias antérieurs* à un ou deux éperons. *Ongles* bifides à l'extrémité. *Corps* rétréci d'avant en arrière à partir de la base des élytres; très-déclive ou presque tronqué sur les derniers arceaux du dos de l'abdomen.

Cette famille se divise en deux genres :

Sommet de la tête | presque plan; de niveau avec le bord antérieur du prothorax ou à peine plus élevé que lui. Tibias antérieurs sans éperons. Tarses postérieurs à articles cylindriques, non garnis en dessous de poils spinosules.

METOECUS.

Sommet de la tête | en demi-cercle un peu obtus, notablement plus élevé que le bord antérieur du prothorax. Tibias antérieurs armés chacun d'un éperon. Tarses postérieurs garnis en dessous de poils spinosules.

RHIPIPHORUS.

Genre *Metæcus*, MÉTÆQUE; (Dejean <sup>1</sup>) Gerstæcker.

(μέτωπος, exilé).

CARACTÈRES. *Sommet de la tête* presque plan; de niveau avec le bord antérieur du prothorax, ou à peine plus élevé que lui. *Prothorax* profondément et largement canaliculé sur sa ligne médiane. *Ventre* de six arceaux apparents. *Tibias* antérieurs sans éperons distincts: les postérieurs à deux éperons. *Articles des tarsi postérieurs* cylindriques, non garnis en dessous de poils spinosules.

1. *M. paradoxus*; LINNÉ. *Suballongé*; brièvement pubescent. *Noir sur la tête, la poitrine, les pieds et au moins sur la partie longitudinalement médiane du prothorax*: moitié postérieure au moins des côtés de ce dernier, d'un jaune ou flave testacé. *Elytres*, soit de cette couleur, avec l'extrémité ou une bande longitudinale raccourcie en avant et couvrant au moins tout leur tiers postérieur, noire, soit noires, parfois avec la base moins obscure. *Ventre* d'un jaune orangé, à extrémité noire.

*Variations de couleur du prothorax et des élytres.*

Ordinairement le prothorax est noir jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes, sur toute sa largeur, à l'exception du bord latéral, et postérieurement au moins sur le tiers médiane de sa largeur, avec les côtés d'un jaune testacé, et d'une manière graduellement plus large d'avant en arrière; mais dans les variétés à élytres obscures, la bordure latérale étroite et d'un jaune testacé du tiers ou des deux cinquièmes antérieurs disparaît, et le prothorax, jusqu'à ce point, est noir sur toute sa largeur.

Les élytres sont parfois d'un flave ou d'un fauve testacé, soit entiè-

---

(<sup>1</sup>) Ce genre, dont Latreille avait indiqué les limites (Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 29 (1819) p. 302, a été nommé par Dejean (Catal. 1835, p. 248). Le premier, en divisant les Rhipiphores en deux sections, avait dit: la première (contenant le *R. paradoxus*, pourra former un genre propre. M. De Castelnau a donc eu tort, selon nous (contrairement à l'opinion de M. Guérin, Iconogr. du Regn. Anim. p. 129) d'appliquer à celle-ci le nom de *Rhipiphorus* réservé aux insectes de la seconde section par le célèbre entomologiste de Brives, et la dénomination générique d'*Emenadia* qu'il a créée pour ces derniers, doit être rejetée.

rement, soit avec leur extrémité noire. Cette couleur paraît particulière au ♂.

Chez la ♀ les élytres ont tantôt une bande longitudinale noire ou brune naissant sur la convexité existant entre le sillon juxta-sutural et le bord externe, à partir du quart ou des deux cinquièmes de leur longueur, étendue jusqu'au bord latéral, un peu après le point où cette bande est le plus avancée, et couvrant toute la largeur des étuis sur le tiers, les deux cinquièmes ou même les trois septièmes postérieurs de la suture : tantôt la matière noire ou brune a envahi une partie plus considérable de la surface des élytres ou la couvre d'une manière soit complète, soit en laissant près de la base un espace égal au quart ou au tiers de la longueur, d'une teinte moins obscure, d'un brun jaunâtre ou d'un flave brun.

*Mordella paradoxa*, LINN. Faun. suec. p. 228. 831. — *Id.* Syst. Nat. t. 4. p. 682. 1. (♀) — MULLER, LINN. Naturs. t. 5. 1. p. 385. 1. — FABR. Syst. Entom. p. 262. 2. — *Id.* Spec. ins. t. 1. p. 332. 2. — *Id.* Mant. t. 4. p. 218. 4. — GOEZE, Entom. Beitr. t. 1. p. 708. 1. — GMEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 2022. 1. — FROELICH, Bemerkungen in Naturforscher, t. 26. p. 161. 91. (♂) — DE VILLERS, C. LINN. Entomol. t. 4. p. 405. 1. — ROSSI, Faun. étrusc. t. 1. p. 224. 603. — *Id.* éd. HELW. t. 4. p. 300. 603. — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 737. 4. — HERBST, Naturg. t. 6. p. 181. 3. — GOEZE, Faun. Europ. t. 8. p. 845. 1. — MARSH. Entom. brit. p. 491. 9.

*Mordella erythrogaster*, FROELICH, Naturf. t. 26. p. 163. 91.

*Rhipiphorus paradoxus*, FABR. Entom. syst. t. 1. 2. p. 111. 5. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 4. 119. 6. — PANZ. Entom. germ. p. 211. 1. (♂). — *Id.* Faun. germ. 26. 14. (♂) — *Id.* Index, p. 149. — OLIV. Entom. t. 3 n° 63. p. 7. 7. pl. 1. fig. 7. (♂) — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 19. (1803) p. 407. — PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 177. 1. (♂♀). — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 411. — *Id.* Gen. t. 2. p. 207. 1. (♂♀). — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 29. (1819) p. 305. (♂♀). — ILIGER, Magaz. t. 3. p. 177. 6 et t. 5. p. 254. 6. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 619. 1. — SCHONH. Syn. Ins. t. 5. p. 79. 6. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 424. 3. — GOLDFUSS, Handb. p. 329. — (DEJ.) Catal. (1821) p. 73. — DUMÉRIL, Dict. des sc. nat. t. 45. p. 375. — GUÉRIN, Dict. class. d'Hist. nat. t. 14. p. 566. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 51. 1. — *Id.* Man. p. 354. 2622. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 261. pl. 20. fig. 5. (♂♀). — L. REDTENB. Faun. aust. p. 612.

♀ *Rhipiphorus angulatus*, PANZ. Faun. germ. 90. 5. (Voy. PANZ. Krit. Revis p. 98).  
*Meteorus paradoxus*, (DEJEAN) Catal. (1835) p. 218. — *Id.* (1837) p. 240. — GERSTAECK. Rhipiphor. Dispos. system. p. 18. 1.

Long. 0,0090 à 0,0135 (1 à 6 l.) Larg. 0,0035 à 0,0045 (1 1/2 à 2 l.)

*Corps* suballongé. *Tête* petite; inclinée; obtriangulaire en devant,



avec la partie postérieure presque plane, de niveau avec le bord antérieur du prothorax ou à peine plus élevée; noire ou d'un brun noir; peu luisante; densément et finement ponctuée; hérissée de poils grisâtres ou obscurs. *Palpes* bruns. *Antennes* noires. *Yeux* noirs. *Prothorax* un peu plus étroit en avant que la tête; tronqué à son bord antérieur; élargi d'avant en arrière, un peu en ligne courbe près de la tête, subsinué près des angles postérieurs, qui sont prolongés en pointe aiguë et embrassent les angles huméraux des élytres; bissinué à la base, avec sa partie médiaire plus prolongée en arrière, obtusément tronquée ou subarrondie à son extrémité; sans rebord dans sa périphérie; perpendiculairement déclive sur les côtés; un peu plus long sur son milieu qu'il n'est large à la base; médiocrement convexe; creusé longitudinalement sur sa partie médiaire d'un sillon profond, naissant un peu après le bord antérieur, graduellement élargi jusqu'à la moitié, plus large et subparallèle sur la seconde moitié, presque égal sur celle-ci au cinquième de la largeur totale du segment; offrant parfois une carène rudimentaire ou la trace d'une ligne longitudinale faiblement élevée dans le fond de ce sillon; hérissé de poils grisâtres; lisse sur la partie sulciforme, ponctué sur les parties latérales; noir sur le tiers longitudinal médiaire et plus largement sur le tiers antérieur; d'un jaune orangé ou d'un jaune testacé, au moins sur la moitié ou sur les deux tiers postérieurs des côtés. *Elytres* à peu près aussi larges à la base que le prothorax à ses angles postérieurs; une fois environ plus longues que lui; déhiscentes à la suture depuis le tiers ou parfois presque depuis la base; rétrécies d'avant en arrière et terminées en pointe; presque planes; à fossette humérale plus ou moins marquée; longitudinalement déprimées ou largement et peu profondément sillonnées entre la suture et la partie voisine du bord externe; cette dernière paraissant par là former une côte longitudinale obtuse ou convexe; colorées comme il a été dit; garnies de poils fins, couchés, peu apparents, concolores. *Ailes* prolongées au-delà des élytres; d'un jaune roussâtre. Partie déclive du dos de l'abdomen d'un jaune testacé ou avec l'extrémité brune. *Dessous du corps* pubescent: noir sur les parties pectorales, d'un jaune testacé ou d'un jaune roussâtre sur le ventre, avec le cinquième arceau ordinairement brun ou obscur: côtés du ventre marqués souvent, surtout chez la ♀, de quelques taches semi-lunaires vers les côtés des arceaux et de quelques autres taches ponctiformes sur les parties les plus internes des mêmes demi-segments. *Pieds* grêles; allongés; noirs; pubescents; épérons des tibias et ongles d'un roux pâle ou testacé.

Cette espèce paraît habiter la plupart des provinces de la France ; mais elle est rare partout. On la trouve parfois sur les ombellifères ou sur les troncs des arbres d'où découle un liquide mucilagineux. Pour l'obtenir plus facilement, il faut enlever, en temps opportun, des nids de guêpes, dans lesquels vit sa larve, suivant les observations de Ramdhor (1) et de divers autres entomologistes.

Genre *Rhipiphorus*, RHIPIPHORE ; Fabricius (2)

(ῥιπίς, éventail ; φέρω, je porte).

CARACTÈRES. *Sommet de la tête* en demi-cercle un peu obtus, notablement plus élevé que le bord antérieur du prothorax. *Prothorax* non creusé d'un sillon profond sur sa ligne médiane. *Ventre* ordinairement de cinq arceaux apparents ; comme tronqué à l'extrémité. *Tibias antérieurs* armés chacun d'un éperon : les postérieurs, de deux. *Articles des tarses postérieurs* subcomprimés, garnis en dessous de poils spinosules (3)

1. *R. bimaculatus* ; FABRICIUS. Oblong ; luisant ; ponctué. *Labre*, *palpes* et *élytres*, d'un roux testacé : celles-ci, ornées chacune d'une tache noire, ovale, prolongée environ depuis la moitié jusqu'aux trois quarts, ou moins, de leur longueur : *pectus* et *genoux*, noirs : autres parties variablement rousses ou noires. *Lobe médiaire* de la base du prothorax relevé, sillonné transversalement entre ses bords supérieur et inférieur. *Deuxième article* des tarses postérieurs près d'une fois plus court que le suivant.

(1) Voy. GERMAN'S Magaz. d. Entom. t. 1. 1<sup>re</sup> cah. (1813) p. 137.

(2) Ce genre, établi par Bosc dans sa collection (voy. Olivier, nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 19. (1803) p. 407), a été adopté par Fabricius. Ce dernier en donna les caractères dans son *Entomologia systematica*, t. 1. 2. p. 109. et le nomma *Ripiphorus*. Panzer, dans la table de son *Entomologia germanica*, et surtout Latreille, dans son Précis, p. 26. rectifièrent les premiers l'orthographe de cette dénomination.

(3) M. Gerstaecker, dans son beau travail sur les Rhipiphores, dit (p. 19) : *tarsorum posteriorum articulo secundo ceteris semper brevior*. Ce caractère qui paraît général, surtout chez les espèces exotiques, n'est pas constant : les différences proportionnelles de cet article avec le suivant, m'ont paru même un des meilleurs moyens de distinguer nos trois espèces de Rhipiphores de France.

♂ Antennes offrant leurs articles, à partir du troisième, allongés sur deux rangées, en forme d'éventail; ordinairement noires, avec les deux premiers articles d'un roux testacé, quelquefois entièrement noires.

♀ Antennes offrant leurs articles à partir du troisième, moins longuement allongés, et sur une seule rangée en forme d'éventail; ordinairement d'un roux testacé, avec l'extrémité noire, plus rarement entièrement noires.

Obs. Ordinairement l'insecte est d'un roux testacé, avec la moitié antérieure de la tête, l'extrémité des antennes, les yeux, la base et la tache des élytres, partie du ventre et les cuisses, noirs. Mais ces différentes parties présentent dans leur couleur des variations si nombreuses qu'il est impossible de les signaler autrement, qu'en examinant les pièces les unes après les autres.

A. *Tête*. 1° Rarement toute d'un roux testacé. — 2° D'un roux testacé avec les parties de la bouche obscures ou roussâtres. — 3° Noire sur sa moitié antérieure, d'un roux testacé sur la postérieure. — 4° Entièrement noire.

B. *Prothorax*. 1° Entièrement d'un roux testacé. — 2° D'un roux testacé avec le bord antérieur obscur ou noirâtre. — 3° D'un roux testacé avec l'extrémité du lobe médiaire de la base, noire. — 4° En partie d'un roux testacé, en partie noir. — 5° Noir, avec une partie discale d'un roux testacé souvent obscur. — 6° Entièrement noir.

C. *Elytres*. 1° d'un roux testacé, sans tache, ou à tache ovale presque nulle. — 2° Parées chacune d'une tache ovale. — 3° Ornées outre la tache ovale, d'une bordure basilaire plus ou moins étroite. — 4° Offrant cette bordure basilaire prolongée jusqu'au sixième de la suture, de manière à former avec sa pareille une tache scutellaire obtriangulaire. — 5° Offrant la bordure basilaire prolongée jusqu'au cinquième ou au quart de la suture, de manière à former avec sa pareille une tache scutellaire carrée. — 6° La tache ovale tantôt couvrant de la moitié aux trois quarts de la longueur des étuis, tantôt réduite à une tache subponctiforme. — 7° Tache des élytres plus allongée, avec les bords sutural et externe noirs, de manière à ce que les élytres paraissent noires dans leur seconde moitié, avec une tache ovulaire, suba-

picale d'un roux testacé, plus ou moins obscure. — 8<sup>o</sup> Élytres noires dans leur seconde moitié (la bordure basilaire est alors ordinairement plus développée sur la suture et se prolonge également en arrière sur le bord latéral. Tout le reste du corps est alors ordinairement noir, moins les tarses ; mais ce n'est pas une règle : quelquefois le prothorax est alors entièrement d'un rouge roux).

- D. *Partie superpendiculairement déclive du dos de l'abdomen.* 1<sup>o</sup> D'un roux testacé. — 2<sup>o</sup> Obscure — 3<sup>o</sup> Noire.
- E. *Poitrine.* Noire sur le postpectus. Médipectus, 1<sup>o</sup> roux testacé. — 2<sup>o</sup> noir ou obscur.
- F. *Ventre.* 1<sup>o</sup> Roux. — 2<sup>o</sup> Roux à l'extrémité, noir à la base. — 3<sup>o</sup> Entièrement noir.
- G. *Pieds.* Hanches antérieures. 1<sup>o</sup> Rousses. — 2<sup>o</sup> Noires. Les postérieures noires. Cuisses : 1<sup>o</sup> rousses ou d'un roux testacé, avec les genoux noirs. 2<sup>o</sup> En majeure partie ou en totalité noires. Tibias, 1<sup>o</sup> roux. 2<sup>o</sup> Tarses le plus souvent roux; rarement noirs.

Ces diverses variations peuvent, pour le dessus du corps, être réduites aux principales variétés suivantes :

- α. *Dessus du corps d'un roux testacé : tache ovale de chacune des élytres nulle ou presque nulle.*

*Rhipiphorus bimaculatus*, KUSTER, l. c. var. β.

ÉTAT NORMAL. Dessus du corps d'un roux testacé. Élytres ornées chacune d'une tache ovale plus ou moins développée, et généralement aussi d'une bordure basilaire plus ou moins apparente.

*Mordella bimaculata*, FABR. Mant. ins. t. 1. p. 218. 8. — GMEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 2023. 13. — DE VILLERS, C. LINN. Entomol. t. 4. p. 366. — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 738. 8.

*Mordella larvata*, SCHRANK, Entomolog. Bemerk. in Naturf. t. 24. (1789) p. 90. 60. — SCRIBA, Journ. p. 35. 60.

*Rhipiphorus limaculatus*, FABR. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 112. 9. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 120. 15. — OLIV. Entom. t. 3. n° 65. p. 5. 4. pl. 1. fig. 4, a, b. — SCHÖNH. Syn. ins. t. 3. p. 31. 15. — LATR. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 21. (1818) p. 303.

*Rhipiphorus himaculatus*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 411. 3 pl. 90 fig. 9. — FISCHER,

Entomogr. de la Russ. t. 1. p. 222 pl. 38. fig. 2. — DUMÉRIE, Dict. des sc. nat. t. 45. (1827) p. 575. pl. cah. 15. 13. fig. 4. — *Id.* Considér. gén. sur les ins. pl. 2. fig. 4. — KUSTER, Kaef. Europ. 23. 78. — GERSTAECK, Rhipiph. Dispos. syst. p. 23. 10.

*Eimenandia bimaculata*, DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 260. 1.

Var.  $\beta$ . Dessus du corps d'un roux testacé ; élytres ornées d'une bordure basilaire formant une tache scutellaire triangulaire ou carrée, et chacune d'une tache ovale, noires.

*Mordella tricuspidata*, LEPELIER, Tagenb. t. 1. pl. 19. fig. 8. — Gmel. Car. Linn. Syst. Nat. t. 1. p. 1024. 20.

*Ripiphorus carinthiacus*, PANZ. Faun. germ. 22. 7. — *Id.* Entom. germ. p. 212. 3. (voy. Krit. Revis. p. 97 et Index p. 149. 2).

*Ripiphorus bicolor*, Oliv. Entom. t. 3. n° 63. p. 5. n° 3. pl. 1. fig. 3.

*Ripiphorus lituratus*, FÄBR. Suppl. p. 126. 8-9. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 120. 14. — (voy. Illig. Magaz. t. 3. p. 177. 14. — SCHONH. l. c. var.  $\beta$ . — KUSTER, l. c. var.  $\alpha$ . — GERSTAECK, l. c. var. b et c.)

Var.  $\gamma$ . Offrant de plus que dans la var. précédente la tête et le prothorax noirs, en totalité ou en partie.

*Rhipiphorus bimaculatus*, GERSTAECK, l. c. var. c.

Var.  $\delta$ . Offrant de plus que dans la var.  $\gamma$ , la tache ovale des élytres plus dilatée, de telle sorte que la matière noire s'est étendue sur le bord sutural et externe et à l'extrémité de l'élytre et couvre même parfois toute la moitié postérieure de celle-ci.

Long. 0,0045 à 0,0135 (2 à 6,1) Larg. 0,0011 à 0,0045 (1/2 à 21.)

Corps oblong ; glabre en dessus ; luisant. Tête ovale ; inclinée ; à vertex notablement saillant au dessus du bord antérieur du prothorax, obtusément arrondi au sommet ; presque lisse, parcimonieusement pointillée sur sa moitié postérieure, densément ponctuée sur l'inférieure ; ordinairement noire sur cette dernière, d'un roux pâle ou testacé sur la supérieure. Labre et palpes maxillaires d'un roux testacé. Yeux noirs. Antennes à peine prolongées jusqu'à la moitié des côtés du prothorax ; ordinairement d'un roux testacé à la base. Prothorax un peu moins large en devant que la tête ; tronqué à son bord antérieur ; élargi d'avant en arrière, presque en ligne droite au moins jusqu'à la moitié des côtés ; à angles postérieurs prolongés en pointe



et embrassant les angles huméraux des élytres ; bissinué à la base, avec la partie médiale de celle-ci plus prolongée en arrière, relevée à son extrémité postérieure, transversalement sillonnée à cette partie entre ses bords supérieur et inférieur : tronquée au premier : échancrée en arc ou bidentée au second ; sans rebord dans sa périphérie ; perpendiculairement déclive sur les côtés, prolongé sur cette partie déclive jusqu'aux hanches de devant, échancré ou sinué entre ce point et les angles postérieurs ; d'un tiers plus long sur son milieu qu'il est large à la base ; médiocrement convexe ; déprimé au devant de chaque sinuosité basilaire : marqué de points ordinairement en demi anneaux, affaiblis ou oblitérés à leur partie postérieure ; coloré comme il a été dit. *Elytres* aussi larges à peu près en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; de moitié plus longues que ce dernier sur son milieu ; déhiscentes à la suture, à partir du quart environ de leur longueur, laissant apparaître les ailes ; terminées en pointe ; peu convexes ; marquées d'une dépression transversale vers le cinquième ou le quart de leur longueur ; ordinairement déprimées ou subsillonnées ensuite longitudinalement sur leur disque ou plus près de la suture ; notées de points presque en forme de triangle incomplet postérieurement, presque réticuleux vers l'extrémité ; d'un roux ou rouge testacé ; ornées chacune d'une tache noire, ovale, couvrant leur disque depuis la moitié jusqu'aux trois quarts environ de leur longueur ; parées ordinairement à la base d'autres signes noirs d'un développement variable. *Dessous du corps* ponctué ; luisant ; presque glabre, garni de poils peu apparents ; noir au moins sur le métathorax, et roux sur le reste ; quelquefois entièrement noir. *Pieds* de couleur variable : jambes et surtout tarses plus souvent roux ou d'un roux testacé que les cuisses : les postérieures ridées transversalement à leur côté interne : premier article des tarses intermédiaires au moins aussi long que le tibia : deuxième article des tarses postérieurs près d'une fois plus court que le suivant.

Suivant M. Farines (1) la larve du *Rhipiphorus bimaculatus* vit dans la racine de l'*Eryngium campestre*, qu'elle perfore au centre, et presque toujours dans le sens vertical. Elle se transforme vers la fin de juin ; fabrique une coque de la grosseur d'une noisette, représentant une

---

(1) Observations sur la Larve du *Rhipiphorus bimaculatus*, in *Annales de science natur* t. 8. (1826) p. 244.

sphère un peu aplatie à sa partie supérieure qui est attachée à une espèce de pédoncule à la tige ou à la base des premières ramifications de la plante. En juillet a lieu la transformation en insecte parfait. La femelle dépose ses œufs au collet de la racine. Ils éclosent aussitôt que la plante est en sève, ce qui a lieu au mois de mars.

M. Audinet-Serville <sup>(1)</sup> et M. Westwood <sup>(2)</sup> se sont demandé si cette larve, au lieu d'être rhizophage, ne serait pas parasite d'autres insectes vivant de végétaux ; cette question n'est pas encore résolue.

2. **R. flabellatus** ; FABRICIUS. *Oblong ; d'un roux pâle ou d'un flave testacé, en dessus ; palpes noirs ; dessous du corps et pieds en majeure partie au moins noirs, avec la base des tibias et des articles des tarses postérieurs, de couleur rousse. Prothorax creusé d'une ligne transversale au devant de chaque sinuosité basilaire ; à lobe de niveau avec les élytres, terminé en pointe entière. Deuxième article des tarses postérieurs égal au suivant.*

♂. Antennes offrant leurs articles, à partir du troisième, allongés sur deux rangés, en forme d'éventail.

♀. Antennes offrant leurs articles, à partir du troisième, allongés sur une seule rangée en forme d'éventail.

Obs. Cette espèce offre moins de variations que la précédente.

*Tête.* La tache épistomale est parfois plus prolongée en arrière, souvent alors bidentée. *Prothorax* et *élytres*. La base du prothorax ou celle des élytres est parfois légèrement obscure. *Dessous du corps* et *cuisses*. Le ventre ou même tout le dessous du corps, et parfois même les cuisses, sont d'un roux de nuance variable, chez des individus chez lesquels la matière colorante n'a pas eu le temps de se développer.

Faut-il avec M. Gerstaecker rapporter à l'une de ces dernières variétés le :

*Rhipiphorus ferrugineus*, FABR. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 110. 2. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 118. 2.

(1) Bulletin de Férussac t. 14, (1828) p. 292.

(2) An. Introduct. to the mod. class. of insects. t. 1. p. 293.

caractérisé de la manière suivante par Fabricius : *rufus, pectore, ano, pedibusque nigris*. Le caractère d'avoir les pieds noirs permet d'en douter. L'insecte ayant servi à cette description provenait d'auteurs des Indes orientales.

*Mordella flabellata*, FABR. Spec. ins. t. 2. app. p. 501. — *Id.* Mant. ins. t. 1. p. 218.

5. — GUEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 2022. 10. — ROSSI, Faun. etrusc. t. 1. p. 244. 602. — *Id.* édit. HELV. t. 1. p. 299. 602. — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 757.

*Mordella pectinata*, DE VILLERS, C. LINN. Entom. t. 1. p. 408. 10. pl. 2. fig. 51,

*Rhipiphorus flabellatus*, FABR. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 111. 6. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 1. 2. p. 119. 7. — OLIV. Entom. t. 3. n° 63. p. 4. 2. pl. 1. fig. 2, b, c. — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 19. (1803) p. 407. — SCHONN. Syn. ins. t. 3. p. 80. 7. — TICNY, Hist. nat. t. 5. p. 258. pl. fig. 6. — LATR. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 21. (1818) p. 303.

*Rhipiphorus flabellatus*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 411. 2. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 424. 2. — L. DUF. Excurs. Entom. p. 71. 430. — KESTER, Kaef. Europ. 23. 77. — GERSTAECK Rhipiph. dispos. syst. p. 26. 17.

*Emenandia flabellata*, DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 262. 32. — ACH. COSTA, Faun. de Regn. di Napol. (*Mordellidées*) p. 72. pl. 19. fig. 3

Long. 0,0045 à 0,0112 (2 à 51) Larg. 0,0015 à 0,0033 (3/5 à 1 1/2 l.)

*Corps* oblong ou suballongé ; peu luisant en dessus. *Tête* ovale ; inclinée ; à vertex notablement saillant au dessus du bord antérieur du prothorax, obtusément arrondi au sommet ; presque lisse, parcimonieusement pointillée sur toute sa surface, mais plus distinctement sur la partie inférieure ; d'un roux pâle ou testacé, avec l'épistome noir. *Labre* ordinairement obscur. *Palpes maxillaires* noirs, ou avec l'extrémité roussâtre. *Antennes* moins longuement prolongées que la moitié des côtés du prothorax ; ordinairement noires, avec les deux premiers articles d'un roux testacé. *Yeux* noirs. *Prothorax* moins large en devant que la tête ; élargi d'avant en arrière, en ligne presque droite ou plutôt un peu flexueuse ; à angles postérieurs aigus, médiocrement prolongés en arrière et embrassant un peu l'angle huméral des élytres ; bissinué à la base, avec la partie médiaire plus prolongée en arrière, de niveau avec les élytres, terminée en pointe simple ou non divisée ; sans rebord dans sa périphérie ; perpendiculairement déclive sur les côtés, prolongé sur cette partie déclive jusqu'aux hanches de devant, échancré ou sinué entre ce point et les angles postérieurs ; près de moitié plus long sur son milieu qu'il est

large à la base ; médiocrement convexe ; légèrement caréné sur le tiers postérieur au moins de sa ligne médiane ; marqué au devant de chacune de ses sinuosités basilaires, d'une dépression transversale ou d'une sorte de ligne enfoncée ; d'un roux pâle ou flave testacé ; marqué de points presque en triangle incomplet postérieurement ; garni de poils fins, couchés, concolores, peu épais et peu apparents. *Elytres* au moins aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; d'un tiers environ plus longues que ce dernier sur son milieu ; déhiscences à la suture à partir du quart environ de leur longueur ; terminées en pointe ; presque planes transversalement en dessus ; un peu arquées ; déprimées ou subsillonées longitudinalement sur la majeure partie de leur disque ou plus près de la suture ; marquées de points presque en demi-cercle ou presque en triangle interrompu postérieurement ; d'un roux pâle ou flave testacé ; garnies de poils fins, couchés, concolores, peu épais, peu distincts. *Ailes* prolongées au delà des élytres. Derniers arceaux du dos de l'abdomen noirs, bruns ou d'un brun fauve à l'extrémité de cette partie. *Dessous du corps* luisant, pointillé ; ordinairement noir : ventre parfois d'un rouge roux. *Pieds* noirs : tibias et articles des tarses postérieurs d'un roux testacé dans leur moitié basilaire : cuisses postérieures ridées transversalement à leur côté interne : premier article des tarses intermédiaires un peu moins long que le tibia : deuxième article des tarses postérieurs égal au suivant.

Cette espèce habite les parties occidentales de notre midi et divers autres pays plus chauds.

3. *R. rufipennis*; CHEVROLAT. Oblong ; noir ; médiocrement luisant ; ponctué : élytres d'un rouge roux, avec la base et l'extrémité noires. Prothorax creusé d'une fossette au devant de chaque sinuosité basilaire ; à lobe de niveau avec les élytres, tronqué ou bidenté à l'extrémité. Deuxième article des tarses postérieurs au moins aussi long que le suivant.

*Rhipiphorus fulvipennis*, (DEJ.) Catal. (1821) p. 73 ? — *Id.* (1833) p. 218 ? — *Id.* (1837) p. 210 ?

*Rhipiphorus rufipennis*, GERSTAECKER, Rhipiph. dispos. syst. p. 27. 18.

Var.  $\alpha$ . *Elytres* d'un jaune orangé, avec la base et l'extrémité, noires.

*Rhipiphorus fulvipennis*, CHEVROLAT, in GUERIN, Iconogr. du Regn. Anim. de Cuvier, p. 129. pl. 31. fig. 4. — *Id.*, 4. a, ius. vu de profil. 4, b, tarse postérieur.



*Rhipiphorus apicalis*, (HANSCHUCH), KUSTER, Kaef. Europ. 13. 79.

Var.  $\beta$ . *Elytres fauves, avec la base noire.*

*Rhipiphorus fulvipennis*, KUSTER, Kaef. Europ. 7. 71.

Long. 0,0067 à 0,0090 (3 à 4 l.) Long. 0,0022 à 0,0028 (1 à 1/2 l.)

*Corps* oblong ou ovale oblong : médiocrement luisant. *Tête* ovulaire ; inclinée ; à vertex notablement saillant au-dessus du bord antérieur du prothorax , obtusément arrondi au sommet ; ponctuée sur sa moitié antérieure , pointillée sur la postérieure ; noire. *Labre* et *palpes* noirs. *Antennes* à peine plus longuement prolongées que la moitié des côtés du prothorax ; noires. *Yeux* noirs. *Prothorax* un peu moins large en devant que la tête ; tronqué à son bord antérieur ; élargi d'avant en arrière , d'une manière un peu sinuée après la moitié ; à angles postérieurs aigus , peu ou médiocrement prolongés en arrière et embrassant assez faiblement les angles huméraux des élytres ; bissinué à la base , avec la partie médiaire plus prolongée en arrière , de niveau avec les élytres , tronquée ou bidentée à son extrémité ; sans rebord dans sa périphérie ; perpendiculairement déclive sur les côtés , prolongé sur cette partie déclive jusqu'aux hanches de devant , échancré ou sinué entre ce point et les angles postérieurs ; de moitié environ plus long sur son milieu qu'il est large à la base ; médiocrement convexe ; marqué d'une dépression ou d'une fossette au-devant de chaque sinuosité basilaire ; marqué de points assez épais presque en demi-cercle comprimé ; garni de poils cendrés , fins , couchés , presque indistincts ; noir , médiocrement luisant. *Elytres* au moins aussi larges en devant que le prothorax à ses angles postérieurs ; d'un tiers plus longues que ce dernier sur son milieu ; déhiscentes à la suture , à partir du quart ou parfois presque de la base ; terminées en pointe ; presque planes ; déprimées ou subsillonnées longitudinalement sur la majeure partie de leur disque ; marquées de points presque en triangle incomplet postérieurement ; d'un rouge roux , avec une bordure basilaire assez étroite et peu nettement limitée et l'extrémité , noires ou noirâtres. *Ailes* prolongées au-delà des élytres. *Des-sous du corps* noir ; pointillé. *Pieds* noirs : éperons et ongles d'un roux testacé : premier article des tarses intermédiaires à peu près aussi long que le tibia : deuxième article des tarses postérieurs au moins aussi long ou un peu plus long que le suivant.



Cette espèce a été prise dans les environs de Marseille par M. Alexandre Wachanru. Elle paraît habiter plus particulièrement la Dalmatie et quelques parties de l'Italie.

OBS. Elle se distingue facilement de l'espèce précédente par la couleur de son prothorax, de la base et de l'extrémité de ses élytres et par celle de ses pieds postérieurs ; surtout par la forme de l'extrémité de son lobe prothoracique et par la longueur proportionnelle du deuxième article des tarses.

## DEUXIÈME FAMILLE.

### MYODIENS.

CARACTÈRES. *Elytres* déhiscentes ; courtes, à peine aussi longues que le quart de l'abdomen ; laissant les ailes à découvert. *Yeux* entiers. *Antennes* insérées vers la partie supéro-interne des yeux. *Ecusson* apparent. *Hanches intermédiaires* très-écartées.

Cette famille est réduite au genre suivant.

Genre *Myodites*, MYODITE ; Latreille (1).

(μυοειδής, semblable à une mouche).

CARACTÈRES. Ajoutez à ceux qui servent à distinguer la famille : *Antennes* de onze articles chez le ♂, ne paraissant en avoir que dix chez la ♀ : à articles allongés en forme d'éventail, à partir du deuxième (♂) ou du troisième (♀). *Vertex* plus élevé que le bord antérieur du prothorax. *Abdomen* élargi d'avant en arrière, recourbé en dessous à son extrémité. *Postépisternums* obtriangulaires ; laissant apparaître les épimères postérieures entre eux et le bord latéral du postpectus. *Tibias* tous munis de deux éperons. *Tarses postérieurs* moins longs que les tibias des mêmes pieds. *Ongles* pectinés.

(1) Latreille en établissant dans le *Nouv. Dict. d'Hist. nat.* 2<sup>e</sup> édit. t. 22. p. 130. ce genre (dont Dorthes avait déjà fait sentir la création comme nécessaire), lui donna le nom de *Myodes*, qu'il changea plus tard, (t. 29. p. 302 du même ouvrage, et *Familles naturelles*, p. 382), en celui de *Myodites*.

**1. *M. subdipterus*; FABRICIUS.** Pointillé : hérissé ou garni d'un duvet grisâtre peu épais ; noir sur la tête, le prothorax et les cuisses postérieures : élytres, partie au moins des antennes, tibias et tarses, d'un jaune testacé. Abdomen noir (♂) ou d'un roux jaune, avec l'extrémité et quelques taches dorsales, noires ou noirâtres (♀). Ailes d'un blanc hyalin à l'extrémité et un peu à la base, nébuleuses ou obscures dans leur milieu.

(♂) Antennes de onze articles : les troisième à onzième allongés en forme d'éventail, sur deux rangs ; entièrement d'un jaune testacé, ou avec l'extrémité des rameaux enfumée. Abdomen noir, ou avec le bord des anneaux d'un brun roussâtre et parfois une tache roussâtre sur l'avant-dernier arceau.

(♀). Antennes de dix articles : les deuxième à dixième allongés en forme d'éventail, sur un seul rang ; noires ou brunes au moins à la base et à l'extrémité des rameaux ; quelquefois entièrement de cette dernière couleur. Abdomen d'un roux jaune, avec l'extrémité noire, et une tache obscure ou noire sur le milieu de chacun des trois à cinq premiers arceaux du dos de l'abdomen.

*Rhipiphorus subdipterus*, FABR. Entomol. Syst. t. 2. 1. p. 109. 1. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 118. 1. — OLIV. Entomol. t. 3. n° 65. p. 4. 1, pl. 1. fig. 1, b, c, d, e ; a, ant. — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 19. (1805) p. 407. — TICNY, Hist. nat. t. 5. p. 258. — PANZ. Faun. germ. 97. 7.

*Mordella ambigua*, GIORNA, Mem. de l'Acad. des sc. de Turin, t. 7. p. 223. pl. 2. fig. 3, 4.

*Rhipiphorus subdipterus*, LATR. Hist. nat. t. 10. p. 410. 1. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. 424. 1, — DUMÉNIL, Dict. des sc. nat. t. 45. p. 375. — MELS. Lettr. t. 2. p. 294. 1.

*Myodes Dorthesii*, LATR. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 22. (1818) p. 131.

*Myodites Dorthesii*, LATR. Nouv. Dict. d'Hist. nat. 2<sup>e</sup> édit. t. 29. (1819) p. 302. note.

*Myodes subdipterus*, SAINT-FARGEAU (et AUDINET-SERVILLE, Encycl. méth. t. 10. p. 292. 1. — GUÉRIN, Dict. class. d'Hist. nat. t. 11. p. 369.

*Myodites subdipterus*, KUSTER, Kaef. Europ. 19. 61. — GERSTAECK. Rhipiph. disposi. systemat. p. 16. 1.

Long. 0,0056 à 0,0078 (2 1/2 à 3 1/2 l.) Larg. 0,0020 à 0,0028 (9/10 à 1 1/4 l.)

Corps oblong. Tête inclinée ; plus large que longue ; noire ; finement ponctuée ; hérissée de poils d'un gris cendré ; marquée, vers

la partie médiaire du milieu du front, d'un point enfoncé ou d'une fossette ponctiforme; presque plane ou plutôt un peu déprimée au dessous de cette fossette; à vertex arqué ou en demi-cercle, plus élevé que le bord antérieur du prothorax. *Palpes* d'un jaune testacé. *Yeux* ovales; saillants. *Antennes* prolongées jusqu'à la moitié (♀) ou aux trois quarts (♂) des côtés du prothorax; entièrement d'un jaune testacé, ou avec l'extrémité des rameaux enfumée (♂), brunes ou noires au moins à la base et à l'extrémité des rameaux, quelquefois presque entièrement brunes (♀). *Prothorax* un peu plus étroit en devant que la tête; tronqué à son bord antérieur: élargi d'avant en arrière, un peu comprimé dans la première moitié de ses côtés; en demi-hexagone dirigé en arrière, à son bord postérieur, avec la partie médiaire tronquée et au moins aussi large ou plus large que chacune des latérales; un peu plus long sur son milieu qu'il est large à sa base; inégal en dessus, irrégulièrement convexe sur sa moitié antérieure, presque plan sur la seconde; marqué de quelques fossettes légères; pointillé; noir; luisant; hérissé de poils grisâtres, fins, médiocrement apparents. *Ecusson* arrondi postérieurement; une fois plus large que long; ordinairement sillonné sur la ligne médiaire; noir; ruguleusement pointillé. *Elytres* à peine plus longues qu'elles sont larges à la base; un peu rétrécies d'arrière en avant, arrondies à l'extrémité; d'un flave testacé ou d'un flave livide; pointillées, plus distinctement à la base qu'à l'extrémité. *Ailes* d'un blanc hyalin à l'extrémité et moins nettement à la base, roussâtres ou nébuleuses dans leur partie moyenne, avec la côte et le stigmate plus obscurs. *Abdomen* élargi d'avant en arrière, inférieurement recourbé à l'extrémité; finement ponctué; noir ou avec le bord des anneaux moins obscur et parfois une tache roussâtre sur l'avant-dernier arceau (♂), ou d'un roux jaune, avec l'extrémité noire, et une tache sur le milieu des trois à cinq premiers arceaux du dos, obscure, brune ou noire. *Dessous du corps* brièvement pubescent; noir sur les parties pectorales; avec le ventre noir (♂) ou d'un roux jaune (♀), avec l'extrémité noire. *Pieds* pubescents; d'un jaune testacé sur les tibias et les tarses: cuisses postérieures noires: les intermédiaires, ordinairement de même couleur, quelquefois en partie d'un roux testacé, surtout chez la ♀: les antérieures soit entièrement d'un jaune testacé (surtout chez la ♀), soit seulement sur leurs deux tiers postérieurs (♂).

Cette espèce est exclusivement méridionale. On la trouve sur les fleurs. Elle a le vol très-rapide. Les ♂ sont en général plus rares que les ♀.

Obs. Elle a été découverte par Dorthes (1). Ce naturaliste en fit la description et en donna la figure dans une mémoire lu, le 20 décembre 1787, à la Société royale des sciences de Montpellier. Il considérait cet insecte comme devant former un nouveau genre, voisin des Nécydales. Les entomologistes anglais admirent ce genre nouveau et lui donnèrent le nom de *Dorthesia* dans leurs catalogues. Fabricius, qui décrivit ensuite cet insecte dans la collection de Bosc, le comprit dans son genre *Ripiphorus* qu'il créait cinq ans plus tard, mais sans mentionner celui qui l'avait découvert (2).

### TROISIÈME FAMILLE.

#### PTILOPHORIENS.

CARACTÈRES. *Elytres* contiguës à la suture jusqu'à l'angle sutural ; couvrant le dos de l'abdomen à l'exception du pygidium : cachant les ailes. *Neusson* apparent. *Hanches* rapprochées. *Yeux* profondément échancrés.

Cette famille est réduite au genre suivant :

Genre *Ptilophorus*, PTILOPHORE ; (Dejean) (3).

(πτίλον, plume légère ; φέρω, je porte).

CARACTÈRES. Ajoutez à ceux de la famille, les suivants : *Antennes* dentées (♀) ou en éventail (♂) à partir du troisième ou du quatrième article. *Vertex* plus saillant que le bord antérieur du prothorax. *Postépisternums* presque parallèles, contigus au bord des élytres. *Epimères* du postpectus cachées. *Hanches intermédiaires* contiguës. *Tibias* tous armés de deux éperons. *Tarses postérieurs* beaucoup plus courts que les tibias. *Ongles* pectinés.

(1) Jacques Anselme DORTNES, médecin et naturaliste, né à Nîmes, le 19 juillet 1739, mort en 1794, attaché à l'armée des Pyrénées en qualité de médecin des hôpitaux.

(2) Voyez l'éloge du professeur Dorthes, par Ch. L. Dumas, *Montpellier 1808 in 4°* p. 16 et 17.

(3) Catalogue (1833) p. 218.

**1. P. Dufourii** ; LATREILLE. Suballongé ; subsemi-cylindrique ; ruguleusement ponctué ; noir, ordinairement avec les élytres et plus rarement les tarses d'un brun rouge ; revêtu d'un duvet gris-cendré plus ou moins épais. Troisième article des antennes dilaté en forme de dent (♀) ou de lame (♂). Lobe médiale de la base du prothorax tronqué ou subéchancré au devant de l'écusson : celui-ci, presque en carré-long. Élytres chargées de quelques faibles côtes longitudinales, dont la plus prononcée naît au dessous de la fossette humérale, et se prolonge presque jusqu'à l'extrémité, en se rapprochant de la suture.

♂. Antennes offrant leurs articles sixième à onzième allongés en forme d'éventail : le troisième égal au tiers de la longueur de ceux-ci. Front orné sur son milieu d'une surface ovale, hérissée de poils gris plus longs que sur le reste de sa surface. Tibias antérieurs à peine denticulés sur leur tranche externe : les intermédiaires, paraissant inermes. Tarses proportionnellement un peu moins courts.

♀. Antennes dentées à partir du troisième article : celui-ci, en dent un peu plus forte que les suivants. Front chargé longitudinalement sur son milieu d'une saillie assez faible, peu convexe et dénudée. Tibias, et plus sensiblement les intermédiaires, dentelés sur leur arête externe.

*Pelecotoma Dufourii*, LATR. Nouv. Dict. d'Hist. nat. 2<sup>e</sup> édit. (1817) t. 25. p. 155. — SAINT-FARGEAU et AUDINET-SERVILLE, Encycl. méth. t. 10. p. 52. 4. — DE CASTELV. Hist. nat. t. 2. p. 262. 2.

*Pelecotoma Stevenii*, FISCHER, Bullet. de la Soc. des natur. de Moscou, t. 1. (1829), n° 9. p. 288. — Id. n° 11. p. 369. pl. 6. (Zool.) fig. 3 et anten.

*Ptilophorus Dufourii*, (DEJEAN), Catal. (1835) p. 218. — Id. (1857) p. 259. — GERSTAECK, Rhipiph. dispos. syst. p. 12. 3.

*Pelecotoma Frivaldskyi*, (STURM) (VILLA) Catal. (1855) p. 20. — GUÉPIN, Iconogr. du Regn. Anim. de Cuvier, pl. 54. fig. 6. (dans le texte du même ouvrage p. 150. l'auteur reconnaît que cet insecte est le même que le *Pelec. Dufourii* de Latreille).

*Evaniocera Dufourii*, GUÉPIN, Gen. d. ins. n° 2. pl. 2. — (GAUBIT) Catal. p. 227.

*Ptilophorus Frivaldskyi*, (STURM) Catal. (1845).

Var. A. *Elytres et tarses noirs*.

*Evaniocera Boryi*, LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, Anim. articul. (Coléopt.) p. 382. 995. pl. 52. fig. 9.

Long. 0,0036 à 0,00155 (2 1/2 à 5 l.) Larg. 0,0017 à 0,0036 (3/4 à 1 2/5 l.)

Corps suballongé ; parallèle ; semi-cylindrique : noir ou d'un noir



brun, ordinairement avec les élytres et souvent aussi les tarsi d'un brun rouge ou roussâtre ; revêtu d'un duvet gris cendré, épais. *Tête* inclinée ; ovalaire ; finement granuleuse ou densément ponctuée : subconvexe sur le front ; offrant sur celui-ci un espace ovale, hérissé de poils allongés et obscurs (♂), ou chargée d'un relief obtus, suballongé, glabre (♀) ; à vertex en demi-cercle transversal, subcomprimé, convexe, hérissé de poils, plus élevé que le bord antérieur du prothorax. *Mandibules* et *palpes* d'un noir brun ou d'un brun noir. *Yeux* noirs ; très-profondément échancrés. *Antennes* noirâtres ou brunes ; pubescentes ; à troisième article moins petit que le deuxième ; dentées (♀), ou en éventail à partir du troisième (ces articles également allongés, moins le troisième qui égale à peine le tiers de la longueur des autres) (♂). *Prothorax* moins large en avant que la tête ; tronqué à son bord antérieur ; élargi d'avant en arrière, d'abord en ligne un peu courbe, subsinué au devant des angles postérieurs qui sont assez vifs, dirigés en dehors, ou à peine dirigés en arrière ; bisinué à la base, avec la partie médiane de celle-ci un peu plus prolongée en arrière, tronqué ou subéchanqué au devant de l'écusson et de la largeur de celui-ci ; sans rebords ; plus large à la base qu'il est long sur son milieu : convexe ; ruguleusement ponctué ; noir ; revêtu d'un duvet cendré ou gris cendré couché et en partie dirigé du côté interne ; rayé longitudinalement sur son milieu d'une ligne à peine prolongée jusqu'à la base, moins avancée du côté du bord antérieur, bordée vers le milieu de sa longueur de poils dirigés longitudinalement. *Écusson* presque en carré plus large que long, obtusément arrondi à son extrémité ; ponctué ; noir, revêtu d'un duvet gris cendré. *Elytres* un peu plus larges en avant que le prothorax à ses angles postérieurs ; près de trois fois aussi longues que lui sur son milieu ; subarrondies aux épaules ; subparallèles ou faiblement rétrécies d'avant en arrière ; arrondies à l'extrémité (prises ensemble) ; convexes ; ruguleusement ponctuées ; marquées d'une fossette humérale peu profonde : offrant, principalement sur la seconde moitié des parties latérales des traces de stries ponctuées ; chargées de quelques faibles côtes longitudinalement obliques, savoir : une, naissant du tiers ou des deux cinquièmes de la base à partir de la suture, prolongée, en s'affaiblissant graduellement, à peine jusqu'à la moitié : une autre, la plus prononcée, naissant au dessous de la fossette humérale, prolongée en se rapprochant de la suture, presque jusqu'à l'extrémité, où elle paraît s'unir à une autre naissant au dessous de l'épaule ; ruguleusement ponctuées ; ordinairement d'un brun rouge ou roussâtre, d'autres fois

noires ; revêtues d'un duvet gris cendré, paraissant souvent moins épais sur les côtés. *Pygidium* presque en triangle renversé obtusément tronqué à l'extrémité ; un peu moins long ou à peine aussi long qu'il est large à la base ; un peu voilé à celle-ci par l'extrémité des élytres ; ruguleusement pointillé ; noir ; moins densément garni de poils d'un gris cendré obscur. *Dessous du corps* noir ; pointillé ; revêtu d'un duvet gris cendré. *Pieds* noirs ou noirâtres : tarses et plus rarement quelques-uns des tibias, surtout les antérieurs, d'une teinte plus ou moins obscure : éperons et ongles, fauves ou d'un fauve testacé.

Cette espèce est méridionale. Elle a été découverte par Draparnaud, dans les environs de Montpellier (1), et dédiée par Latreille à son illustre ami, M. Léon Dufour, qui lui en avait envoyé des individus pris en Espagne. Elle a été prise une fois dans le Beaujolais, par M. Foudras. Je l'ai reçue assez souvent, du département du Var, de feu Doublier et de MM. Robert et Arias. Suivant ce dernier, la larve vit probablement aux dépens du chêne liège. L'insecte parfait se trouve sur les vieux arbres de cette essence, principalement sur les branches mortes. Il faut frapper fortement ces parties desséchées pour faire tomber les Ptilophores dans le parapluie. Quand ils s'y trouvent, ils savent se glisser avec vivacité pour s'échapper, ou déploient leurs ailes avec agilité pour prendre leur vol. Ils apparaissent dans les mois de mai et de juin, à l'époque de la floraison des chênes. Dans la matinée ils sont vraisemblablement cachés dans le bois, il faut les chasser dans l'après-midi ou aux approches de la nuit. Leur robe se déflore assez facilement si on ne les pique pas de suite.



## TRIBU

DES

## LATIPENNES.

---

CARACTÈRES. *Tête* non prolongée en devant en forme de museau ; penchée ; ordinairement engagée dans le prothorax , quelquefois séparée de ce segment par une sorte de cou ou de nodule , mais alors antennes dentées ou pectinées. *Yeux* non contigus au bord postérieur de la tête. *Antennes* de longueur médiocre ; grossissant vers l'extrémité , chez ceux qui ont la tête engagée dans le prothorax , dentées ou pectinées chez les autres. *Base du prothorax* notablement plus étroite que celle des élytres. *Ecusson* distinct. *Elytres* généralement larges , offrant après la moitié de leur longueur leur plus grande largeur ; voilant le pygidium. *Hanches antérieures* continuës ou à peu près , non séparées par un prosternum aussi saillant qu'elles. *Ventre* de cinq arceaux , offrant quelquefois apparente une partie du sixième : ces arceaux graduellement un peu moins développés dans le sens de la longueur de l'insecte , du deuxième au quatrième : le premier ordinairement un peu moins long ou à peine aussi long vers la base des cuisses que le deuxième. *Pieds* grêles et allongés. *Tarses antérieurs et intermédiaires* de cinq articles : les postérieurs de quatre. *Ongles* simples ou munis d'une dent rudimentaire insignifiante.

Séparés de tous les Héétéromères précédents par leurs élytres notablement plus larges en devant que le prothorax à sa base , ces insectes se distinguent de ceux des deux familles suivantes , par leur tête soit engagée dans le prothorax , soit pourvue d'antennes dentées ou pectinées , quand elle est , comme chez les Pyrochroïdes , séparée de ce segment par une sorte de cou. Ils s'éloignent des ANGUSTIPENNES par la largeur de leurs étuis ; caractère frappant et commun à tous , que semble exprimer d'une manière intelligible le nom de LATIPENNES.

## ÉTUDE DES PARTIES EXTÉRIEURES DU CORPS.

Les parties visibles du corps des insectes se rapportent à deux fonctions très-différentes : les unes, situées à l'orifice du tube digestif, se rattachent à la nutrition : les autres, selon nous plus importantes, servent à indiquer le genre de vie de l'animal. Les unes et les autres méritent de fixer l'attention du Naturaliste. Nous continuerons donc à suivre la marche que nous avons adoptée.

La *tête*, penchée plutôt que verticale ou inclinée, varie dans sa configuration : ovalaire chez les Latipennes des deux premiers groupes, elle est triangulaire ou cordiforme chez ceux du dernier. Chez ceux-là, sans être aussi profondément enchâssée dans le prothorax que chez la plupart des Barbipalpes, elle est visiblement engagée dans ce segment ; chez ceux-ci, elle est séparée du tronc par une sorte de cou ou de nodule. On dirait que la main créatrice a voulu nous montrer dans le troisième groupe, comme un essai de ce qu'elle allait nous offrir d'une manière générale, chez les COLLIGÈRES et les VÉSICANTS.

Le *labre*, toujours visible, ordinairement en parallélogramme transversal, est obcordé chez les Lagries.

Les *mandibules*, courtes et robustes chez ces derniers insectes, s'allongent visiblement chez les Pyrochres et surtout chez les Pythies ; chez tous elles sont cornées, et bifides à l'extrémité ; parfois elles sont munies d'une dent à leur côté interne.

Les *mâchoires*, ciliées ou garnies de franges coriaces ou de poils presque spinosules, à leur côté interne, sont composées de deux lobes ; mais, chez les Pyrochres, l'externe, plus grand et courbé sur l'interne, est parfois si faiblement séparé de celui-ci, que les mâchoires semblent à un seul lobe, dont l'interne constitue la moitié inférieure.

Les *palpes maxillaires*, notablement plus longs que les autres, sont composés de quatre articles : le dernier, ordinairement le plus variable dans sa forme et le plus important par les caractères qu'il fournit, est d'une configuration diverse suivant les genres. Il est épais, subparallèle, obliquement tronqué et à peine plus long que large, chez les Pythies ; il s'allonge en forme de coute, chez les Pyrochres ; s'élargit comme une coupe, chez les Lagries.

Le *menton* ne remplit qu'une portion médiocre de l'échancrure progéniale, et laisse toutefois à découvert la base des mâchoires.



Petit et presque carré chez les Lagries, il montre, chez les autres, une disposition transverse et une surface moins restreinte.

La *languette*, membraneuse ou subcoriace, se divise ordinairement en deux lobes, parfois très-développés.

Les *palpes labiaux*, plus grêles et plus courts que les autres, sont formés de trois articles, dont le dernier se rapproche, par sa forme, de celui des maxillaires, chez les Pythes; il s'en éloigne, chez les Pyrochres.

Les *joues* occupent en général un espace très-restreint; souvent elles échancrent les organes de la vision.

Le *front*, resserré chez les ♂ des Lagries, conserve chez les autres une étendue plus ou moins remarquable.

Les *yeux*, situés sur les côtés de la tête, varient de forme et de direction. Hémisphériques et saillants chez les Pythes, ils sont un peu obliquement transverses chez les Pyrochres, et leur échancrure regarde la partie antérieure de la tête. Chez les Lagries leur direction est longitudinale, et leur échancrure plus profonde entame le milieu de leur côté interne. Chez ces derniers insectes, les yeux varient d'étendue suivant les sexes.

Les *antennes*, insérées à découvert ou à peine voilées à leur base par le bord latéral de l'épistome, sont généralement de longueur médiocre. En partie au moins dentées ou pectinées chez les Pyrochres, elles sont simples et vont plus ou moins en grossissant vers l'extrémité, dans les autres genres. On leur compte toujours onze articles: le premier, un peu renflé: le deuxième, le plus court: quelques-uns des autres, de formes ou de proportions un peu variables suivant les genres ou même suivant les sexes: le dernier surtout chez les Lagries offre, à cet égard, entre les ♂ et les ♀ des différences très-sensibles.

Les *tempes* ont toujours, après les yeux, un développement suffisant pour empêcher à ces organes d'être rapprochés du bord postérieur de la tête.

Le *prothorax* varie dans sa configuration. Presque cylindrique chez les Lagries, il se montre subcordiforme chez les Pythes, en ovale transversal chez les Pyrochres. Chez les premières, il est plus ou moins convexe: chez les autres sa surface est presque plane.

L'*écusson* est toujours distinct, en triangle ou presque en demi-cercle.

Les *élytres*, toujours libres, et d'une ampleur qui a valu à ces insectes le nom de LATIPENNES, vont en s'élargissant jusque au delà de la moitié de leur longueur: elles varient parfois de formes suivant les sexes. Elles couvrent le pygidium et servent de voile protecteur aux

véritables ailes. Chez les Pythes, elles se rapprochent de la dureté de la corne : chez les Pyrochres et surtout chez les Lagries, elles ont une flexibilité frappante. Presque planes chez les insectes des deux derniers groupes, elles ont chez ceux du premier une convexité plus ou moins prononcée. Leur surface est tantôt unie, tantôt striée ou sillonnée. Glabres chez les uns, elles sont le plus souvent garnies de poils ou de duvet. Leur repli, prolongé presque jusqu'à l'extrémité chez les Lagries, se trouve réduit chez les autres à une tranche, à partir des hanches postérieures.

Le *dessous du corps*, dont les pièces ont une étendue ou une disposition servant à expliquer quelques-unes des habitudes des insectes, fournit sous ce rapport des caractères qu'on ne saurait dédaigner.

Le *prosternum*, refoulé par les hanches, ne les sépare jamais complètement, et n'est surtout jamais aussi saillant qu'elles.

Le *mésosternum* se prolonge rarement jusqu'à l'extrémité des hanches du milieu.

Les *postépisternums* ou *épisternums du postpectus* sont allongés et presque parallèles.

L'*épimère postérieure* est souvent indistincte.

Le *ventre*, de cinq arceaux, qui vont ordinairement en diminuant un peu de longueur du deuxième au quatrième ; quelquefois une partie du sixième arceau est distincte.

Les *pièdes* sont généralement grêles et assez allongés.

Les *hanches antérieures*, subglobuleuses chez les premiers, s'allongent en cône obtus chez les Pyrochres.

Les *hanches intermédiaires* se montrent habituellement couchées et parallèles.

Les *hanches postérieures* ont une disposition transversale, et sont peu développées dans le sens de la longueur de l'insecte.

Les *cuisse*s et les *tibia*s sont assez grêles et de forme ordinaire : les éperons sont très-courts : les tibia postérieurs aussi longs ou un peu plus longs que tous les articles du tarse réunis.

Les *tarses* ont leur avant-dernier article bilobé ou avancé sous le suivant en forme de sole chez les Pyrochres et les Lagries, grêle et entier chez les Pythes.

Les *ongles* sont simples ou munis d'une dent rudimentaire.

## VIE ÉVOLUTIVE.

Malgré les analogies qui rapprochent nos LATIPENNES à l'état parfait, leurs larves sont loin d'avoir entre elles des rapports aussi frappants. Toutes ont six pieds ; le corps composé de douze anneaux, non comprise la tête ; des antennes de quatre articles ; des mandibules cornées ou presque cornées ; des mâchoires à un seul lobe, pourvu au moins de cils plus ou moins raides ; des palpes maxillaires de trois articles : des palpes labiaux de deux : le dernier anneau abdominal terminé par une ou deux pointes ; les pieds pourvus d'un ongle ; neuf paires de stigmates.

Mais à part ces caractères généraux communs à beaucoup d'autres larves, elles diffèrent par des caractères qui sont en harmonie avec leurs habitudes. Les unes, destinées à vivre à l'air, à jouir de toute leur liberté, sur les haies, au pied des buissons ou dans les bois, ont le corps revêtu d'une enveloppe flexible capable de lui permettre des mouvements variés, hérissé de poils, presque semi-cylindrique, et rapproché par ses formes de celui de certaines chenilles.

Les autres, condamnées à se traîner entre l'écorce et le bois des arbres morts ou malades, ont les pieds déjetés en dehors à la manière de ceux des Reptiles ; leur corps est allongé, plat et aminci, pour se glisser avec plus ou moins de facilité dans les voies étroites qu'elles se fraient ; il est revêtu d'une peau coriace ou parcheminée, pour avoir toute la résistance nécessaire ; il est armé à son extrémité de deux pointes cornées et râpeuses, qui jouent un rôle actif dans leur vie laborieuse.

Les premières de ces larves, ou celles des Lagries, se nourrissent de débris de matières végétales et peut-être aussi de substances animales. Si on les inquiète, elles courbent leur corps en arc, le replient en boule, se laissent ainsi rouler, si la pente est déclive, ou se tiennent immobiles dans la même position, tant qu'elles le croient utile pour leur sûreté.

Les autres, ou celles des Pythes et des Pyrochres, cachées sous les écorces, y rongent à l'aide de leurs instruments masticateurs les parties les plus tendres du liber et de l'aubier, deviennent ainsi les auxiliaires du temps, soit en opérant la destruction de ces matières végétales dont la vie se retire ou qu'elle a abandonnées, soit en facilitant l'introduction des eaux et autres agents chargés d'activer leur décomposition.

Ces larves lignivores se pratiquent facilement dans la sciure ou dans les dédales qu'elles ont pratiqués, un petit tombeau pour y passer à leur second état. Celles des Lagries choisissent les inégalités du sol ou l'abri que leur offre l'assemblage de quelques feuilles recouquillées, pour y couler les jours de sommeil qui doivent précéder leur résurrection.

Débarrassées de leur enveloppe de larve et devenues nymphes, elles ont, comme la plupart de celles des autres Coléoptères, la tête infléchie, les antennes et les palpes étendus, les élytres et les ailes déhiscentes et repliées en dessous; les pattes emmaillottées, offrant les jambes repliées vers les cuisses et anguleusement dirigées sur les côtés du corps, les tarses longitudinalement disposés près de la ligne médiane. Après un espace de temps variable, mais qui parfois ne dépasse pas huit jours, elles rejettent l'espèce de suaire qui les enveloppait et entrent dans la dernière et plus brillante phase de leur existence.

#### GENRE DE VIE DES INSECTES PARFAITS.

Dans leur état parfait, ces insectes offrent généralement, soit dans leurs formes gracieuses, soit dans la beauté de diverses parties de leur robe, tous les avantages faits pour plaire. Chez les Lagries, au corps hérissé de duvet, les élytres d'un blond flavescent contrastent agréablement avec le fond obscur de leur corsage; chez les Pythes, leur surface d'un bleu d'acier se nuance souvent de la plupart des teintes de l'écharpe d'Iris; chez les Pyrochres, leur tissu satiné semble emprunter au feu la vivacité de ses couleurs et reproduire la richesse de la pourpre romaine.

Ces charmantes créatures n'opposent à la main prête à les saisir que les ruses innocentes employées par la faiblesse; elles replient les antennes et les pattes, et restent avec une patience résignée dans un état d'immobilité trompeuse.

Toutes se trouvent généralement sur les végétaux. Les unes se plaisent sur les diverses plantes de nos champs, ou recherchent les abris des buissons de nos haies; les autres, comme les Hamadryades des poètes, sont généralement fidèles aux grands arbres auxquels leur existence se trouva liée dans leur état vermiforme. Quelques-unes de ces dernières se rencontrent parfois accidentellement dans les chantiers de nos villes, quand elles y ont été transportées avec les troncs vieillis qui les cachaient; mais les forêts sont leur principal asile. Leur conquête dédommage sans peine des pas employés à leur

recherche. Quel ardent ami de la science a jamais saisi pour la première fois une de ces Pyrochres au manteau d'écarlate, aux antennes si artistement dentées ou pectinées, sans avoir éprouvé dans tout son corps un frémissement de plaisir?

Aimable étude que celle de la Nature ! elle plaît à l'enfant, et va jusqu'à triompher quelquefois de la mobilité des goûts de son âge. Elle enchante le jeune homme, et souvent lui inspire une passion heureuse qui le séduit, le préoccupe, et ne laisse plus de place dans son cœur à des entraînements plus dangereux. L'homme mûr lui-même lui doit des charmes et des délices inconnues au vulgaire. Dans ces campagnes tranquilles, dans ces solitudes boisées, où il vient admirer les œuvres du Créateur, son âme plus calme et plus recueillie se sent plus facilement portée à bénir Dieu de ses bienfaits ; il trouve dans les mœurs des insectes, dans leurs habitudes instinctives, et jusque dans leurs formes et leurs couleurs, des plaisirs pour son esprit et pour ses yeux, plaisirs d'autant plus doux que, contrairement à tant d'autres, ils ne laissent jamais après eux ni regrets, ni remords.

#### HISTORIQUE.

Nos Latipennes, en raison de leur configuration différente, servant à déguiser une partie des relations qui les unissent, durent d'abord être peu rapprochés les uns des autres.

1761. Le Législateur des sciences Naturelles, Linné, soit dans sa *Fauna suecica*, soit dans son *Systema Nature*, en répartit les espèces dans ses genres *Chrysomela*, *Tenebrio* et *Cantharis*.

1762. L'auteur de la méthode tarsienne, Geoffroy, fut appelé, par suite des divisions établies par lui, à détacher des coupes dans lesquelles elles avaient été colloquées, les deux seules espèces décrites dans son ouvrage. L'une cessa d'être une Chrysomèle pour faire partie de ses *Cantharis*, bien différentes de celles du Naturaliste suédois ; à l'aide de l'autre, il constitua un genre nouveau, celui de *Pyrochroa*.

1775. De Geer, dans le t. 5 de ses *Mémoires*, adoptait cette coupe nouvelle, et transportait, parmi ses Ténébrions, l'espèce que l'auteur précédent avait rejetée parmi ses Cantharides.

1775. La même année, Fabricius, mieux inspiré, dans son *Systema Entomologie*, faisait entrer cette espèce si diversement ballottée, dans son genre *Lagria* qu'il établissait. Comme De Geer, il reconnut la nécessité du genre *Pyrochroa* ; mais en même temps il transplantait



parmi ses Cucujes, l'espèce de nos Latipennes admise avec plus de raison, par Linné, au nombre de ses *Tenebrio*.

Pendant plus de vingt ans la classification des insectes de cette tribu resta à peu près ce que l'avait faite l'Entomologiste de Kiel, qui voyait sans cesse grandir l'autorité provenant de l'ascendant de son génie, et ses écrits devenir des guides, dont on osait peu s'écarter. Quelques admirateurs plus exclusifs du Plin du nord (1), continuèrent seuls à suivre ses voies, ou ballottèrent dans les genres *Crioceris*, *Cryptocephalus* et *Auchenia*, formés aux dépens de celui de *Chrysomela*, l'espèce que Linné avait colloquée dans celui-ci.

1796. Latreille, dans son *Précis des Caractères génériques des Insectes*, institua le genre *Pytho*, ayant pour type l'espèce de nos Latipennes transplantée par Fabricius du genre *Tenebrio* dans celui de *Cucujus*.

1801. Quelques années plus tard, l'auteur danois, dans son *Systema Eleutheratorum*, reconnut lui-même l'opportunité de l'établissement de cette coupe, et dès lors se trouvèrent admis d'une manière à peu près générale, les trois genres dont se compose aujourd'hui notre Tribu.

Il ne nous reste plus qu'à examiner quelle place fut assignée à chacun d'eux.

1791. Latreille, dans son premier ouvrage systématique, les dissémina dans ses huitième, neuvième et douzième familles.

1800. M. Duméril, dans son *Huitième tableau de classification*, comprenant celle des insectes, fit entrer les genres Pyrochre et Lagrie dans sa famille des VÉSICANTS : celui de *Pytho* ne fut pas mentionné. Quelques mois plus tard, les Lagries, en raison de leurs élytres molles, firent partie de la famille des ÉPIRASIQUES, et les Pyrochres, de celle des ORNÉPHILES.

1804. Latreille, dans son *Histoire naturelle*, colloqua nos Latipennes dans la division de ses Coléoptères HERÉCOLES de la tribu des Obscurs. Les *Pytho* et les *Lagria* trouvèrent place dans la famille des Hélopiens, et les *Pyrochroa* dans celle des Macrogastrés.

1809. Dans ses *Considérations générales sur l'ordre des animaux*, le même auteur réunit les Pythes et les Lagries à sa famille des TÉNÉBRIONITES, et fit des Pyrochres la base de celle des PYROCHROÏDES.

1810. Gyllenhal, dans le t. 2 de ses *Insecta suecica*, sentit le premier le besoin de rapprocher les insectes qui composent nos LATIPENNES. Il

---

(1) Muller, Schrank, Gmelin, De Villers, etc.

plâça les Lagries à la fin de sa famille des MÉLOÏDES : les *Pyrochroa* et les *Pytho* constituèrent, avec le genre *Calopus*, la famille suivante ou celle des PYROCHROÏDES.

1812. De Lamarck, dans l'extrait de son *Cours de Zoologie*, rangea les Lagries parmi ses TÉNÉBRIONITES, et les Pyrochres parmi ses CANTHARIDIENS.

1815. Leach, dans l'*Encyclopédie d'Edimbourg*, avait à peu près suivi, avons-nous dit, la marche de Latreille. Il avait partagé les Hétéromères en sept tribus : les PIMÉLIÈRES, TÉNÉBRIONIDES, PYROCHROÏDES, MORDELLIDES, CANTHARIDES, OËDÉMÉRIDES, SALPINGIDES.

Les TÉNÉBRIONIDES comprirent trois familles :

1<sup>o</sup> *Ténébrionidés* (*G. Pedinus, Opatrum, Tenebrio*).

2<sup>o</sup> *Diapéridés*. Première division. (*G. Toxicum, Sarrotrium*).

Deuxième division. (*G. Hypophlæus*).

Troisième division :

Première subdivision. (*G. Phaleria, Diaperis, Eustrophus, Tetra-toma, Leiodes, Trachyseelis, Cossyphus*).

Deuxième subdivision. (*G. Eledona, etc.*)

Quatrième division :

Première subdivision. (*G. Helops, Pytho, Hallomenus*).

Deuxième subdivision. (*G. Cistela*).

3<sup>o</sup> *Mélandrydés*. Ils se partagèrent en deux divisions :

Première division. (*G. Serropalpus, Dircaea*).

Deuxième division. (*G. Melandrya, Lagria, Calopus*).

Les PYROCHROÏDES offrirent aussi deux divisions :

Première division. (*G. Dendroides, Pyrochroa*).

Deuxième division. (*G. Scirptia, Notoxus, Anthicus*).

Les MORDELLIDES (*G. Ripiphorus, Mordella, Anaspis, etc.*)

1817. Latreille dans le t. 3 du *Règne animal*, par Cuvier, en remaniant les familles de ses Hétéromères dont il changeait les dénominations, fit entrer les Pythes et les Lagries dans sa famille des STÉNÉLYTRES, et les Pyrochres dans celle des TRACHÉLIDES.

1825. Dans ses *Families naturelles*, les Pythes, conservés parmi les

STÉNÉLYTRES, y firent partie de la famille des *Hélopiens*. Les Lagries, rejetées dans celle des TRACHÉLIDES, y devinrent la base de la première tribu, celle des *Lagriides*, et les Pyrochres, le type de la seconde, celle des *Pyrochroïdes*.

1829. Il n'apporta aucune modification à cette disposition, dans la seconde édition du *Règne animal*, par Cuvier.

1832. Stephens, dans ses *Illustrations*, rangea les Lagries avec ses MELANDRYDES, et les Pyrochres avec ses PYROCHROÏDES.

1834. Solier, dans le t. 3 de la *Société Entomologique de France*, avait partagé les Hétéromères en trois divisions principales ou en sept familles :

La cinquième ou celle des CLYNOCÉPHALIDES, comprit deux tribus :

1<sup>o</sup> *Serropalpites* ( *G. Eustrophus*, *Orchesia*, *Hallomenus*, *Dircaea*, *Serropalpus*, *Conopalpus*, *Nothus*, *Scaptia*, *Melundrya*, *Anaspis*, *Anisostoma* ).

2<sup>o</sup> *Mordellites* ( *G. Pelecotoma*, *Myodites*, *Rhipiphorus*, *Mordella* ).

La sixième ou celle des TRACHÉLIDES fut composée de trois tribus :

1<sup>o</sup> CANTHARIDITES ( *G. Cerocoma*, *Tetraonyx*, *Dices*, *Mylabris*, *Lydus*, *OEnas*, *Lytta*, *Meloe*, *Zonitis*, *Nemognatha*, *Apalus*, *Sitaris* ).

2<sup>o</sup> ANTHICITES ( *G. Anthicus*, *Steropes* ).

3<sup>o</sup> PYROCHROÏDES ( *G. Pyrochroa*, *Dendroïdes*, etc. ).

Enfin les LEPTODÉRIDES furent répartis dans trois tribus :

1<sup>o</sup> *Lagriites* ( *G. Lagria*, *Sparedrus*, *Calopus* ).

2<sup>o</sup> *Pythites* ( *G. Pytho* ).

3<sup>o</sup> *Rhinosimiles* ( *G. Stenostoma*, *Mycterus*, *Salpingus* et *Rhinosimus* ).

1838. Nos divers LATIPENNES, comme on a pu le voir, avaient jusqu'alors été très-diversement ballottés, lorsque M. Westwood, dans son *Introduction*, marchant sur les traces de Gyllenhal, entra dans une voie plus naturelle. Il réunit dans sa deuxième famille, celle des PYROCHROÏDES, les *Pytho* et les *Pyrochroa*, qui la constituèrent seuls, et forma la famille suivante ou celle des LAGRIDES, du genre *Lagria*.

1842. Le travail d'Erichson, relatif à la *Connaissance systématique des Larves des Insectes* vint confirmer le classement nouveau du savant entomologiste de Hammerschmidt.

Ces pas heureux vers une classification plus rationnelle ne furent pas imités par tous leurs successeurs.

1815. M. Blanchard, dans son *Histoire des Insectes*, laissa les Pythies dans sa Tribu des PIMÉLIENS, où ils composèrent le groupe des Pythites, le cinquième de la famille des TÉNÉBRIONIDES.

Les Lagries et les Pyrochres restèrent dans sa Tribu des CANTHARIDIENS. Les premiers y constituèrent le groupe des *Lagriites*, le deuxième de la première famille, celle des LAGRIIDES. Les Pyrochres y devinrent les principaux représentants de la seconde famille, celle des PYROCHROÏDES.

1845.— La même année, M. le Dr L. Redtenbacher, dans ses *Genres de la Faune des Coléoptères d'Allemagne*, disposés d'après une méthode analytique dont nous avons indiqué la marche, les noms et l'ordre des familles<sup>(1)</sup>, colloqua les Pythies dans sa famille des SERROPALPES, et forma une famille particulière avec chacun des genres *Lagria* et *Pyrochroa*. Il n'apporta aucune modification à ce plan, dans sa *Faune* publiée quatre ans plus tard.

Le petit nombre des espèces dont nous allons parler, les rapports qu'elles ont entre elles par la dilatation de leurs élytres, nous ont porté à les réunir dans une même Tribu. Nous diviserons cette dernière en trois groupes :

Tête engagée dans le prothorax. Antennes ni dentées ni pectinées, grossissant plus ou moins sensiblement vers l'extrémité ;	insérées dans une échancrure profonde des yeux, vers le milieu du côté interne de ces organes. Avant-dernier article de tous les tarses dilaté et avancé sous le suivant en forme de sole.	Groupes.  LAGRIIDES.
	insérées au devant des yeux qui sont entiers et hémisphériques. Avant-dernier article de tous les tarses grêle et non avancé sous le suivant.	PYTHIDES.
	séparée du prothorax par une sorte de col étroit ou de nodule. Yeux obliquement transverses, échancrés en devant. Antennes insérées un peu au devant de l'échancrure des yeux ; dentées ou pectinées à leur côté interne. Avant-dernier article de tous les tarses dilaté et avancé sous le suivant en forme de sole.	PYROCHROÏDES

(1) Hist. nat. des Coléopt. (Latigènes p. 16 à 19).

## PREMIER GROUPE.

## LAGRIHES.

CARACTÈRES. *Tête* engagée dans le prothorax. *Antennes* ni dentées ni pectinées, grossissant plus ou moins sensiblement vers l'extrémité ; insérées dans une échancrure profonde des yeux, vers le milieu du côté interne de ces organes. *Avant-dernier article de tous les tarsi* dilaté et avancé sous le suivant en forme de sole, et garni de duvet en dessous.

Ce groupe est réduit au genre suivant :

Genre *Lagrie*, LAGRIA ; Fabricius (1).

(λαρυνη, duvet ?)

CARACTÈRES. *Tête* petite ; subarrondie ou ovale. *Antennes* médiocres ; de onze articles : le deuxième, court, subglobuleux : les cinquième à dixième, presque égaux, peu élargis en ligne droite de la base à l'extrémité : le troisième ordinairement à peine aussi long (♂) ou un peu plus long (♀) que le quatrième : le onzième, beaucoup plus long chez le ♂ que chez la ♀. *Epistome* échancré presque en demi-cercle, dans le milieu de son bord antérieur. *Labre* transverse. *Mandibules* courtes, peu apparentes au delà du labre ; bifides à leur extrémité. *Pulpes maxillaires* à dernier article sécuriforme ou presque en forme de coupe, obliquement tronqué à son extrémité. *Prothorax* presque cylindrique. *Elytres* d'un tiers au moins plus larges à la base que le prothorax ; à repli prolongé jusqu'à l'extrémité ; plus ou moins flexibles. *Ventre* de cinq arceaux. *Pieds* allongés ; grêles. *Corps* plus ou moins convexe.

Ajoutez à ces caractères, au moins pour les espèces suivantes :

*Mâchoires* à deux lobes, ciliés ou frangés. *Palpes labiaux* à dernier article ovalaire. *Dernier article des antennes* de moitié au moins (♀) ou deux fois et demie au moins (♂) plus grand que le dixième. *Mésosternum* prolongé presque jusqu'à l'extrémité des hanches intermédiaires. *Episternums* subparallèles, plus fortement ponctués que les autres parties du dessous du corps. *Tibias postérieurs* plus longs que

---

(1) Syst. entom. p. 31.



le tarse qui les suit : premier article de ces derniers aussi long (♂) ou presque aussi long (♀) que tous les suivants réunis.

On trouve ces insectes dans les bois, dans les haies et sur différentes plantes. On les fait tomber dans le parapluie, en battant les arbres ou les buissons ; on les obtient aussi en fauchant à l'aide du filet. Ils contrefont les morts quand on les touche ou qu'ils sont menacés de quelque danger.

Les larves connues de ces Hétéromères montrent quelque analogie avec certaines chenilles ; elles ont le corps hérissé de poils rudes et épais, et se roulent en boule quand elles sont effrayées. Pendant l'hiver, on les trouve aux pieds des buissons ou des arbres, surtout sous les fagots empilés qu'on laisse hiverner dans les bois. Leur existence à l'état de larve dure près d'un an. Elles ne prennent presque aucune précaution pour se cacher à l'état de nymphe.

**1. *L. atripes*;** E. MULSANT et F. GUILLÉBAU. *Hérissée en dessus de poils fins; noire, avec les élytres d'un flave testacé. Prothorax à peine pointillé; rayé d'une ligne longitudinale médiane; à pubescence testacée. Elytres ruguleusement ponctuées; marquées d'une fossette humérale une fois environ plus longue que le calus; à stries plus ou moins faibles: intervalles sutural, troisième, cinquième, septième et neuvième, sensiblement relevés chez la ♀. Cinquième à huitième articles des antennes plus longs que larges: le onzième, égal au deux (♀) ou presque aux trois (♂) précédents réunis.*

♂. Corps allongé. Tête subarrondie, plus large que longue. Antennes à troisième article à peine plus long que le quatrième : les sixième à neuvième, une fois plus longs chacun qu'ils sont larges : le dixième, de moitié au moins plus long que large à l'extrémité : le onzième, presque aussi long que les trois précédents réunis. Yeux saillants ; séparés l'un de l'autre sur le front, dans leur point le plus rapproché, par un espace plus étroit que la longueur du troisième article des antennes ; séparés sous la tête par un espace à peine plus large que cet article ; séparés du bord postérieur de la tête par un espace égal au cinquième ou au sixième de la longueur du prothorax. Ce dernier, au moins aussi long que large ; sensiblement plus étroit que la tête, un peu plus large postérieurement. Elytres graduellement élargies jusqu'aux deux tiers, subarrondies ou un peu en ogive à l'extrémité, prises ensemble ; très-médiocrement convexes. Repli à peine anguleux à son bord interne vers les hanches postérieures, d'un

tiers plus large dans ce point que vers le bord postérieur du deuxième arceau ventral.

♀. Corps suballongé. Tête ovale, visiblement plus longue que large. Antennes à troisième article ordinairement un peu plus long que le quatrième : le cinquième de moitié : le septième, d'un quart plus long qu'il est large : le neuvième, à peine aussi long : le dixième, moins long que large à l'extrémité : le onzième, aussi long que les deux précédents réunis. Yeux à peine saillants ; séparés l'un de l'autre sur le front, dans leur point le plus rapproché, par un espace égal aux deuxième, troisième et quatrième articles des antennes réunis ; séparés, sous la tête, par un espace à peine plus large ; séparés du bord postérieur de la tête par un espace égal au moins au tiers de la longueur du prothorax. Ce dernier à peine aussi long que large ; aussi large que la tête ; offrant sur sa ligne médiane une dépression ou surface plane, elliptique, prolongée depuis le bord antérieur jusque près de la base, impointillée, souvent creusée d'une fossette vers le tiers de la longueur du segment. Elytres élargies, et plus sensiblement que chez le ♂, jusqu'aux trois cinquièmes de leur longueur, en ogive postérieurement ; assez convexes. Repli à peine anguleux à son bord interne, vers les hanches postérieures ; de trois quarts environ plus large dans ce point que vers le bord postérieur du deuxième arceau ventral.

*Lagria atripes*, E. Mulsant et F. Guillebeau, Notes etc. in Annales de la Soc. Linn. de Lyon, nouv. série, t. 2. 1854-1855, p. 74. — E. Mulsant, Opuscules, 6<sup>e</sup> cal. p. 42.

Long. 0,0090 à 0,0093 (4 à 4 1/4 l.) Plus grande largeur des élytres 0,0033 (1 1/2 l.) (♂) — 0,0015 à 0,0018 (2 à 2 1/3 l.) (♀).

Corps hérissé en dessus de poils fins et assez longs. Tête pointillée ; à pubescence d'un testacé livide ; noire : labre et palpes de même couleur. Antennes prolongées environ jusqu'au quart (♀) ou un peu plus (♂) des élytres ; pubescentes ; noires. Prothorax un peu arqué à son bord antérieur ; tronqué à la base ; subcylindrique ; un peu rétréci sur les côtés et marqué en dessus de deux dépressions ou sillons transverses : le premier, après le bord antérieur, ordinairement peu sensible, surtout chez la ♀ : le deuxième, vers les deux tiers de la longueur ; relevé en rebord ou légèrement rebordé à sa base ; noir ; à peine pointillé ; hérissé de poils d'un livide testacé ; rayé sur la ligne médiane d'une ligne ordinairement entière (♀) ou raccourcie sur son

tiers antérieur (♂). *Ecusson* généralement noir. *Elytres* cinq ou six fois aussi longues que le prothorax ; ruguleusement ponctuées ; d'un flave testacé ; hérissées de poils concolores, mi-relevés ; marquées d'une fossette humérale une fois environ plus longue que le calus ; à stries plus ou moins faibles , peu distinctes près de la base. Intervalles sutural, troisième et cinquième, faiblement saillants postérieurement , et non relevés en avant (♂) : les sutural, troisième, cinquième, septième et neuvième, sensiblement plus saillants jusque vers la base, de telle sorte que les élytres offrent une sorte de gouttière large et peu profonde entre les sutural et neuvième intervalles. *Dessous du corps* pointillé ; luisant ; parcimonieusement pubescent ; noir, avec les côtés du ventre parfois moins obscurs. *Mésosternum* linéaire dans sa seconde moitié. *Pieds* noirs.

Cette espèce se trouve dans les environs de Lyon ; elle a été prise dans ceux de Ronen par M. Mœquers (collect. Reiche) ; elle paraît plus commune dans le midi.

Obs. M. Guillebeau et moi avons fait connaître sa larve (1).

**2. *L. hirta* ; LINNÉ.** Hérissée en dessus de poils fins ; noire ou brune, avec les élytres d'un flave testacé. Tête et prothorax ponctués : celui-ci, parfois d'un testacé roussâtre à la base et même au bord antérieur. *Elytres* ruguleusement ponctuées ; marquées d'une fossette humérale à peine prolongée après le calus ; à stries légères non avancées jusqu'à la base, parfois presque nulles ; offrant, chez la ♀, leur plus grande largeur vers les quatre septièmes de leur longueur. Cinquième à huitième articles des antennes visiblement plus longs que larges : le dixième, plus large que long (♀) : le onzième égal aux deux (♀), ou presque aux trois (♂) précédents réunis. *Ventre* souvent d'un testacé brunâtre sur les côtés.

♂. Corps allongé. Tête subarrondie, plus large que longue. Antennes à troisième article souvent à peine aussi long ou un peu moins long que le quatrième : les cinquième à septième une fois plus longs chacun qu'ils sont larges : le dixième de moitié environ plus long qu'il est large à l'extrémité : le onzième presque égal aux trois précédents réunis. Yeux séparés l'un de l'autre, sur le front, dans leur point le plus rapproché, par un espace égal à la longueur du troisième article

---

(1) Notes pour servir à l'histoire des Lagries, (Annales de la Soc. Lion. de Lyon, nouv. série, t. 2. 1854-1855, p. 73. — E. Mulsant, Opuscules, 6e cah. p. 41).

des antennes; séparés sous la tête par un espace un peu moins étroit; distants du bord postérieur de la tête d'un espace égal au quart de la longueur du prothorax. Ce dernier, au moins aussi long que large; subcylindrique, graduellement un peu rétréci d'arrière en avant dans son tiers antérieur, sensiblement étranglé vers les trois cinquièmes ou deux tiers, un peu élargi ensuite jusqu'à la base; plus étroit même à cette dernière et surtout en devant, que la tête; luisant; un peu moins densément et moins fortement ponctué que chez la ♀; marqué d'un sillon transversal correspondant à son étranglement vers les deux tiers de sa longueur; sans fossette ni dépression longitudinale sur la ligne médiane; offrant parfois sur le tiers de cette ligne une petite saillie linéaire; relevé en rebord à la base. Elytres graduellement élargies jusqu'aux trois quarts de leur longueur; arrondies à l'extrémité, prises ensemble; très-médiocrement convexes. Repli faiblement anguleux à son bord interne, vers les hanches postérieures; de moitié plus large dans ce point que vers le bord postérieur du deuxième arceau ventral.

♀. Corps suballongé. Tête ovalaire, un peu plus longue que large. Antennes à troisième article ordinairement un peu plus long que le quatrième: les cinquième à septième, de moitié plus longs qu'ils sont larges: le neuvième, à peine plus long que large; le dixième, moins long que large; le onzième, égal à peu près aux deux précédents réunis. Yeux séparés l'un de l'autre, sur le front, dans leur point le plus rapproché, par un espace égal aux deuxième, troisième et quatrième articles des antennes réunis; un peu plus largement séparés en dessous; distants du bord postérieur de la tête d'un espace égal au quart ou au tiers de la longueur du prothorax. Celui-ci à peine aussi long que large; subcylindrique; aussi large que la tête; plus densément et plus fortement ponctué que chez le ♂; n'offrant pas ordinairement les traces d'un rétrécissement ni d'un sillon transversal vers les deux tiers; rebordé à la base; souvent rayé transversalement vers le tiers de sa longueur; noté, dans ce point, sur sa ligne médiane, d'une fossette suborbiculaire, non avancée jusqu'au bord antérieur; offrant souvent, en outre, à partir du milieu de la fossette, une dépression longitudinale ou une surface plane, elliptique, impunctillée, prolongée jusque vers le rebord postérieur. Elytres élargies, et plus sensiblement que chez le ♂, jusqu'aux quatre septièmes de leur longueur, en ogive postérieurement. Repli sensiblement anguleux à son bord interne, vers les hanches postérieures; deux fois environ aussi



large dans ce point que vers le bord postérieur du deuxième arceau ventral.

*Chrysomela hirta*, LINN. Syst. Nat. (10<sup>e</sup> édit.) (1758) t. 1. p. 577. 76. — *Id.* Syst. Nat. (12<sup>e</sup> édit.) t. 1. p. 602. 119. — *Id.* Faun. suéc. p. 171. 578. — O. F. MULLER, Faun. Insect. frid. p. 9. 83. — P. L. S. MULLER, C. V. LINN. Natur. 5. 1. p. 201. 119. — GOEZE, Entom. Beit. t. 1. p. 297. 118. — SCHRANK, Enum. p. 99. 189. — DE VILLERS, C. LINN. Entom. t. 1. p. 167. 189.

*La Cantharide noire, à écus jaunes*, GEOFFR. Hist. t. 1. p. 344. 6. (♂).

*Tenebrio villosus*, DE GEER, Mem. t. 5. p. 44. 6. pl. 2. fig. 23. (♀) fig. 24. (♂). — RETZ. Gen. p. 135. 835.

*Lagria hirta*, FABR. Syst. entom. p. 123. 8. — *Id.* Spec. ins. t. 1. p. 160. 11. — *Id.* Mant. insect. t. 1. p. 93. 13. — *Id.* Ent. syst. t. 1. 2. p. 79. 4. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 70. 8. — HERBST, in FUESSLY'S Arch. 3<sup>e</sup> cah. (1784) p. 68. 1. — ROEMER, Gen. p. 44. 35. p. 34. fig. 22 (17) ♂. — ROSSI, Faun. étr. t. 1. p. 103. 274 — *Id.* éd. HELW. t. 1. (1795) p. 114. 274 (♀) et note ♂. — *Id.* p. 455. 114. (♂♀) — OLIV. Encycl. méth. t. 7. (1792) p. 446. 2. (♂). — *Id.* Entom. t. 3. n° 49. p. 4. 2. pl. 1. fig. 1, a, b. (♀), c, (♂). — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 12. (1803) p. 461. — PANZ. Entom. germ. p. 202. 2. (♀). — *Id.* Faun. germ. 107. 2. (♀). — *Id.* Index, p. 142. (♂♀). — CUV. Tabl. élém. p. 543. — PAVK. Faun. suéc. t. 2. p. 154. 1. (♂♀) — WALCK. Faun. par. t. 1. 159. 1. — TICNY, Hist. nat. t. 7. p. 442, pl. fig. 5. (♀) — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 351. (♂♀). pl. 50, fig. 3. — *Id.* Gener. t. 2. p. 198. 1. (♂♀). — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 17. (1817) p. 209. — SCHROB. Syn. ins. t. 5. p. 9. 10. (♂♀). — GYLLENH. Ins. suéc. t. 2. p. 504. 1. (♂♀). — LAMARCK, Anim. s. ver. t. 4. p. 577. 2. — GOLDFUSS, Handb. p. 353. — DUMÉRIL, Dic. des sc. nat. t. 24. (1822) p. 127. 1. — MULS. Lettr. t. 2. p. 295. 1. (♀). — *Id.* Opusc. entom. 6<sup>e</sup> cah. p. 77. (♂♀). — *Id.* Notes, etc. in Ann. de la Soc. Linn. de Lyon nouv. série, t. 2. (1854-1855) p. 65. — STEPH. Illust. t. 5. p. 33. 1. (♂♀) — *Id.* Man. p. 528. 2573. (♂♀), — CURTIS, Brit. entom. t. 15, (1836) p. 598. 13. — SAHLB. Ins. fenn. p. 441. 1. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 251. 1. pl. 20. fig. 3. (♂). — L. DUF. Excurs. p. 70. 424. — E. BLANCHARD, in Regn. anim. de Cuvier, édit. Croch. p. 53 bis, pl. 1, a, labre; b, mandibule; c, mâchoire; palpe max.; d, lèvres; e, antennes. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 629. (♂♀).

*Lagria pubescens*, FAB. Syst. entom. p. 123. 7? — *Id.* Spec. ins. t. 1. p. 160. 10? — *Id.* Mant. t. 1. p. 93. 12? — *Id.* Entom. Syst. t. 2. p. 79. 3. (♀?). — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 70. 6. (♀?) — OLIV. Encycl. méth. t. 7. p. 446. 6. — PANZER, Ent. germ. p. 201. 1. (♂) — *Id.* Faun. germ. 107. 1. (♂) — TICNY, Hist. nat. t. 7. p. 143. — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 351. 2. — MULS. Lettr. t. 2. p. 291. 2. (♂).

*Coccinella hirta*, MULLER, Zool. Dan. Prodr. p. 85. 937.

*Gryptocephalus hirtus*, GMEL. C. LINN. Syst. nat. t. 1. p. 1750. 236. — GOEZE, Faun. Eur. t. 8. p. 418. 13. — MARTYN, Engl. entom. pl. 17. fig. 15.

*Auchenia hirta*, MARSH. Ent. brit. t. 1. p. 218. 10.



Long. 0,0074 à 0,0081 (3 1/3 à 3 2/3 l.) Plus grande largeur des élytres 0,0028 à 0,0030 (1 1/4 à 1 2/5 l.) (♂) ; 0,0036 à 0,0039 (1 2/3 à 1 3/4 l.) (♀).

*Corps* hérissé en dessus de poils fins et assez longs. *Tête* à pubescence d'un testacé livide; noire, avec le labre parfois d'un testacé obscur; ponctuée. *Antennes* prolongées environ jusqu'au quart (♀) ou un peu plus (♂) des élytres; pubescentes; noires ou brunes, parfois avec les articles basilaires moins obscurs. *Prothorax* marqué de points médiocrement profonds; noir ou d'un brun noir, avec le bord postérieur et moins souvent l'antérieur d'un testacé roussâtre, surtout chez la ♀; hérissé de poils d'un livide testacé. *Ecusson* ordinairement brun; parfois d'un flave testacé. *Elytres* cinq ou six fois aussi longues que le prothorax; ruguleusement ponctuées; d'un flave testacé; hérissées de poils concolores, mi-relevés; marquées d'une fossette humérale à peine prolongée après le calus; offrant des stries légères non avancées jusqu'à la base (♂), variablement prononcées, parfois presque nulles (♀). Intervalles en général légèrement saillants: les quatre plus rapprochés de la suture presque uniformément saillants chez le ♂, raccourcis près de la base: les autres et parfois tous, peu distincts au moins en avant (♂). *Dessous du corps* pointillé; luisant; parcimonieusement garni de poils fins et livides; ordinairement brun, ou plutôt d'un brun testacé, avec les côtés du ventre d'un testacé brunâtre, quelquefois tout noir. *Mésosternum* linéaire dans sa seconde moitié. *Pieds* bruns ou d'un brun testacé, parfois noirs.

Cette espèce paraît habiter toutes les parties de la France.

*Obs.* Elle offre diverses variations. Ainsi, sous le rapport de la couleur, les antennes, le dessous du corps et les pieds sont entièrement noirs; d'autres fois les antennes sont brunes, quelquefois même avec la base moins obscure. Le labre et l'écusson varient du noir brun au flave testacé: le labre toutefois reste généralement plus obscur. Le dessous du corps varie du noir au brun sur la poitrine; du noir au brun testacé sur le ventre, avec les côtés plus pâles ou d'un testacé brunâtre chez les variétés moins obscures. Les pieds parfois noirs, sont plus ordinairement bruns ou d'un brun tirant sur le testacé: rarement la base des cuisses a quelque tendance à être d'un brun testacé.

Chez la ♀, le prothorax n'offre souvent qu'une fossette, dont le centre correspond au tiers de la longueur de la ligne médiane, et qui ne s'avance pas jusqu'au bord antérieur: cette fossette offre ordinai-

rement au moins les traces d'une raie transversale vers la moitié de sa longueur ; mais d'autres fois à partir de la moitié de cette fossette, se montre postérieurement comme chez la *L. atripes*, une dépression ou surface plane impointillée, elliptique, prolongée presque jusqu'au rebord basilaire. Les élytres, chez le même sexe, qui souvent offrent à peine des traces de stries, en ont quelquefois de plus sensibles et même montrent, quoique rarement, les troisième, cinquième et septième intervalles très-légèrement plus saillants. Ordinairement les stries et les intervalles sont plus réguliers chez le ♂.

Quoi qu'il en soit, cette espèce diffère de la *L. atripes* par une taille plus faible ; par la tête et le prothorax très-distinctement ponctués ; par ce dernier, non rayé d'une ligne longitudinale médiane ; par la fossette humérale plus courte.

Chez la ♀ de la *L. hirta* la dépression ou surface plane et impointillée du prothorax ne part ordinairement que de la moitié de la fossette, et dans tous les cas ne s'avance jamais jusqu'au rebord antérieur. Elle part toujours de celui-ci chez la *L. atripes*, et chez celle-ci la fossette ne semble qu'un signe accessoire.

Les ♂ et ♀ des Lagries en général, et de la *L. hirta* en particulier, diffèrent assez entre eux pour avoir pu être considérés, par les premiers Entomologistes, comme constituant deux espèces différentes. Mais en étudiant les ouvrages de Fabricius, on est naturellement embarrassé de savoir quel insecte il avait en vue, en décrivant dans son *Systema entomologiae*, la *L. pubescens*. Les expressions : *nigra*, *thorace marginato villosa*, *clytris glabris testaceis*, ne peuvent s'appliquer aux insectes de ce genre dont aucun n'a le prothorax rebordé. Evidemment ces paroles se rapportent à la *Chrysomela pubescens* de Linné, qui, suivant l'exemplaire typique conservé à Londres, est l'*Omophlus* auquel j'ai conservé son nom spécifique. L'auteur danois avait cependant, il est du moins vraisemblable, voulu décrire l'un des sexes de notre *L. hirta*, et par respect pour son illustre maître, il aura reproduit, à peu de chose près, la diagnose de la *Chrysomela pubescens* qu'il croyait identique avec la Lagrie qu'il avait sous les yeux. Dans ses voyages en Angleterre, il dut reconnaître son erreur, et il substitua, dans son *Entomologia systematica*, à la phrase précitée, celle-ci : *nigra, villosa thorace tereti : puncto medio impresso, clytris testaceis*, facilement applicable à une Lagrie.

Les Entomologistes ont généralement cru reconnaître dans cette description, le ♂ de notre *L. hirta*. Latreille seul, ainsi que je l'ai déjà

dit (1), a soupçonné y voir la ♀, et évidemment il a eu raison. Celle-ci, en effet, présente seule sur le prothorax cette fossette ou ce gros point enfoncé indiqué par l'Entomologiste de Kiel.

La larve de la *L. hirta* se trouve dans les bois ou dans les buissons, soit au pied des végétaux, soit sur leurs rameaux. On la fait parfois tomber en battant. Elle a été élevée par M. Ingpen (2). Lyonnet (3) la fit connaître pour la première fois. MM. Westwood (1), Perris (3), Guillebeau et moi (6) en avons aussi donné une description.

J'ai trouvé dans les environs de Fréjus une Lagrie qui peut être caractérisée ainsi :

***L. nudipennis.*** *Parcimonieusement pubescente sur la tête et le prothorax, à peu près glabre sur les élytres. Tête, antennes et poitrine, noires. Prothorax ponctué ; d'un noir brun, avec la base tirant sur le roux testacé. Ventre d'un brun testacé. Cuisses d'un brun noir, avec les deux cinquièmes basilaires d'un testacé translucide : tibias et tarses bruns ou d'un brun testacé. Elytres ruguleusement ponctuées ; à stries légères, non avancées jusqu'à la base ; offrant chez la ♀, vers les trois cinquièmes de leur longueur leur plus grande largeur. Cinquième à septième articles des antennes plus longs que larges : le dixième, moins long que large ; le onzième, égal aux deux précédents réunis (♀).*

♂. Inconnu.

♀. Tête ovale ; ponctuée. Antennes à troisième article plus long que le quatrième : les cinquième, sixième et huitième, d'un tiers ou de moitié plus longs qu'ils sont larges : le neuvième, à peine aussi long que large : le dixième, plus large que long : le onzième, égal

(1) Opuscul. Entomol. 6<sup>e</sup> cah. p. 40.

(2) WESTWOOD, *Introduct. to the mod. classific.* t. 1. p. 290.

(3) Mémoires du Muséum, t. 18. p. 417-420 pl. 22. fig. 17 à 19 — fig. 20 à 29 détails, — fig. 30, nymphe. — *Recherches sur l'anatomie et les métamorphoses de différentes espèces d'insectes*, ouvrage posthume du P. Lyonnet, publié par M. W. de Hahn, p. 112-114. pl. 11. mêmes figures.

(4) WESTWOOD, loc. cit. p. 290. pl. 32. fig. 25.

(5) PERRIS, Mém. de l'Acad. des sc. de Liège, t. 10. (1855) p. 253. pl. 64-72.

(6) Annales de la Soc. Linn. de Lyon, nouv. série t. 2. (1854-1855) p. 66. — E. MELSANT, Opuscules, 6<sup>e</sup> cah. p. 34.

aux deux précédents réunis. Yeux séparés l'un de l'autre, sur le front, par un espace égal à la longueur des deuxième, troisième et quatrième articles des antennes réunis. Prothorax moins long que large; à peine aussi large que la tête, un peu moins large qu'elle en devant; marqué d'une fossette, vers le tiers de sa ligne médiane; offrant, à partir de la moitié de cette fossette, une surface déprimée ou plane, impointillée, prolongée jusqu'au rebord basilaire; offrant, sur le tiers postérieur de sa longueur, les traces d'une raie longitudinale sur la ligne médiane. Elytres élargies en ligne presque droite jusqu'aux trois cinquièmes, en ogive postérieurement. Repli obtus ou peu anguleux à son bord interne, vers les hanches postérieures, trois fois environ aussi large vers ce point que vers l'extrémité du deuxième arceau ventral.

Long, 0,0078 (3 1/2 l.) Larg. des élytres à la base 0,0023 (1 l.) Plus grande largeur des élytres 0,0029 (1 1/3 l.)

♀. Corps suballongé; ponctué et hérissé de poils livides, peu épais, sur la tête et le prothorax. Tête et antennes noires. Prothorax noir ou d'un noir brun, avec le rebord basilaire d'un brun tirant sur le roux testacé; subcylindrique, un peu rétréci en devant et vers les trois cinquièmes. Elytres d'un flave testacé; glabres ou garnies seulement près du bord externe de poils livides peu nombreux; ruguleusement ponctuées; à faibles stries. Intervalles très-légèrement ou à peine saillants.

Elle a beaucoup d'analogie avec la *L. hirta*. Elle en diffère par son corps d'une forme différente, plus allongée ou moins large, offrant vers les trois cinquièmes de la longueur des élytres sa plus grande largeur; par son prothorax offrant une légère raie longitudinale sur le tiers postérieur de sa ligne médiane; par ses élytres à peu près glabres; par ses cuisses testacées ou d'un flave testacé brunâtre, mais translucide sur les deux cinquièmes basilaires de leur longueur.

Je ne la note ici que pour mémoire n'en ayant trouvé qu'un individu ♀.

J'ai vu dans la riche collection de M. Chevrolat deux exemplaires: l'un ♂, l'autre ♀, d'une Lagrie dont voici la diagnose:

**3. *L. depilis*.** Hérissée de poils livides et peu nombreux sur la tête et sur le prothorax, glabre sur les élytres. Noire ou brune, avec les élytres



d'un flave testacé. Tête et prothorax ponctués : celui-ci parfois d'un rouge brunâtre à la base et en devant. Elytres ruguleusement ponctuées ; marquées d'une fossette humérale ; à stries légères, parfois presque nulles ; offrant vers les trois cinquièmes de leur longueur leur plus grande largeur. Cinquième à dixième articles des antennes au moins aussi longs que larges, même chez la ♀ : le onzième, aussi long que les deux (♀) ou un peu plus long que les trois (♂) suivants réunis. Ventre souvent d'un testacé brunâtre sur les côtés.

♂. Corps allongé. Antennes à troisième article à peine aussi long que le quatrième : les cinquième à dixième articles presque égaux : les cinquième et sixième, plus distinctement ponctués : les septième à dixième, offrant une dent légère à l'extrémité de leur côté externe : le dixième, de moitié au moins plus long qu'il est large à l'extrémité : le onzième, un peu plus long que les trois ou presque aussi long que les quatre précédents réunis. Le reste comme chez le ♂ de la *L. hirta*.

♀. Corps allongé ou suballongé. Antennes à troisième article un peu plus long que le quatrième : les cinquième, sixième et neuvième, d'un quart ou d'un cinquième plus longs qu'ils sont larges à l'extrémité : les septième et huitième, à peine plus longs que ceux-ci : le dixième, un peu plus court que les précédents, mais au moins aussi long que large : le onzième, égal aux deux précédents réunis. Elytres élargies presque en ligne droite, jusqu'aux trois cinquièmes de leur longueur, en ogive à l'extrémité. Le reste, comme chez la *L. hirta* ♀.

*Lagria depilis*, CHEVROLAT, in Litter.

Long. 0,0078 à 0,0090 (3 1/2 à 4 l.) Largeur des élytres à la base 0,0025 (1 l.) Plus grande largeur des élytres 0,0035 0,0036 (1 1/2 à 1 2/3 l.)

Corps hérissé de poils livides, peu épais sur la tête, plus clair-semés sur le prothorax ; glabre sur les élytres ; noir sur la tête, les antennes et le prothorax : celui-ci, d'un rouge brun ou brunâtre à la base et en devant, chez la ♀. Elytres ruguleusement ponctuées. Dessous du corps noir ou brun sur la poitrine, brun ou d'un brun testacé sur le ventre, avec les côtés de celui-ci tirant davantage sur le testacé, ou d'un testacé roussâtre. Pieds noirs ou bruns.

Cette espèce a été trouvée dans le département du Cher.



Obs. Elle a quelque analogie avec la *L. hirta* ; mais elle en diffère non-seulement par ses élytres glabres, mais par une forme plus allongée, sensiblement moins élargie chez la ♀, et offrant vers les trois cinquièmes plutôt que vers les quatre septièmes leur plus grande largeur. Les élytres de la ♀ se rapprochent, par là, de la forme de celles du ♂. Elle s'éloigne encore de la précédente par les proportions des articles des antennes, le dixième article plus long que large chez la ♀, par le onzième, plus long que les trois précédents réunis, chez le ♂ ; sous ce rapport, elle se rapproche du ♂ de la *L. glabrata*, dont elle s'éloigne sous beaucoup d'autres rapports, et entre autres, sous ceux de la ponctuation et de la couleur des antennes et des pieds : le défaut de raie longitudinale sur le prothorax suffirait pour empêcher de la confondre avec la *L. atripes*. Malheureusement je n'ai vu que les deux individus précités, et l'on hésite toujours à admettre une espèce nouvelle, sur des représentants réduits à un chiffre si faible, quand l'espèce n'est pas très-caractérisée.

4. ***L. glabrata*** ; OLIVIER. Garnie en dessus de poils concolores, courts et souvent peu apparents chez la ♀. Tête et prothorax couverts de points profonds et contigus ; bruns (♂) ou d'un brun noir (♀). Elytres rugueusement ponctuées : d'un flave testacé et ordinairement sans traces de stries (♂), ou fauves et à stries légères (♀). Dessous du corps d'un brun rouge (♀) ou d'un brun testacé (♂). Base des cuisses testacée. Antennes d'un brun rouge (♀) ou d'un fauve testacé (♂) : quatrième à dixième articles un peu plus longs (♂) ou moins longs (♀) que larges : le onzième, moins long que les deux précédents réunis (♀), ou aussi long que les quatre précédents réunis (♂).

♂. Corps allongé. Tête subarrondie, plus large que longue. Antennes presque filiformes ou grossissant très-légèrement à partir du quatrième article : les quatrième à dixième, un peu plus longs que larges : le onzième, à peu près aussi long que les quatre précédents réunis. Yeux séparés l'un de l'autre, sur le front, dans leur point le plus rapproché, par un espace un peu plus grand que la longueur du troisième article des antennes ; séparés sous la tête par un espace un peu plus étroit ; séparés du bord postérieur de la tête par un espace égal environ au quart de la longueur du prothorax : ce dernier, à peu près aussi long qu'il est large ; sensiblement plus étroit en devant que la tête, à peu près aussi large qu'elle vers les deux cinquièmes de sa longueur ; sans fossette ni dépression, sur la ligne médiane ; offrant

ordinairement sur le tiers postérieur de celle-ci un ligne élevée. Elytres graduellement élargies jusqu'aux trois quarts de leur longueur, obtusément arrondies postérieurement, prises ensemble; très-médiocrement convexes. Repli à peine anguleux à son bord interne, vers les hanches postérieures; de moitié plus large dans ce point que vers le bord postérieur du deuxième arceau ventral.

♀. Corps ovulaire-oblong. Tête ovulaire, un peu plus longue que large. Antennes grossissant sensiblement à partir du troisième article: les quatrième à dixième moins longs que larges à leur extrémité: le onzième, un peu moins long que les deux précédents réunis. Yeux séparés l'un de l'autre, sur le front, par un espace à peu près égal à la longueur des troisième à cinquième articles des antennes réunis; séparés, sous la tête, par un espace à peine plus large; séparés du bord postérieur de la tête par un espace égal aux deux cinquièmes de la longueur du prothorax. Ce dernier, moins long que large; à peine aussi large en devant que la tête, un peu plus large qu'elle vers les deux cinquièmes de sa longueur; rayé, sur sa ligne médiane, d'une ligne ou d'un sillon léger, parfois peu marqué, non avancé jusqu'au bord antérieur, ordinairement élargi en fossette, un peu au devant de la base, ou marqué d'une fossette ponctiforme, près de cette dernière. Elytres ovales, offrant vers les trois cinquièmes leur plus grande largeur, en ogive postérieurement. Repli faiblement anguleux à son bord interne, vers les hanches postérieures; une fois plus large dans ce point que vers l'extrémité du deuxième arceau ventral.

*Lagria glabrata*, OLIV. Encycl. méth. t. 7. (1792) p. 446. 3. (♀). — *Id.* Entomol. t. 3. n° 49. p. 5. 5. pl. 1. fig. 3.

*Lagria tristis*, BONELLI, Specim. Faun. subalp. in Memor. d. Soc. di Agric. di Torin. t. 9. (1812) p. 172, 17. pl. 5. fig. 17.

Long. 0,0072 à 0,0090 (3 1/4 à 4 l.) Plus grande largeur des élytres 0,0025 à 0,0028 (1 1/8 à 1 1/4 l.) (♂) 0,0023 à 0,0033 (1 1/4 à 1 1/2 l.)

Corps garni en dessus de poils courts, couchés, fins, peu serrés, de la couleur du fond; paraissant souvent presque glabre chez la ♀ et sur le prothorax du ♂. Tête densément et fortement ponctuée; brune ou d'un brun noir; à pubescence mi-hérissée. Palpes noirs ou bruns. Antennes d'un brun rouge (♀) ou d'un rouge testacé ou d'un fauve testacé (♂); pubescentes. Prothorax un peu arqué à son bord antérieur; écointé à ses angles de devant, jusqu'au tiers ou aux deux cinquièmes de sa longueur, offrant dans ce point sa plus grande

largeur, subparallèle ensuite ou plutôt subsinué ou rétréci entre ce point et sa base; tronqué à cette dernière; offrant vers les deux tiers une dépression ou un léger sillon transverse; marqué de points grossiers et contigus; garni ou hérissé de poils peu épais ou clairsemés; brun de poix (♀) ou d'un brun noir (♂), avec le bord postérieur souvent d'un brun roussâtre, surtout chez le ♂. *Ecusson* en triangle subéquilatéral, de la couleur des élytres. *Elytres* quatre fois et demie (♀) à cinq fois et demie (♂) aussi longues que le prothorax; marquées d'une fossette humérale peu prolongée après le cales; rugueusement ponctuées, plus fortement chez le ♂; colorées comme il a été dit. *Dessous du corps* pointillé; rugueux; peu garni de poils; brun ou d'un brun rougeâtre (♀), brun ou d'un brun testacé (♂). *Pieds* bruns, avec les tarses et parfois une partie des tibiais moins obscurs, et le tiers basilaire au moins d'un testacé brunâtre (♀), ou testacés ou d'un flave testacé, avec les trois cinquièmes postérieurs des cuisses d'un brun de poix ou d'un brun testacé (♂).

Cette espèce, plus rare que les autres, se trouve dans les environs de Lyon, et surtout dans le midi de la France (1):

Oes. Elle est considérée dans toutes les collections comme étant la *L. glabrata* d'Olivier, et la figure donnée par cet écrivain correspond assez bien à celle de la ♀ de notre *glabrata*; mais les exemplaires que j'ai eus sous les yeux n'ont ni les élytres glabres, ni les antennes noires. Les élytres sont garnies de poils fins et couchés, souvent faiblement apparents. Quant aux antennes, leur couleur varierait-elle au point de passer au noir, de fauve ou de roux-testacé qu'elles sont habituellement, ou Olivier aurait-il eu sous les yeux une autre espèce? Dans tous les cas, le ♂ n'avait pas encore été décrit. Quant à la *L. glabrata* de Fabricius (Syst. entom. p. 125, 10) elle n'est vraisemblablement qu'un exemplaire dépillé et incomplètement coloré de la *L. hirta*. Le professeur de Kiel l'a lui-même rayée de son catalogue, et n'en fait plus mention, à partir de son *Entomologia systematica*.

Notre *L. glabrata* diffère de toutes les précédentes par sa tête et par son prothorax couverts de gros points contigus; par la couleur de ses antennes et de ses pieds, et ordinairement par celle du dessous du corps. La ♀ se distingue des autres par la brièveté des articles de ses antennes; par ses élytres plus foncées en couleur, et chagrinées;

(1) PERRIS, Lettre etc, in Mém. de l'Acad. des sc. de Lyon, t. 2. 1830 (cl. des sc. p. 472).

par son prothorax sans surface plane sur la ligne médiane, sans fossette vers le tiers de cette ligne. Le ♂ s'éloigne de la plupart des précédents par la longueur du dernier article de ses antennes.

## DEUXIÈME GROUPE.

### PYTHIDES.

**CARACTÈRES.** *Tête* engagée dans le prothorax. *Antennes* grossissant faiblement vers l'extrémité; insérées près de la base des mandibules qui sont saillantes. *Yeux* entiers, arrondis, saillants; situés sur les côtés de la tête. *Avant-dernier article de tous les tarses* grêle et non avancé sous le suivant en forme de sole. *Corps* presque plan, en dessus.

Genre *Pytho*, PYTHE; Latreille (1).

**CARACTÈRES.** Ajoutez à ceux du groupe : *tête* plus longue que large, offrant vers les yeux sa plus grande largeur. *Yeux* non contigus au bord postérieur de la tête. *Antennes* médiocres, de onze articles : le premier, renflé de la base à l'extrémité : le deuxième, près d'une fois plus court : le troisième, subfiliforme, le plus grand, ou au moins aussi long que le premier : les cinquième à septième, faiblement élargis de la base à l'extrémité; au moins aussi longs que larges : les neuvième et dixième, en forme de coupe, plus larges que longs : le onzième, une fois plus long que large, rétréci à partir de sa seconde moitié. *Mandibules* arquées; saillantes; bidentées à l'extrémité; armées d'une dent à leur côté interne. *Prothorax* subcordiforme. *Ecusson* apparent. *Elytres* offrant après le milieu leur plus grande largeur. *Repli* réduit à une tranche à partir des hanches postérieures. *Ventre* de cinq arceaux. *Pieds* assez allongés. *Premier article des tarses postérieurs* aussi long que tous les suivants réunis. *Labre* transverse. *Mâchoires* à deux lobes inégaux; ciliées. *Palpes maxillaires* allongés; subcomprimés; à deuxième article obconique, presque égal au quatrième : celui-ci, un peu élargi de la base à l'extrémité; un peu obliquement tronqué à cette dernière, à peine plus long que large. *Palpes labiaux* à dernier article le plus long, élargi de la base à l'extrémité. *Menton* en carré transverse. *Langue* échancrée. *Elytres* striées.

---

(1) Précis des caractères génériques des insectes, p. 23, genre 44.



Ce genre est réduit, en France, à l'espèce suivante.

1. **P. depressus**; LINN. *Allongé; glabre et presque plan, en dessus. Antennes, bouche, tibias et tarses au moins, d'un rouge testacé. Prothorax et poitrine noirs ou obscurs, au moins en partie. Elytres bleues, ou d'un rouge roux en partie. Ventre et cuisses, de couleur variable. Prothorax subcordiforme, rayé d'un sillon étroit sur la ligne médiane; creusé de chaque côté de celui-ci d'une fossette longitudinale arquée en dehors. Elytres à stries sulciformes et ponctuées, raccourcies en arrière et surtout en devant. Intervalles lisses, en arc.*

♂. Huitième article des antennes obconique, c'est-à-dire élargi en ligne droite d'arrière en avant, un peu plus long qu'il est large à l'extrémité: le onzième article terminé en pointe. Partie du sixième arceau ventral ordinairement apparente. Ventre ordinairement obscur.

♀. Huitième article des antennes cupiforme ou élargi en ligne courbe de la base à l'extrémité; moins long qu'il est large à cette dernière: le onzième article terminé en pointe obtuse. Ventre de cinq arceaux seulement; généralement d'un rouge roux.

ÉTAT NORMAL. Bouche, antennes, tibias et tarses, d'un rouge testacé: tête, prothorax, écusson, poitrine et cuisses, noirs: élytres d'un bleu ou d'un violet noir, d'un bleu d'acier ou d'un bleu foncé: ventre brun, ou avec les côtés et la partie postérieure souvent d'un rouge testacé, ordinairement entièrement de cette couleur chez la ♀.

*Tenebrio depressus*, LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 675. 11. — DE VILLERS, Éclairc. t. 1. p. 388. 8. — OLIV. Entom. t. 3. n° 57. p. 15. 19. pl. 2. fig. 18.

*Tenebrio lignarius*, DE GEER, Mem. t. 5. p. 38. 4. var. 1. pl. 2. fig. 15. — RETZ. Gener. p. 155. n° 855. — DE VILLERS, C. LINN. Entom. t. 1. p. 391. 30 et t. 4. p. 549. 30.

*Cucujus cæruleus*, HERBST, in FOESSLY'S Arch. 2<sup>e</sup> cah. (article *Cucujus*) p. 6. pl. 1. (de ce 2<sup>e</sup> cah. et 7<sup>e</sup> de l'ouvrage) fig. 5 et 6. — *Id.* 5<sup>e</sup> cah. p. 107. 2. — *Id.* trad. fr. p. 143. 2. pl. 7. fig. 5 et 6. — FABR. Mant. t. 1. p. 166. 3. (♀) — *Id.* Ent. Syst. t. 1. 2. p. 94. 4. (♀). — GUEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 1889. 6. — GYLLENH. in Nov. act. Soc. Upsal. t. 6. p. 131. 20. — OLIV. Encycl. méth. t. 6. p. 242. 4. pl. 369. 1. fig. 10, 11 et 12. — *Id.* Entom. t. 4. n° 74 bis p. 9. 11. pl. 1. fig. 11, a, b. — PANZ. Entom. germ. p. 207. 2. (♀) — KUGEL. Verzeich. in SCHNEIDER. N. Magaz. p. 570. 2. — PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 166. 2. (♂ ♀) — GOEZE, Faun. Europ. t. 8. p. 653. 1.

*Cucujus festivus*, FABR. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 93. 5. — PANZ. Entom. germ. p. 207. 3.



*Pytho cœruleus*, LATR. Précis des caract. p. 25, genre 44. — *Id.* Hist. nat. t. 10. p. 532. — *Id.* Gen. t. 2. p. 196. 1. — FABR. Syst. Eleuth. t. 2. p. 95. 1. — OLIV. Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 18. (1803) p. 595. — PANZ. Faun. germ. 95. 2. — *Id.* Index p. 147. 1. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 380. 1. — GOLDFUSS, Handb. p. 535. — DUMERIL, Dict. des sc. nat. t. 44. p. 212. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 238.

*Tenebrioplanus*, HERBST, Natus. t. 8. (Kaefer) (1799) p. 14. 37. pl. 117, fig. 4. (nommé par erreur au bas de la planche : *Tenebrio laevigatus*).

*Pytho festivus*, FABR. Syst. Eleuth. t. 2. p. 96. 2.

*Pytho depressus*, GYLLENH. Ins. succ. t. 2. p. 509. 1. (♂) et var. b (♀). — SAINT-FARGEAU et AUD SERVILLE, Encycl. méth. t. 10. p. 261. 1. — DUFTECH. Faun. austr. t. 2. p. 274. 1. — SCHONH. Syn. ins. t. 5. p. 85. 4. — ZETTERST. Faun. lapp. p. 278. 1. — *Id.* Ins. lapp. p. 160. 1. — GUÉPIN, Dict. classique d'Hist. nat. t. p. 398. — *Id.* Icono. p. 125. pl. 52. fig. 8 et 8, a. — SAULS. Ins. fenn. p. 444. 1. — L. REDTENS. Faun. austr. p. 607. — KUSTER, Kaefer. Europ. 23. 52. — GACOGNE, in ANN. de la Soc. Linn. de Lyon (1850-1852) p. 253.

*Variations de couleur (par excès).*

Obs. Quelquefois les jambes et les tarses sont obscurs.

*Cucujus cœruleus*, FABR. Entom. syst. t. 1. 2. p. 94. 4.

*Variations (par défaut).*

Obs. Quand la matière colorante a été moins abondante, le *prothorax* se montre d'un rouge testacé soit sur les bords, soit sur une partie plus ou moins considérable de sa surface; quelquefois le disque seul reste obscur; d'autres fois il est entièrement d'un roux testacé. Les *élytres* se modifient d'une manière plus remarquable; leur couleur bleue ou violette passe au brun, au brun testacé, ou même au rouge testacé, soit sur une partie, soit sur la totalité de leur surface, d'autres fois elle est irisée des teintes du cuivre ou de pourpre. Les cuisses, surtout les postérieures, perdent également leur couleur noire, chez ces variétés par défaut, pour passer au brun testacé ou même au rouge testacé.

A ces variétés diverses qui souvent offrent des modifications différentes suivant chaque individu, se rapportent les descriptions suivantes :

*Cucujus castaneus*, FABR. Entom. syst. t. 1. 2. p. 93. 6. — PANZ. Entom. germ. p. 207. 4,

*Pytho castaneus*, FABR. Syst. Eleuth. t. 2. p. 96. 3. — PANZ. Faun. germ. 95. 3. — *Id.* Index, p. 148. 2. — DUFTECH. Faun. austr. t. 2. p. 275. 2.

et les diverses variétés indiquées par De Geer, Olivier, Paykull, Gyllenhal, etc.

Long. 0,0100 à 0,0135 ( $\frac{1}{4}$  à  $\frac{1}{2}$  à 6 l.) Largeur des élytres à la base 0,0022 à 0,0033 (1 à 1  $\frac{1}{2}$  l.) plus grande largeur des élytres 0,0033 à 0,0045 (1  $\frac{1}{2}$  à 2 l.)

*Corps* suballongé ; à peu près glabre , et presque plan , en dessus. *Tête* oblongue ; peu penchée ; marquée de points médiocrement serrés ; notée de deux fossettes vers la partie antérieure du front ; noire : *labre* et *palpes* d'un roux testacé. *Antennes* de la même couleur ; faiblement pubescentes ; prolongées un peu au delà des angles postérieurs du prothorax. *Yeux* noirs. *Prothorax* à peine plus large en devant que la tête dans son diamètre transversal le plus grand ; subcordiforme, c'est-à-dire tronqué en devant et à la base ; élargi en ligne courbe jusqu'au tiers ou un peu moins , rétréci ensuite en ligne presque droite jusqu'aux angles postérieurs ; de moitié plus large en devant , un peu moins large en arrière , qu'il est long sur son milieu ; muni d'un rebord basilaire , sans rebord bien distinct sur les côtés ; à peu près plan : rayé d'une ligne ou d'un faible sillon longitudinal médiaire , souvent raccourci à ses extrémités ; noté , entre cette ligne et chaque bord latéral , d'une dépression en forme de parenthèse , arquée en dehors ; noir ; luisant ; finement ponctué. *Ecusson* presque en demi-cercle , ou en triangle à côtés curvilignes , et subarrondi à l'extrémité ; noir ou obscur ; impointillé. *Elytres* près d'une fois plus larges en devant que le prothorax à sa base ; quatre fois aussi longues que lui ; élargies en ligne presque droite jusque vers la moitié de leur longueur ; obtusément arrondies à l'extrémité , prises ensemble ; presque planes en dessus ; à neuf stries sulciformes , finement et irrégulièrement ponctuées , naissant vers le sixième antérieur de leur longueur , non prolongées jusqu'à l'extrémité ; ponctuées sur la partie antérieure non sillonnée ; intervalles élevés en forme de toit , presque impointillés : le troisième , un peu dirigé en dehors à son extrémité ; colorées comme il a été dit. *Repli* moins large en devant que les postépisternums , réduit à une tranche à partir des hanches postérieures. *Dessous du corps* noir ou brun , sur la poitrine , souvent d'une teinte rapprochée chez le ♂ , ordinairement roux testacé chez la ♀. *Postépisternums* allongés ; presque parallèles ou à peine rétrécis ; quatre ou cinq fois aussi longs qu'ils sont larges. *Pieds* allongés ; ordinairement noirs ou bruns sur les cuisses , d'un roux testacé sur les tibias et les tarses.

Cette espèce se trouve dans les parties froides ou élevées de la

France, principalement sur les frontières de la Suisse. Elle a été prise souvent dans les environs de Haguenau par M. Billot.

La larve de cet insecte a été décrite et figurée par De Geer <sup>(1)</sup>, par MM. Bouché <sup>(2)</sup> et Westwood <sup>(3)</sup>. En voici la description, d'après ces savants auteurs,

*Larve* hexapode ; allongée ; plate ; mince : presque parallèle ; revêtue d'une peau parcheminée ou presque cornée ; luisante. *Tête* suborbiculaire, plus longue que large ; peu penchée ; plate ; d'un jaune d'ocre ou d'un brun jaune <sup>(4)</sup>. *Labre* semi-orbiculaire, cilié. *Mandibules* épaisses ; arquées ; munies d'une dent basilaire. *Mâchoires* allongées ; arrondies à l'extrémité ; ciliées. *Palpes maxillaires* coniques ; de trois articles. *Langnette* arrondie à son bord antérieur. *Palpes labiaux* coniques ; de deux articles. *Antennes* courtes ; garnies de quelques poils ; de trois articles diminuant successivement de grosseur et de longueur : les deux premiers presque obconiques : le dernier grêle, aciculé. *Corps* composé de douze segments ; revêtu d'une peau parcheminée ou presque écailleuse, luisante, d'un jaune pâle, avec le bord postérieur des anneaux d'une teinte moins pâle ; hérissé de quelques poils obscurs ; marqué, près du bord antérieur des segments, ou du moins des onze premiers, d'une petite ligne transversale, en relief, interrompue dans son milieu : les deuxième à onzième, rayés en outre près de la ligne médiane, d'un trait longitudinal raccourci à ses extrémités : le premier segment ou le prothoracique, un peu plus long que les autres : le dernier ou anal, échanuré en croissant et concave à son extrémité, avec les angles postérieurs prolongés chacun en une pointe chargée de petits tubercules râpeux <sup>(5)</sup> : cet anneau, chargé également de tubercules semblables près de son bord postérieur. Entre les pointes,

(1) De Geer, Mémoires t. 5. p. 40-42. pl. 2. fig. 17 larve ; fig. 18 et 19, détails. (Latreille a reproduit cette description dans son Histoire naturelle, etc, t. 10, p. 529).

(2) Bouché, Naturg. p. 192-195. n° 21. pl. 9. fig. 15, larve ; fig. 14 à 19, détails.

(3) Westwood, Introd. t. 1. p. 289.

(4) Suivant M. Bouché, elle a une impression annuliforme, en dessus.

(5) Suivant M. Bouché, chacune de ces pointes aurait, vers la partie supérieure, deux dents : l'une près de la base, l'autre, près de l'extrémité, et vers la partie inférieure une autre dent vers le milieu de la longueur ; De Geer ne fait pas mention de ces dents.

se montre une petite cavité, dont les bords sont cornés, bruns et saillants. Au dessous de cette cavité, sur l'anus, l'espace est divisé en cinq sillons. L'*anus* est tuméfié, susceptible de contractions et de dilatations. Au dessous de celui-ci est un espace déprimé, presque quadrangulaire, chargé sur son milieu d'une ligne longitudinale élevée, entouré par de petites épines d'un rouge brun. *Pieds* dirigés en dehors; composés de quatre pièces: la hanche, assez grosse: la cuisse, cylindrique: la jambe, un peu plus courte, subconique: le tarse, court, armé d'un ongle simple. *Stigmates* au nombre de neuf paires: la première, près du bord antérieur du deuxième segment: les autres, sur les quatrième à onzième anneaux.

Long. 0,0225 à 0,0278 (10 à 12 l.) Larg. 0,0033 (1 1/2 l.)

Ces larves vivent sous les écorces des pins et des sapins morts ou abattus; leur corps agile et flexible est assez plat pour leur permettre de ramper sous les écorces mi-détachées ou pour s'y creuser des galeries en rongant les parties tendres, soit de celles-ci, soit de l'aubier.

*Nymphe* allongée; plate; d'un jaune pâle. *Tête* subtriangulaire; inclinée. *Yeux* noirs ou obscurs. *Antennes* couchées en dessous. *Prothorax* rebordé: sillonné sur le dos; garni dans son pourtour de poils spiniformes. *Meso* et *métathorax* presque carrés, très-distincts l'un de l'autre, revêtus d'une peau mince. *Anneaux de l'abdomen* presque en carré plus large que long; garnis de chaque côté de petites épines ou poils spiniformes jaunâtres à la base, d'un rouge brun à l'extrémité; ciliés à leur bord postérieur de poils spiniformes ou de petites épines d'un rouge brun: trois derniers segments graduellement rétrécis: le dernier, parallèle, une fois au moins plus large que long, échancré à l'extrémité.

Long. 0,0112 à 0,0135 (5 à 6 l.)

La nymphe reste ordinairement quinze jours à trois semaines avant de passer à l'état d'insecte parfait.

---

(1) Бовуэ, l. c. p. 493. pl. 9. fig. 21 et 22.

## TROISIÈME GROUPE.

## PYROCHROIDES.

CARACTÈRES. *Tête* séparée du prothorax, par une sorte de cou ou de nodule. *Antennes* dentées ou pectinées; insérées un peu au devant des yeux, dans un point correspondant à l'échancrure de ces organes. *Avant-dernier article de tous les tarses* élargi et avancé sous le suivant en forme de sole.

Ce groupe est réduit au genre suivant.

Genre *Pyrochroa*, PYROCHRE; Geoffroy.

(πυρόχρος, qui a la couleur du feu).

CARACTÈRES. Ajoutez à ceux du groupe : *Antennes* médiocres : de onze articles : le premier graduellement renflé vers l'extrémité : le deuxième, court : le troisième, obconique, à peine aussi long (♂) ou un peu plus long (♀) que le suivant : les quatrième à dixième, offrant à leur côté interne une dent graduellement plus prononcée du quatrième au dixième, surtout chez le ♂, quelquefois en éventail chez ce dernier sexe. *Yeux* obliquement transverses ; échancrés dans le milieu de leur bord antérieur ou antéro-interne ; séparés du bord postérieur de la tête par un espace notable. *Prothorax* presque en ovale transverse. *Ecusson* apparent. *Elytres* un peu flexibles ; offrant après le milieu de leur longueur leur plus grande largeur ; très-faiblement convexes. *Repli* réduit à une tranche à partir des hanches postérieures. *Manches intermédiaires* couchées longitudinalement, parallèles ; non séparées par un prosternum aussi saillant qu'elles. *Ventre* de cinq arceaux ; offrant parfois apparente une partie du sixième arceau. *Pieds* allongés ; grêles. *Ongles* simples. *Corps* suballongé. *Labre* transverse. *Mandibules* cornées, arquées, terminées en pointe. *Mâchoires* à deux lobes : l'externe ou supérieur, armé, au moins chez quelques espèces, d'une ou de deux dents presque cornées. *Palpes maxillaires* à deuxième article obconique, presque aussi long que le dernier, cilié au côté interne : le troisième, court : le quatrième, comprimé, en forme de coute. *Palpes labiaux* : dernier article comprimé, obtriangulaire. *Langue* membraneuse,



bilobée. *Prothorax* sans rebord sur les côtés; rebordé à la base. *Elytres* sans stries. *Premier article des tarses postérieurs* à peu près aussi long que tous les autres réunis.

Les larves des Pyrochres, grâce à leur corps déprimé et flexible et à leurs pieds dirigés en dehors à la manière de ceux des reptiles, peuvent ramper sous les écorces des arbres aux dépens desquels elles vivent. Elles sont vives et agiles. Les pointes râpeuses dont l'extrémité de leur corps est armée servent non-seulement à faciliter leurs mouvements progressifs, mais encore à élargir les galeries qu'elles pratiquent durant leur existence vermiforme.

α. Mésosternum non prolongé entre les hanches intermédiaires. Tête en triangle tronqué; plus large à ses angles postérieurs qu'aux yeux.

β. Tête et écusson noirs.

1. **♀. coccinea**; LINNÉ. Noire, avec le *prothorax*, les *élytres* et les côtés de l'*antépectus*, d'un rouge écarlate. *Prothorax* et *élytres* revêtus d'un duvet soyeux de leur couleur: le premier, presque en ovale transversal, muni d'un rebord basilaire graduellement moins étroit dans son milieu; rayé sur la ligne médiane d'un sillon étroit à peine élargi à son extrémité. Tête presque en triangle plus large à ses angles postérieurs qu'aux yeux.

♂. Front creusé d'une dépression tronquée en devant, arrondie postérieurement. Antennes plus longuement dentées: les dents des sixième à dixième articles allongées en filets subparallèles: le onzième, subparallèle ou sublinéaire. Ventre de six arceaux apparents: le cinquième, sillonné ou déprimé transversalement à sa base, échancré au milieu de son bord postérieur: le sixième, plus étroit, échancré au milieu de son bord postérieur.

♀. Front creusé d'une dépression transversale divisée parfois en deux sillons transversaux. Antennes moins longuement dentées: les dents des sixième à dixième articles graduellement rétrécies de la base à l'extrémité: le onzième, plus long, sublinéaire. Ventre n'offrant ordinairement que cinq arceaux apparents (le sixième, quand il se montre, d'une consistance plus faible, et d'une couleur moins foncée): le cinquième, non déprimé ou sillonné à la base, non échancré à son bord postérieur.

*Variations de couleur.*

Oes. La tête ordinairement entièrement noire en dessus et en dessous, montre quelquefois quelques-unes de ses parties d'un rouge ferrugineux ou testacé, ou d'un rouge obscur: le milieu du front, l'épistome, le labre et les mandibules, sont les plus sujets à offrir cette couleur.

*Cantharis coccinea*, LINN. Faun. suec. p. 202. 705. — MULLER, LINN. Natur. t. 3. p. 305. 18. — BARBET, Geuer. ins. pl. 6. fig. 4.

*Pyrochroa coccinea*, FABR. Syst. entom. p. 202. 1. — *Id.* Spec. ins. t. 1. p. 254. 1. — *Id.* Mant. t. 1. p. 162. 1. — *Id.* Entom. Syst. t. 2. p. 104. 1. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 108. 1. — HERBST Arch. p. 104. 1. — *Id.* trad. fr. p. 142. 1. — *Id.* Naturg. p. 141. 6. pl. 19. fig. 4. — SCHAEFF. Elem. pl. 106. — *Id.* Icon. pl. 90. fig. 4. — HARRER, Beschr. n° 227. — BECHSTEIN, Naturg. t. 1. 2 p. 866. 4. — ROSSI, Faun. elruss. mant. t. 1. p. 54. 154. — *Id.* ed. HELW. p. 386. 154. — PANZ. Faun. germ. 15. 11. — *Id.* Entom. germ. p. 210. 1. — *Id.* Index, p. 148. 1. — *Id.* Voet's Coleopt. t. 3, p. 66. pl. 23. fig. 12. — OLIV. Entom. t. 3. n° 53. p. 4. 1. pl. 1. fig. 1, a, b, c. — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 18. (1803) p. 591. — CUVIER, Tabl. élém. p. 545. — CEDERH. Faun. ingr. prodr. p. 71. 220. — PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 172. 1. — GOEZ. Faun. Eur. t. 8. p. 651. 4. — MARSH. Entom. brit. p. 364. 2. — WALCKEN. Faun. par. t. 1. p. 169. 1. — TICNY, Hist. nat. t. 7. p. 160. pl. fig. 2. — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 2. pl. 90. fig. 4. — ILLIG. Mag. t. 3. p. 176. 1. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 505. 1. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 68. 1. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 422. 2. — SAMOUELLE, The Entom. Usef. p. 56. 196. pl. 3. fig. 3. — SAINT-FARG. et A. SERVILLE, Encycl. méth. t. 10. p. 260. 1. — MULS. Lettr. t. 2. p. 295. 2. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 64. 2. — *Id.* Man. p. 340. 2667. — CURTIS, Brit. Entom. t. 13. 590. — SAHLB. Ins. fenn. p. 442. 1. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 260. 2. — L. DUF. Excurs. p. 71. 425. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 629. — GUÉRIN, Icon. du Règn. anim. de Cuvier, p. 129 pl. 54. fig. 3, a, b, c, détails. — KUSTER, Kaef. Europ. 49.

*Pyrochroa rubra*, DE GEER, Mem. t. 5, p. 20. 1. — RETZ, Gen. p. 155. 819.

*Pyrochroa purpurata*, SCHRANK, Edum. p. 175. 525. — *Id.* Faun. boic. t. 1. p. 698. — *Id.* Entom. Bemerk. in Naturf. t. 24. (1789) p. 78. 59. — DE VILLERS, C. LINN. Entom. t. 1. p. 288. 1. pl. 2. fig. 55. et t. 4. p. 518.

*Lampyris (Pyrochroa) coccinea*, GUEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 1886. 18. — BRAUN, Ins. Kal. t. 1. p. 149. 486.

Long. 0,0146 à 0,0157 (6 1/2 à 7 l.) Larg. 0,0059 à 0,0045 (1 5/4 à 2 l.) à la base des élytres. 0,0056 à 0,0070 (2 1/2 à 3 1/8 l.) dans la partie la plus large des élytres.

Corps suballongé; presque plan ou plutôt très-peu convexe. Tête presque en triangle tronqué en devant; plus large à ses angles postérieurs qu'à la partie la plus saillante des yeux; finement

ponctuée sur le front, un peu moins finement sur l'épistomie ; creusée sur le front d'un sillon transversal (♀) ou d'une impression (♂) ; noire ; garnie de poils de même couleur. *Palpes* noirs. *Yeux* bruns. *Antennes* prolongées environ jusqu'à la moitié du corps (♀) ou un peu plus longuement (♂) ; brièvement pubescentes ; noires, avec le dernier article roussâtre ou d'un roux testacé à son extrémité ; dentées en scie à partir du troisième article et graduellement ensuite d'une manière plus longue. *Cou* noir. *Prothorax* en ovale transversal, près d'une fois plus large que long, c'est-à-dire, arqué en devant, arrondi sur les côtés ; tronqué à la base et muni d'un rebord graduellement moins étroit dans son milieu, d'un tiers moins long que le segment prothoracique dans son diamètre transversal le plus grand ; rayé d'un sillon au devant de ce rebord ; sans rebord en devant et sur les côtés, ou parfois étroitement et légèrement relevé en rebord à ceux-ci ; presque plan ; rayé sur la ligne médiane d'un sillon longitudinal étroit, prolongé jusqu'au sillon antébasilaire et à peine triangulairement élargi vers ce dernier ; d'un rouge écarlate ; revêtu d'un duvet fin et soyeux de même couleur. *Ecusson* en triangle obtus ou subarrondi à l'extrémité ; noir ; pubescent. *Elytres* d'un quart plus larges en devant que le prothorax vers la moitié de ses côtés ; cinq fois environ aussi longues que lui ; élargies jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de leur longueur ; subarrondies chacune à l'extrémité, mais plus brièvement à l'angle sutural qu'au côté externe ; peu convexes ; sans stries ; d'un rouge écarlate ; revêtues d'un duvet fin et soyeux de même couleur. *Repli* réduit à peu près à une tranche, à partir du premier arceau ventral. *Ailes* obscures. *Dessous du corps* noir, avec les côtés de l'antépectus bordé de rouge ; pointillé ; garni d'un duvet noir, peu épais. *Mésosternum* non prolongé entre les hanches intermédiaires. *Pieds* noirs ; pubescents. *Ongles* au moins en partie d'un rouge fauve.

Cette espèce habite les parties froides ou alpines de la France. Elle n'est pas rare à la Chartreuse, de juin au milieu de juillet.

Obs. Linné la décrit dans sa *Fauna suecica* (1761) sous le nom de *Cantharis coccinea*, et la caractérisa de la manière suivante : *nigra thorace clytrisque sanguineis*. Dans son *Systema Naturæ* (1767), il ajouta : *clytris striatis*. Peut-être cet illustre père de la science a-t-il voulu dire : *clytris non striatis*. L'insecte typique n'existe plus dans la collection précieuse dont la Société Linnéenne de Londres est en possession ; mais à en juger par la collection

de Banks, conservée par la même compagnie, et surtout d'après les Mémoires du baron de Geer, qui avait procuré à Linné l'insecte d'après lequel avait été décrite sa *Cantharis coccinea*, il est hors de doute qu'elle n'est autre que notre *P. coccinea*.

Ahrens a fait connaître les premiers états de cet insecte, dans la Revue entomologique de Silbermann, (t. 1 p. 247 à 250, et pl. 14 fig. 1, larve — 2 et 3, nymphe — 4, insecte parfait — 5 à 9, détails). Un peu plus tard, M. L. Dufour, avec le talent qui lui est particulier, a publié un travail plus intéressant et complet sur les métamorphoses et l'anatomie du même insecte, (Annal. des sc. nat. 2<sup>e</sup> série t. 13 (1840), p. 321-343 pl. 5, fig. 1, larve; — fig. 4, détails; — fig. 2 et 3, nymphe; — fig. 5 à 8, détails anatomiques de la larve).

La larve vit sous les écorces des chênes, des frênes et de diverses autres sortes d'arbres. Je l'ai trouvée souvent à la Grande-Chartreuse; en voici la description :

*Larve* hexapode; allongée; déprimée, mince, presque plate en dessus; revêtue d'une peau parcheminée ou presque écailleuse. *Tête* subtriangulaire; presque horizontale ou peu penchée; tronquée ou à peine échancrée à son bord postérieur; nettement limitée avec le premier anneau du corps; presque plane en dessus; d'un roux testacé; marquée d'une raie blanchâtre, naissant du milieu de son bord postérieur; bifurquée en avant. *Epistome* tronqué en avant. *Labre* transverse; arrondi, trilobé et cilié en avant. *Mandibules* robustes; d'un roux testacé à la base, noires à l'extrémité; terminées par trois dents. *Mâchoires* à un seul lobe, à peine élargi de la base à l'extrémité, obtusément arrondi à celle-ci, garni de soies raides et d'un crochet corné. *Palpes maxillaires* subfiliformes; de trois articles: le premier un peu plus épais, à peu près de la grandeur du deuxième: le troisième, un peu plus court, conique. *Lèvre* suballongée: ciliée à son extrémité. *Palpes labiaux* de deux articles; insérés de chaque côté de la lèvre, un peu plus courts que celle-ci. *Antennes* au moins aussi longues ou plus longues que la tête; garnies de poils fins et peu épais; d'un roux testacé; de quatre articles: le basilaire, très-court: le deuxième, subcylindrique, un peu plus long que le troisième: celui-ci grossissant à peine de la base à l'extrémité: le quatrième, grêle, légèrement fusiforme, à peine moins long que le troisième. *Corps* allongé; déprimé; presque plan en dessus et en dessous: de douze anneaux; hérissé sur les côtés de quelques poils peu épais; plus corné et



d'un roux testacé sur les trois segments thoraciques et sur les deux derniers, ordinairement plus pâle, d'un flave roux ou d'un flave blanchâtre sur les septième à dixième; rayé d'une ligne médiane parfois raccourcie à ses extrémités, sur chaque anneau: les trois premiers marqués de chaque côté de cette ligne, de deux fossettes ponctiformes, disposées sur la même ligne longitudinale: le premier ou prothoracique, presque en carré une fois plus large que long; un peu moins large que la tête; tronqué en devant, à peine rétréci et en ligne presque droite sur les côtés, émoussé aux angles postérieurs: les deuxième et troisième presque en forme de cœur tronqué et dirigé en arrière; d'un quart plus longs chacun que le premier: les septième à dixième, les plus courts, plus de trois fois aussi larges qu'ils sont longs, égaux entre eux, marqués chacun, plus près du sillon médiaire que du bord latéral, d'une ligne raccourcie en devant et en arrière, et, près des côtés, d'une ligne ou impression arquée en dehors et souvent divisée en deux: onzième segment deux fois et demie aussi long que chacun des sept anneaux précédents; lisse, luisant; rayé de chaque côté du sillon médiaire, d'une ligne longitudinale, un peu obliquement dirigée d'avant en arrière de dehors en dedans, interrompue vers le tiers ou les deux cinquièmes antérieurs de sa longueur: dernier segment à peine aussi long sur son milieu que le tiers du segment précédent; échaneré dans le milieu de son bord postérieur et prolongé à chacun des côtés de celui-ci en une sorte de pointe une fois plus longue, un peu divergente, un peu relevée, chagrinée sur sa surface: ce dernier segment émoussé en dessous dans son milieu. *Dessous du corps* à peu près de la couleur du dessus. *Pieds* dirigés en dehors; de quatre articles: la hanche, en forme de bourrelet, presque confondue avec le corps: la cuisse, subconique: la jambe, subcylindrique: le tarse, très-court, terminé par un ongle robuste, plus long que lui, médiocrement arqué, terminé en pointe. *Stigmates* au nombre de neuf paires situées sur la partie inférieure des bords latéraux: la première paire, plus grande, placée près du bord antérieur du deuxième anneau: les autres sur les quatrième à onzième segments.

Long. 0,0225 à 0,0270 (10 à 12 l.) Larg. 0,0035 à 0,0039 (1 1/2 à 1 5/4 l.)

*Nymphe* allongée; rapprochée par sa forme de celle des Longicornes; garnie de chaque côté de la ligne médiane et sur les bords latéraux de la plupart des segments du corps, de poils spinosules. *Tête*



infléchie, voilée par le segment prothoracique. *Antennes* filiformes ou peu distinctement denticulées, dirigées en arrière sur les côtés du corps, puis contournées en dessus. *Prothorax* arqué à son bord antérieur, tronqué en arrière. *Elytres* et *ailes* repliées en dessous. *Avant-dernier anneau du corps* entaillé dans le milieu de ses bords latéraux : le dernier, divisé en deux pièces rétrécies d'avant en arrière et terminées par une pointe cornée; muni en dessous de deux petits appendices. *Pieds* offrant les cuisses et les jambes anguleusement dirigées en dehors et les tarses allongés parallèlement à la ligne médiane.

L'insecte parfait paraît ordinairement une quinzaine de jours après la transformation de la larve en nymphe :

♀♀. Tête et écusson rouges ou d'une teinte rapprochée.

2. **P. satrapa** ; SCHRAMM. D'un rouge presque écarlate et revêtu d'un duvet de même couleur sur la tête, le cou, le prothorax, l'écusson et les élytres ; dessous du corps et pieds, noirs : dessous de la tête et côtés de l'antépectus, jusqu'aux hanches, rouges. *Prothorax* presque en carré ou en ovale transversal ; muni d'un rebord basilaire anguleusement avancé dans son milieu ; rayé sur la ligne médiane d'un sillon étroit, triangulairement élargi à son extrémité. Tête presque en triangle, un peu plus large aux angles postérieurs qu'aux yeux.

♂. Front creusé d'une dépression tronquée en devant, arrondie postérieurement : troisième et quatrième articles des antennes en dents de scie ; le sixième en dent allongée : les septième à dixième en filets subparallèles : le onzième plus long, sublinéaire. Ventre de six arceaux distincts : le cinquième, creusé à sa base ou sur la partie médiane de celle-ci d'un sillon transversal, échancré en arc à son extrémité : le sixième ; entaillé à son extrémité.

♀. Front creusé d'un large sillon transversal, ou parfois de deux sillons transversaux. Troisième à sixième articles des antennes en forme de dent simple : les septième à neuvième en dents de scie : le dixième, en dent allongée : le onzième, plus long, sublinéaire. Ventre de cinq arceaux, ou n'offrant que rarement une partie du sixième arceau : le cinquième, sans sillon transversal à sa base ; arrondi et sans échancrure à son extrémité.

*La Cardinale*, GEOFF. Hist. abr. t. 1. p. 358. 1.

*Cantharis serraticornis*, SCOPOL. Entom. carn. p. 42. 155.

*Pyrochroa coccinea*, var. FABR. Syst. entomol. p. 202. 1.

*Pyrochroa purpurata*, MÜLLER, Zool. Dan. prodr. p. 80. 872.

*Pyrochroa satrapa*, SCHRANK. Enumer. p. 174. 324. — *Id.* Faun. boic. t. 1. p. 698.

990. — HERBST, Arch. p. 104. 5. — DE VILLERS, C. LINN. Entom. t. 1. p. 289-2. — *Id.* t. 4. p. 319.

*Lampyris rubens*, SCHALLER, Neue Insekt. in Abhandl. de hall. Naturf. Gesellsch. t. 1. p. 301. — Gmel. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 1086. 35.

*Pyrochroa ruberrima*, FOURCER. Ent. paris. t. 1. p. 155. 1.

*Pyrochroa rubens*, FABR. Entom. Syst. t. 1. 2. p. 105. 2. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 109. 2. — PANZ. Ent. germ. p. 210. 2. — *Id.* Faun. germ. 95. 5. — *Id.* Index, p. 148. 2. — *Id.* VOET's Coleopt. t. 4. p. 113. 1. pl. 48. fig. 1. — HERBST, Arch. trad. fr. p. 142. 2. — OLIV. Entom. t. 3. n° 53. p. 4. 2. pl. 1. fig. 2, a, b. — *Id.* Nouv. Dict. d'Hist. nat. t. 18. (1805) p. 591. — STURM, Verz. (1796) p. 64. 15. pl. 2. fig. 2. — MARSH. Ent. brit. p. 365. 1. — DOXOV. Brit. ins. t. 2. pl. 56. fig. 1. — WALCK. Faun. par. t. 1. p. 170. 2. — TICNY, Hist. nat. t. 7. p. 160. — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 361. 3. — *Id.* Gen. t. 2. p. 205. 1. — *Id.* Regn. anim. t. 3. (1817) p. 512. — ILLIG. Mag. t. 5. p. 176. 2. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 507. 2. — SCHÖNH. Syn. ins. t. 3. p. 69. 2. — LAMARCK, Anim. s. vert. t. 4. p. 422. 1. — GOLDFUSS, Handb. p. 550. — SAINT-FARGEAU et AUDINET SERVILLE, Ency. méth. t. 10. p. 260. 2. — DUMÉRIL, Dict. des sc. nat. t. 44. p. 166. 2. — WESTWOOD, Introd. p. 287. pl. 32. fig. 8 à 10 détails. — MULS. Lettr. t. 2. p. 294. 1. — STEPH. Illustr. t. 5. p. 65. 1. — *Id.* Man. p. 340, 2666. — CURTIS, Brit. entomol. t. 13. 590. — SAULS. Ins. fenn. p. 445. 2. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 260. 1. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 629. — KEST. Kaef. Europ. t. 48.

Long. 0,0100 à 0,0135 (4 1/2 à 6 l.) Largeur des élytres à la base à 0,0033 0 0045 (1 1/2 à 2 l.) Plus grande largeur des élytres 0,0045 à 0,0057 (2 à 2 1/2 l.)

*Corps* suballongé ; très-peu convexe. *Tête* presque en triangle tronqué en devant ; un peu plus large à ses angles postérieurs qu'à la partie la plus saillante des yeux ; finement ponctuée ; creusée sur le front d'un sillon transversal (♀) ou d'une impression (♂) ; d'un rouge roux ; garnie de poils fins, soyeux, de même couleur. *Palpes* et *extrémité des mandibules*, noirs. *Yeux* bruns. *Antennes* prolongées environ jusqu'à la moitié de la longueur du corps (♀) ou un peu plus longuement (♂) ; peu pubescentes ; noires ; dentées à partir du troisième article, et plus longuement ensuite sur les suivants. *Cou* court ; d'un rouge roux. *Prothorax* presque en carré transversal ou presque en ovale transversal ; de deux tiers au moins plus large qu'il est long, c'est-à-dire faiblement arqué en devant, obtusément arrondi sur les côtés, tronqué à la base, et muni à cette dernière

d'un rebord anguleusement avancé dans son milieu ; d'un tiers ou de deux cinquièmes moins large que le segment prothoracique dans son diamètre transversal le plus grand ; rayé d'un sillon au devant de ce rebord ; sans rebord en devant et sur les côtés ; presque plan ; rayé sur la ligne médiane d'un sillon postérieurement divisé en deux branches ou constituant une fossette triangulaire ; d'un rouge roux , d'un rouge roux testacé ou d'un rouge presque écarlate ; garni d'un duvet fin et soyeux de même couleur. *Ecusson* en triangle très-obtus ou subarrondi ; d'un rouge presque écarlate , garni d'une pubescence concolore. *Elytres* d'un quart plus larges en devant que le prothorax vers la moitié de ses côtés ; quatre fois et demie environ aussi longues que lui ; élargies jusqu'aux deux tiers ou trois quarts de leur longueur ; obtusément arrondies à l'extrémité (prises ensemble), avec l'angle sutural subarrondi ou très-émoussé ; peu convexes ; sans stries ; d'un rouge presque écarlate , plus clair que le prothorax ; revêtues d'un duvet soyeux et fin de même couleur. *Repli* réduit à peu près à une tranche , à partir du premier arceau ventral. *Ailes* nébuleuses ou obscures. *Dessous du corps* d'un rouge presque écarlate sur la partie inférieure de la tête et sur les côtés de l'antépectus , jusqu'aux hanches ; noir sur le reste ; pointillé ; garni d'un duvet peu épais , de même couleur que les diverses parties. *Mésosternum* non prolongé entre les hanches. *Pieds* noirs ; pubescents. *Ongles* au moins en partie d'un rouge fauve.

Cette espèce habite la plupart des parties chaudes ou tempérées de la France. Elle n'est pas rare au printemps dans les environs de Lyon.

Obs. Elle est facile à distinguer de la précédente par la couleur rouge du dessus et du dessous de la tête , du cou , des côtés de l'antépectus jusqu'aux hanches , et de l'écusson ; par le sillon de la ligne médiane du prothorax , bifurqué ou triangulairement dilaté à son extrémité ; par les différences que présentent les antennes , surtout chez les ♂.

Geoffroy la fit connaître le premier. Scopoli la décrivit ensuite sous le nom de *Cantharis serraticornis*, dénomination plus convenable à la ♀ qu'au ♂. Schrank ( 1781 ), la remplaça parmi les Pyrochres , rappela la description de Geoffroy , et le premier en décrivant l'espèce précédente , ainsi que celle-ci , signala les caractères servant à les distinguer l'une et l'autre. Herbst et De Villers contribuèrent encore à rendre plus évidentes les distinctions entre ces deux espèces , en conservant à celle-ci le nom de *satrapa* que lui avait donné le naturaliste autrichien.

Deux ans après Schrank, en 1783, Schaller décrivit la *P. satrapa* comme un insecte nouveau, sous le nom de *Lampyrus rubens*.

Fabricius, dans ses premiers écrits, avait considéré l'espèce qui nous occupe comme une variété de la *P. coccinea*. Dans son *Entomologia systematica*, tout en l'admettant au nombre des espèces, il ajoutait : elle est peu distincte de la précédente, et n'en est peut-être qu'une variété sexuelle. L'illustre professeur, en adoptant le nom spécifique donné par Schaller, a entraîné sur ses pas tous les écrivains postérieurs. Il est juste aujourd'hui de rendre à Schrank la justice qui lui est due.

La larve de la *P. satrapa* vit, comme celle de la précédente, aux dépens des vieux arbres ; elle n'est pas très-rare dans les environs de Lyon. Elle a beaucoup d'analogie avec celle de la *P. coccinea*. Schrank (Faun. boic. t. 1, p. 699) l'avait soupçonnée lignivore. Elle a été signalée par St. Fargeau et M. Aud. Serville (Encyclop. méth. t. 10, pag. 266), si toutefois c'est bien elle, dont ces derniers ont ébauché la description. Elle a été décrite un peu plus tard et figurée par M. Westwood, (Introd. to the mod. classific.) 1839 (t. 1. p. 288, pl. 32, fig. 11 et fig. 12 dernier anneau).

xx. Mésosternum linéairement prolongé entre les hanches intermédiaires. Tête presque orbiculaire, moins large à ses angles postérieurs qu'aux yeux.

3. *P. pectinicornis* ; LINNÉ. Noire, avec le prothorax, les élytres et les côtés de l'antépectus, jusqu'aux hanches, d'un roux testacé. Prothorax et élytres revêtus d'un duvet soyeux de leur couleur : le premier, presque en ovale transversal, rétréci d'une manière sinuée sur son tiers postérieur ; muni d'un rebord basilaire uniforme ; rayé sur la ligne médiane d'une raie, transformée sur sa seconde moitié en fossette triangulaire noirâtre : les élytres à trois sillons longitudinaux irréguliers. Tête subarrondie, moins large à ses angles postérieurs qu'aux yeux.

♂. Front offrant à peine les traces d'un sillon transversal. Antennes ornées à chacun des troisième à dixième articles d'un prolongement linéaire, grêle, naissant au côté antéro-interne de chacun de ces articles : celui du troisième une fois au moins plus long que lui : les autres, graduellement plus longs : le onzième moins grêle, filiforme, le plus long. Ventre de six arceaux : le sixième étroit, petit, entaillé à son bord postérieur ; le cinquième à peine marqué à la base d'un sillon transversal ; échancré au milieu de son bord postérieur.



♀. Front creusé d'un sillon transversal. Antennes offrant le troisième article en dent simple : les quatrième à sixième en dents de scie : les septième à dixième en dents allongées : le onzième, plus long, subfiliforme. Ventre de cinq arceaux apparents seulement : le cinquième, non sillonné transversalement à sa base, arrondi et non échancré à son bord postérieur.

*Cantharis pectinicornis*, LINN. Syst. Nat. (1758) p. 405. 26. — *Id.* (1767) t. 1. p. 560. 20. — *Id.* Faun. suec. p. 204. 715.

*Pyrochroa pectinicornis*, FABR. Mant. t. 1. p. 162. 3. — *Id.* Ent. Syst. t. 1. 2. p. 103. 4. — *Id.* Syst. Eleuth. t. 2. p. 109. 4. — PANZ. Faun. germ. 13. 12. — *Id.* Ent. germ. p. 210. 3. — *Id.* Index p. 148. 3. — OLIV. Entom. t. 3. n° 53. p. 5. 4. pl. 1. fig. 4, a, b. — *Id.* Nouv. Dict. d'His. nat. t. 18. (1803) p. 591. — PAYK. Faun. suec. t. 2. p. 173. 2. — TIGNY. Hist. nat. t. 7. p. 161. — LATR. Hist. nat. t. 10. p. 361. 2. — GYLLENH. Ins. suec. t. 2. p. 507. 3. — SCHONH. Syn. ins. t. 3. p. 69. 4. — S. FARGEAU et A. SERVILLE, Encycl. méth. t. 10. p. 260. 3. — DUMERIL, Dict. des sc. nat. t. 44. p. 166. 3. — ZETTERST. Faun. lapp. p. 277. 1. — *Id.* Ins. lapp. p. 160. 1. — SAHLB. Ins. fenn. p. 443. 3. — DE CASTELN. Hist. nat. t. 2. p. 260. 3. — L. REDTENB. Faun. austr. p. 629. — KUSTER, Kaef. Europ. 7. 48.

*Pyrochroa rubra*, ♂ DE GEER Mem. t. 5. p. 22.

*Lampyrus pectinicornis*, GMEL. C. LINN. Syst. Nat. t. 1. p. 1886. 34.

Long. 0,0084 à 0,0095. (3 3/4 à 4 1/4 l.) Largeur des élytres à la base 0,0022 à 0,0025 (1 à 1 1/3 l.) Plus grande largeur des élytres 0,0033 à 0,0036 (1 1/2 à 1 2/3 l.)

Corps suballongé; très-peu convexe. Tête suborbiculaire, moins large aux angles postérieurs qu'aux yeux; inégale; offrant, au côté interne de chaque œil, un sillon plus profond postérieurement; pubescente; pointillée; noire, avec le labre et les mandibules d'un rouge brun ou brunâtre et parfois le milieu du front d'un brun rouge ou d'un brun roux ou hérissé de poils roussâtres. Palpes maxillaires allongés, noirs. Yeux noirs; saillants. Antennes prolongées jusqu'à la moitié du corps (♂) ou un peu moins; pubescentes; noires; dentées (♀) ou pectinées (♂) à partir du troisième article. Cou noir. Prothorax presque en ovale transversal; bissinueusement arqué à son bord antérieur; obtusément arrondi sur les côtés jusqu'aux deux tiers de sa longueur, rétréci ensuite d'une manière sinuée; tronqué à la base, et muni à cette dernière d'un rebord uniforme, d'un quart ou presque d'un tiers moins large que ce segment thoracique dans son diamètre transversal le plus grand; rayé d'un sillon au devant de ce rebord; sans rebord en devant et sur les côtés; de deux tiers environ plus large dans son milieu qu'il est long; peu convexe; inégal, marqué



vers chaque cinquième externe de sa surface, d'une dépression ou d'un sillon longitudinal raccourci à ses extrémités; rayé, sur la ligne médiane, d'un sillon transformé en fossette triangulaire, sur la seconde moitié; pointillé; d'un rouge roux, hérissé ou garni de poils fins et soyeux de même couleur; noir ou brun sur la fossette de la ligne médiane. *Ecusson* arrondi postérieurement; noir; ponctué. *Elytres* d'un quart au moins plus larges en avant que le prothorax vers la moitié de ses côtés; près de quatre fois aussi longues que lui; arrondies chacune à l'extrémité, mais brièvement à l'angle sutural; peu convexes; à trois sortes de sillons longitudinaux, irréguliers: l'un près de la suture; l'autre, naissant du dessus de l'épaule: le troisième près du bord externe: ces sillons les faisant paraître relevées à la suture et chargées chacune de deux autres espèces de carènes longitudinales plus ou moins prononcées: l'une, sur le milieu de la largeur: l'autre, entre celle-ci et le bord externe; pointillées; d'un rouge roux; garnies d'un duvet de même couleur, soyeux, fin et couché. *Repli* réduit à l'état de tranche à partir de l'extrémité des postépisternums. *Ailes* obscures. *Dessous du corps* pointillé; garni d'un duvet court et peu épais; d'un rouge roux, sur les côtés de l'antépectus, jusqu'aux hanches, noir, luisant sur le reste. *Mésosternum* linéairement prolongé entre les hanches. *Pieds* noirs; pubescents. *Ongles* d'un rouge testacé.

Cette espèce est rare en France. Elle en habite les parties les plus froides. On la trouve à la Grande-Chartreuse à la fin de mai ou dans la première quinzaine de juin, c'est-à-dire au premier printemps de ces lieux élevés.



Obs. Elle se distingue facilement des deux espèces précédentes par sa tête suborbiculaire; par sa taille plus petite; par son prothorax sinueusement rétréci sur le tiers postérieur de ses côtés; par le troisième article des palpes maxillaires moins court, non triangulaire, etc.

La larve qu'ont fait connaître MM. Chapuis et Chandèze <sup>(1)</sup> diffère de celle de la *P. coccinea* par son prothorax plus étroit, plus régulièrement quadrangulaire; par son mésothorax sans étranglement à sa partie antérieure, aussi large dans ce point que la partie antérieure du premier segment: par le huitième segment abdo-

(1) Catalogue des Larves des Coléoptères p. 186. pl. 7. fig. 4.

minal moins grand , égal au plus aux deux précédents réunis ; surtout par le dernier segment offrant le bord antérieur de sa plaque dorsale coupé carrément , au lieu de présenter une concavité ; par ses angles latéraux moins prononcés , et par les deux prolongements postérieurs plus longs , plus grêles , fortement arqués et à convexité tournée en dehors.





*Barbipalpus*

*Barbipalpus*

*Barbipalpus*

*Barbipalpus*

## EXPLICATION DE LA PLANCHE I.



---

- Fig. 1. Antenne de *Tetratoma (fungorum)*.  
2. Hanches antérieures des Orchésiens (*Orchesia micans*).  
3. Hanches antérieures des Serropalpiens (*Anisoxya tenuis*).  
4. Tête des Orchésiens et des Serropalpiens (*Orchesia micans*).  
5. Tête des Mélandryens (*Hypulus quercinus*).  
6. Tibia et tarse postérieurs des *Orchesia* (*Orchesia micans*).  
7. Tibia et tarse postérieurs des *Hallomenus* (*Hall. humeralis*).  
8. Tibia intermédiaire des *Anisoxya* (*Anisoxya tenuis*).  
9. Palpe maxillaire de l'*Anisoxya tenuis*.  
10. Palpe maxillaire du *Dircæa lævigata*.  
11. Palpe maxillaire du *Phloiötuya Vaudoueri*.  
12. Palpe maxillaire du *Serropalpus striatus*.  
13. Antenne du *Conopalpus Vigorsii*.  
14. Ongle de l'*Osphya præusta*.
-









*Longipèdes*

*Longipèdes*

*Longipèdes*

*Longipèdes*

## EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

---

- Fig. 1. Poitrine et premier arceau ventral des Mordelliens (*Tomoxia*).  
2. Poitrine et premier arceau ventral des Anaspiens (*A. frontalis*).  
3. Poitrine et premier arceau ventral des Scraptiens (*Scraptia fusca*).  
4. Postépisternum de la *Mordella aculeata*.  
5. Postépisternum de la *Mordellistena abdominalis*.  
6. Postépisternum de la *Mordellistena*.....?  
7. Postépisternum de la *Stenaria testacea*.  
8. Dernier article des antennes de la *Tomoxia bucephala*.  
9. Ecusson de la *Tomoxia bucephala*.  
10. Ecusson de la *Mordella fasciata*.  
11. Ongle de la *Tomoxia bucephala*.  
12. Tibia et deux premiers articles des tarses postérieurs de la *Mordellistena inæqualis*.  
13. Tibia et deux premiers articles des tarses postérieurs de la *Mordellistena subtruncata*.  
14. Tibia et tarse postérieurs de la *Stenaria testacea*.  
15. Tibia et tarse postérieurs de l'*Anaspis frontalis*.  
16. Les trois derniers articles des tarses antérieurs de l'*Anaspis frontalis*.  
17. Les trois derniers articles des tarses antérieurs de la *Pentaria sericaria*.  
18. Les deux derniers arceaux du ventre de l'*Anaspis frontalis* ♂.  
19. Repli des élytres des *Anaspis*.  
20. Repli des élytres des *Silaria*.  
21. Tibia et tarse postérieurs des *Scraptia* (*Scr. fusca*).

Genre *Pygidiphorus*, PYGIDIPHORE.

CARACTÈRES. Ajoutez à ceux de la famille des Ulomiens (1) :

*Antennes* à peine prolongées au-delà de la moitié des côtés du prothorax ; de onze articles : le premier un peu renflé, plus long que le troisième : le deuxième court : le troisième, plus long que le suivant : les quatrième et cinquième égaux, obconiques ; les sixième à onzième comprimés, plus larges, constituant une sorte de massue : les sixième à dixième, en ovale transverse, un peu dentés surtout au côté interne : le onzième, ovalaire. *Epistome* constituant avec les joues une sorte de chaperon en demi-cercle, voilant sur les côtés la base des antennes, laissant le labre à découvert. *Labre* transverse. *Mandibules* cornées ; débordant un peu ce dernier ; paraissant entières à leur extrémité. *Palpes maxillaires* courts ; à dernier article conique. *Menton* élargi d'avant en arrière ; tronqué en devant ; plus large que long. *Yeux* transverses ; à grosses facettes ; entamés par la tranche des joues ; séparés sur le front par un espace à peu près double du diamètre transversal de l'un d'eux ; très-rapprochés sous la tête. *Prothorax* plus large que long ; en ligne droite à la base. *Elytres* laissant le pygidium à découvert. *Repli* prolongé presque jusqu'à l'angle sutural. *Mésosternum* sillonné sur toute sa longueur. *Postépisternums* allongés ; rétrécis d'avant en arrière. *Ventre* offrant les trois premiers arceaux presque soudés ; le quatrième de moitié plus court que le troisième. *Pieds* médiocres. *Hanches antérieures* un peu en ovale oblique ; séparées par un prosternum aussi saillant qu'elles, un peu élargi en fer de lance après elles. *Cuisses* comprimées ; les postérieures un peu renflées. *Jambes antérieures* triangulairement élargies de la base à l'extrémité ; denticulées sur leur tranche externe : celle-ci de même longueur que l'interne. *Tarses* filiformes : premier article des postérieurs à peu près égal aux deux suivants réunis, égal environ au quatrième. *Corps* ovalaire ; très-médiocrement convexe.

Ce genre semble faire le passage des *Alphitobius* aux *Cataphronetis*.

---

(1) Hist. nat. des Coléoptères de France (LATIGÈNES) p. 227.



**1. P. Caroli.** *Ovale oblong; très-médiocrement convexe; glabre; luisant; pointillé en dessus; noir ou d'un noir brun, avec la base des antennes d'un rouge testacé. Prothorax faiblement échancré en avant; élargi en ligne un peu courbe jusqu'au tiers, puis en ligne droite jusqu'aux angles postérieurs. Elytres à neuf stries légères et ponctuées en avant, graduellement profondes et imponctuées postérieurement. Intervalles plans en avant, convexes postérieurement: les quatrième et sixième ordinairement plus courts à l'extrémité. Dessous du corps et pieds d'un noir brun: le premier garni sur les côtés de points tuberculeux; les seconds armés de petites épines aux jambes et aux tarses.*

Long 0,0067 (31). Larg. 0,0033 (1 1/2 l.).

*Corps ovale-oblong; très-médiocrement convexe; glabre; noir ou d'un noir brun, luisant. Tête pointillée; transversalement déprimée sur la suture frontale. Labre cilié en avant. Antennes d'un rouge testacé sur les six premiers articles, d'un brun gris sur les autres. Prothorax faiblement échancré en arc en avant; à angles antérieurs vifs; élargi en ligne courbe jusqu'au tiers, puis moins sensiblement en ligne droite jusqu'aux angles postérieurs; coupé en ligne à peu près droite à la base; très-étroitement rebordé à cette dernière et sur les côtés; de moitié environ plus large à son bord postérieur qu'il est long sur son milieu; médiocrement convexe; noir ou noir brun; lisse, presque impointillé surtout sur le disque. Ecusson en triangle plus large que long; à côtés un peu curvilignes et légèrement subsinués près de l'extrémité; noir brun, avec les bords souvent translucides d'un rouge testacé. Elytres un peu plus larges en avant que le prothorax à ses angles postérieurs; trois fois et quart environ aussi longues que lui; ovalaires; faiblement élargies dans leur milieu, obtusément arrondies à l'extrémité, et laissant à découvert le pygidium; rebordées; très-médiocrement convexes; noires ou d'un noir brun; lisses, luisantes; superficiellement pointillées; chacune à neuf stries légères et finement ponctuées en avant, graduellement profondes postérieurement: la sixième, ordinairement incurbée vers la cinquième à sa partie antérieure et souvent liée à elle: la huitième, raccourcie en avant. Intervalles plans en avant, graduellement convexes postérieurement: les quatrième et sixième ordinairement un peu plus courts postérieurement: les cinquième et septième habituellement unis à leur extrémité posté-*


rieure. *Repli* prolongé presque jusqu'à l'angle sutural. *Pygidium* une fois plus large que long; obtusément arrondi; d'un noir brun; finement pointillé. *Dessous du corps* d'un noir brun; glabre; chargé sur les côtés de petits points tuberculeux, ponctué sur les parties plus voisines de la ligne médiane. *Prosternum* lisse; parallèle entre les hanches, en fer de lance après elles. *Mésosternum* creusé d'un sillon en forme de V et rebordé. *Postépisternums* rétrécis d'avant en arrière, terminés en pointe; quatre ou cinq fois aussi longs qu'ils sont larges dans leur milieu. *Pieds* d'un noir brun: cuisses marquées d'assez gros points, garnies postérieurement de poils spinosules assez courts d'un livide flavescent: jambes râpeuses: les antérieures élargies en forme de triangle de la base à l'extrémité, denticulées sur leur tranche externe, subarrondies à leur angle antéro-interne: les suivantes, armées de petites épines d'un livide flavescent: tarses munis de poils spinosules et de petites épines semblables.

Cette espèce a été prise dans les environs de Bordeaux par M. Charles Perroud, à qui l'Entomologie doit bien d'autres découvertes. Puisse le nom attaché à cet insecte rappeler le souvenir des services rendus à la science par ce savant et zélé naturaliste!

---

*Errata.* — Avant le mot ALPHITOBUS du tableau de la page 228, au lieu de: arête transverse, mettez: arête externe.





2

asbestaria



P. Milliere del

Dejean sculp

*Andalua asbestaria* Kell

# HISTOIRE DES MÉTAMORPHOSES

DE

## L'ACIDALIA ASBESTARIA <sup>(1)</sup>, KOLL.

PAR

M. PIERRE MILLIÈRE.

(Lue à la Société Linnéenne de Lyon, le 11 août 1856).

---

L'insecte que j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui à la Société Linnéenne a été récemment découvert en Hongrie ; peu de temps après il fut décrit par Kollar, naturaliste allemand ; il n'est donc pas étonnant que M. le docteur Boisduval , dans son *Index methodicus*, et , plus récemment , M. Duponchel dans son *Histoire naturelle des Lépidoptères d'Europe*, n'aient pas fait mention de cette Géomètre. Je dirai même que les entomologistes en général s'entendent assez peu sur l'identité de cette espèce. Ses caractères nébuleux et peu tranchés, la simplicité de sa parure et la petitesse de sa taille, prêtent à la confusion. Le vague et l'incertain que présente cette Phalénide dans ce qui la distingue, explique comment on soit resté si longtemps avant de reconnaître en elle une espèce. Sans nul doute elle a été recueillie depuis plusieurs années déjà ; mais on a dû , par les raisons que je viens de dire, la confondre avec une de ses congénères. Si *Asbestaria* avait été connue de Duponchel, bien certainement cet auteur l'eût placée dans la division C de ses

---

(<sup>1</sup>) Couleur d'asbeste ou amiant.



*Acidalia* et dans le voisinage de son *Albularia*, Bvl et de sa *Candidaria*, H. Ce Lépidoptère est fort peu connu, je le répète ; mais ses premiers états, j'en ai la certitude, n'ont point encore été publiés. Comme j'ai suivi sa larve dans toutes les phases de sa vie, je puis fournir quelques détails sur ses habitudes et sur ses mœurs. C'est dans l'espérance d'être agréable à MM. mes collègues, que je viens les leur faire connaître.

Pendant l'été de 1854, je pris pour la première fois aux environs de Lyon, l'*Acidalia Asbestaria* à l'état d'insecte parfait. Mon attention ayant été appelée sur cette rare Phalénide, je retournai l'année suivante au même lieu, et la pris de nouveau. En juillet 1856 enfin, j'en capturai une douzaine d'exemplaires appartenant aux deux sexes. Chaque fois je vis cette *Acidalia* dans des conditions analogues à la première, c'est-à-dire qu'elle volait toujours dans les fourrés de bois de chêne les plus obscurs. Son vol me paraissait lourd, craintif et inexpérimenté ; au repos elle se plaçait constamment sur le revers d'une feuille, dans le but, sans doute, d'échapper aux regards de ses ennemis, comme aussi pour se soustraire à la lumière du soleil qu'elle semblait fuir obstinément.

Le dimanche premier juillet 1855 j'obtins une ponte d'une *Asbestaria* prise dans un bois que traverse le ruisseau de Francheville, situé à cinq ou six kilomètres de Lyon. Pendant les trois ou quatre premiers jours, les œufs pondus qui étaient légèrement comprimés et oblongs, me parurent d'un gris verdâtre. Le quatrième jour, il se forma au centre de l'œuf, un point noir très-prononcé. Soixante heures après, ces œufs passèrent au rouge brun ; puis, la veille de l'éclosion, c'est-à-dire le neuvième jour qui avait suivi leur ponte, ils devinrent d'un brun noirâtre. La jeune larve au sortir de l'œuf m'a paru d'un jaune clair ; elle était de plus cerclée de six anneaux bruns des plus caractéristiques, qu'elle a conservés jusqu'à son troisième changement de peau.

De toutes les plantes qui furent présentées à cette larve, c'est le pissenlit commun (*Leontodon taraxacum*, LIN.) qu'elle a préféré, bien cependant qu'elle ait mangé de plusieurs Composées, de plusieurs Rumex, Graminées et autres plantes basses.

Les habitudes de cette chenille polyphage, ainsi que je vais le rapporter, sont des plus singulières. Souvent, fixée par les pattes anales à une feuille ou à une des parois du vase qui la renfermait, on la voyait, le corps ployé en demi-cercle, demeurer des journées entières dans cette attitude qui paraissait des plus pénibles. D'autres fois, toujours retenue par les pattes inférieures, elle projetait en avant les neuf dixièmes de son corps grêle et effilé, et restait ainsi pendant quarante-huit heures et plus, sans s'être dérangée, sans avoir fait un seul mouvement. Cette position bizarre et qui paraissait forcée, bien qu'habituelle à la plupart des larves de Géomètres, ne m'a semblé, chez aucune d'elles, se prolonger aussi longtemps que chez la chenille d'*Asbestaria*. C'est dans cet état que l'insecte dont il est question, ressemblait à s'y tromper à un fragment de plante desséchée, ou mieux, à une petite branche de bois mort. Par suite de cette constante immobilité, je n'ai jamais pu savoir à quelle heure du jour ou de la nuit cette chenille rongait les feuilles qui lui servaient de nourriture. Sa croissance étant relativement fort lente, on explique qu'elle doit manger rarement et très-peu à la fois. Le bruit ne l'effrayait pas, ainsi que j'ai été souvent à même de l'observer sur un grand nombre de chenilles : il ne produisait sur celle d'*Asbestaria* pas le plus petit mouvement de contraction. Cette immobilité, cette privation de vie apparente, cette indifférence, si je puis m'exprimer ainsi, n'était pas aussi absolue chez ce petit être qu'on serait tenté de le croire. En effet, ces larves, bien qu'arrivées à toute leur grosseur, affectaient toujours de se rapprocher (¹).

---

(¹) La plupart des chenilles devenues fortes, cessent de vivre en famille et se séparent pour ne plus se réunir.

Sans cesse je les ai vues rassemblées dans un espace resserré : c'était le plus souvent sous une large feuille. S'il m'arrivait de les éloigner les unes des autres, j'étais certain de les retrouver le lendemain réunies de nouveau. Ce n'est qu'après son troisième changement de peau que cette chenille prend une livrée toute différente de celles qu'elle a eues précédemment, à tel point qu'on ne reconnaîtrait jamais sous ce nouvel état l'insecte revêtu de ses premières parures. Sa croissance, ainsi que je l'ai dit, s'opère très-lentement ; ce qui m'en a donné la preuve, c'est qu'après avoir obtenu en juin l'insecte *ab ovo*, il ne s'est transformé en nymphe que l'année d'après. Parvenu à toute sa grosseur vers le 10 du mois d'avril, il cessa alors complètement de manger pendant six ou huit jours ; le 17 du même mois, il se retira dans un coin du vase, rassembla quelques légers brins de mousse, les réunit par des fils de soie brunâtre, et forma un réseau qui ayant l'apparence d'un tulle grossier, permettait de voir tous les mouvements de l'insecte qui l'habitait. Deux jours après avoir tissé cette toile si fragile, si peu propre à le préserver des dangers auxquels il serait exposé s'il devait l'habiter longtemps <sup>(1)</sup>, deux jours après, dis-je, l'insecte rongeur se plaça sur le dos en se contournant quelque peu, et, vingt-quatre heures après, il s'est transformé en nymphe qui, à quinze jours de là, m'a donné son insecte parfait très-bien développé.

---

(1) L'admirable loi providentielle qui dirige si sagement, pour leur conservation tous les êtres créés, commande aux larves de l'ordre des Lépidoptères qui doivent demeurer un temps plus ou moins long en chrysalide, de former une coque solide, impénétrable à l'humidité et inattaquable à la dent de leurs nombreux ennemis, tandis que celles qui ne resteront que fort peu de jours en nymphe, ne construisent qu'une enveloppe légère et qui n'a pas la moindre solidité, parce que tout en la formant, elles savent combien doit être court leur état léthargique, avant de renaître brillantes et parées à la lumière.

## LARVE.

Cette chenille a dix pattes, dont six antérieures et quatre postérieures. Arrivée à toute sa grosseur, elle a de vingt-six à vingt-huit millimètres de long. Elle est allongée, presque cylindrique, légèrement aplatie depuis le troisième anneau jusqu'au neuvième, s'amincissant à partir de celui-ci jusqu'à la tête. Cette larve est recouverte, sur plusieurs parties du corps, de tubercules pilifères visibles seulement à la loupe; elle varie beaucoup pour la teinte qui, chez quelques individus, passe au rouge brun des plus prononcés. Le type serait d'un rougeâtre obscur; la tête qui est globuleuse et relativement assez petite, est de couleur brunâtre. La troisième paire de pattes antérieures est plus allongée que les deux premières; ces six pattes, ainsi que la tête, sont recouvertes d'une villosité plus abondante. Les trois derniers anneaux sensiblement plus forts que les autres supportent des poils courts et spinuliformes. Sur le fond d'un brun plus ou moins prononcé, se détache de chaque côté du corps la ligne dite stygmatale qui, plus claire que le fond, ondule dans sa plus grande longueur et vient aboutir à la naissance de l'avant-dernière paire de pattes; cette ligne ou bande qui ondule davantage à mesure qu'elle approche des derniers anneaux, s'élargit fortement sur le huitième, et prend à cet endroit une teinte blanchâtre très prononcée; le dernier anneau est marqué de chaque côté de deux traits jaunâtres fins qui viennent aboutir en se réunissant à un gros point brun situé au centre du neuvième anneau. A partir du septième jusqu'au dixième anneau les stygmatales se soupçonnent plutôt qu'ils ne se voient à l'œil nu; examinés à la loupe, ils se reconnaissent très-bien et se montrent alors sous forme de très-petits points noirs cerclés de blanc; ces organes de la respiration sont placés en dessous de la ligne stygmatale. La région dorsale est d'un rougeâtre plus clair; chez quelques sujets cette



couleur tourne au vert foncé. Avec le secours de la loupe cette partie du corps nous montre deux traits bruns très-fins qui se suivent parallèlement sur toute la longueur de l'animal ; chaque anneau vu de dos nous laisse voir une sorte de V couché qui reçoit à son ouverture deux points bruns séparés l'un de l'autre par le double trait dont il vient d'être question. Le dessous du corps est blanc grisâtre dans sa plus grande longueur ; cette couleur s'affaiblit et prend une teinte verdâtre en se rapprochant de la tête. Les pattes antérieures sont d'un brun clair , les postérieures sont beaucoup plus obscures.

#### NYPHE.

La chrysalide qui d'abord est d'une couleur jaune pâle, acquiert au bout de peu de temps une teinte beaucoup plus foncée : quatre jours après sa formation elle devient d'un brun vineux obscur ; elle est alors très-luisante. Cette nymphe qui a, en moyenne, dix millimètres de long, est de forme cylindrico-conique ; l'enveloppe des ailes et du dos , d'un vert foncé , laisse très-bien distinguer les nervures des ailes. L'extrémité de la chrysalide se termine par deux pointes très-fines placées à côté l'une de l'autre. Les stygmates qui se détachent en plus clair, s'aperçoivent très-bien.

#### INSECTE PARFAIT.

Envergure 23 à 24 millimètres.

Les quatre ailes, d'un blanc verdâtre très-luisant , sont traversées par cinq lignes légèrement ondulées ; chez la plupart des individus les quatre premières de ces lignes ou bandes , sont géménées dans toute leur longueur , sauf pourtant celle qui se rapproche le plus de la naissance de l'aile ; cette dernière bande n'arrive pas comme les autres jusqu'au bord supérieur et n'atteint



que la nervure médiane; cette ligne forme alors un crochet dont la pointe se dirige du côté de la naissance de l'aile. Les bandes transversales d'un gris assez peu prononcé, tranchent faiblement sur le fond. La surface des quatre ailes est recouverte d'un sablé très-fin visible seulement à la loupe. Entre la première et la seconde ligne se voit sur les quatre ailes, le point discoïdal; ce caractère essentiel quoique faiblement accusé, est constant chez tous les individus. La naissance des ailes antérieures est lavée d'une teinte fuligineuse d'autant plus prononcée, que la lumière frappe plus obliquement cette partie de l'insecte. La première ligne des ailes inférieures paraît oblitérée; c'est tout au moins ce que j'ai remarqué chez tous les sujets que j'ai été à même d'examiner. La frange qui est de la couleur des ailes, est précédée d'une série de petits croissants noirs à peine visibles, dont les pointes sont tournées en dehors, chacune d'elles est surmontée d'un très-petit point visible seulement à la loupe.

Le dessous des quatre ailes est également d'un blanc verdâtre; mais le nombre des lignes transverses est réduit: il n'en paraît que deux sur chaque aile; ces lignes sont, ainsi que le point discoïdal et la série de croissants qui précède la frange, beaucoup plus accusés qu'aux ailes supérieures.

La tête, le corselet, les antennes et les pattes, rappellent la couleur du fond.

Je ferai observer en terminant, qu'il est peu de Géomètres qui varient autant pour la forme et la disposition des lignes: sur dix-huit ou vingt exemplaires d'*Asbestaria* que j'ai été à même de comparer, je n'en ai pas vu deux absolument semblables.

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

---

N<sup>o</sup> 1 Chenille d'*Asbestaria*, jeune.

— 2 id. id. adulte.

— 3 Nymphe.

— 4 Insecte parfait grossi.

— 5 Anneaux du milieu vus de dos.

---

TABLEAU MÉTHODIQUE  
DES  
COLÉOPTÈRES BARBIPALPES  
DE FRANCE.

---

PREMIÈRE FAMILLE. **TÉTRATOMIENS.**

TETRATOMA, Fabricius.

Fungorum, *Fabricius*.

Desmarestii, *Latreille*.

Ancora, *Fabricius*.

DEUXIÈME FAMILLE. **ORCHÉSIENS.**

PREMIÈRE BRANCHE. **Orchésiaires.**

EUSTROPHUS, (Illiger) Latreille.

Dermestoides, *Fabricius*.

ORCHESIA, Latreille.

Micans, *Panzer*.

Sepicola, *Rosenhauer*.

Fasciata, *Paykull*.

DEUXIÈME BRANCHE. **Malloménaires.**

HALLOMENUS, (Helwig) Panzer.

Humeralis, *Panzer*.

TROISIÈME FAMILLE. **SERROPALPIENS.**

PREMIÈRE BRANCHE. **Diréciaires.**

ANISOXYA, Mulsant.

Tenuis, *Rosenhauer*.

ABDERA, Stephens.

Triguttata, *Gyllenhal*.

Scutellaris, *Mulsant*.

Quadrifasciata, *Curtis*.

Griseo-guttata, *Fairmaire*.

Bifasciata, *Marsham*.

DRYALA, Mulsant.

Fusca, *Gyllenhal*.

CARIDA, Mulsant.

Affinis, *Paykull.*

Flexuosa, *Paykull.*

DIRCAEA, Fabricius.

Quadriguttata, *Paykull.*

Laevigata, *Hellenius.*

#### DEUXIÈME BRANCHE. **Serropalpaire.**

PHLOIOTRYA, Stephens.

Rufipes, *Gyllenhal.*

Vaudoucri, (*Latreille*).

SERROPALPUS, Hellenius.

Striatus, *Hellenius.*

#### QUATRIÈME FAMILLE. **MELANDRYENS.**

ZILORA, Mulsant.

Ferruginca, *Paykull.*

HYPULUS, Paykull.

Quercinus, *Paykull.*

Bifasciatus, *Fabricius.*

MAROLIA, Mulsant.

Variegata, *Bosc.*

MELANDRYA, Fabricius.

Caraboides, *Linné.*

{ Canaliculata, *Fabricius.*

{ Var ? Diversa, *Mulsant.*

Flavicornis, *Dufschmidt.*

#### CINQUIÈME FAMILLE. **MYCETOMIENS.**

MYCETOMA, (Dejean).

Suturale, *Panzer.*

#### SIXIÈME FAMILLE. **CONOPALPIENS.**

CONOPALPUS, Gyllenhal.

Testaceus, *Olivier.*

Vigorsii, *Stephens.*

#### SEPTIÈME FAMILLE. **OSPHYENS.**

OSPHYA, Illiger.

Bipunctata, *Fabricius.*

---

# TABLE DES BARBIPALPES

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

<b>ABDERA.</b>	239
<i>bifasciata.</i>	243-249
<i>griseo-guttata.</i>	246
<i>quadrifasciata.</i>	243
<i>scutellaris.</i>	242
<i>triguttata.</i>	240
<b>ANASPIS</b>	
<i>clavicornis.</i>	224
<b>ANISOXYA.</b>	257
<i>tenuis.</i>	257
<b>CANTHARIS</b>	
<i>barbata.</i>	274
<i>bipunctata.</i>	302
<b>CARIDA.</b>	253
<i>affinis.</i>	253
<i>flexuosa.</i>	256
<b>CHRYSOMELA</b>	
<i>caraboides.</i>	287
<b>CONOPALPIENS.</b>	297
<b>CONOPALPUS.</b>	297
<i>collaris.</i>	299
<i>flavicollis.</i>	298
<i>ruficollis.</i>	293
<i>testaceus.</i>	298
<i>Vigorsii.</i>	299
<b>DERMESTES</b>	
<i>piceus.</i>	224
<b>DINOPHORUS</b>	
<i>axillaris.</i>	251
<i>humeralis.</i>	253
<b>DIRCAEA</b>	259
<i>barbata.</i>	274
<i>bifasciata.</i>	282
<i>discolor.</i>	264
<i>dubia.</i>	280
<i>flexuosa.</i>	256
<i>ferruginea.</i>	277
<i>grisea-guttata.</i>	246
<i>humeralis.</i>	235

<i>laevigata.</i>	263-264
<i>micans.</i>	221
<i>Parreyssii.</i>	266
<i>quadriguttata.</i>	260
<i>quercina.</i>	280
<i>rufipes.</i>	268
<i>serrata.</i>	287
<i>suturalis.</i>	296
<i>tenuis.</i>	257
<i>triguttata.</i>	240
<i>undata.</i>	246
<i>undulata.</i>	246
<i>variegata.</i>	284
<b>DIRCÉAIRES.</b>	256
<b>DIRCÉATES.</b>	258
<b>DRYALA.</b>	230
<i>fusca.</i>	251
<b>DRYALATES.</b>	238
<b>DRYOPS.</b>	
<i>bipunctata.</i>	302
<i>clavipes.</i>	502
<i>suturalis.</i>	296
<b>ELATER.</b>	
<i>bleckingensis.</i>	279
<i>quercinus.</i>	279
<b>ELATEROÏDES.</b>	
<i>boleti.</i>	233
<b>EUSTROPHUS.</b>	220
<i>dermestoides.</i>	221
<b>HALLOMÉNAIRES.</b>	232
<b>HALLOMENUS.</b>	252
<i>affinis.</i>	284
<i>bifasciatus.</i>	282
<i>fasciatus.</i>	223
<i>flexuosus.</i>	156
<i>fuscus.</i>	231
<i>humeralis.</i>	232-233
<i>micans.</i>	226



<i>quercinus</i> . . . . .	280	<b>MORDELLA.</b>	
<i>undatus</i> . . . . .	256	<i> barbata</i> . . . . .	274
<b>HALLOMINUS.</b>		<i> bifasciata</i> . . . . .	249
<i> bipunctatus</i> . . . . .	253-251	<i> boleti</i> . . . . .	224
<i> flexuosus</i> . . . . .	256	<i> humeralis</i> . . . . .	255
<i> humeralis</i> . . . . .	253	<i> picea</i> . . . . .	251
<i> micans</i> . . . . .	224	<b>MYCETOMA.</b>	295
<b>HELLENIA</b>		<i> suturale</i> . . . . .	295
<i> Vigorsii</i> . . . . .	299	<b>MYCÉTOMIENS</b>	295
<b>HELOPS</b>		<b>MYCETOPHAGUS</b>	
<i> canaliculatus</i> . . . . .	290	<i> dermestoides</i> . . . . .	221
<i> fasciatus</i> . . . . .	279-282	<b>NOTHUS</b>	
<i> serratus</i> . . . . .	287	<i> anceps</i> . . . . .	302
<b>HYPULUS</b>	279	<i> bimaculatus</i> . . . . .	302
<i> bifasciatus</i> . . . . .	282	<i> bipunctatus</i> . . . . .	302
<i> biflexuosus</i> . . . . .	249	<i> clavipes</i> . . . . .	302
<i> dubius</i> . . . . .	280	<i> praeustus</i> . . . . .	302
<i> quadrifasciatus</i> . . . . .	243	<b>NOTOXUS</b>	
<i> quadriguttatus</i> . . . . .	260	<i> bifasciatus</i> . . . . .	282
<i> quercinus</i> . . . . .	279	<i> dubius</i> . . . . .	279
<b>IPS</b>		<b>ORCHESIA</b>	222
<i> elateroides</i> . . . . .	253	<i> fasciata</i> . . . . .	227
<b>LYMEXYLON</b>		<i> fasciata</i> . . . . .	230
<i> barbatum</i> . . . . .	274	<i> grandicollis</i> . . . . .	231
<i> laevigatum</i> . . . . .	265	<i> micans</i> . . . . .	225-224
<b>MAROLIA</b>	284	<i> sepicola</i> . . . . .	226
<i> variegata</i> . . . . .	284	<i> undulata</i> . . . . .	230
<b>MEGATOMA</b>		<b>ORCHÉSIAIRES.</b>	219
<i> picea</i> . . . . .	224	<b>ORCHÉSIENS.</b>	219
<b>MELANDRYA</b>	286	<b>OSPHYA.</b>	300
<i> barbata</i> . . . . .	295	<i> bipunctata</i> . . . . .	301
<i> canaliculata</i> . . . . .	290	<i> bipunctata.</i> . . . . .	302
<i> caraboides</i> . . . . .	287	<i> praeusta</i> . . . . .	302
<i> dubia</i> . . . . .	280	<b>OSPHYENS.</b>	300
<i> flavicornis</i> . . . . .	295	<b>PELECINA</b>	
<i> Goryi</i> . . . . .	295	<i> bipunctata.</i> . . . . .	302
<i> quercina</i> . . . . .	280	<b>PHILOIOTRYA</b>	268
<i> rufipes</i> . . . . .	293	<i> rufipes</i> . . . . .	268
<i> serrata</i> . . . . .	288	<i> Vaudoueri</i> . . . . .	271
<i> undata</i> . . . . .	256	<b>PIMELIA</b>	
<i> variegata</i> . . . . .	284	<i> canaliculata</i> . . . . .	290
<b>MELANDRYENS</b>	276	<i> serrata</i> . . . . .	287
<b>MELYRIS.</b>		<b>PTILINUS</b>	
<i> testaceus</i> . . . . .	298	<i> alni</i> . . . . .	282

<i>bisfasciatus</i> . . . . .	282
<b>SERROPALPAIRES</b> . . . . .	267
<b>SERROPALPIENS</b> . . . . .	235
<b>SERROPALPUS</b> . . . . .	273
<i>barbatus</i> . . . . .	274
<i>bifasciatus</i> . . . . .	282
<i>canaliculatus</i> . . . . .	290
<i>caraboides</i> . . . . .	287
<i>dubius</i> . . . . .	280
<i>humeralis</i> . . . . .	233
<i>laevigatus</i> . . . . .	263
<i>quadrimaculatus</i> . . . . .	260
<i>striatus</i> . . . . .	273
<i>naturalis</i> . . . . .	296
<i>variegatus</i> . . . . .	284
<i>Vaudoueri</i> . . . . .	271
<b>TELEPHORUS</b>	
<i>bipunctatus</i> . . . . .	302

<b>TENEBRIO</b>	
<i>dubius</i> . . . . .	290
<i>rnfsibarbis</i> . . . . .	287
<b>TETRATOMA</b> . . . . .	243
<i>ancora</i> . . . . .	246
<i>dermestoides</i> . . . . .	244
<i>Desmarestii</i> . . . . .	213
<i>fungorum</i> . . . . .	214
<b>TÉTRATOMIENS</b> . . . . .	243
<b>XILYTA</b>	
<i>ferruginea</i> . . . . .	277
<i>buprestoides</i> . . . . .	264
<b>ZILORA</b> . . . . .	276
<i>ferruginea</i> . . . . .	277
<b>ZONITIS</b>	
<i>clavipes</i> . . . . .	302
<i>testacea</i> . . . . .	298

## ERRATA.

P. 242 ligne 30 }  
 et p. 243 ligne 1 } au lieu de *tifasciata*, mettez : *triguttata*.

P. 295, ligne 25 au lieu de  $\mu\acute{o}\kappa\acute{\epsilon}\zeta\epsilon\text{-}\theta\omicron\omicron\varsigma$ , lisez :  $\mu\omicron\kappa\eta\varsigma\text{-}\eta\tau\omicron\varsigma$ .

Ajoutez p. 266, après la description de la *Dircaea laevigata*: ses différents états ont été étudiés et décrits par M. PERRIS, in Mémoires de la Soc. r. des sc. de Liège, t. 10. 1853. p. 243. pl. 5. fig. 47-55- — *Id.* tiré à part, p. 20. fig. *Id.*

TABLEAU MÉTHODIQUE  
DES  
COLÉOPTÈRES LONGIPÈDES  
DE FRANCE.

---

PREMIER GROUPE.

MORDELLIDES.

PREMIÈRE FAMILLE. *Mordelliniens.*

*TOMOXIA*, A. Costa.

*Bucephala*, Costa.

*MORDELLA*, Linné,

<i>Duodecim-punctata</i> , Rossi.	<i>Basalis</i> , A. Costa.
<i>Maculosa</i> , Naezen.	<i>Decora</i> , Chevrolat.
<i>Albo-signata</i> , (Dejean).	<i>Aeuleata</i> , Linné.
<i>Gacognii</i> , Mulsant.	<i>Brachyura</i> , Mulsant.
{ <i>Fasciata</i> , Fabricius.	<i>Sulcicauda</i> , (Reiche).
{ Var ? <i>coronata</i> , A. Costa.	<i>Viridipennis</i> , (Reiche).

*MORDELLISTENA*, A. Costa.

<i>Abdominalis</i> , Fabricius.	<i>Stricta</i> , A. Costa.
<i>Humeralis</i> , Linné.	<i>Tarsata</i> , (Cl. Rey).
<i>Lateralis</i> , Olivier.	<i>Stenidea</i> , Mulsant.
<i>Inæqualis</i> , Mulsant.	<i>Perroudi</i> , Mulsant.
<i>Episternalis</i> , Mulsant.	<i>Confinis</i> , A. Costa.
<i>Liliputiana</i> , Mulsant.	{ <i>Minima</i> , A. Costa.
<i>Grisea</i> , (Frøhlich).	{ Var ? <i>Perrisi</i> , Mulsant.
<i>Subtruncata</i> , Mulsant.	{ Var ? <i>trilineata</i> , Mulsant.
<i>Pumila</i> , Gyllenhal.	<i>Artemisiæ</i> , (Rey).

*STENALIA*, Mulsant.

*Testacea*, Fabricius.

DEUXIÈME FAMILLE. **Anaspicus.**

ANASPIS, Geoffroy.

Monilicornis, <i>Mulsant.</i>	Ruficollis, <i>Fabricius.</i>
Rufilabris, ( <i>Sturm</i> ) <i>Gyllenhal.</i>	Thoracica, <i>Linné.</i>
Frontalis, <i>Linné.</i>	Flava, <i>Linné.</i>
Forcipata, <i>Mulsant.</i>	Arctica, <i>Zetterstedt.</i>
Labiata, <i>Ach. Costa.</i>	Subtestacea, <i>Stephens.</i>
Geoffroyi, <i>Muller.</i>	Maculata, ( <i>Geoffroy</i> ) <i>Fourcroy.</i>

SILARIA, *Mulsant.*

Brunnipes, ( <i>Rey</i> ).	Chevolati, <i>Mulsant.</i>
Latiuscula, ( <i>Rey</i> ).	Quadripustulata, <i>Muller.</i>
Varians, <i>Mulsant.</i>	

PENTARIA, *Mulsant.*Sericaria, *Mulsant.*TROISIÈME FAMILLE. **Serapticus.**SCHAPTIA, *Latreille.*

Fusca, <i>Latreille.</i>	Minuta, <i>Mulsant.</i>
Ophthalmica, ( <i>Rey</i> ).	

TROTOPMA, *De Kiesenwetter.*Pubescens, *De Kiesenwetter.*

## DEUXIÈME GROUPE.

## RHIPIPHORIDES.

PREMIÈRE FAMILLE. **Rhipiphoricus.**METOECUS, (*Dejean*) *Gerstaecker.*Paradoxus, *Linné.*RHIPIPHORUS, *Fabricius. Chevrolat.*

Bimaculatus, <i>Fabricius.</i>	Rufipennis, .
Flabellatus, <i>Fabricius.</i>	

DEUXIÈME FAMILLE. **Myodites.**MYODITES, *Latreille.*Subdipterus, *Fabricius.*TROISIÈME FAMILLE. **Ptilophoricus.**PTILOPHORUS, *Dejean.*Dufourii, *Latreille.*

# TABLE DES LONGIPÈDES

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

<b>ANASPIENS.</b>	389
<b>ANASPIS.</b>	391
<i>arctica.</i>	419
<i>atra.</i>	397
<i>bicolor.</i>	408
<i>biguttata.</i>	408
<i>brunnea.</i>	422
<i>collaris.</i>	433
<i>depressa.</i>	431
<i>fasciata.</i>	409
<i>ferruginea.</i>	382
<i>flava.</i>	417
<i>flava.</i>	421
<i>flavescens.</i>	361
<i>forcipata.</i>	402
<i>frontalis.</i>	396
<i>frontalis.</i>	398
<i>fusca.</i>	422
<i>fuscescens.</i>	415
<i>Geoffroyi.</i>	407
<i>hameralis.</i>	408, 409, 410, 411
<i>labiata.</i>	402
<i>lateralis.</i>	399, 403
<i>lurida.</i>	421
<i>maculata.</i>	423
<i>melanopa.</i>	424
<i>melanostoma.</i>	393
<i>monilicornis.</i>	392
<i>nigra.</i>	396, 431
<i>nigricollis.</i>	409
<i>obscura.</i>	424
<i>pallida.</i>	425
<i>pulicaria.</i>	403, 431
<i>quadrimaculata.</i>	409, 437
<i>quadrinotata.</i>	411
<i>quadripunctulata.</i>	411, 436
<i>ruficollis.</i>	412
<i>rufilabris.</i>	395

<i>sericans.</i>	440
<i>subtestacea.</i>	420
<i>thoracica.</i>	413, 418
<i>thoracica.</i>	414
<i>variegata.</i>	365
<i>vulcanica.</i>	409
<b>DIRCAEA.</b>	
<i>fuscula.</i>	443
<i>sericea.</i>	443
<b>EMENANDIA.</b>	
<i>bimaculata.</i>	459
<i>flabellata.</i>	462
<b>EVANIOCERA.</b>	
<i>Dufourii.</i>	469
<i>Borgi.</i>	469
<b>MELANDRYA.</b>	
<i>fusca.</i>	443
<b>MELYRIS.</b>	
<i>dubius.</i>	413
<b>METOEUS.</b>	453
<i>paradoxus.</i>	453
<b>MORDELLA.</b>	327
<i>abdominalis.</i>	357
<i>aculeata.</i>	340, 346
<i>aculeata.</i>	353
<i>albo-signata.</i>	333
<i>ambigua.</i>	466
<i>angustata.</i>	357
<i>arctica.</i>	419
<i>atomaria.</i>	531
<i>atra.</i>	396
<i>aurofasciata.</i>	346
<i>axillaris.</i>	461
<i>basalis.</i>	346
<i>bicolor.</i>	357, 368
<i>biguttata.</i>	324, 408
<i>bimaculata.</i>	425, 458
<i>bipunctata.</i>	345, 425



<i>hipustulata</i> . . . . .	438
<i>brachyura</i> . . . . .	354
<i>brevicauda</i> . . . . .	354, 385
<i>briantea</i> . . . . .	343
<i>brunnea</i> . . . . .	362
<i>chiragra</i> . . . . .	387
<i>clavicornis</i> . . . . .	396
<i>collaris</i> . . . . .	361, 366
<i>coronata</i> . . . . .	344
<i>decora</i> . . . . .	349
<i>dorsalis</i> . . . . .	366
<i>duodecim punctata</i> . . . .	327
<i>elongata</i> . . . . .	379
<i>erythrogaster</i> . . . . .	454
<i>fasciata</i> . . . . .	339
<i>fasciata</i> . . . . .	324, 440
<i>fasciolata</i> . . . . .	343
<i>ferruginea</i> . . . . .	362
<i>flabellata</i> . . . . .	462
<i>flava</i> . . . . .	418
<i>flavescens</i> . . . . .	361
<i>flavifrons</i> . . . . .	400
<i>frontalis</i> . . . . .	396, 400
<i>fusca</i> . . . . .	361, 422
<i>Gacognii</i> . . . . .	335
<i>grisea</i> . . . . .	376
<i>guttata</i> . . . . .	331
<i>helvola</i> . . . . .	369
<i>humeralis</i> . . . . .	360, 366, 387, 408
<i>interrupta</i> . . . . .	343
<i>iriformis</i> . . . . .	340
<i>irrorata</i> . . . . .	331
<i>larvata</i> . . . . .	453
<i>lateralis</i> . . . . .	364, 399
<i>maculosa</i> . . . . .	331
<i>melanopa</i> . . . . .	424
<i>multipunctata</i> . . . . .	328
<i>murina</i> . . . . .	346
<i>Neuvaldegiana</i> . . . . .	362
<i>nigra</i> . . . . .	358, 396
<i>nigricollis</i> . . . . .	409, 425
<i>obscura</i> . . . . .	424
<i>octo-punctata</i> . . . . .	323

<i>pallida</i> . . . . .	425
<i>paradoxa</i> . . . . .	454
<i>parvula</i> . . . . .	385
<i>pectinata</i> . . . . .	462
<i>perlata</i> . . . . .	328
<i>perspicillata</i> . . . . .	349
<i>picta</i> . . . . .	324
<i>pumila</i> . . . . .	379
<i>pusilla</i> . . . . .	369, 371
<i>quadripustulata</i> . . . . .	411
<i>ruficeps</i> . . . . .	369
<i>ruficollis</i> . . . . .	413
<i>rufilabris</i> . . . . .	397
<i>seriato-guttata</i> . . . . .	345
<i>sericea</i> . . . . .	324
<i>sex punctata</i> . . . . .	328
<i>stricta</i> . . . . .	381
<i>subcoeca</i> . . . . .	345
<i>sulcicauda</i> . . . . .	354
<i>testacea</i> . . . . .	387, 421
<i>thoracica</i> . . . . .	413, 415, 418
<i>tricuspidata</i> . . . . .	459
<i>troglodites</i> . . . . .	375
<i>variegata</i> . . . . .	363, 366
<i>ventralis</i> . . . . .	357
<i>villosa</i> . . . . .	346
<i>viridipennis</i> . . . . .	355
<b>MORDELLIDES</b> . . . . .	320
<b>MORDELLIENS</b> . . . . .	321
<b>MORDELLISTENA</b> . . . . .	356
<i>abdominalis</i> . . . . .	357
<i>Artemisiae</i> . . . . .	385
<i>brevicauda</i> . . . . .	383
<i>confinis</i> . . . . .	383
<i>episternalis</i> . . . . .	371
<i>grisea</i> . . . . .	376
<i>humeralis</i> . . . . .	360
<i>inequalis</i> . . . . .	368
<i>lateralis</i> . . . . .	364
<i>liliputiana</i> . . . . .	374
<i>minima</i> . . . . .	385
<i>parvula</i> . . . . .	385
<i>Perrisii</i> . . . . .	384

<i>Perroudi</i> . . . . .	382	<i>apicalis</i> . . . . .	464
<i>picipes</i> . . . . .	369	<i>bicolor</i> . . . . .	459
<i>pumila</i> . . . . .	379	<i>bimaculatus</i> . . . . .	456
<i>stenidea</i> . . . . .	381	<i>carinthiacus</i> . . . . .	459
<i>stricta</i> . . . . .	380	<i>ferrugineus</i> . . . . .	461
<i>subtruncata</i> . . . . .	377	<i>flabellatus</i> . . . . .	461
<i>tarsata</i> . . . . .	381	<i>fulvipennis</i> . . . . .	463, 464
<i>trilineata</i> . . . . .	384	<i>lituratus</i> . . . . .	459
<b>MYODES</b>		<i>paradoxus</i> . . . . .	454
<i>Dorthesii</i> . . . . .	466	<i>rufipennis</i> . . . . .	463
<i>subdipterus</i> . . . . .	466	<i>subdipterus</i> . . . . .	466
<b>MYODIENS</b> . . . . .	465	<b>SCRAPTIA</b> . . . . .	442
<b>MYODITES</b> . . . . .	465	<i>dubia</i> . . . . .	443
<i>Dorthesii</i> . . . . .	466	<i>fusca</i> . . . . .	443
<i>subdipterus</i> . . . . .	466	<i>fuscula</i> . . . . .	443, 447
<b>NATIRICA</b>		<i>minuta</i> . . . . .	446
<i>meridionalis</i> . . . . .	361	<i>ophthalmica</i> . . . . .	445
<b>PELECOTOMA</b>		<b>SCRAPTIENS</b> . . . . .	441
<i>Dufourii</i> . . . . .	469	<b>SILARIA</b> . . . . .	426
<i>Frivaldskyi</i> . . . . .	469	<i>brunnipes</i> . . . . .	427
<i>Stevenii</i> . . . . .	469	<i>Chevrolati</i> . . . . .	434
<b>PENTARIA</b> . . . . .	459	<i>latiuscula</i> . . . . .	429
<i>sericaria</i> . . . . .	459	<i>quadripnstulata</i> . . . . .	455
<b>PLESIANASPIS</b>		<i>varians</i> . . . . .	451
<i>flava</i> . . . . .	418, 421, 422	<b>STENALIA</b> . . . . .	387
<i>thoracica</i> . . . . .	415	<i>testacea</i> . . . . .	387
<b>PTILOPHORIENS</b> . . . . .	468	<b>TOMOXIA</b> . . . . .	322
<b>PTILOPHORUS</b> . . . . .	468	<i>bucephala</i> . . . . .	325
<i>Dufourii</i> . . . . .	469	<b>TROTOMMA</b> . . . . .	449
<i>Frivaldskyi</i> . . . . .	469	<i>pubescens</i> . . . . .	449
<b>RHIPIPHORIDES</b> . . . . .	451		
<b>RHIPIPHORIENS</b> . . . . .	452		
<b>RHIPIPHORUS</b> . . . . .	456		
<i>annulatus</i> . . . . .	454		

TABLEAU MÉTHODIQUE  
DES  
COLÉOPTÈRES LATIPENNES  
DE FRANCE.

---

PREMIER GROUPE.

**LAGRIDES.**

LAGRIA, Fabricius.

Atripes *B. Mulsant et Guillebeau*,  
Hirta, *Linné*.  
Nudipennis ? *Mulsant*.  
Depilis, *Chevrolat*.  
Glabrata, *Olivier*.

DEUXIÈME GROUPE.

**PYTHIDES.**

PYTHO, Latreille.

Depressus, *Linné*.

TROISIÈME GROUPE.

**PYROCHROIDES,**

PYROCHROA, Geoffroy.

Coccinea *Linné*.  
Satrapa, *Schrank*.  
Pecticornis, *Linné*.

---

# TABLE DES LATIPENNES

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

<b>AUCHENIA.</b>	
<i>hirta</i> . . . . .	489
<b>CANTHARIS.</b>	
<i>coccinea</i> . . . . .	506
<i>pectinicornis</i> . . . . .	514
<i>serraticornis</i> . . . . .	514
<b>CHRYSOMELA.</b>	
<i>hirta</i> . . . . .	489
<b>COCCINELLA.</b>	
<i>hirta</i> . . . . .	489
<b>CRYPTOCEPHALUS.</b>	
<i>hirtus</i> . . . . .	489
<b>CUCUJUS.</b>	
<i>castaneus</i> . . . . .	500
<i>cæruleus</i> . . . . .	499-500
<i>festivus</i> . . . . .	499
<b>LAGRIA.</b> . . . . .	484
<i>atripes</i> . . . . .	485
<i>depilis</i> . . . . .	495
<i>glabrata</i> . . . . .	495
<i>hirta</i> . . . . .	487
<i>nudipennis</i> ? . . . . .	492
<i>pubescens</i> . . . . .	489
<i>tristis</i> . . . . .	496

<b>LAGRIDES</b> . . . . .	484
<b>LAMPYRIS.</b>	
<i>coccinea</i> . . . . .	503
<i>pectinicornis</i> . . . . .	514
<i>rubens</i> . . . . .	511
<b>PYROCHROA</b> . . . . .	504
<i>coccinea</i> . . . . .	505
<i>coccinea</i> . . . . .	511
<i>pectinicornis</i> . . . . .	515
<i>purpurata</i> . . . . .	506-511
<i>rubens</i> . . . . .	511
<i>ruberrima</i> . . . . .	511
<i>rubra</i> . . . . .	506-514
<i>satrapa</i> . . . . .	510
<b>PYROCHROIDES.</b> . . . .	504
<b>PYTHIDES</b> . . . . .	498
<b>PYTHO.</b> . . . . .	498
<i>castaneus</i> . . . . .	500
<i>cæruleus</i> . . . . .	500
<i>depressus</i> . . . . .	499
<i>festivus</i> . . . . .	500
<b>TENEBRIO.</b>	
<i>depressus</i> . . . . .	499
<i>lignarius</i> . . . . .	499
<i>planus</i> . . . . .	500
<i>villosus</i> . . . . .	489

# TABLE ALPHABÉTIQUE

## DES ESPÈCES DÉCRITES.

### Coléoptères.

ADONIA interrogans . . . . .	139
ANATIS Circe . . . . .	142
ANISOSTICTA Dorniana. . . . .	136
ASPIDIMERUS ? stellaris . . . . .	151
ATHOUS analis . . . . .	89
— — cylindricollis . . . . .	82
— — Dejeanii . . . . .	64
— — escorialensis. . . . .	71
— — fuscicornis . . . . .	67
— — Godarti . . . . .	75
— — olbiensis. . . . .	93
— — subtruncatus . . . . .	86
— — titanus . . . . .	60
— — vestitus . . . . .	79
BOSTRICHUS alni . . . . .	111
BRACHYACANTHA albifrons . . . . .	149
— 10 pustulata . . . . .	149
CARDIOPHORUS versicolor . . . . .	9
CHILOCORUS monachus . . . . .	147
CHRYSOMELA Ludovicæ . . . . .	12
CISTELA serrata . . . . .	21
CLEIS lycia . . . . .	143
COCCINELLA juliana . . . . .	141
COELOPHORA symbolica . . . . .	145
CTENIOPUS . . . . .	31
— — altaicus. . . . .	32
— — lutens . . . . .	33
— — pallidus . . . . .	33
— — sulfurcus . . . . .	33
— — sulphuripes . . . . .	34

DIACANTHUS aeratus. . . . .	97
EPILACHNA serva . . . . .	151
ERYX anthracina . . . . .	23
— mauritanica. . . . .	23
EXOCENTRUS punctipennis . . . . .	103
GONODERA metallica . . . . .	20
HARMONIA dionea . . . . .	140
HELIOTAURUS . . . . .	36
— — abdominalis . . . . .	39
— — anceps . . . . .	41
— — angusticollis . . . . .	42
— — cœruleus . . . . .	43
— — distinctus . . . . .	45
— — erythrogaster. . . . .	42
— — marrocanus . . . . .	52
— — nigripennis . . . . .	37
— — ovalis . . . . .	40
— — Perroudi . . . . .	43
— — Reichii . . . . .	50
— — ruficollis . . . . .	47
— — rufiventris. . . . .	42
HELOPS pellucidus . . . . .	15
HIPPODAMIA leporina. . . . .	155
HYMENORUS rugicollis . . . . .	20
ISOMIRA corsica . . . . .	22
LEIS Calypso . . . . .	143
MELASIA n. g. . . . .	160
— — gagatina . . . . .	161
— — tarsalis. . . . .	163
MENESIA n. g. . . . .	157
— — Perrisi . . . . .	158
OCHTHERPHILUS n. g. . . . .	1
— — flexuosus . . . . .	2



OMOPHILUS . . . . .	52
— — armillatus. . . . .	52
— — orientalis. . . . .	53
— — scutellaris . . . . .	56
— — syriacus . . . . .	57
ORCHESIA maculata . . . . .	108
ORCUS cerberus . . . . .	148
PHOLIDUS n. g. . . . .	7
— — insignis . . . . .	9
PLEGADERUS hispidulus . . . . .	5
PODONTA . . . . .	25
— — alpina. . . . .	30
— — Aubei . . . . .	29
— — lugubris . . . . .	26
— — nigrita . . . . .	27
PROXYLEA conglobata . . . . .	144
PYGIDIPHORUS. n. g. . . . .	319
Caroli . . . . .	320
SCYMNUS lacustris . . . . .	153
— — ornatus . . . . .	152
STERNOLOPHUS . . . . .	171
— — noticollis . . . . .	171
— — rufipes. . . . .	173
TROPISTERNUS . . . . .	176
— — apicipalpis . . . . .	169

UPINELLA n. g. . . . .	17
— — aterrima. . . . .	18

**Larves.**

AGNATHUS decoratus . . . . .	114
AMPHIMALLUS marginatus . . . . .	100
ELENOPHORUS collaris . . . . .	153
LUDIUS ferrugineus . . . . .	190

**Hémiptères - Héteroptères.**

CAPSUS Yersini . . . . .	129
— — Foreli . . . . .	150
DERULA n. g. . . . .	123
— — flavoguttata . . . . .	121
SCIOCORIS auritus. . . . .	126
STERNODONTUS n. g. . . . .	119
— — obtusus . . . . .	120

**Lépidoptères.**

ACIDALIA asbetaria. . . . .	523
-----------------------------	-----

**Oiseaux-Mouches**

TRACHILUS Idaliae . . . . .	187
— — Aspasiae . . . . .	188

Voir pour les monographies des Barpipalpes, des Longipèdes et des Latipennes les tables ci-devant











